

1870



ARCHIV  
FÜR  
ANTHROPOLOGIE

---

ARCHIV  
FÜR  
ANTHROPOLOGIE

ORGAN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR  
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE  
BEGRÜNDET VON A. ECKER UND L. LINDENSCHMIT

HERAUSGEGEBEN VON

JOHANNES RANKE

GENERALSEKRETÄR DER DEUTSCHEN ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UND

GEORG THILENIUS

NEUE FOLGE — BAND II

(DER GANZEN REIHE XXX. BAND)

MIT 26 TAFELN UND 249 EINGEDRUCKTEN ABBILDUNGEN

---

BRAUNSCHWEIG

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1904

Alle Rechte, namentlich das der Übersetzung in fremde Sprachen,  
vorbehalten

# INHALTSVERZEICHNIS.

## I. Abhandlungen. — Kleinere Mitteilungen.

|   | Seite |
|---|-------|
| <u>I. Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatazierung auf den Marshallinseln nebst technologischen, philologischen und ethnologischen Notizen. Mit 6 Tafeln und 50 Abbildungen im Text. Von Augustin Krämer, Prof. Dr., Marineoberstabsarzt, Kiel. . . . .</u> | 1     |
| <u>II. Die ununterbrochene Besiedelung Velem St. Veits. Mit 63 Abbildungen im Text. Von Kálmán Freiherr von Miske, Kosszeg. . . . .</u>   | 29    |
| <u>III. Die sogenannten magischen Spiegel und ihr Gebrauch. Von E. Bälz, Dr., Professor, Tokio . . .</u>  | 42    |
| <u>IV. Die Ptolemäer. Ein Beitrag zur historischen Anthropologie. Mit 7 Tafeln und 40 Abbildungen im Text. Von weiland Karl Freiherr von Ujfalvy, Florenz. . . . .</u>  | 73    |
| <u>V. Die Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gufstätte mit Berücksichtigung der Antimon-Bronzefrage. Mit 62 Abbildungen im Text. Von Kálmán Freiherr von Miske, Kosszeg. . . . .</u>  | 124   |
| <u>VI. Die Datierung des Stonehenge. Mit 1 Abbildung im Text. Von Oskar Montelius, Dr., Professor, Stockholm. . . . .</u>   | 139   |
| <u>VII. Beiträge zur anthropologischen Untersuchung des harten Gammens. Mit 1 Tafel und 1 Abbildung im Text. Von Moritz Bauer, Dr., Hamburg. . . . .</u>  | 151   |
| <u>VIII. Ethnographisches aus Südwest-Frankreich. (II. Das Baskenland.) Mit 10 Abbildungen im Text. Von L. Laloy, Dr., Bordeaux. . . . .</u>  | 185   |
| <u>IX. Ethnographische Wandlungen in Turkestan. Von Richard Karutz, Dr., Lübeck. . . . .</u>  | 194   |
| <u>X. Der Schloßberg bei Burg im Spreewald. Von A. Voß, Dr., Geheimrat, Berlin. . . . .</u>   | 222   |
| <u>XI. Die Tierwelt der Ansiedlungen am Schloßberge zu Burg an der Spree. Ein Beitrag zur algermanischen Viehwirtschaft. Mit 5 Tafeln und 1 Abbildung im Text. Von J. Ulrich Duerst, Dr., Privatdozent, Zürich. . . . .</u>                                       | 233   |
| <u>XII. Das Fehlgemetz und seine Verallgemeinerung durch Fochner und Pearson in ihrer Tragweite für die Anthropologie. Mit 16 Abbildungen im Text. Von Karl Ernst Raake, Dr., Arosa, und Richard Greiner, Dr., Arosa. . . . .</u>                                 | 295   |

## 2. Neue Bücher und Schriften.

|  |    |
|--|----|
| A. Rutot, L'état actuel de la question de l'antiquité de l'homme (Bull. Soc. Belge de Géologie etc. Tom XVII, Bruxelles 1903). (Aurel von Türök) . . . . .   | 47 |
| Gustav Retzius, Crania suecica antiqua, eine Darstellung der schwedischen Menschenschädel aus dem Steinzeitalter, der Bronze- und der Eisenzeit, sowie ein Blick auf die Forschungen über die Rassencharaktere der europäischen Völker. Mit 100 Tafeln in Lichtdruck. Stockholm 1903. Folio. — Gustav Retzius und Carl M. Fürst, Anthropologia suecica, Beiträge zur Anthropologie der Schweden. Nach den auf Veranlassung der schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie in den Jahren 1897 und 1898 angeführten Erhebungen ange-arbeitet und zusammengestellt von Gustav Retzius und Carl M. Fürst. Mit 130 Tabellen, 14 Karten und 7 Proportions tafeln in Farbendruck, vielen Kurven und anderen Illustrationen. Stockholm 1902. — Gustav Retzius, Das Menschenhirn. (Julius Kollmann) . . . . . | 51 |
| J. R. Steinmetz, Rechtsverhältnisse von eingeborenen Völkern in Afrika und Ozeanien. Beantwortungen des Fragebogens der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin. Berlin, Julius Springer, 1903. (Christian Eckert) . . . . .  | 61 |

|   |     |
|---|-----|
| <u>Ludwig Katona, Die Literatur der ungarischen Volksmärchen. Kelti Szemle (Revue orientale, redigiert von Dr. Ign. Kúnos und Beruh. Munkacsy. In Komm. bei Harrassowitz, Leipzig) II (1891) X, S. 138 u. 283. — Katona Lajos XVII. Századbeli orologus könyve. (Ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Teufelbeschwörungsbuchlein. (Geschöpft aus einer Handschrift der dem Franziskanerorden geborenen Gyöngyösi-Bibliothek. (Separatdruck aus der Zeitschrift „Ethnographia“ Jahrg. 1902. Budapest, Victor Hornyanszky. S. 21.) — Katona Lajos, A Remete és az Angyal. Ludwig Katona, Der Einsiedler und der Engel. (Separatdruck aus der Zeitschrift „Ethnographia“ Jahrg. 1900. Budapest, Victor Hornyanszky. S. 24.) — Katona Lajos, A Virginia-Codex Ferencz-Legendái. Katona, Die Franziskanerlegenden aus dem Virginia-Codex. (Separatdruck aus den Berichten der ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1903. Budapest, Victor Hornyanszky. S. 15.) (Karl Freiherr von Ujfalvy)</u> | 62  |
| Sophus Müller, Das Sonnenbild von Trundholm. (Nordiske Fortidsminder, Bd. I, Heft 5, 6. (Mit 1 Tafel.) (Hans Seger)   | 64  |
| Moritz Alsberg, Erbliche Entartung bedingt durch soziale Einflüsse. Kassel und Leipzig, Th. G. Fischer, 1903. (Ferdinand Birkner)   | 142 |
| <u>Y. Kogauei, Messungen an chinesischen Soldaten. (Mitt. med. Fakultät Kaiserl. Jap. Univ. Tokio. Bd. VI, Heft 2, 1903. (Ferdinand Birkner)</u>  | 143 |
| <u>Adolf Bastian, Die Lehre vom Denken. Zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Psychologie in Anwendung auf die Geisteswissenschaften. II. Teil. Ferd. Dümmler, Berlin 1903. (Thomas Achelis)</u>  | 143 |
| <u>Lortet et Gaillard, La femme momifiée de l'ancienne Égypte. (Arch. Mus. d'hist. natur. Lyon, Tom. VIII.) (M. Schlusser)</u>  | 202 |
| <u>P. Matschie, Über einen Gorilla aus Deutsch-Ostafrika. Ges. naturf. Freund. Berlin 1903. — Derselbe, Bemerkungen über die Gattung Gorilla. Ebenda 1904. — Derselbe, Einige Bemerkungen über die Schimpansen. Ebenda 1904. (Paul Bartels)</u>   | 205 |
| <u>Ribbe, Zwei Jahre unter den Kannibalen der Salomonsinseln. (F. Graebner)</u>   | 207 |
| <u>Richard Semon, Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guinea und den Molukken. Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1903. (F. Grabowsky)</u>   | 333 |
| <u>U. T. Siralius, Ornamente auf Birkenrinde und Fell bei den Ostjaken und Wogulen. Societé Finnougrienne. Helsingfors 1904. (Dr. B. Laufer)</u>  | 333 |
| <u>Dr. v. Hansemann, Das menschliche Skelett. Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmediziner zum Gebrauche bei Ansgabungen. Berlin, August Hirschwald, 1904. (G. Thilenius)</u>   | 334 |
| <u>H. Beblen, Der Pfäh und das Pfählen bei den Römern und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit. (J. Ranke)</u>  | 334 |
| <b>3. Aus der russischen Literatur. Von Ludwig Stieda.</b>  |     |
| <u>A. A. Spizyn, Kurgane mit gefärbten Skeletten. (Schriften der K. Russischen Archäologischen Gesellschaft, Bd. XI, 1. und 2. Heft. Neue Serie: Arbeiten der slawische und russische Archäologie, herausgegeben unter der Redaktion des Vorsitzenden der Abteilung S. Th. Platonow. 4. Buch. St. Petersburg 1903. S. 53 bis 153)</u>   | 66  |
| <u>Nachrichten der Kaiserlichen Archäologischen Kommission, Heft 1 bis 5. St. Petersburg 1901 bis 1903</u>  | 146 |
| <u>Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der Universität Moskau, III. Jahrgang, Moskau 1902</u>   | 203 |

## I.

# Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung<sup>1)</sup> auf den Marshallinseln nebst technologischen, philologischen und ethnologischen Notizen.

Von

Prof. Dr. Augustin Krämer.

Wenn man die bislang noch so wenig bekannte Ornamentik Mikronesiens überblickt, so gewahrt man auf den am Knie zwischen den Karolinen und Gilbertinseln eingekleiteten Marshallinseln eine gewisse Eigenart, namentlich in Beziehung auf die Kleidmatten, die im ersten Augenblicke völlig selbständig erscheint. Bis zu einem gewissen Grade ist sie es auch, weniger freilich betreffs der Ornamente selbst, als vielmehr betreffs der Anordnung derselben. Die Gesetze der Anordnung sind es aber, welche vornehmlich unser Interesse in Anspruch nehmen müssen, weil nämlich aus ihnen bestimmte Beziehungen klarer hervergehen, als aus den fast gleichmäßig und gleichartig über den Erdball hin verbreiteten Ornamenten. So haben wir z. B. bei der Tatauierung auf den Karolinen und Marshallinseln zwar ziemlich dieselben Ornamente, aber diese tragen eine verschiedenartige Bezeichnung; andererseits ist die Anordnung auf den Karolinen eine wesentlich andere als auf den Marshallinseln, wobei aber trotzdem gleichsinnige Bezeichnungen für gewisse verschieden lokalisierte Teile auftreten, woraus sicherer eine einheitliche Genese hervorgeht.

Eine noch deutlichere Sprache redet die Ornamentik der Kleidmatten. Denn hier treten gemäß der Art der Herstellung durch Flechten lineare und geometrische Ornamente auf, wie wir sie nicht allein aus dem alten Assyrien und Griechenland, sondern auch aus Amerika und Afrika kennen, kurzum von allen den Orten, wo geflochten und gewirkt wird.

Die völlige Eigenart der marshallanischen Anordnung aber belehrt uns darüber, daß die Motive nicht etwa entlehnt wurden, sondern daß die Ornamente hier entweder freie künstlerisch stilisierte Nachbildungen von Gegenständen der Natur oder des täglichen Lebens sind, oder daß zufällige oder launisch hervorgebrachte Figuren diesbezügliche Deutungen erfahren. Leider geben uns die in der Anordnung mit den marshallanischen Kleidmatten so nahe verwandten orientalischen Teppiche einen schlechten Vergleich an die Hand, da von diesen, so weit mir die Literatur bekannt ist, weder die Bedeutung der Ornamente noch die Anordnung genügend bekannt ist. Ich muß mich deshalb an die Säulenordnungen halten, von denen ja verschiedene bekannt sind, wie die dorische, jonische, korinthische usw. Innerhalb dieser wechseln die Ornamente sehr, aber die einzelnen Teile als Säulenschaft, Abakus, Archi-

<sup>1)</sup> Siehe über diese Schreibweise des Wortes Tatauierung „Die Samoainseln“, Bd. II, S. 64.  
Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.



trav usw. sind allenthalben fest vorhanden. Deshalb gebrauche ich auch das Wort *Ordnung*, um das Gesetzmäßige in der Ornamentik anzudeuten, unter Gegenüberstellung der mehr oder weniger willkürlichen und wechselnden *Ornamente*.

Leider ist, wie ich schon eben betonte, über die Ornamentik Mikronesiens noch recht wenig bekannt. Zwar hat Kubary in seiner Arbeit „Das Tätowieren in Melanesien“ speziell auf den Karolinen<sup>1)</sup>, welche in Joests Werk „Das Tätowieren“ S. 75 erschienen ist, die einheimischen Bezeichnungen zahlreicher Ornamente der Karolinen angegeben, aber leider die Übersetzungen und Bedeutungen derselben zu geben verabsäumt, obwohl er darauf hinweist, daß man aus dem genannten Studium der Marshallatauierung wohl einst näheres über die karolinische erfahren würde.

Dies scheint sich in der Tat zu erfüllen, wie man weiter unten sehen wird, wenn auch Kubarys Unterlassung große Beschränkung auferlegt. Ich will dies aber dem Dahingegangenen keineswegs zum Vorwurf machen; Kubary hat uns so viel gut Beobachtetes über jene Inseln berichtet, daß wir nur dankbar seiner gedenken können. Und er hat mehr gerade hierin getan als alle übrigen, wie z. B. Finsch<sup>2)</sup> in seinen zahlreichen Schriften, Harnsheim<sup>3)</sup>, Choris<sup>4)</sup>, die uns Zeichnungen der Tatuierung gegeben haben, ohne jeglichen Kommentar betreffs der Ornamentik. Kubary gab sogar im Joestschen Werk etliche Abbildungen der Marshallatauierung, die gleich denen von Harnsheim genau genug ausgeführt sind, um von mir zum Vergleich und als Ergänzung meiner Studien herangezogen werden zu können. Insbesondere verweise ich aber hierin auf die farbigen Abbildungen bei Choris, die Finsch mit Unrecht tadelt. Schlimmer noch steht es mit den Kleidmatten, von denen nur Finsch in seinen „Belegstücken“ einige und zwar farbig und naturgetreu produziert, freilich auch hier

ohne jede Erklärung. Merkwürdigerweise fehlen Wiedergaben der hübschen Marshallmatten in fast allen Werken der Ethnographie, und selbst Spezialwerke aus der Südsee, wie z. B. Edge-Partingtons „Album of the Weapons, Tools, Ornaments, Articles of dress of the Natives of the Pacific Islands“ bildet sie nur bruchstückweise und sehr mangelhaft ab, obwohl sie in fast allen Museen vorhanden sein dürften. Selbst Schmelzts erwähnt sie nur flüchtig in seinem ausführlichen Katalog<sup>5)</sup>. Es wird deshalb nicht unwillkommen sein, wenn ich mehrere Abbildungen solcher Matten beilege, deren Ordnung und Ornamente ich selbst an Ort und Stelle bestimmt habe und welche bei meinen übrigen Sammlungen im Stuttgarter Museum für Völkerkunde sich befinden.

Ich machte mir im Jahre 1898 einen mehrtägigen Aufenthalt auf den Marshallinseln, während dessen ich die ausgezeichnete Gastfreundschaft der Jaluit-Gesellschaft genoß, zu nutze, um etwas Licht in dieses dunkle Gebiet zu bringen, und der volle Erfolg, den ich wider Erwarten hatte, legt die Annahme nahe, daß auch auf den übrigen Inselgruppen ähnliche Verhältnisse vorwalten; denn ich glaube, daß mein Mißerfolg in selber Beziehung auf den ornamental allerdings weit tiefer stehenden Gilbertinseln nur dem Mangel eines guten Dolmetschers zur Last zu legen ist. Ein Büchlein über die Gilbertsprache gab es überdies während meines Aufenthaltes draußen noch nicht<sup>6)</sup>, obwohl eine Bibelübersetzung längst vorhanden war; aber es erschien wenigstens ein kleines Dictionary Gilbert-English im Jahre 1898 in Nantes von einem französischen Pater herausgegeben, groß genug, um mit meinen eigenen Wortsammlungen zusammen mir späterhin die Herausgabe eines leidlich vollständigen Wörterbuchs zu ermöglichen. Auf den Marshallinseln war zwar das Harnsheimische Vokabular<sup>7)</sup> vorhanden; aber weder dieses

<sup>1)</sup> Siehe vor allem „Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee, 3. Abteilung. Mikronesien“. Ann. des k. k. Hofmuseums in Wien, Bd. VIII.

<sup>2)</sup> Franz Harnsheim, „Süddeerinnerungen“ Berlin 1857.

<sup>3)</sup> Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde, Paris 1822.

<sup>4)</sup> Schmelzts-Kranze, Die ethnographisch-anthropologische Abteilung des Museums Godeffroy in Hamburg, Hamburg, Friederichsen 1881.

<sup>5)</sup> Hales, Abhandlung über die Gilbertsprache in seiner Philology and Ethnology of the U. S. Explor. Exped. Vol. 6, p. 435 war mir damals nicht zugänglich.

<sup>6)</sup> Beitrag zur Sprache der Marshallinseln. Leipzig, Thiel 1890.

noch das 1902 erschienene Steinbach-Grössersee<sup>1)</sup> „Wörterbuch der Marshallsprache“, und Senffts Wörterverzeichnis<sup>2)</sup> kann, so verdienstlich auch an und für sich diese Arbeiten sind, mit dem Prattschen „Grammar and Dictionary of the Samoan language“ verglichen werden, ein Buch, das ich als Muster zum Gebrauch für ethnologische Forschungen aufstellen möchte. Wenn ich hier zur Veranschaulichung noch erwähne, daß ich diesem großartigen Werke durch Übersetzung zahlreicher samoanischer Überlieferungen und Sammlungen naturwissenschaftlicher Objekte noch einige 100 Vokabeln und Bedeutungen hinzuzufügen vermag, so erhellt daraus, wie relativ reich an Vokabeln diese Sprachen sind. Sind doch z. B. von Samoa nun über 12000 bekannt. Und so sind es leider zu früh dahingegangenen Stabsarztes Dr. Steinbach Worte betreffs der Reichhaltigkeit der Marshallsprache eher unter- als überschätzend. Sein Vokabular weist nämlich nur etwa 3000 Worte auf, wobei Herrn Grössers nachträgliche Zutaten mit einbegriffen sind. So ist es erklärbar, wenn Steinbach bescheiden meint, daß seine Sammlung hinter dem wirklichen Sprachschatz wohl zwei bis drei mal zurückstände. Wie viele Worte nur aus der folgenden Arbeit dem Vokabular hinzugefügt werden können, kann man beim Vergleich leicht finden. Andererseits zeigt St.-G. Büchlein aber,

mit Ausnahme der eben bis jetzt noch völlig unbeachtet gebliebenen Ornamentik, eine erstaunliche Fülle von Wörtern betreffs der Technik, und wenn man vollends die Worte über Hans- und Bootbau<sup>3)</sup>, über Edgerichte, Fauna und Flora, Krankheiten, Sitten und Gebräuche zusammenstellt, so gewahrt man, welch ein Landeskennner uns in Dr. Steinbach verloren gegangen ist, ehe er seine Erfahrungen zusammenzustellen vermochte<sup>4)</sup>. Um so dankbarer müsse wir Herrn Grösser sein, daß er das Vorliegende gerettet und bereichert hat.

Die Wortsammlungen von Hensheim, Steinbach-Grösser und Senfft liefern uns fährigen, wenn auch ohne Kommentar, neben den Zeichnungen von Hensheim, Kubary, Finseh und Choris den Beweis durch Vergleich, daß die vorliegenden Ermittlungen richtig sind.

Eine Schwierigkeit beim Gebrauch der marshallischen Wörterverzeichnisse muß ich aber hier noch erwähnen, nämlich die der verschiedenen Schreibweise der Worte. Es gibt wenig Idiome, wo dieselbe so wechselt wie hier. Dies bewirkt die so häufig unal gesprochenen Vokale und die kaum merklich hauchend oder zischend hervorgebrachten Konsonanten. Wer aber nur nach dem Gehör notirt, — und dies taten bis jetzt alle — der hört einmal so, das nächste Mal anders. Dies tritt sogar bei St.-G. hervor, wo man *likamid* und *likomid*, *momij* und *mamij*, *ingin* und *inging*, *jangini* und *jañini*, usw. an verschiedenen Stellen lesen kann. Namentlich ist auch noch nicht geklärt, ob man *elap* oder *elab*, *p* oder *b*, schreiben soll. Diese Unterschiede sind allerdings gering; größere ergeben sich aber bei den verschiedenen Autoren. So hörte ich deutlich *digenät* und *dijenät*, wo Finseh *tiginät* und St.-G. *piginiet* notieren. Ich hörte *djanogin*, wo St.-G. *djanuguen* schreibt, Hensheim *djenugue*, Senfft *djenegung* und Finseh *dschenägnuce*. Ferner schrieb ich zuerst *triginin*, später hörte ich deutlich *rägginin*; St.-G. aber sagt (*djrekanin*, der Klöppel, von *dreka* Stein), Senfft *rekenin*. Dann sei noch besonders

<sup>1)</sup> Ich gebrauche hierfür fernerhin stets die Abkürzung St.-G., erschienen 1902 bei L. Friederichsen, Hamburg.

<sup>2)</sup> A. Senfft, Wörterverzeichnis der Sprache der Marshallinseln, Zeitschr. für afrikanische und ozeanische Sprachen V, 1900. Von Grösser nicht mehr berücksichtigt, enthält es zahlreiche neue, auch für diese Arbeit wichtige Worte. Bei der ethnographischen Anwendung wird aber zur Vorsicht dringend ermahnt, da übernommen sind ohne Hinweis darauf, wie z. B. *djambin* Nekt, gut *möna* sich die Hände geben (*good morning*), *kau* Ochse (*cow* Kub), *poijen* Tausendfüß (*poison* Gift), *calabudj* Gefängnis (*Calabus*), *Ratenfalle* *kalabudj in kidjerik* (richtiger rein *kakidjerikik*), *tainann* Moskito-netz (=m. *tainann*), *kimmidj* Bohrer (*ginlet*), und endlich *longtain* für Quecksilbersalbe, da die Ärzte zu den mit der grauen Salbe Schmierenden zu *esgen* pflegen: lange Zeit, *long time*. Ein solches Verfahren ohne Kommentar muß auf das schärfste getadelt werden. Daß manche Worte an verschiedenen Stellen verschieden geschrieben auftreten, mag an schlechter Durchsicht liegen. Ferner sei noch auf das Vorhandensein zahlreicher Druckfehler aufmerksam gemacht.

<sup>3)</sup> Eine Arbeit hierüber folgt.

<sup>4)</sup> Es existiert nur eine allgemeine Beschreibung der Marshallinseln aus seiner Feder in d. Verh. der Ges. für Erdkunde Bd. 22, 1895.



und diese Nadeln werden in einer Nadelbüchse, *koba*<sup>1)</sup> in *ie*, meist aus angeschweimtem Bambus hergestellt, aufbewahrt. Rechnet man dazu noch ein kleines scharfes Stück einer dünnen Pinnanschel, *djabor* und *djeber*<sup>2)</sup> genannt, welches zum Aufschlitzen der Pandanusblätter dient, so wären die Gerätschaften erschöpft. Alle diese Dinge nun bewahrt man in einer aus Kokosblättern geflochtenen Tasche<sup>3)</sup>, *badjo*, auf, und dazu gesellt sich natürlich auch das Flechtmaterial, welches in erster Linie aus den Blättern des Pandanus odoratissimus besteht, *bullik* in *many* genannt, während die Bäume im ganzen und ihre gerne und viel genossenen Früchte *bob* heißen. Da nun das Pandanusgeflecht bei den Kleidmatten die Grundform bildet, so nennt man diese Grundform wie das Blatt kurzweg *many*<sup>4)</sup>. In dieses Grundgeflecht werden dann rote Fasern eingeflochten oder auch schwarze aufgenäht, von denen alsbald die Rede sein wird. Die Pandanusblätter zuvorderst entstammen einer sogenannten *edj*-Art („Flechtart“) und werden für die feinen Matten jung gepflückt und am Feuer getrocknet. Für die größeren Matten und für Segel nimmt man ältere Blätter, die man an der Sonne trocknen läßt und dann durch Schlagen mit einem *drüggjin*<sup>5)</sup> genannten, aus der Riesen-Tridanaschel<sup>6)</sup> gefertigten, oft recht schweren Klöppel bricht<sup>7)</sup>. Danach werden die Blätter wie ein Maßband

<sup>1)</sup> *koba* heißt nach St.-G. „zusammen“.

<sup>2)</sup> Finsch *djabor*, St.-G. *djabor*, Senfft *djabor-djeber*.

<sup>3)</sup> *badjo kimidi* nennt man den Korb für die schwarz gefärbten Fasern, die man getrennt aufbewahrt. Ein größerer Korb heißt sonst *ieb*, mit Henkel *djelli*, für Fischlein, aus Pandanusblättern geflochten, *olii*. Nach St.-G. heißt diese Tasche *olii*, während Senfft auch *olii* schreibt. Der *ieb*-Korb wäre aus einem halben, der *küli* oder *kiki* aus einem ganzen Kokoswedel geflochten. Senfft *külligin küli* geflochtener Korb, *iepa-dodo* Handkorb, *nien medjid* Henkelkorb.

<sup>4)</sup> Ich höre auch *man* dafür sagen, weiß aber nicht bestimmt, ob dies zutreffend ist. Senfft nennt das Mittelstück *ie*, was sich aber auf die ganze Matte bezieht.

<sup>5)</sup> Bei St.-G. *drekanin* geschrieben, von *dreko* Stein; Senfft *lekanin*, *rekanin*.

<sup>6)</sup> Die Muscheln der Tridana *giga*, *koabor* genannt, werden auf den Marshallinseln oft mehrere Zentner schwer.

<sup>7)</sup> Das Drehen der Blätter für das Hausdach geschieht durch Ziehen über einen scharfkantigen Stab. Es heißt *gavre*.

aufgerollt und bis zum Gebrauche aufbewahrt. Die Rollen für die feineren Matten nennt man *djedjid mang in edj*<sup>1)</sup>, die für die gröbere und die Segel *djedjid mang in bil*. Wenn man das Flechten beginnt, dann schützt man die oft bis zu 10 cm breiten und 1 bis 2 m langen Blätter in feine Striemen mittels des schon genannten *djeber*. Diese Striemen haben für die verschiedenen Matten natürlich eine verschiedene Breite und St.-G. gibt mehrere Namen für die Breiten an, so *djaber* drei Finger breit, *djenen* daunenbreit, *djerik* noch dünner (etwa 1/2 bis 1 cm), *ruar* am feinsten (2 bis 3 mm). Die roten Fasern nun entstammen einer schon von Chamisso genaunten gemeinen Kriechpflanze, der unserer Fienria ranunculoides ähnlichen *Triumfettia procumbens* Forst, *adad* genannt (Finsch *adant*). Die Haut, die Rinde der dünnen Ranken wird aufgeschlitzt und abgezogen, von der Epidermis befreit und getrocknet, wobei der Bast einen braunen bis gelbrotten Ton annimmt. Die schwarzen Fasern dagegen werden wie auf anderen Inseln aus dem Bast des Hibiscus durch Färben mit Kaneb oder Schlamm bereitet. Die Pflanze heißt *loa* oder *lö*<sup>2)</sup>, während der Bast *djab* genannt wird (nach Finsch *gill*). Die durch Ruß schwarz gefärbten Fasern<sup>3)</sup> wurden mir als *sabb* bezeichnet, während Finsch angibt, daß sie *gill-kilmed* heißen und daß die Schwarzfärbung durch die Frucht der Mangrove *dschong*, (richtiger *djong*, St.-G. *jong*) bewirkt werde. Diese würde abgeschabt und in Schnecken- oder Kokosnussschalen gekocht. In den Absud würden dann die Baststreifen gelegt und darauf im Schatten getrocknet. Auch eine Rotfärbung derselben Faser soll nach Finsch durch einen Farbstoff *ninn*, von der „Rinde“ von der Wurzel eines Baumes (? Mangrove)<sup>4)</sup> gewonnen, geschaffen werden, *gill-emtar* genannt<sup>5)</sup>. Solcher Bast befindet sich

<sup>1)</sup> O. Finsch, S. 156. *jeljit mangine*; St.-G. *djedjid* wie *ieb*. Bei Senfft erscheint *djedjid* und *djedjidie*; *mang in bil* für Segel, *mang in bob* für Schlafmatten, *mang tedj* für feine Matten, in *rabogot* schmale Rollen.

<sup>2)</sup> St.-G. *loa*, Senfft *lo*; *loa* nennt er irrtümlich die weißen Streifen in den Kleidmatten.

<sup>3)</sup> Vgl. oben den Korb *badjo kimidi* für dieselben.

<sup>4)</sup> Die Farben heißen *emtar* gelb, auch oft wie *marar* gesprochen, was Finsch wohl verlieste, dies für „rot“ zu nehmen; schwarz *kilmed*, rot *beron* (St.-G. *borö*), blau und grün *marow*.

im Museum für Völkerkunde in Berlin. *Nin* ist aber die *Morinda citrifolia*, deren Wurzelhaut auch auf Samoa und Tonga, hier *nouu* geheißt, gebraucht wird<sup>1)</sup>, und unter Zusatz von Kalk eine rote Färbung annimmt. Endlich wird noch zum Annähen der Borte *ining*, ein geädter Faden verwendet, *örr* genannt, nach Finsch *örr*<sup>2)</sup>, in feiner Art *urdjib*, und aus der Faser einer Urtiacee (Böhmeria) gewonnen<sup>3)</sup>, *armé* oder *armun* genannt. Wenn ich noch erwähne, daß auch aus Kokospalmblättern rohe Matten geflochten werden und daß die jungen, noch unentfalteten Blätter dieser Palme, *djubub in ni* genannt, das Material für die **Fächer**, *drel*, liefern, so wären damit die Pflanzenprodukte für die Flechtereie erschöpft.

Betrachten wir nun die Erzeugnisse der Flechtkunst selbst, so haben wir hauptsächlich:

1. Schlaf- und Haarmatten,
2. Kleid- und Prankmatten und
3. Fächer.

Die Schlafmatten, *djaki in babu*<sup>4)</sup>, teilen sich vornehmlich in zwei Arten, in die geflochtenen und in solche, welche durch Aneinanderheften der breitesten Striemen (*djilar*) der Pandanusblätter hergestellt werden. Die letzteren dienen, einfach gefaltet, auch zum Schutze gegen den Regen<sup>5)</sup>, gleichsam ein wandelndes Dach abgebend, wie überhaupt zum Decken. Die grob geflochtenen Matten hingegen bilden die Unterlage beim Schlafen und werden als Bodenmatten verwendet. Je nach Größe und Feinheit unterscheidet man mehrere Unterarten: *kodj* oder *djab kod* (groß), *dubego*<sup>6)</sup> und *djanging*<sup>7)</sup>.

Außerdem sind hierbei noch grobe Matten

<sup>1)</sup> Siehe: Die Samoanischen, Bd. II, S. 304.

<sup>2)</sup> So nach Senfft, der aber so den „Saum der Kleidmatten“ benennt.

<sup>3)</sup> St.-G. *armu*, Senfft *armé*. Nach Chamisso *aromá*, „in zu der Familie der Nessel (Boehmeria) gehöriger Strauch, der nur auf seichtem Grunde wächst und manchen Inseln fehlt, so z. B. Udirik und Allin, die ihren Bedarf von Ligip beziehen“ (Finsch).

<sup>4)</sup> *djab* (Finsch *dehky*) geben fast alle Autoren gleichmäßig an; St.-G. auch *hones* Matte zum Schlafen, *babu* liegen.

<sup>5)</sup> Nach St.-G. heißt diese Tragart *ihörur*; nach Ribbe sind ähnliche auf den Arminen in Gebrauch.

<sup>6)</sup> Harnsheim *djubego*, Finsch *dachbepoo*, St.-G. *djabeko* für den Fußboden, Senfft *djabeko*, *djabgo*.

<sup>7)</sup> St.-G. *jangim* und *janini*, Sitzmatten, feiner als *djab*; Senfft *djanini*.

aus Kokosblättern zu erwähnen, *djinaí* oder *djinai* genannt<sup>1)</sup>.

Am wichtigsten sind die **Kleid- und Prankmatten**, gemeinhin *ir* genannt. Sie werden in verschiedenen Größen hergestellt und sind im Gegensatze zu den Schlafmatten immer verziert. Die Breite der Flechtmasse ist hierbei nur 2 bis 3 mm. Die gewöhnlichsten, als Kleidung ehedem im Gebrauch, sind die *ir*-Matten, gewöhnlich 75 cm im Quadrat groß, aber an Ausdehnung wechselnd; je nach der Größe der Trägerin; denn hauptsächlich bilden sie das Kleid der Frau. Es werden hierzu zwei sich vollkommen gleiche Matten genommen; die eine wird schürzenartig vorn herumgeschlungen, als solche *nerir* genannt, die andere von hinten darüber gezogen und als solche *kedeligelig*<sup>2)</sup> bezeichnet (eine vordere und eine hintere Schürze). Sie werden dann in dieser Position durch eine oft an 20 m lange<sup>3)</sup> und 5 mm dicke drehrunde Gürtelschnur, welche vielmals um den Leib geschlungen wird, festgehalten. Sie heißt nach einstimmiger Angabe aller Autoren *irik*, aber auch zur Unterscheidung vom männlichen Bastrock (*in*)-Gürtel *kangr in in*, weil für die Matten (*ir*) gebraucht, *kangr in ir*. Es ist eine Schnur, welche mit Pandanus- und schwarzem Hibiscusbast umflochten ist, wie man gut auf der Taf. 6 im Heft 1 des Journ. des Mus. Godeffroy sehen kann. Solche Umflochtungen kommen auch an Tanzstäben und Speeren vor und heißen dann nach Senfft *ningbago*.

Auch die Männer tragen zuweilen die Matten schürzenartig, wie aus der Fig. 1 zu sehen, und hieß diese Tragart nach St.-G. *kal* (nach Senfft *tuman*), namentlich wenn über dem Bastrock getragen, wovon noch unten die Rede sein wird. Diese Figur zeigt aber auch die andere Tragart, bei der ein Zipfel der *ir*-Matte von hinten zwischen den Beinen durchgezogen wird, während

<sup>1)</sup> St.-G. *djinai*, roh geflochten aus gespaltenen Kokosblättern zum Garnieren der inneren Schiffwände. Harnsheim *djinai*, Senfft *djinai*. Nach Senfft *niekejok*, weiche Matte zum Einwickeln von Säcken.

<sup>2)</sup> St.-G. *ketilidik*, alt und schlecht geworden von dieser hinteren *ramid*, von beiden *nyat*, nach Senfft *adema*.

<sup>3)</sup> Finsch gibt an, solche sogar von mehr als 50 m Länge gesehen zu haben.

die anderen drei Zipfel das Hinterteil bedecken. Die beiden diagonalen Zipfel werden hinten und vorn durch eine Schnur festgehalten. Die Tragart heißt *lägebä* und dürfte im Hause vor Häuptlingen nicht Anwendung finden. Es ist nämlich diese Bekleidung der Arbeitsanzug der

hat sich das langwallende Musselingswand (Hobart gown) seinen Platz erobert. Daraus darf man aber keineswegs schließen, daß diese Matten nicht mehr getragen würden; unter dem europäischen Gewande fristen sie heute noch, allerdings ein minder schönes, aber unentbehr-

Fig. 1.



Marshallaser im Mattenkleid, links als Rock, rechts als maro, lägebä genannt.

Männer, obwohl die Eingeborenen es heute vorziehen, in Hosen und Jacken zu gehen, wie ich denn auch niemals auf den Marshallinseln, wenigstens auf denen, die ich besuchte, auf Djalut, Ailinglablah, Gnadjilin und Likieb, die kleidsame Mattentracht bei den Frauen und Mädchen gesehen habe. Fast allenthalben

liches Dasein, vornehmlich Reinlichkeitszwecken dienend. Waren diese Kleidmatten bei den Frauen einst die offizielle Festtracht, so war sie es bei den Männern keineswegs. Hier war der offizielle Anzug der **Bastrock**. Um mit der Kleidung gleich hier abzuschließen, welche für die Ordnung der Tatauierung von Wichtigkeit

ist, wie man unten sehen wird, will ich ihn hier kurz noch erwähnen, obwohl ihm Finsch (S. 168) und Hensheim ihre Aufmerksamkeit schon zugewendet haben. Finsch zeigt auch, wie er befestigt wird, was aus der Fig. 2 nicht hervor-

Fig. 2.



Marshallaner im Bastrock (in). Lauina,  
Verwandter von Kabua.

geht. Der Bastrock der Marshallinsulaner, in genannt, besteht nämlich aus zwei besonderen, fast gleich großen<sup>1)</sup> Quasten, *bogod* genannt, die durch ein Band, *erik*, miteinander verbunden sind; das Band wird zwischen den Beinen durch-

<sup>1)</sup> Nach Kubary sollen die vorderen größer sein, was eine Täuschung ist, da der vordere Teil, in *djabbe insan*, gut ausgebreitet getragen wird, der hintere aber, in *djabbe uk*, zusammengefaltet.

gezogen, vorn und hinten durch einen Gürtel<sup>2)</sup>, *kungr in in*, hochgenommen, so daß die beiden Quasten nach vorn und hinten über den Gürtel von innen nach außen hängen. Da diese Quasten recht groß und dick sind, so wird dadurch ein unformliches Aussehen zeitigt. Die Fasern der Quasten sind gewöhnlich aus Kokosschnüren gefertigt<sup>3)</sup>; aber ich habe auch noch einige aus *alod*-Fasern erhalten, die durch ihr gelbrotes Aussehen als besonders schön und kostbar erscheinen. Der Gürtel, welcher die Quasten nach oben drängt und trägt, besteht gewöhnlich aus mehreren Lagen ganzer Pandanusblätter oder wenigstens aus den breitesten Streifen der Blätter, und wird durch eine Schnur zusammengebunden. Bei Häuptlingen und als Festschmuck ist dieser Gürtel indessen auch öfters überflochten mit schwarz-weißem Flechtwerk<sup>4)</sup>, ähnlich der Gürtelschnur *irik*. Auch diese findet man übrigens in zahllosen Touren noch um den Leib der Häuptlinge bei solchen Festtrachten geschlungen und überdies noch eine feine Kleidmatte vorn als Schürze über den Bastrock herunterhängend, wie in Hensheims Südseeerinnerungen, S. 80 auf Tafel 9 schön zu sehen ist. Schon oben wurde diese Tragart als *kal* hervorgehoben.

Doch zurück zu den Matten, zu den Kleid- und Prunkmatten, von denen hauptsächlich zwei Arten unterschieden werden, die schon erwähnten Kleidmatten *ir* und die Königsmatte *goid*<sup>4)</sup> (Fig. 3 und Tafel I), letztere ebenfalls quadratisch und etwa 2 m im Durchmesser haltend. Daneben gibt es noch einige kleinere Arten von nur 40 bis 50 cm im Quadrat, so z. B. eine zum Bedecken des Gesichts beim Tatauieren, *bumisemid* (Taf. I), eine, auf welcher der König das Essen gebracht wird, *eririk* genannt (Fig. 3) usw. So groß der Unterschied aber in der Größe der Matten sein mag, so sind sie doch alle nach einem bestimmten Schema angefertigt. Es ist dies ähnlich wie bei der Tatanierung, die freilich, wie z. B. auf Samoa, noch

<sup>1)</sup> Siehe Journ. Mus. God., Heft 1, Taf. 6.

<sup>2)</sup> Nach Finsch, S. 167, aus Hibiscusfasern, oder auch aus Boehmeriafasern, in *joje*, welche schön weiß sind und nur von Häuptlingen getragen werden dürfen.

<sup>3)</sup> Siehe die Abbildung eines solchen bei Hensheim, Marshallsp., S. 87.

<sup>4)</sup> *goid* (Decke) Hensheim, *erikodj* (Königsmatte) Benff.

in viel strengeren Formen gehalten ist, da sogar die Ornamente innerhalb derselben nur wenig oder gar nicht wechseln. Bei den Matten nun ist die willkürliche Behandlung der Ornamente eine große, ja geradezu eine künstlerisch

muß es wundernehmen, daß ihrer z. B. in dem neuesten Buche Woernmanns, „Die Geschichte der Kunst“, nicht einmal Erwähnung getan ist.

Dies kommt wohl daher, daß bis jetzt es

Fig. 3.



Matte a:

**Esmatte** *iririk*,

auf der den hohen Frauen bei Festen das Essen gebracht wird. Durchmesser 45 cm.

4. Stützband.
- | Schwarzes Schmuckband *dilledil*.
3. Stützband.
- | in der Ecke (*dram*) Orn. Bootschmuck *uac*. (Fig. 21).
2. Stützband.
- | Schwarzes Schmuckband *dilledil* Orn. *larideang* Windrad. (Fig. 6).
1. Stützband Orn. *lagic le buene*. Hosenbesatz. (Fig. 13).
- | Borte *inag*, Orn. *dilleb*, Mann und Frau. (Fig. 18).

Matte b:

**Häuptlingsmatte** *göid*.

3. Stützband *drimon, djour*.
- | Schwarzes Schmuckband *dilledil*, Orn. *göwudjiale* Spiegel. (Fig. 14).
2. Stützband.
- | rotes Schmuckband *lala* Orn. *göwud*, großer Stern, der nur auf einer Seite scheint. (Fig. 10).
1. Stützband, Orn. *ligelorois* „Zickzackgehen“. (Fig. 20).
- | Borte *inag*, Orn. *uöcar* ein Fisch.

**Ordnung der Mattenmuster.**

freie, nur die Anordnung derselben hat sich, wie erwähnt, noch in keiner Weise vom Schema losgemacht.

Da wir es zweifellos hier also mit einer zwar fortgeschrittenen, aber zum Stillstand gekommenen Flechtornamentik zu tun haben, so

niemand für der Mühe wert gehalten hat, diese Mattenmuster zu erforschen. So gebe ich denn das wenige, was ich bei meinem kurzen Aufenthalt habe in Erfahrung bringen können.

Man teilt die Ordnung einer Matte in folgende vier Teile (siehe Fig. 3):



1. die Borte (*ining*<sup>1)</sup>),
2. das rote Schmuckband (*lälä*<sup>2)</sup>),
3. das schwarze Schmuckband (*dilledill*<sup>3)</sup>).

Hierzu kommen meist drei schmale Einfaßungsbänder, *drimon* genannt, in Mille *béoud*, oder auch sonst noch *djor* oder *djour*<sup>4)</sup>, „Pfosten“, wohl weil diese ganz dünnen Streifen dem Ganzen den festen Rahmen gehen, in den sich das schwarze und rote Schmuckband einschleibt, wie z. B. besonders deutlich die Matte *b* zeigt. Ich nenne sie deshalb kurz Stützbänder. Diese Stützbänder sind es aneh, die nie ganz fehlen, während von den anderen drei Hauptteilen nicht jeder immer vorhanden zu sein braucht.

Die Borte *ining* ist nun kein fester Bestandteil der Matte, sondern ist angenäht. Sie ist aus schwarzem *djab* (Hibiscus) und *manj* (Pandanus) geflochten. Da aber die Borte nur 1 bis 2 cm breit zu sein pflegt, können darauf auch nur kleinere Ornamente Verwendung finden. Ausnahmsweise sind sie auch breiter, wie z. B. auf Matte *a*, wo sie 4 cm breit ist, und auf den Fächern, wie auf Tafel I zu sehen ist.

Damit man indessen die Naht bezw. die Stelle, wo die beiden Mattenteile zusammenstoßen, nicht sieht, ist auf diese in ihrer ganzen Länge um die Matte herumlaufend ein ungefähr 3 mm breiter, dicker, dunkelbrauner Baststreifen aufgelegt, welcher *bôaved* genannt und mittels des schon genannten gedrehten *ôrr*-Fadens durch Knopflochnaht festgehalten ist und zwar so, daß stets in Zwischenräumen von  $\frac{1}{2}$  bis 1 cm ein Schlag gemacht wird. Bei der Matte *b* kann man dies sehen. Der *bôaved* besteht meist aus braunem Bast (*adad*), kann aber auch *djab* sein wie bei Matte *d*. Als erster äußerster Teil der eigentlichen Matte folgt dann gewöhnlich ein Stützband (*drimon*, *djour*). Dieses, ebenso die folgenden zwei sind fast immer mit braunem *adad*-Bast aufgestickt.

Zwischen dem ersten und zweiten Stützband (*drimon*) liegt das Hauptband der Matte, das rote Schmuckband (*lälä*), meist 10 bis 15 cm

breit und dadurch leicht erkennbar, daß hier die Ornamente mit den rotbraunen *adad*- Fasern nicht aufgenäht, sondern eingeflochten sind. Deshalb ist dieser Teil der kunstvollste der Matte, während das innere Schmuckband immer mit schwarzem *djab*-Bast gestickt ist.

Wenn eine Matte die vollständige Ordnung besitzt, so ist sowohl das rote wie das schwarze Schmuckband von einem *drimon*-Stützband zu beiden Seiten eingefäßt, wovon natürlich das mittlere gemeinsam ist. Manchmal fehlt auch das innerste Stützband wie auf den Matten *f*, *i* und *l*. Ich habe aber schon erwähnt, daß auch einzelne Hauptteile fehlen können. Betreffs der Borte *ining* dürfte dies indessen kaum zu treffen. Ich besitze zwar eine Matte, der eine Borte fehlt, aber die korrespondierende gleiche andere Matte besitzt eine, so daß das Fehlen in dem einen Falle nur darauf zurückgeführt werden kann, daß die Matte unfertig ist. Anders steht es mit dem roten Schmuckbande *lälä*, das z. B. bei der großen Königsmatte *c* auf Taf. I fehlt, indem hier das schwarze Schmuckband *dilledill* besonders groß entwickelt ist. Auch bei Matte *e* auf Taf. II trifft dies zu.

Eine solche Matte mit dem fehlenden roten Schmuckband *lälä* heißt *kâloean*, was „viel Weißes“ bedeutet, da hier die Ornamente das Weiße überall durchkommen lassen und der Mittelfläche viel hellen Raum gewähren, wie die Matte *c* und besonders *e* dartun. Die kleine Königsmatte *a* entläßt deshalb sogar eine Wiederholung des schwarzen Schmuckbandes in eigenartiger Anordnung. Andererseits heißt eine Matte *râri*, wenn das schwarze Schmuckband *dilledill* fehlt, wie z. B. bei der Matte *d* und *g*. Natürlich haben solche Matten dann nur zwei Stützbänder und die Bezeichnung *djour* für dieselben anstatt *drimon* wird besonders dann angewandt, wenn das schwarze Schmuckband *dilledill* fehlt, also bei der *râri*-Matte. Dies gilt z. B. für die Matte *g*, wo die Stützbänder doppelt sind, der innere Teil rot, der äußere schwarz. Für die inneren ruten wurde mir aber hier noch ein besonderer Namen *arling*<sup>1)</sup> an-

<sup>1)</sup> St.-G. *ingin* und *inging*, so die Kante.

<sup>2)</sup> *lälä*, tonlos gesprochen, Senfft *lälä*.

<sup>3)</sup> Nach Senfft heißt *dilledill* „sticken“.

<sup>4)</sup> St.-G. *jur*, ebenso Hornsheim, Senfft *djor* und *djour*.

<sup>1)</sup> *ar* Finger, *eling* viel, d. h. viele Finger breit, was sich jedenfalls auf das ganze Stützband bezieht, wie z. B. *ar emen*, die vier (*emen*) Finger breiten Kleider (Strelais) der Mattenspel heißen.

gegeben, während man den äußeren eine doppelte Reihe von einfachen schwarzen Kreuzchen *djour* benannte. Bei der *rāri*-Matte *d* sind die beiden Stützbänder zwar einfach, dafür aber die Linien, welche das Schleuderornament einfassen, von besonderer Stärke. Das innerste dritte *drimon*-Stützband kann indessen auch bei vorhandenem roten und schwarzen Schmuckband fehlen, wie z. B. bei Matte *f*, *i* und *l*. Doch das wird wohl nur dann weggelassen, wenn die Bänder sehr breit sind, damit das weiße Mittelfeld nicht gar zu sehr eingengt wird; es kann aber auch Unvollkommenheit sein.

Wenn ich zum Schluß hierbei noch erwähne, daß die Ecken des großen braunen Schmuckbandes in einzelnen Fällen ein braunes dunkles Quadrat ausmalen, *dram*<sup>1)</sup> oder *drām* genannt, was „Ecke“ bedeutet, wie auf Matte *d*, *g*, *h* *i* und *l* zu sehen, so dürfte das wichtigste über die Mattenordnung damit gesagt sein.

Ehe ich zur Erklärung der Ornamente übergehe, will ich noch kurz der **Fächer**, *dre**l*,

gedenken, von denen auf Tafel I einige abgebildet sind. Der mittelste in Herzform, dessen Blatt aus Schildpatt besteht, sowie die beiden seitlichen zeigen die Borte *ining*, die sich in nichts von derjenigen der Kleidmatten unterscheidet. Diese Borte ist bei dem zweiten und vierten Fächer aber so breit geworden, daß sie die Hauptfläche des Fächers ausmacht. Diese Fächer sind denn auch Prunkstücke der Häuptlingfrauen. Die einfachste und häufigste Form ist jedenfalls die rechts oben, und die sich in dem Mittelfeld kreuzenden Kokosblattrippen, deren jede noch mit der ganz jungen Palmsieder<sup>2)</sup> in Verbindung ist, geben dem Ganzen in ihrer blendenden Weiße, unrahmt von der hübschen Borte, einen vorteilhaften Anblick. Erwähnt sei noch, daß die Ornamente in den Borten auch hier stets mit dem geschwärzten Ilibi-eusbast eingeflochten sind.

Die folgende Aufzählung bringt einige häufigere Ornamente:

Fig. 4.



*bigor*, dreieckiger scharfer Stein zum Zerschlagen der Pandanusbohnen; nach Senfft *bigur*, auf Ratak *buigorr*, ein Reibstein für Pfeilwurz.  
Matte: *c* Borte.

Fig. 5.



*wōdja bobbo*, „braun, mit weißen Streifen (zu je drei) abwechselnd“.  
Matte *c*: Stützband (*drimon*).

Fig. 6.




*lōrideang*, „Windrad“, Spielzeug<sup>3)</sup> (*loritang*, St.-G.), auch *lingangene* genannt, wie der Seestern (*Linckia*) heißt.  
Matte *c*: schwarzes Schmuckband.



*lōrideang*, wie das vorige, nur ein Teil davon. Teilweise auch als Zickzackmuster, *wōri* aufgefaßt.  
Matte *a*: schwarzes Schmuckband.  
Matte *h*: Borte und schwarzes Schmuckband.

Fig. 7.



*kōlowan*, „viel weißes“ (siehe oben S. 10).  
Matte *d*: Borte.

<sup>1)</sup> St.-G.: die Stirn.

<sup>2)</sup> Man stellt diese Fächer aus einem noch nicht entfalteten Kokosblattrippe her.

<sup>3)</sup> Siehe näheres darüber in „Die Samoainsel“, Bd. II, S. 292. Auch Thilenius berichtet neuerdings (Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien, II. Teil, S. 309) von Kaniet über stilisierte Zeichnungen des Fregattvogels, welche den Wirbelornamenten nahe zu kommen scheinen.

Fig. 8.



*ajinoum*, Fährten der Taschenkrebse im Sande des Strandes.  
Matte *d*: rotes Schmuckband.

Fig. 9.



*gabadönjedlong*, das wellige Land der Inseln, die Aufhäufung von Schuttwällen durch die Orkane.  
Matte *i*: Borte.

Fig. 10.



*medjan ulju*, Augensterne<sup>1)</sup> (*iyu*, Stern, St.-G.).  
Matte *f*: Stützband.  
Matte *i*: Stützband (Reihenornament).

Matte *g*: rotes Schmuckband (einzelne Raute mit Stern in der Mitte).

Vergleiche auch Fig. 11 und das rote Schmuckband der Matte *b*, wo die Kante *girriad* heißt, ein großer Stern, der nur auf einer Seite scheint.

Fig. 11.




*labána*, der Fregattvogel *ák*, schwarz mit weißer Zeichnung an den Flügeln und am Leib.

Matte *i*: rotes Schmuckband.

Diese Zeichnung ebenso benannt:

Matte *e*: Borte.


Fig. 12.



*bewired*, Vogel (*ured*) mit langer Schwanzfeder, der sich gern auf Schiffe setzt (Tropikvogel?).

Matte *e*: Stützband.

Fig. 13.



*läogin le buwece* Hasenscharte mit Gaumenspalte und Bödsinn (*buwece*) kompliziert.

Königinmatte *a*: Stützband.

Fig. 14.



*gōa seudjiläle*, Segel.

Matte *b*: schwarzes Schmuckband.

Matte *i*: schwarzes Schmuckband.

Matte *k*: Stützband und schwarzes Schmuckband.

Fig. 15.



*nōnbar*, Zeichnung an der Bauchplatte der Schildkröten; Schildkröte nach St.-G. und Seufft *seun, boär; barangi* heißt „ähnlich“.

Matte *k*: Borte.

<sup>1)</sup> Siehe näheres darüber in „Die Samosineln“, Bd. II, S. 309. Die halbierte Raute mit dem Stern wird nach v. d. Steinen auch als Hütte nebst Eingang bei den Amerikanern aufgefaßt.



Fig. 16.

*gabodóngedang*, das wellige Land der Inseln.  
Matte *i*: Borte.



Fig. 17.

*gällö*, Bedeutung mir nicht bekannt.  
Matte *k*: rotes Schmuckband.



Fig. 18.

*dilleb*, Mann und Frau, ein Paar.  
Matte *a*: Borte.  
Matte *l*: Borte und schwarzes Schmuckband.  
Matte *g*: Borte.



Fig. 19.

*dinbuad*<sup>1)</sup>, Schleuder (Winkel zum Einlegen des Steines).  
Matte (*d*): Stützband und schwarzes Schmuckband.  
Matte *f*: Stützband; hier ähnlich dem Augenreihenornament Fig. 10.




Fig. 20.

*uöri*, Zickzack (siehe unten bei der Tatauierung, *oä*); auch als *ligoboroilin* (Zickzackgerben) bekannt.  
Matte *b*: Stützband.  
Matte *e*: Borte.  
Matte *l*: rotes Schmuckband.  
Matte *f*: Borte und schwarzes Schmuckband.  
Matte *h*: schwarzes Schmuckband.



Fig. 21.

*udes*, *udeñj* alte Form des *büllele*, des Bugschmuckes am großen Segelboot.  
Matte *a*: in den Ecken.  
Matte *e*: schwarzes Schmuckband.




Fig. 22.

*mällo*, abgesetzter Strich, keine Linie.  
Matte *f*: rotes Schmuckband.



Fig. 23.

*djour*, Pfosten (auch Bezeichnung der Stützbänder der *räri*-Matte).  
Matte *g*: Stützbänder, hier auch *djour ariling* genannt, s. Text. Auch die Bänder zwischen den Quadraten der Königsmatte *c* im schwarzen Schmuckbande können hierher gerechnet werden.

So einformig die Ordnung ist, so vielfältig sind die Ornamente, welche in die Bänder hineingestreut sind. Es gibt deren so viele, daß ich nur die häufigsten und originellsten herausgegriffen und stilisiert gezeichnet vorgeführt habe. Man hat behauptet (Rätzel, Völkerkunde, Bd. 1, S. 223), daß jede Insel ihren besonderen Mattenschmuck habe und daß man die Herkunft der Matten von gewissen Inseln bestimmen könne. Aber dies ist augenscheinlich nicht richtig. Die

<sup>1)</sup> Senfft *boart*, *boanf* (Schleuder); St.-O. und Finsch *bust*.

Frauen, welche mir über die Bedeutung der Ornamente Auskunft geben konnten, erklärten einstimmig, daß jeder Vorwurf freie Erfindung irgend einer Flechterin sei, und sie zeigten mir stolz die Figuren, die sie selbst erfunden hatten und erklärten sie mir. So hat die Frau des Lauina, den Fig. 2 darstellt, das *uöri*-Ornament erfunden, wie es sich im roten Schmuckbande der Matte *h* darstellt. Man kann solche Zickzackmuster auch als Winkelband bezeichnen, ebenso wie das auf der Borte und im schwarzen Schmuckbande derselben Matte befindliche Wind-

radmutter *lorideang*, das von manchen Marshallern wirklich auch als *wöri* bezeichnet wird. Auch in den Stützbändern der Matte *b* erscheint eine Zickzacklinie unter der Bezeichnung *ligoborolin*, was Zickzackgehen bedeutet; ferner zeigt das rote Schmuckband der Matte *l* ein Zickzack und ebenso kann man das rote Schmuckband der Matte *g* als solches auffassen, da die Rauten sich ja ans Zickzacks, aus Winkeln zusammensetzen. Hier waltet die Phantasie der Künstlerinnen frei, und was die eine als Zickzack auffaßt, kann von einer anderen als Rauten, als Augenmuster bezeichnet werden, von einer anderen als Fisch, von einer dritten als Schildkrötenbauch usw. Deshalb habe ich oben betont, daß die Deutung der Ornamente nur mit äußerster Vorsicht zur Begründung von Völkerverwandschaften herangezogen werden dürfen und daß für diese Zwecke die Ordnung in der Ornamentik viel, viel wichtiger ist. Ich will mich deshalb bei der Deutung der Ornamente nicht aufhalten, sondern habe oben die wichtigsten schematisch aufgezeichnet. Ihre künstlerische Verwendung geht aus den abgebildeten Matten hervor.

## 2. Die Tatauierung äo.

Wie die Ornamentik der Kleidmatten, so ist auch die der Tatauierung auf den Marshallinseln keine willkürliche, sondern eine bestimmte, durch eine deutliche Ordnung gegebene. Dies geht soweit, daß den Häuptlingen hier Vorrechte zuerkant sind, welche man vergeblich auf anderen pazifischen Inselgruppen nachweisen zu können geglaubt hat, nämlich die Verzierung des Gesichtes<sup>1)</sup>, die an Schönheit und Eigenart freilich durch die der Maori auf Neuseeland übertroffen wird. Auf den Marshallinseln ist sie aber ausgesprochen ein Vorrecht der älteren Großhäuptlinge, der *irodj* Faulilien<sup>2)</sup>, und dient vornehmlich dazu, die Falten des Alters zu glätten, die Runzeln (*birdodo* St.-G.). Der Zweck der Tatauierung als Körper schmuck tritt denn wie sonst, so auch hier deutlich her-

vor und wenn auch ein religiöser Zusammenhang nicht ganz von der Hand gewiesen werden kann, so haben wir auf den Marshallinseln die merkwürdige Ersehnung, daß die Eingeborenen auf göttlichen Rat diesen Schmuck sich zugelegt haben.

Als Tataniergötter gelten nämlich Leowudj als erster und Lanidj als zweiter. Auch ein Ludjiruäwe wird genannt. Sie wurden besonders zu Enüebing auf Ailinglablab, dem Königssitz, verehrt, wo auch einige heilige Steine sich befanden<sup>3)</sup>. Auf diese wurden eine Woche vor dem Beginn des Schlagens Opfergaben bestehend in Essen und Matten niedergelegt<sup>4)</sup>.

Nach der Sage nun sollen die Marshallaner vor Alters keine Tatauierung gekannt haben. Die beiden genannten Götter sollen gekommen sein und gesagt haben: „Ihr müßt euch tatauieren lassen, damit ihr schön werdet und die Haut euch im Alter nicht schrumpfe. Die Fische im Wasser sind gestreift und haben Linien, deshalb müssen auch die Menschen solche haben. Alles vergeht nach dem Tode, nur die Tatauierung besteht; sie überdauert euch. Alles läßt der Mensch auf der Erde zurück, seine ganze Habe, nur die Tatauierung nimmt er ins Grab mit.“

Die Opfer hießen gemeinhin *kaddok*<sup>5)</sup>, zur Zeit der Brotruchtreife aber *mama*; um diese Zeit fanden nämlich die meisten Tatauiererschlächten statt und zwar vornehmlich zu Enüebing, wo die übrigen Inseln sich versammelten. Ein *irodj* ein Großhäuptling, begann, dann folgten die Gemeinen, Enüebing begann, dann folgten die anderen Inseln. Ehe man aber die Arbeit anfang, wurde ein großes Gebet gesungen; dann tanzte ein Häuptling mit Weibern<sup>6)</sup>, welche Palmwedel in den Händen

<sup>1)</sup> Dies gilt wohl nur für die Eilikkette. Auf den *Rotaks* scheint *Erikub* nach *Kotobus* ein ähnlicher Tatauierplatz gewesen zu sein.

<sup>2)</sup> Die Vorbereitungen zum Tatauierfest heißen nach St.-G. *kebungasing*.

<sup>3)</sup> Nach St.-G. *kafok*, und *lokakok* Opferplatz.

<sup>4)</sup> Sie durften während des Tanzes von den Männern nicht angesehen werden. Im Übrigen waren die Weiber für den, der sich der Tatauierung unterzog, *tabi* und hießen als solche nach St.-G. *besti*, während andererseits die Männer, deren Frauen tatauiert wurden, *jisaid* hießen. Nach Senft heißt *ijowidj* ein fertig tatauierter Mann.

<sup>1)</sup> Von Gerland (Mikronesien S. 65) noch für ganz Mikronesien geltend.

<sup>2)</sup> Über die gesellschaftlichen Verhältnisse gewinnt man ein gutes Bild bei Kubary. (J. M. G. I. Heft.)

bieten, um das Tatauieren nnd um die Palmen herum. Chamisso schrieb darüber in seinen „Bemerkungen nnd Ansichten“: „Die Operation des Tatauierens steht auf Radack in Beziehung zu dem religiösem Glauben und darf ohne gewisse göttliche Zeiebn nicht unternommen werden. Diejenigen welche tatauiert zu werden begehren, bringen die Naacht in einem Hause zu, auf welehes der Chef, welcher die Operation vollziehen soll, den Gott herab beschwört; ein vernehmbarer Ton, ein Pfeifen soll seine Zustimmung kund geben.

Bleibt dieses Zeichen ans, so unterbleibt aneb die Operation. Daher sie an etlichen nie vollführt wird. Im Fall der Übertretung würde das Meer über die Inseln kommen und alles Land untergehen“.

Folgender Gesang ist ein Gebet, das vor dem Beginn der Arbeit gesungen wurde; angeblich sind die Worte desselben altertümlich, und wohl deshalb teilweise unbekannt und von der gewöhnlichen Schreibweise abweichend.

### 1. Gebet vor dem Tatauieren.

1. *J eang in imain<sup>1)</sup> ineu djidaen*  
*imain eē*  
*J rak in imain ineu djidaen*  
*imain eē*
5. *Jwō<sup>2)</sup> wudjiae<sup>3)</sup>*  
*Jneu rāman imālablab*  
*Tāddi buere irrim*  
*Lāddi bulogo daya meicin*  
*Gagāie bonnin*
10. *Bonidagai, bonidā maedju.*  
*Ewūdāo anir?<sup>4)</sup>*  
*Namo, Mādjigin!<sup>5)</sup>*  
*Deidje dābbū*  
*Dābbō, dābbō dābbō<sup>6)</sup>.*
15. *Dābbō ēre<sup>7)</sup> Kabua*  
*Ngaion<sup>8)</sup> ailingean!*

Im Norden dieses Hauses soll unser Flehn ertönen für dieses Haus eē  
Im Süden dieses Hauses soll unser Flehn ertönen für dieses Haus eē  
Für der Kokosnüsse Gedeihen.  
Bringt den Tatauierten ins große Haus<sup>9)</sup>  
Laug möge er leben, er dort auf seiner Matte.  
Manche leben, manche sterben ja,  
Aber dein Name soll gepriesen sein,  
Er soll wachsen —  
Wo ist dein Land?  
Namo, Mādjigin!  
Es baut sich auf sein Ansehen,  
Ansehen, Ansehen, Ansehen!  
Das Ansehen Kabuas breitet sich aus  
Über seine Inseln!

Wenn nun das Tatauieren selbst beginnen sollte, so setzten sich die Weiber vor dem Hause unter die Palmen hin und sehlugen die Trommeln, ohne dazu zu singen. Erst wenn der Tatauierer mit dem Aufzeichnen der Muster begaun, schieden sie mit dem Trommeln aus

und sangen einen Chor, möglichst ohne Geräusch und Geschrei, um den Meister beim Zeiebnen nicht zu stören. Oft muß aue völlige Stille herrschen.

Dies deutet der folgende Gesang an:

<sup>1)</sup> Eigentlich *imāin* im Hause in dies; a wohl des Wohlwants wegen eingefügt, vgl. Zeile 6.

<sup>2)</sup> *ineo* = in si, si die Kokosnuß.

<sup>3)</sup> *wudjak* Abfallen der Blätter, *wudjiae* offenbar das Gegenteil bedeutend.

<sup>4)</sup> Unter die Dachtraufe desselben, wo sich der Tatauierte auf die Matte setzt.

<sup>5)</sup> *Jwōi* fragendes wo, *an* Land (*an* St.-G.).

<sup>6)</sup> *Mādjigin* auf Namō, der Hāuptlingsinsel.

<sup>7)</sup> Durch das Tatauieren wächst das Ansehen der Hāuptlinge; *dābbō* bedeutet augenscheinlich dasselbe, was *mana* im Polynesischen.

<sup>8)</sup> *ere* ausbreiten St.-G.

<sup>9)</sup> *ngan* nach, bis; St.-G. an sein, am dein.

*Djarráo*<sup>1)</sup> *djab bá*  
*Eub boen*<sup>2)</sup> *djaub lögyä*<sup>3)</sup>  
*agügä.*  
*Binnáo, djadje, djadje*  
*Djedje äwáo, äwáo, äwáo!*

*Kamaneman*  
*Äwáo ná rio*<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> *jar* Schaar hansen, *já* trommeln St.-G.; so heißt Linien ziehen und danach auch tatauieren; *djarráo* die Weiberschaar die beim tatauieren trommelt.

<sup>2)</sup> *boe* oder *boer* weit, daß, damit St.-G.

<sup>3)</sup> *lögyä* fallen, tropfen, tanzen, nämlich die Finger *agüg* (*ari* St.-G.) in die Farbe vor Aufregung, statt der Feder, mit der gezeichnet wird.

<sup>4)</sup> *ná* ná wohl hinweisend „ihr“, *rio* wohl aus *dríáo* zusammengesogen; denn *drí* deutet auf die Person (*dríano* Arzt, *dríbélí* Fremder usw.).

Wenn die Muster für die Tagesarbeit gezeichnet waren, begann das Schlagen, das von lanten Gesängen und wildem Trommeln begleitet wurde, um den Schmerz zu übertönen. Folgendes Beispiel möge dies dartun:

### 3. Lied.

*Ua lägälägöl*  
*Ua ägädägöl*  
*Ua dje*  
*Bä geria djou ää*<sup>1)</sup>  
*Ägáo, äägarreo*<sup>2)</sup>  
*Ägädäggé meí*  
*Dangagedak*  
*Ä djok*  
*Äwáo, äwáo, äwáo;*  
*Kamaneman, äwáo*  
*Ná rio.*

Der Gesang steigt zu den Göttern empor  
 Und Begeisterung kehrt zurück  
 Für den Zeichner.  
 Schlägt die Trommeln, schlägt im Kreise!  
 Die Ägáo- und die Tölpelseechwalbe  
 Fliegen herbei  
 Mit ausgebreiteten Flügeln,  
 Ihre Schwärze fällt  
 Auf die Tatauierung;  
 Macht gut die Linien,  
 Ihr Tatauierer!

<sup>1)</sup> *geria* hier für *adji* die Trommel, die mit den Händen geschlagen wird (siehe Finsch S. 132 *adecha*); *djou ää* das kreisförmige Schlagen der Hände.

<sup>2)</sup> Zwei schwarze Seechwalben (*dägarreo* Anous stolidus) deren Schwärze vorbildlich für die Tatauierung ist. (Finsch S. 145, *djeggor* Anous melanogena, *kíar* und *kíarlab* Sterna melanachna und St. Bergii).

In voller Tätigkeit zeigt dann das folgende Lied, das aus Medjidj stammt, die Tatauierleute:

### 4. Lied.

*Djuo*<sup>1)</sup> *adjíáo*  
*Bennáreo iman äwáo,*  
*Rídjued*<sup>2)</sup> *ngirílok, ngirílok*  
*Ngirídjok, ngiribogadak*<sup>3)</sup>.

Leg an die Seite jene Trommel  
 Schlagt sie für seu Tatauierhaus  
 Er seufzt, er singt aus,  
 Er seufzt laut und bewegt sich.

<sup>1)</sup> *djuo* auf die linke Seite legt die Trommel der sitzende Trommler, unter den linken Arm, so daß das Fell in die Gegend der linken Bauchseite kummt.

<sup>2)</sup> *ändjued* den Hammer hantieren. Ob *äu* mit dem samoanischen 'au für die Tatauierhacke identisch ist, ist unsicher; *to* schlagen vom Segel (St.-G.)

<sup>3)</sup> *rej* er, *ngir* seufzen (St.-G.).

<sup>4)</sup> Wohl mit *bodagedak* „Blut“ zusammenhängend, „durch die Schmerzen unruhig werden“.

*Lanulang an dōod, an dōod,*  
*Kon djurje Redjolubu*  
*Kamu djūli<sup>1)</sup>,*  
*Edju bōgorrau<sup>2)</sup> alligin*  
*Djaluide<sup>3)</sup> le,*  
*Kondir<sup>4)</sup> mamōdj<sup>5)</sup>*  
*Langin adibung,*  
*Emedj odiridir<sup>6)</sup>!*

<sup>1)</sup> Identisch mit *ninegringem*; siehe unten Fig. 34.

<sup>2)</sup> Identisch mit *dōgorat*; siehe unten Fig. 29; *edju* senkrecht; *allig Rücken* (St.-G.).  
<sup>3)</sup> *aludj* zusehen, nach St.-G. *alud*; das Präfix *dj* deutet offenbar auf er sie es e, *edj*, hin (vgl. Hername im Marshallische S. 26); *le* Leute (*lee* dieser Mann St.-G.).

<sup>4)</sup> *Kondir* die durch das Gebet ererbte Wirkung, das Wunder.

<sup>5)</sup> *mamōdj*, fast wie *mamudj* gesprochen, Farbe, siehe unten; St.-G. *mamj* Ruh.

<sup>6)</sup> *odir, odir*, die punktförmigen Flecken in der Tatauierung; siehe unten Fig. 33.

Wenn nun aus dem Vorhergehenden hervorgeht, daß die Vornahme der Tatauierung mit Geheten und heiligen Handlungen verknüpft war, so war der Grundzweck wie allenthalben so auch hier doch in erster Linie der Schmuck des Leibes. Ich habe dies ausführlich auch für Samoa nachzuweisen mich bemüht<sup>1)</sup>, wo man nach Graeffes Vorgang die Tatauierung als rein religiös darzustellen beliebt hat, wo sie aber weit mehr als auf den Marshallinseln dekorativen Zwecken dient. Denn hier ist die Gesichtstatauierung ein Vorrecht der Großhäuptlinge, während ein solches Abzeichen auf Samoa für Häuptlinge nicht besteht. Allenthalben wird sonst meist nur bei Häuptlingen die Tatauierung sorgfältiger und reicher ornamentiert ausgeführt als bei Gemeinen, wofür auch Gerland zahlreiche Zeugen beibringt, weil letztere es eben nicht bezahlen können und auch nur stinkende Schweine sind, *pu'a a'elo*, wie der hohe Samoaner einen armen Mann aus dem Volke nennt. Der Jüngling tritt nicht durch die Operation in nähere Beziehung zu den Göttern, nicht geweiht wird er, sondern er wird durch den Farben-, den Ritterschlag ein Mann, und die Weiber finden Gefallen an ihm. Das ist das große Geheimnis, das über dem ganzen Stillen Ozean schwebt. Chamisso sagt mit Recht: „Sie (die Tatauierung) verhält und verunstaltet die Formen nicht, sie schließt sich ihnen an mit anmutiger Verzierung und scheint deren Schönheit zu erhöhen“.

<sup>1)</sup> Die Samoainseln, II. Bd., S. 45.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

*Lanulang* schlägt, schlägt die Hacke,  
 Du zeichnest *Redjolubu*  
 Mache Zickzacks,  
 Senkrechte Linien auf diesen Rücken.  
 Es sehen zu die Leute.  
 Ein Wunder, die Farbe  
 Vom Himmel fällt,  
 Fertig sind die Punkte!

Und die Gesichtstatauierung dient ja, wie oben erwähnt, vornehmlich dazu, die Runzeln des Alters zu glätten, und wer sich den alten Löiak und seinen Nächstverwandten den König Kabua auf Djalut daraufhin ansieht, wird die Wahrheit dieser Angabe bestätigen müssen. Kein Wunder, wenn die bis ins hohe Alter so liebesbedürftigen Marshallhäuptlinge sich diesen Vorteil vor ihren Untertanen, über die sie absolut regieren, nicht entgehen ließen. Denn Leidenschaft macht auch hier das Alter töricht, und daß, wie Finsch betreffs der Gilbertinsulaner meint, die Kanaken nach den Dreißigern bei ihrem schnellen Altern über die jugendliche Torheit des Tätowierens hinaus seien, kann ich nicht gut heißen. Nur als ein göttliches Geschenk wird die Tatauierung allenthalben betrachtet, wie auch wir den Künstler für einen gottbegnadeten Mann halten. Und darum, daß das Muster recht schön ausfalle und Unheil abgewendet werde, darum beten die Marshallaner, darum bringen sie ihren Tatauierergöttern Opfer dar. Also wie für Samoa, so muß ich auch für die Marshallinseln die tiefe religiöse Bedeutung, welche Gerland (Mikronesien S. 67) der Tatauierung beilegt, ablehnen.

Ehe ich nun auf die Erklärung der Ordnung und der Ornamente eingehe, will ich noch kurz die Hilfsmittel erwähnen, mit denen die Operation ausgeführt wird und die sich von den bekannten kaum unterscheiden.

1. Das Tatauierinstrument, die Hacke, deren Stiel *djurr* heißt, während die Spitze, der „Zahn“ *ngi* genannt wird, (samoanisch




*nifo* Zahn<sup>1)</sup> ehemals aus Fischgräten oder Vogelknochen gefertigt (das von mir erworbene aus Hühnerknochen). Zwei verschiedene Größen, das größere *ngi giö* oder *ngiburomug*, das kleinere *muädjir* für die feineren Ornamente.

2. Der Schlegel *djuh* (*jib* St.-G.) aus dem

3. Der Farbertopf, Kokosshale, *ar in äo* zum Eintauchen des Instruments, *ar in djelje* kleiner zum Eintauchen des Zeichenpincels; die Farbe, Kohle der versengten Kokosnußhülle mit Wasser angerührt, heißt *manudjir*<sup>1)</sup>.

4. Der Zeichenpincel *djedje*, entweder die lange Schwanzfeder eines Tropikvogels oder eine

Fig. 24.



#### Lanlant, Häuptling von Mille.

Gesichtstataurierung *öwanedj*, bestehend aus den Ornamenten *wür* (Zickzackband Fig. 34) und *merrimdjiman* (Fig. 42).

Stamm des Kokoswedels, wie auf Samoa, oder aus anderem Holz.

<sup>1)</sup> Da auf Ponapé der Tausendfuß in der Tataurierung *ngi-ngi* genannt wird, (nach Christian bei Edge-Partington, III. Ser., Taf. 53) so erhellt daraus (wie bei der samoanischen Tataurierung schon betont), daß es nur der Biß des Tieres ist, der ähnliche Empfindungen hervorruft. Auf den Marshalls habe ich dies Ornament nicht bemerkt.

Kokosblattrippe (siehe Abbild. Die Samoainseln, II. Bd., S. 74).

5. Die Matte zum Bedecken des Gesichtes *bunimemid* (siehe oben Taf. 1).

6. Korb *ieb* zum Aufbewahren der Geräte (aus

<sup>1)</sup> Nach St.-G. *manij* der Ruß, *manij* die Kokosnußkohle.



schmerzhaften Brustwarzen (ähnlich dem Nabel auf Samoa).

Die Tatauierung selbst heißt nun *āo*, womit eigentlich „Linien ziehen“ gemeint ist, denn die schönen Linien des Fisches *Holacanthus diacanthus* galten als vorbildlich. Die Muster bedecken in der Hauptsache Brust und Rücken,

Rücken (Fig. 28, S. 22).


4. *ōū* „Zickzack“.

5. *ādalab* „Große Tatauierung“.

6. *dōgorak* „Feinerhacke“.

Auf der Brust nun sind es zwei mit der Spitze nach unten zielende, halb sich deckende Dreiecke, welche an einem „Mast“, dem *gidju*,

Fig. 26.



Gemeiner Mann (Kadjur) von Mille. Brust-Tatauierung. Ornamente.

und zwar besteht jede Seite aus drei Teilen, die als feststehend zu crachten sind.

Ihre Ordnung ist folgende:

Brust (Fig. 27).

1. *menilou* „Brust des Tatauierten“.
2. *dōd* „Brust“.
3. *gidju* „Mast“.

aufgespießt sind. Das obere Dreieck heißt *menilou*, wie man auch im allgemeinen die „Brust eines Tatauierten“ nennt, während sie sonst *ub(a)*, *noub* (*laub* St.-G.) heißt. Das untere Dreieck bedeckt die Brustwarzen, *dōd* genannt (*fit* das Enter, die Brust St.-G.), weshalb es eigentlich aus zwei Teilen besteht, die


das obere Dreieck einschließen. Der Mast, *gidju*, gibt dem ganzen den Halt.

Auf der Brust kam auch innerhalb der Muster **Narbartatowierung**<sup>1)</sup> vor, wie Taf. VI zeigt. Finsch leugnet sie, wie man sieht, mit Unrecht.

Auf dem Rücken, Fig. 28, ist zu oberst gleich-

aber durch ein handbreites Band dicker horizontaler Linien abgeschnitten, die in ihrer Gesamtheit *dadalab*, „große Tätowierung“, heißen. Dieses Muster ist von Wichtigkeit wegen seiner Beziehungen nach den Karolinen hin. Denn *dalabedja* oder *gilipedja* nennt Kubary, ohne die Bedeutung anzugehen, die mächtigen Tätowier-

Fig. 27.



#### Hauptling von Mille. Brust-Tätowierung. Ordnung.

falls ein mit der Spitze nach unten zeigendes Dreieck, *oä* oder *oaa* genannt, was Zickzack bedeutet, da sich dieses immer aus übereinander geschichteten Winkeln (Fig. 26) zusammensetzt. Die untere Spitze des Dreiecks wird

flächen an den Beinen der Yaper<sup>1)</sup>; diese heißen bei den Samoanern *tapulu*. *Dalab* und *gilep* heißt im Marshallanischen „groß, stark, mächtig“, während *edja* auf das polynesisch *tā* schlagen

<sup>1)</sup> Siehe in Joests „Das Tätowieren“ S. 75, Kubarys Arbeit „Das Tätowieren in Melanesien speziell auf den Karolinen“.


<sup>1)</sup> Narbe heißt nach Senfft *kinaij* oder *gorar*.

(*tá latus* tatauieren auf Samon) zurückzuführen sein dürfte<sup>1)</sup>. Die mächtigen dicken Striche (Taf. V) geben aber der Rückentatauierung der Marshallner einen Halt wie der Mast vorne, und deshalb wird auch die *öodalab* in drei Pfostengruppen *djur*, eingeteilt, in der Mitte am „Rückgrat“ die *djuren rilib*, auf beiden

meist je zwei Stück auf jeder Seite, also im ganzen zwölf, obwohl die Zahl nicht feststehend ist.

Auf dieses Muster *öodalab* der dieken unterbrochenen zehn horizontalen Doppellinien folgt ein System senkrechter Linien, *dögorak* genannt, nach einem Ornament, der „Feuerhaeke“, welche

Fig. 28.



Kabna, König von Djalut. Rücken-Tatauierung. Ordnung und Ornamente.


Seiten davon die „Pfosten des Rückens“ *djuren lemälik* und ganz lateral die „Pfosten der Rückenseite“ *djuren lämar*, und zwar

<sup>1)</sup> Tatauieren heißt auf Yap nach Tetens *agatau*. Siehe die Karolineninsel Yap usw. in Journ. Mus. God, Heft II, S. 47.

immer diese Bänder zusammensetzt. Als ich zuerst dieses Muster zeichnete, machte ich die senkrechten Linien stets in der Form *a* (Fig. 29). Als ich aber die Erklärung erhielt und genauer zusah, bemerkte ich, daß die Bänder, wie *b* zeigt sich zusammensetzten und daß das Ornament die

Feuerhacke *dōgorak* (*c*) (*tōkorak* St.-G.) ist, ein spazierstockähnliches Gerät, mit dem die glühenden Steine des Ofens ausgebreitet werden.

Fig. 29.



Auf dem Bilde von Hemsheim (Südsce-  
erinnerungen S. 79 und Marshallsprache S. 93)  
nehmen dünne Horizontallinien von Zickzack-  
form die ganze Rückenseite, abwärts vom obersten  
Dreieck<sup>1)</sup>, ein und die senkrechten *dōgorak*-  
Schnüre reichen dort von der vorderen und  
seitlichen Bauchseite bis zur Mitte des Ober-  
schenkels. (Fig. 30.)


Auch Kubary (Joest, S. 95) bildet eine  
Marshalltatauierung ab, bei der die Seiten-

nicht *dōgorak*, sondern die bei den Gilbert-  
insulanern üblichen Kokoswedel, und direkt  
über diesen nicht die „große Tatauierung“ *āoda-  
lab*, sondern das Dreieck *ōā*. Es scheint dem-  
nach, daß das horizontale Band zwischen den  
beiden senkrechten Strichmustern das *āodalab*  
darstellen soll. Aber die Ornamente sind bei  
Kubary nicht so genau angezeichnet, wie bei  
Hemsheim, sodaß ein Schluß nicht erlanbt  
erscheint, um so weniger, als keinerlei ein-  
heimische Bezeichnungen angeführt werden.

Die Tatauierung am Gesäß und Oberschenkel  
nennt man nun auf den Marshallinseln *ineballe-  
būll*, und da mir einige Ponapesen sagten, daß  
die Gesäßtatauierung bei ihnen *ine buelbuel*  
heiße, so liegt hier zweifellos auch ein gemein-  
samer Sinn zugrunde, den ich aber nicht sicher  
auszumachen vermochte<sup>1)</sup>.

Finsch bezweifelt, ob die oberen senkrechten  
befiederten Linien bei den Gilbertinsulanern  
Kokoswedel seien, was aber in der Tat doeh  
der Fall ist. Sie sind in der Marshalltatauierung  
ganz richtig gezeichnet, während Finsch in  
seiner Arbeit „Hautverzierungen der Gilbert-

Fig. 30.



Tatuerter Mann (Rücken und Seite) nach Hemsheim, Marshallsprache, Seite 93.

teile der Oberschenkel bis zur Mitte mit senk-  
rechten Linien versehen, aber nach unten und  
oben durch ein Band von Querlinien begrenzt  
sind. Über dem oberen Band ist aber wieder  
ein System von senkrechten Schnüren, aber

insulaner“, Globus Bd. 65, die Mittelrippe  
nirgend einzeichnet, sondern nur die winkel-

<sup>1)</sup> Ich sah solche Zickzacklinien nur in senkrechter  
Richtung zu beiden Seiten der *dōgorak* hinablaufen.  
Man nannte sie *lobōgorogō* (s. Taf. V).

<sup>1)</sup> *ine* heißt Tragestock wie im Samoanischen *ome*,  
*būllbūll* nach St.-G. die vagina, *būllbūlls* aber auch  
Deckhaus auf den Segelbooten. Nach Benfft heißt  
*ine* Pflanzling, *ine* Kern und *inebūll* der Kokosblattbast,  
solbst Clitoris, *būllbūll* das Deckhaus. Eine synische  
Bedeutung wäre denkbar, da die Häuptlinge sich steh-  
dem das ganze membrum einschließlich der Glans be-  
schlagen ließen.

ständigen Blattfedern  $\wedge$  übereinander oder direkt Zickzacklinien  $\wedge$ . Näher kommt Parkinson im Int. Arch. f. Ethnogr. Bd. II, S. 41, „Beiträge zur Ethnologie der Gilbertinsulaner“. Bei Wilkes (U. S. Expl. Exp. Bd. 5, S. 73) ist wenigstens ein einfacher Längsstrich angedeutet<sup>1)</sup>.

Ich möchte dies deshalb hier betonen, weil in dieser Rückentatouierung, deren senkrechte Linie über das Gesäß und über die Hüfte nach der Seite des Oberschenkels bis zu dessen Mitte hin, entschieden eine Beziehung zu den Gilbertinseln sich ausspricht. Während aber die Gilbertinsulaner noch weiter gehen und, wie die Ponapesen und Yaper, teilweise die ganzen Beine<sup>2)</sup>, oder auch nur einen Teil derselben durch befiederte Linien oder quadratische Felder an Waden und Schienbein bedecken, hört bei den Marshallanern in der Mitte des Oberschenkels die Tatauierung auf.

Nach unten hin wäre damit die Tatauierung abgeschlossen, denn die Beistatauierung, wie sie den Karolinern und Gilbertinern gemeinsam eigen ist, kommt, wie eben erwähnt, auf den Marshallinseln nicht vor. Sind doch die unteren Extremitäten wie auch das Gesäß bei Mann und Frau durch die Kleidung, wie im vorigen Kapitel angeführt, nahezu ganz bedeckt, wie schon Kotzebue und Chamisso betonten, sodaß die Verzierung hier nur im intimen Verkehr zur Geltung kommen konnte. Die Brust aber und die Arme werden stets unbedeckt bei beiden Geschlechtern getragen, weshalb auch diese Teile so ausgiebig tatouiert sind. Deshalb sind auch die oberen Teile der Schultern bei den Häuptlingen noch tatouiert, *vavrog* genannt (Fig. 27), ferner Hals<sup>3)</sup> und

Gesicht (*iuumedj*), und endlich die Arme (Fig. 28<sup>4)</sup>, 31 und Taf. IV), wofür mir die Namen *kanung* für den Achselteil, und für den ganzen Arm *aridjaub* (Rücken einer Krabbe), *ariladju* (eine gestreifte Muschel) und *doiririk* „Tatauierung gleich der Gürtelschnur *irik*“ angegeben wurden. Der Arm kann dabei völlig mit Ornamenten übergossen sein, wie bei Kabna (Fig. 28) und bei den *irodj*, den Großhäuptlingen, konnte somit bis zur Mitte der Oberschenkel herab alles mit den feinsten Ornamenten übersät sein, wobei nur wenig Stellen an Stirn und Wangen<sup>5)</sup>, an den Schulterblättern, vor der Achselhöhle, um Scham und After frei blieben. Dies wechselte sehr nach Neigung, Rang und Reichtum der Betreffenden<sup>6)</sup>; feststehend waren eben nur die drei Brust- und die drei Rückenmuster, die allen gemeinsam waren, wenn auch hier die feinere Ornamentik, namentlich die Ausführung des Mastes vorne, schon den Höheren verriet<sup>7)</sup>.

Ehe ich aber die Ornamente aufzähle, will ich noch der **Tatauierung der Frauen** gedenken, bei denen die *irodj* aus hoher Familie gleichfalls gewisse Vorrechte hatten, wie Fig. 31 zeigt. Im Gegensatz zu den Männern wurde bei den Frauen nicht der Leib tatouiert wie auf den Gilbertinseln und Karolinern, sondern nur die Schultern und Arme, teilweise auch die Oberschenkel. Auf den Schultern befindet sich hier vornehmlich ein Muster, das seiner dicken Linien halber auch *oóalab* (siehe oben beim Rücken des

Chamisso erwähnte, daß sie so stark erweitert wurden, daß die pendula über den Kopf geschwungen werden konnten. Auch sollen (nach St.-G.) auf Medjidj Schnitte in die Mitte der Unterlippe gemacht werden, *midjemdj* genannt, was auch beschnitten heißt.

<sup>1)</sup> Senfft, *zumedj*.

<sup>2)</sup> Wohl von *fanuggent* bekleidet (St.-G.).

<sup>3)</sup> Auch diese sollen ehemals teilweise beschnitten gewesen sein.

<sup>4)</sup> Choris sagt 8. 6 und 12, daß die Eingeborenen ihn auf die Lenden der Häuptlinge hingewiesen hätten, welche im Gegensatz zu denen der Gemeinen verziert waren. Finsch, S. 173, widerspricht dem und Chamisso's gleichzeitiger Angabe, indem er darauf hinweist, daß nur die Gesichtstatauierung Vorrecht der Häuptlinge sei. Das ist nur bis zu einem gewissen Grade richtig. Eine angebreitete Leib- und Schenkel-tatauierung wird auf den Marshallinseln stets einem Reichen und Mächtigen ansehn; denn gemeine Leute dürfen und können sich so einen Pomp nicht leisten.

<sup>5)</sup> Ein fertig beschlagener Mann heißt nach Senfft *djemidj* (siehe oben).

<sup>1)</sup> Finsch meint hierzu „Das Muster ist übrigens nicht korrekt genug, um als exaktes Vorbild zu dienen“.

<sup>2)</sup> Von Finsch mit Recht als Ausnahme erklärt. Finsch sagt aber (Zeitschr. f. Ethnologie 1880 S. 201) über die Ponapesen: „Aber dieser originellen Verzierungswiese des Körpers, die durchaus einen eigentümlichen Charakter bewahrt und total verschieden ist, von der auf den Marshall- und den Gilbertinseln sowie auf den anderen Gruppen der Karolinen, findet man auf dem Oberarm der Ponapesen noch andere usw.“ Dies ist keineswegs richtig und ersichtlich. Siehe auch Kubary, I. M. G., Heft VIII.


<sup>3)</sup> Hierbei sei auch der Lächer in den Ohren gedacht, *validik* (St.-G. *valik*) genannt, wie Fig. 24 zeigt.

Mannes Fig. 28) genannt wird. Das Ornament ist fast stets ein Fischschwanz und zwar der des Nasenfisches (Nasens unicornis), welcher zu beiden Seiten des Schwanzes drei scharfe breite Dornen trägt. Es heißt deshalb *lokan bullak* (Fig. 48)<sup>1)</sup>. Dieselben finden sich unverkennbar auch bei Hershheim abgebildet. Darunter, auf dem

weis, daß dies mit einem solchen „Fisch“ gar keine Ähnlichkeit habe, wußten mir meine Gewährsleute auch nicht mehr zu sagen.

Darunter finden sich senkrechte, dann wagerechte Linien, deren Namen schon oben bei der Männerarmtatauierung erwähnt wurde. Es kommt natürlich auch hier feinere Ornamentik

Fig. 31.



Frau von Djalut. Ordnung und Ornamente.

Deltoidesmuskel sieht man zwei dreizinkige Gabeln und eine zweizinkige, nach vorne offen. Sie heißen *ngé*, Delphin<sup>2)</sup>. Auf meinen Hlin-

<sup>1)</sup> *lokan*) Schwanz (St.-G.), *bullak* der Nasens unicornis.

<sup>2)</sup> Senfft *ge* Tümmeler.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.


zur Verwendung, ähnlich der auf Fig. 28 von Kabua, wie es auch Hershheim angedeutet hat.

Endlich werden als Vorrecht bei den Hauptlingsfrauen die Finger und Handrücken geschmückt, *äö in trin* und *äö in beréñbä*, wie es Fig. 32 zeigt.



Im übrigen pflegen sich die meisten nur den Karolinen, wo indessen auch geschlossene mit dünnen Ringen um die Arme und Beine Ringe vorkommen.

Fig. 32.

Fingertatouierung bei Marshall-Frauen, *do in arsa (do in berisaba)*.

beschlagen zu lassen, wie es Fig. 25 zeigt, aber nicht nur die Innenseite der Arme, wie besonders häufig auf den südlichen Gilbertinseln und auf


Im folgenden bilde ich die wichtigsten Ornamente (Orn.) ab, welche man auf den Bildern innerhalb der Ordnung (Ord.) auffindet.

Fig. 33.



*uadjir*, Punkte. Fig. 25, 26 und 32. Mitte im oberen Dreieck, Finger, *ao*, Linien, wonach das Tatauieren überhaupt *ao* genannt wird, Arm Fig. 31.

Fig. 34.



*ninegeinegom*, Stab *inē*, *geine* machen, (St.-G. kein Werkzeug). Brotfruchtspfücken *gomegom*. Siehe das über Zickzacklinien oben gesagte. Fig. 26 und 27 im unteren Brustdreieck und Hals und Fig. 28 im oberen Rückendreieck, Gesicht Fig. 24, Taf. V usw.

Fig. 35.



*buār ānan Lebulling*, das Zeichen des *Lebulling*. Fig. 25 den äußeren Teil des oberen Brustdreiecks nach unten begrenzend, Fig. 26 linke Schulter.

Fig. 36.



*lidje*, Bedeutung unbekannt, erscheint vornehmlich im oberen Brustdreieck (s. Fig. 25, 26, 27 und Taf. IV) und im Mast (Fig. 25).

Fig. 37.



*denemenegarobūd*, kleine, schwarze Linienwolken z. B. Fig. 26 und 27 an Lenden und Bauch, Fig. 25 im unteren Brustdreieck.

Fig. 38.




*longā (lōnge St.-G.)*, die gestielten Entenmuscheln, die Bernakeln (*Lepae*). Fig. 26 Schulter (*rāuroy*) und Fig. 28 Unterarm.

Fig. 39.



*marub* Edelstein, Perlen.



Betreffs des letzten W-ähnlichen Ornamentes *kabinout*, babe ich zu erwähnen, daß ich es nur beim König Kabua sah, der es am unteren Ende des Mastes, in der Gegend des Nabels trug. Auch bei Kubary (Joest S. 95) und Choris Taf. I, ist es deutlich an selber Stelle zu bemerken, ein Beweis, daß Finsch Unrecht tut, die Abbildungen von Choris als „Vergleichsmaterial zu streichen“. Auch auf dem Rücken hatte Kabua noch ein eigenartiges Ornament, das auf Fig. 28 nach innen zu von der Aohselhöhle zu sehen ist. Kabua selbst nannte es *dödadu* und es soll dies Wort nur bedeuten „Die Schulter nach hinten abschließend“,

da es in der Tat nur ein Ausfüßel der großen freien Stelle über den Schulterblättern ist.

Es ist natürlich, daß noch weitere Ornamente auch hier bei der Tatauierung Eingang gefunden haben, aber diese wenigen dürften als die häufigsten doch genügen, um einen Begriff von ihrer Anwendung innerhalb der Ordnung zu geben. Leider war mein Aufenthalt auf den Marshallinseln zu kurz, um diese Studien auf die verschiedenen Atolle der Gruppe ausdehnen und vertiefen zu können.

Da ich jedoch zu Djalut nicht allein zahlreiche Lente der Ralikette zu sehen bekam, sondern auch zutüßig daselbst längere Zeit eine

größere Reisegesellschaft von dem zu den Rataks gehörigen Mille anwesend war, so hatte ich hier wie auch auf einer kleinen Inselreise Gelegenheit mich zu überzeugen, daß die gegebene Tatauierordnung im großen und ganzen für die ganze Ralik-Ratakgruppe Gältigkeit besitzt.

Jedenfalls kann man sich einen Begriff aus dem Beigebrachten davon machen, daß die Ausführung nicht ohne Sinn geschieht; und die näheren Beziehungen, welche sich daraus zu den benachbarten Inselgruppen deduzieren lassen, legen die Weiterverfolgung dieser und ähnlicher Probleme nahe.



Oben 5 Fächer *derl.* Mitte Blatt aus Schildpatt;  
Ganz rechts gewöhnliche Form, ganz links viereckig, der 2. und 4. Häuptlingsfächer mit sehr breiter Borte.

Matte *c*, große Königsmatte *göid.*

Kleine Matte *d.*

*ining* (Borte)

1. *drimon* (Stützband)

*isä* (rotes Schmuckband)

2. *drimon*

*älschill* (schwarzes Schmuckband)

3. *drimon*

*bjuggor* (Fig. 4)

o

*wödjuböbög* (Fig. 5)

*lorödmög* (Fig. 6)

*wöfja löbbög*

*köloran* (Fig. 7)

*döschuaf* (Fig. 10)


*agincum* (Fig. 8)

*döschuaf*

o

o

Die kleine Matte hält 55cm im Quadrat und dient zum Bedecken des Gesichts beim Tätowieren (*banisierid*).



|   | Matte e.                    | Matte f.                                | Matte g.                          | Matte h.                                     |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| <i>ining</i> (Borte)                        | <i>labina</i><br>(Fig. 11)  | <i>wūri</i> <sup>(1)</sup><br>(Fig. 20) | <i>dill-b</i><br>(Fig. 16)        | <i>lorideang</i><br>( <i>wūri</i> ) (Fig. 6) |
| 1. <i>drimon</i> (Einfassungs-<br>band)     | "                           | <i>medjan idju</i><br>(Fig. 10)         | <i>djaur ariling</i><br>(Fig. 23) | <i>eboud</i> <sup>(1)</sup>                  |
| <i>lilla</i> (rotes Schmuck-<br>band)       | "                           | <i>malla</i><br>(Fig. 22)               | <i>medjan idju</i><br>(Fig. 10)   | <i>wūri</i><br>(Fig. 20)                     |
| 2. <i>drimon</i>                            | <i>benared</i><br>(Fig. 12) | <i>medjan idju</i>                      | <i>djaur ariling</i>              | <i>eboud</i>                                 |
| <i>dilledill</i> (schwarzes<br>Schmuckband) | <i>wāra</i><br>(Fig. 21)    | <i>wūri</i>                             | "                                 | <i>lorideang</i><br>( <i>wūri</i> )          |
| 3. <i>drimon</i>                            | <i>benared</i>              | "                                       | "                                 |  |

<sup>1)</sup> Schlinge am Segelboot für das Ruder (*somonu. futia*).



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>eing. Berbe</b><br/> <b>1. drimou</b> (Steinband)<br/> <b>2. drimou</b><br/> <b>3. drimou</b></p> | <p><b>Matte i.</b><br/>                 schubungsbund (Fig. 10)<br/>                 auf dem (Fig. 10)<br/>                 lila (Fig. 11)<br/>                 auf dem (Fig. 11)<br/>                 auf dem (Fig. 14)<br/>                 auf dem</p> | <p><b>Matte k.</b><br/>                 auf dem (Fig. 15)<br/>                 auf dem (Fig. 14)<br/>                 auf dem (Fig. 17)<br/>                 auf dem<br/>                 auf dem</p> | <p><b>Matte l.</b><br/>                 auf dem (Fig. 18)<br/>                 auf dem (Fig. 19)<br/>                 auf dem (Fig. 20)<br/>                 auf dem<br/>                 auf dem</p> |
|---|---|---|---|



**Brust- und Armtatouierung eines jungen Häuptlings von Djilat.**

Mose, Loiak's Sohn, Neffe des Königs.

Auf dem rechten Arm modernes Muster, links *lofj* (Fig. 46).



**Rückentatanerung eines jungen Mannes von Mille.**

(Vergl. Fig. 28.)





**Brusttätowierung nebst Schmecknarben eines jungen Mannes von Mille.**

## II.

### Die ununterbrochene Besiedelung Velem St. Veits.

Von

Kálmán Freiherr von Miske.

Der Nachweis, daß eine kontinuierliche, ununterbrochene Besiedelung an einem und demselben Fundorte durch verschiedene aufeinander folgende Zeitalter hindurch stattfand, ist für die Prähistorie von großer Wichtigkeit.

Daß die Antwort auf die Frage nach einer solchen Besiedelung überhaupt nur dort gesucht werden kann, wo einerseits das Fundmaterial, und andererseits nicht minder die Kulturschichten in ihrem Lagerungsbilde die gleiche Tendenz einer ununterbrochenen Kulturentwicklung ineinandergreifend und ineinanderübergehend aufzuweisen vermögen, ist selbstverständlich.

An der Hand der Funde und unter Benutzung des bei den stattgehabten Ausgrabungen vorgefundenen Kulturschichtenbildes sei mir der Versuch gestattet, dieses Faktum in der Ansiedelung von Velem St. Veit zu erweisen.

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage ist zunächst jene Reihe von Altsachen aus den Funden der Velem St. Veiter Ansiedelung zur Anschauung zu bringen, die den unzweifelhaften und unstreitigen Beweis liefern, daß dort am Ort verschiedene zeitlich getrennten und aufeinanderfolgenden Altersstufen angehörende Funde gemacht werden.

Das Kulturbild von Velem St. Veit fügt in seinen Funden mit einer jüngeren, nur kurz dort ansäßig gewesenen Neolithzeit an, der sich die Bronze-, Hallstatt- und La-Tène-Zeit im Prähistorikum anreihen. Das weitere Bild seiner

Besiedelung im Historikum bestimmen: Römer, Slawen, Völkerwanderungszeit und Mittelalter.

Da Steinartefakte auch noch dem Neolithikum nicht mehr zuzurechnenden Funden angehören, so dürfte für den Nachweis dieser Zeit nicht jedes derartige Stück einwandfrei sein. Ich beschränke mich daher bei Benutzung dieses Materials nur auf die Erwähnung des thüringischen Schuhleistenkeiles, das am Orte vorkommt (Fig. 1). Unbedingt derselben jungen

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Steinzeitstufe würde ich den aus Hirschhorn gefertigten Pfeil zuzählen (Fig. 2). Endlich sei, um auch ein Beispiel aus der Keramik anzuführen, eines jener für die jüngere Steinzeit Ungarus charakteristischen Gefäße (Fig. 3) zur Anschauung gebracht, das bei der systematischen Ausgrabung des Jahres 1898 in einer der Neolithzeit zuzuschreibenden Schicht in der Tiefe von 360 cm gefunden wurde.

Daß die Bronzezeit mit manchem Funde vertreten, ist unzweifelhaft. Dieser Zeit sind die Säbelnadeln (Fig. 4) und Schwertnadeln (Fig. 5), das Miniaturschwert (Fig. 6) und noch mancher andere Bronzetypus zuzurechnen. Jedoch nicht minder ist die Keramik imstande, einen vollgültigen Nachweis dieser Zeit zu liefern. Aus diesem Material würde ich als Beispiel die Schalen mit hohen Henkeln (Fig. 7) erwähnen.

Eine reiche Serie von Gegenständen liefert die Hallstattperiode der Ansiedlung, aus denen hier die charakteristische Brillenfibel (Fig. 8), Hängeschmuck in mancher Variante (Fig. 9, 10) und als Beispiel der Keramik die Schüssel mit eingebogenem Rande (Fig. 11) erwähnt seien.

Den Schluß der prähistorischen Fundkette bilden die Altsachen der La-Tène-Zeit. Ich würde hier auf das Vorkommen der La-Tène-Fibel (Fig. 12), der Knotenringe (Fig. 13) und der auf der Drehscheibe gemachten Gefäße (Fig. 14) hinweisen.

Den so in großen Umrissen mitgeteilten Altsachen reihen sich die Funde des Historikums an, zunächst Römer-, dann Slawen- und Völkerwanderungszeit, die ich hier mit je einem Stücke zur Anschauung bringe. Es sind dies eine Fibel der Römerzeit (Fig. 15), ein slawischer Schlüßfening (Fig. 16) und eine Pflugesarbfibel (Fig. 17) der Völkerwanderung.

Die mitgeteilte Serie Velem St. Veiter Funde ist zwar geeignet, das Vorkommen der zeitlich getrennten Altersstufen zu beweisen, jedoch lange noch nicht so vollständig, um auch zugleich die für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage notwendige Tiefenausdehnung im Rahmen der einzelnen Zeitabschnitte zur Anschauung zu bringen.

Zur Beantwortung dieser unbedingt nötigen und unerläßlichen Frage muß vielmehr in den einzelnen Zeitabschnitten, die zwischen Neolithikum und Historikum liegen, jenes Fundmaterial zur Publikation gezogen werden, das die Unterstufen im einzelnen Zeitabschnitte typisch zur Anschauung bringt. Damit erst wird der Beweis erbracht sein, daß im Rahmen der einzelnen Zeitstufen die Entwicklung am Orte selbst stattgefunden hatte. So auch sind dann später jene Grenzlinien zu bilden, zwischen

denen die zur Kontinuität unerläßlichen einzelnen Übergangsfunde einzureihen sind.

Die Neolithstufe der Velem St. Veiter Ansiedlung hat, wie bereits erwähnt, auf Grund der ihr sicher zuzurechnenden Funde keine große Ausdehnung und auch keine lange Lebensdauer am Orte besessen. Ihr folgte die Bronzezeit, die in den Funden Velem St. Veits durch manche Type zur Anschauung gebracht wird. Auch ist das diesbezügliche Material geeignet, die Kontinuität im Rahmen der Zeitstufe mit manchem Stücke zu erbringen. Da jedoch begründete Aussicht vorhanden ist, daß im Laufe der nächsten Jahre die Monographie des Fundortes zur Publikation gelangen wird, so sei es mir erlaubt, mich hier an ein an Zahl geringeres Material halten zu dürfen.

Die Bronzefunde der Ansiedlung lassen unbedeutend auf eine lange Zeitdauer und Entwicklung schließen. Sie berühren sich einerseits mit Altsachen, die noch dem Neolithikum ihre Formen entlehnen, andererseits gehen dieselben mit manchen Typen in die Hallstattzeit über. So bildet einen wichtigen Beleg einer alten Bronzezeit der dreieckige Dolch (Fig. 18) in den Funden. Diesem Stücke folgen als jüngere Typen die bereits mitgeteilten Stücke (Fig. 4 bis 6) und noch jüngere Typen, wie z. B. die die Fibel durchgehends in den Bronzezeitfunden Ungarns ersetzende Schmucknadel mit Ohr (Fig. 19) und das Rasiermesser (Fig. 20).

Den besten Beweis der Kontinuität im Rahmen der Hallstattzeit liefert die Typenserie der in Velem St. Veit gefundenen Fibeln. Die Fibel ist dort, wie überhaupt in ganz Ungarn, ausschließlich der Hallstattzeit zuzurechnen. Ihr Vorkommen ist auch hier in zwei Perioden einzuteilen, in eine ältere und eine jüngere. Es würde jedoch hier zu bemerken sein, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die sogenannte ungarische Type mit ihren Varianten eine Zwischenstellung einzunehmen scheint, da dieselbe sowohl mit Typen der jüngeren als auch mit denen der älteren Zeit vorkommt. Die Typen, die in den Funden vertreten sind, sind folgende. Zu den ältesten Typen der Ansiedlung dürfte die unter Fig. 21 abgebildet werden, deren Bügel sicherlich durch Glas verziert gewesen sein wird. Eine gleichfalls alte





Fig. 26.



Type ist die Kahnfibel (Fig. 22) mit kurzem Fuße und die mit langen in einen kleinen Knopf endigenden Fuße (Fig. 23). Eine weitere Type dieses Zeitabschnittes ist die Brillenfibel (Fig. 8) und ihre Variante mit Hängeschmuck (Fig. 24).

Wie bereits erwähnt, dürfte die aus der Brillenfibel hervorgegangene Fibel vom sogenannten ungarischen Typus eine Zwischenstellung zwischen der älteren und der jüngeren Hallstattzeit einnehmen — daher werde ich auch hier die am Orte vorkommenden Varianten

Fig. 27.



gesondert zur Darstellung bringen. Als erste Type dieser Serie ist jene Fibel zu nennen, deren Bogen durch in 8-Form gebogenen Draht gebildet wird (Fig. 25). Als nächste Type ist die mit großen Spiralen endende Fibel zu erwähnen, deren Bogen aus rundem, nur eine leichte Krümmung zeigendem Draht besteht (Fig. 26). Diese Type sowohl, als auch die nächstfolgende wird am Orte stets paarweise durch Ketten vereint gefunden. Es ist dies die Type, bei der der Bügel durch Spiralscheiben (Fig. 27) verziert ist. Den Schluß dieser Serie bildet jene Fibel, bei der sich der Bügel zur gepunzten Platte erweitert (Fig. 28).

Die der jüngeren Hallstattzeit angehörenden Fibeln der Ansiedelung sind: Die Kahnfibel mit querlaufendem Wulst (Fig. 29) und so auch die mit Knöpfchen versehene (Fig. 30); die langfüßige Fibel (Fig. 31); die aus ihr entstandene Glasinaefibel (Fig. 32); endlich die Certosa-fibel (Fig. 33) und die Tierfibel (Fig. 34).

Auch für die La-Tène-Zeit ist die Fibel diejenige Type, die in ihrer Entwicklung am besten die Kontinuität innerhalb dieser Zeitstufe zur Anschauung bringen kann. Unter den Velem St. Veiter Funden sind sämtliche drei Haupttypen vertreten: Die der Früh- (Fig. 35), Mittel- (Fig. 36) und Spät-La-Tène-Stufe (Fig. 37).

Diese Kontinuität im Rahmen der einzelnen Zeitabschnitte genügt keinesfalls, um auch die Kontinuität der Besiedelung zu beweisen. Denn zur Beantwortung dieser Frage ist unbedingt ein weiteres Material notwendig und zwar eines, das sich an zwei Zeitstufen anlehnend in seinen Typen den Übergang von einer zur anderen bildet.


Da in der Ansiedelung am Velem St. Veitsberge für die Entwicklung und Blüte eines Kupferalters die Bedingungen zum Suchen und zum Finden kaum vorhanden sein dürften, so fehlen derzeit noch dort in den Funden jene klassischen Übergänge der Neolithzeit zur Bronzezeit, die sonst gerade diesem Übergangsalter eigen sind. Auch dürfte hier ein später mitzuteilender Umstand noch in Berücksichtigung gezogen werden. Die Gegenstände und Funde sind demnach nicht derart, daß sie ein Verschmelzen dieser zwei Zeitalter ersichtlich

machen würden, sondern solche, die mangels eines Systems sowohl dem Neolithikum als auch einer alten Bronzezeitstufe zugerechnet werden können.

Aus dem zur Hand liegenden reichen Materiale erlaube ich mir beiliegendes zu erwähnen und zur Abbildung zu bringen: Flaches Steinbeil mit an die Eneolithstufe erinnernder Perforation (Fig. 38); Steinbeil mit dünnem Nacken (Fig. 39), der in einer Metallzeit zu perforieren versucht wurde; ein Stück Obsidian (Fig. 40) mit seitlichen Retouchen; ein Nukleus aus dem im Bakony sich findenden Holzopal (Fig. 41); endlich ein Beinknopf mit doppelter Perforation in der charakteristischen Form (Fig. 42).

An Übergangstypen zwischen Bronzezeit und Hallstattzeit ist in den Funden der Ansiedelung kein Mangel. Aus dem verfügbaren Material dürfte zur Beleuchtung der Frage das Folgende genügen: Gußform zu einem Celt (Fig. 43) mit dem für ungarische Funde charakteristischen Schnabelfortsatz, der sich sowohl Funden der späten Bronzezeit als auch denen der frühen Hallstattzeit anreicht. Zu diesen Übergangstypen müssen ferner die aus dünnem Bronzedraht gefertigten Arminge gezählt werden, deren Ende aufgerollt ist (Fig. 44), wie auch jene Arminge, die ziemlich massiv gegossen auf ihrer abgerundeten Außenfläche reiches Punzornament besitzen (Fig. 45). Als weitere Typen würden zu nennen sein die Lanzenspitze mit breitem Blatte (Fig. 46) und der für die Ansiedelung nicht minder charakteristische Palstab (Fig. 47) mit abgerundeten Flügelappen, die fast eine doppelte Tülle bilden. Diese Kulturstufe besitzt in ihren keramischen Funden zwei in erster Linie zu erwerbende, für diese Übergangszeit charakteristische Gefäßtypen: eine mit zwei, oder auch manchmal nur mit einem Henkelchen versehene Urne, die auch zuweilen am Hals und Bauch ornamentiert vorkommt (Fig. 48), und als zweites Gefäß ein kleines Töpfchen mit nach außen sich krümmendem Rande, das am Bauche mit in Büscheln stehenden seichten Hohlkehlen ornamentiert ist (Fig. 49).

Doch auch die Serie von in der Ansiedelung gefundenen Bronzemessern zeigt diesen






Übergang von der Bronzezeit zur Hallstattzeit recht charakteristisch, wie dies aus den drei hier zur Abbildung gelangenden Stücken leicht ersichtlich ist (Fig. 50 bis 52).

Den Übergang zwischen Hallstatt- und Latène-Zeit bildet in erster Linie die Armbrustfibel,

andere Typen bilden in den Funden einen wenn auch nicht so charakteristischen Übergang als z. B. die Stecknadeln mit primitiver Menschengehirn (Fig. 57, 58), und die Stecknadeln und Schneckenadeln mit primitiven Pferdeköpfen (Fig. 59 bis 60).



zunächst mit ihrer allgemein vorkommenden, noch der jüngsten Hallstattzeit zuzurechnenden Variante (Fig. 53), und mit ihrer dem Süden angehörenden zweiten Variante mit primitivem Pferdekopf (Fig. 54), die entschieden schon eine Früh-Latène-Type ist. Übergänge, die jedoch mehr der Hallstattzeit als der Latène-Zeit zuzurechnen sind, sind zwei interessante Varianten, deren eine einen Kahn (Fig. 55), leider nur im Bruch, die zweite als Bogen den einer Glasnadel besitzt (Fig. 56). Doch auch

Endlich bildet den Übergang von Prähistorikum zum Historikum jene Gruppe von Fundgegenständen, die ihre Analogie in den Funden von Stradonice finden. Aus dieser Gruppe erlaube ich mir vier Gegenstände zur Ansicht zu bringen (Fig. 61 bis 64).

Der nun mitgeteilte Auszug vom St. Veiter Funde dürfte genügen, um ad oculos zu demonstrieren, daß wirklich eine Kontinuität den am Orte vorkommenden Gegenständen eigen ist und so in ihrem Gesamtkultur-Entwickelungs-

jene ununterbrochene Besiedelung vom Neolithikum an aufweist, die den Gegenstand meiner jetzigen Mitteilung bildet.

Diese Erscheinung ist jedoch in sich allein noch nicht völlig beweiskräftig; sie muß unbedingt durch die am Orte sich vorfindenden Situsbilder ergänzt werden, um auch auf diesem Felde den Nachweis der Kontinuität der Ansiedelung zu erbringen.

Das im folgenden zur Erörterung gelangende Beweismaterial stützt sich auf die seit einer kurzen Reihe von Jahren am Orte gemachten systematischen Ausgrabungen.

Doch ehe ich auf dieses Thema übergehe, dürfte es hier am Platze sein, jenen bei dem Übergang vom Neolithikum zur Bronzezeit angedeuteten Umstand vor allem zu besprechen. In dem Bereiche der Wohnungsanlagen, des Besiedelungsortes von Velem St. Veit, die entweder einer frühen Bronzezeit, oder aber auch nicht minder manchmal einer frühen Hallstattzeit zugewiesen werden müssen, und die somit auf dem gewachsenen Boden aufliegen, kommt öfters eine recht sonderbare Erscheinung vor. Es sind dies die teilweisen Bestattungen. Diese bestehen in Menschenschädeln und einzelnen anderen Menschenknochen, zumeist von mehreren Individuen stammend. Sie finden sich in im gewachsenen Boden ausgehöhlten, 30 bis 50 cm tiefen, runden oder länglich ovalen Löchern ohne jedwede Beigabe. Die Kulturschicht über diesen und um diese Löcher ist immer eine ungestörte.

Die Erklärung dieser Befunde dürfte darin liegen, daß wir Nachbestattungen vor uns haben; sie verdanken ihre Entstehung dem Umstande, daß bei Anlage neuer Wohnungen in älterer Kulturschicht Bestattungen gefunden wurden, die nun gesammelt und neuerlings bestattet wurden. Mit Ausnahme dieser Nachbestattungen wurden keine anderen dem Prähistorikum angehörende Gräber in der Ansiedelung gefunden, und diesen Nachbestattungen wurden weder die alten, noch neue Beigaben beigelegt. Demnach ist der historische Hergang wohl folgender gewesen: Mit der frühen Bronzezeit tritt am Orte eine neue Besiedelung durch ein neues Volk auf, das seine Toten gesondert von seinen

Wohnanlagen in eigens diesem Zwecke dienendem Gräberfelde bestattet. Da nun diesem Volke der überall vorkommende Totenkult, oder vielmehr die Furcht vor den Toten, keinesfalls gemangelt hat, so war die unausbleibliche Folge die Nachbestattung zufällig aufgefundener Skelette aus früherer Zeit, und zwar in der in Velem St. Veit sich findenden Form, ohne jede Beigabe. Die Anzeichen des Ahnenkultes mangeln diesen Nachbestattungen, da der neue Ansiedler sich dessen bewußt ist, daß die im Bereiche seiner Wohnung gefundenen Bestattungen einem alten, fremden, ihm kaum verwandten Stamme und Volke angehören. Er kann dieses Bewußtsein entweder durch eine nicht unmögliche Tradition erhalten haben, oder aber auch durch das in situ gefundene Skelett, das jedenfalls eine von seinem eigenen altgewohnten Totenkulte abweichende Beisetzung gehabt haben wird.

Auf Grund des eben erwähnten Umstandes ist daher mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß in Velem St. Veit durch die Einwanderung eines fremden Volkes die Neolithzeit unmittelbar in die Bronzezeit übergeht, und so das Fehlen der typischen Übergänge eine natürliche Erscheinung ist.

Daß am Orte diese neue Besiedelung am Ende der Neolithzeit ohne Kampf und auf friedlichem Wege stattfand, würde ich im folgenden begründet sehen: Die derzeit gemachten Ausgrabungen haben immer den Beweis geliefert, daß zur Neolithzeit eine nur dünne Besiedelung am Velem St. Veitsberge gewesen ist, daß aber mit der Bronzezeit die Ansiedelung plötzlich und unvermittelt eine große Ausdehnung erhalten hat. Auch ist der Umstand wichtig, daß von einer gewaltsamen Eroberung, die mit der Zerstörung der vorhanden gewesenens Ansiedelung verbunden sein müßte, keine Spur zu finden ist. Endlich sind die einer reinen Neolithzeit zuzuschreibenden Schichten überhaupt selten, und nur an kleinen, zwischen bronzezeitlichen oder auch früh-hallstattzeitlichen Wohnanlagen ausgespart gebliebenen Stellen zu finden und dort auch nicht als Wohngruben, sondern vielmehr als Reste von Urstahnen zu betrachten. Solche Stellen kommen überhaupt nur im oberen Drittel der Bergeshöhe vor. Hingegen sind die Spuren der Bronzezeit

auch an unteren Drittel der Besiedelung nicht selten in tiefer Schicht zu finden.

Die mit einer alten Bronzezeit am Orte auftretende Bevölkerung scheint auf Grund aller bis jetzt gemachten Wahrnehmungen im ungestörten Besitze der Ansiedelung bis zum Historikum zu bleiben.

Die diese Ansicht begründenden stratigraphischen Wahrnehmungen sind folgende: A. Das konstant gleichmäßige Kulturschichtungsmodell der Ansiedelung. B. Die sukzessive Benutzung der Wohnanlagen in zwei verschiedenen Zeitaltern. C. Der Aufbau der Feuerstellen. D. Die unzwischen zeitlich weit getrennten Kulturschichten auftretenden fundlosen Schichten. E. Die Umkehr des Schichtenlagerungsbildes an den der Erosion ausgesetzten Stellen.

Die Lagerung der einzelnen Kulturschichten und so das Kulturschichtungsmodell ist, wie bereits erwähnt, immer ein gleichartiges. Der oberen Erosionschicht oder Ackerkrume folgt in geringer Tiefe eine dünne, historische Funde führende Schicht, der sich alsbald eine der La-Tène-Zeit anschließt. Unter der La-Tène-Zeit-Schicht wird beim Vorkommen von mächtigeren Kulturschichten stets als folgende Schicht die der Hallstattzeit gefunden, der sich unmittelbar an den gewachsenen Boden angelehnt, eine bronzenzeitliche öfters zugesellt. Derlei Durchschnitte wurden z. B. bei den Ausgrabungen vom Jahre 1900 und 1902 gefunden. Die des Jahres 1900 hatte das Durchschnittsbild von 10 cm Ackerkrume, 10 bis 75 cm La-Tène-Zeit-, 75 bis 90 cm Hallstätter- und 90 bis 100 cm Bronzezeit-Schichten.

Die des Jahres 1902, die eine bedeutend mächtigere Kulturschicht ergab, zeigte im Durchschnitt die folgende Lagerung: 0 bis 60 cm obere rezente Erosion, 60 bis 75 cm Slawenzeit, 75 bis 100 cm ältere Erosion mit prähistorischen Funden, 100 bis 125 cm Römerschicht, 125 bis 130 cm La-Tène-, 130 bis 220 cm Hallstattzeit- und 220 bis 300 cm Bronzezeit-Schicht.

Andere Durchschnittsbilder mit geringerer Kulturschicht sind z. B. eine zweite des Jahres 1900 mit 10 cm Rasen-, 10 bis 50 cm La-Tène-Zeit- und 50 bis 70 cm Hallstattzeit-Schicht.

Oder eine des Jahres 1901 mit 10 cm Rasen-,

10 bis 110 cm La-Tène-, 110 bis 225 cm Hallstattzeit-Schicht usw.

Aus diesen vier als Beispiel hier mitgeteilten Durchschnittsbildern wird ersichtlich, daß die Reihenfolge der prähistorischen Schichtung immer eine gleiche ist, es dürfte daher dies Material genügen.

Der Grundriß der Wohnanlagen ist zu allen prähistorischen Zeiten am Besiedelungsorte ein runder. Diese Wohnanlagen standen in der Bronze- und Hallstattzeit-Periode zumeist in zwei Reihen auf den etwa 20 bis 25 m breiten prähistorischen Terrassen, und zwar abwechselnd, so daß sie in ihrer Anlage eine ziemlich langgezogene Zickzacklinie bilden. Das Dach der Hütten bestand aus Stangen und Astgeflecht, das sowohl von innen als von außen einen geglätteten Lehmwurf hatte. Dank diesem 5 bis 7 cm dicken Bewurfes zählte es zu den Seltenheiten, wenn zwei nebeneinanderstehende Hütten dem Feuer zum Opfer fielen. Diese durch Feuer zerstörten Hütten geben die besten Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der Wohnanlagen. Bei solchen zerstörten Wohnanlagen wird in der obersten Schicht rotgebrannter Lehmwurf gefunden, der auf der einen Oberfläche glatt und auf der anderen die Eindrücke von Flechtwerk hat. Dieser Lehmwurf wird an der Peripherie der einstigen Wohnanlage in dieser Schicht gefunden, die gegen den Mittelpunkt an Dichte abnimmt, so daß im eigentlichen Mittelpunkte sich nur einzelne kleine Bruchstücke dieses Lehmwurfes finden. Als zweite folgt eine an Holzkohle reiche schwarzgefärbte Schicht von etwa 15 bis 20 mm Dicke. Als dritte Schicht kommt dann wieder eine aus rotgebranntem Lehmwurf, doch mit dem Untersiede, daß in dieser die mit den Eindrücken versehenen Seite nach oben zu liegen kommt. Auch hier ist im Mittelpunkte das Fehlen des Bewurfes zu beobachten. Aus diesen drei Schichten ist zu folgern, daß das Hüttendach aus Stangen und Astgeflecht bestand, das sowohl von außen als von innen mit Lehm verkleidet gewesen, und daß die Spitze der Hütte keinen Lehmwurf hatte, da dieselbe zum Entweichen des Rauchs diente. Unter den bisher besprochenen Schichten folgt alsbald die Feuerstelle und die innere Hüttenanlage. In der

Hüttenmitte befindet sich die Feuerstelle mit einem ovalen Querschnitt. Sie besteht aus einem noch später zu besprechenden, 40 bis 60 cm hohen Aufbau, der auf dem gewachsenen Boden aufricht. Rund um die Feuerstelle ist eine etwa 40 bis 50 cm hohe Stufe zu finden, die von der Feuerstelle 40 bis 50 cm entfernt gelegen ist. Durch diese Stufe wird am Grunde der Hütte

bunden. Ich erlaube mir, zur besseren Erklärung dieser Beschreibung, das ideale Durchschnittsbild einer solchen Wohnstätte beizulegen (Fig. 65 u. 66).

Da die Wohnanlagen der La-Tène-Zeit in manchen Fällen auf Schichten der Hallstattzeit zu liegen kommen, so ist deren genauer Durchschnitt schwer erhältlich. Doch konnte

Fig. 65.



Fig. 66.




Fig. 67.



Fig. 68.



um die Feuerstelle herum eine seichte Mulde gebildet, in der Kohle, Asche, vermoderte organische Stoffe, Knochen, Bruchstücke von Gefäßen, beschädigten Gerätschaften immer zu finden sind. Die 40 bis 50 cm hohe Stufe bildet oben eine 50 bis 60 cm breite Platte oder Ebene und endet an ihrer Peripherie entweder in einer schrägen Wand oder aber in einem um 50 bis 60 cm höher gelegenen zweiten Absatz. Der immer gegen Osten gelegene Eingang besteht aus einem schmalen Vorbau von 100 bis 110 cm Länge und 90 bis 100 cm Breite, der gleichfalls ein Dach hatte. Der Vorbau ist mit der Sohle der Wohnanlage durch Stufen ver-

bunden. Auf Grund der in dieser Zeit abgebrannten Hütten der Grundriß derselben als rund bestimmt werden. Auch dürften die meisten Wohnanlagen der La-Tène-Zeit aus der Hallstattzeit stammen. So z. B. die zwei im vergangenen Monat Juni erforschten Hütten, in denen auf der dem gewachsenen Boden aufliegenden Sohle sich typische Scherben der Hallstattzeit fanden (Fig. 67 u. 68). Dieser Umstand ist für die Kontinuität der Besiedelung von großer Wichtigkeit. Auch schon bei der Ausgrabung des Jahres 1900 fand sich auf derselben prähistorischen Terrasse in deren nordwestlichen Fortsetzung im vierten und

fünften Forschungsgraben 150 cm tief eine gleiche, entschieden der Hallstattperiode zuzuschreibende Wohnstätte, die bis zur Sohle mit Scherben und anderen Funden der La-Tène-Zeit angefüllt war. Auch ist der Fall nicht selten, daß in der die Feuerstelle unmittelbar umgebenden Mulde Gegenstände zu finden sind, die bei Hallstattzeit-Hütten auf eine Übergangsperiode oder sogar auf eine bronzeezeitliche Besiedelung der Hütte unbedeutend hinweisen.

In der Mitte der Hütte stand, wie bereits erwähnt, die Feuerstelle mit ihrem Aufbau. Die Feuerstelle ist zumeist von ovaler Form, selten rund. Der Rand ist oft mit stehenden Steinplatten eingefast, die nur an der Ostseite fehlen. Die schmale Seite der Feuerstelle befindet sich immer gegen den Ausgang zu, also gegen Osten gelegen. Sie ist immer mit einer 15 bis 20 cm dicken, reinen oder aber auch mit Spreu vermischten Lehmenschicht ziemlich eben verputzt. Dieser Verputz ist ungleich rot gebrannt, woraus zu schließen ist, daß sich nicht auf der ganzen Feuerstelle zugleich Feuer befand, sondern daß dieser Platz vielmehr je nach Luftzuge abhängig war, der durch den Eingang zuströmte. Der Durchmesser der Feuerstellen schwankt zwischen 100 × 150 cm und 160 × 200 cm bei den ovalen; die runden sind zumeist 100 × 100 cm angelegt.

Auf Grund der bei den systematischen Ausgrabungen gemachten Beobachtungen ist der Aufbau der Feuerstellen, sowohl für die Zeitbestimmung, in der die Hütten errichtet wurden, als auch für die Kontinuität der Besiedelung ein wichtiger Beleg.

Der 40 bis 60 cm hohe Aufbau ist immer aus in gelben Lehm gebetteten Gefäßbruchstücken und kleinen Steinplatten erbaut. Da nun zwischen den zum Aufbau verwendeten Gefäßbruchstücken und zwischen den in der Hütte zu findenden Gegenständen ein Zeitstufenunterschied oft zu beobachten ist, so dürfen wir in dem Aufbau bzw. in den in ihm verwendeten Gefäßbruchstücken jenen Gegenstand besitzen, der zur Zeitbestimmung, in welcher die Hütte angelegt wurde, den besten Anhaltspunkt gibt; und dies um so mehr, da im Aufbau noch nie Scherben zweier Zeitstufen vermischt gefunden wurden. Bei der Ausgrabung des Jahres 1901 hatten wir

z. B. Gelegenheit zu beobachten, daß im Forschungsgraben III der zweiten Abteilung der Aufbau zweier Feuerstellen aus Bronzezeit-Gefäßbruchstücken bestand, hingegen um die Feuerstellen sich nur solche der Übergangs- und Hallstattzeit befanden. Einen ziemlich ähnlichen Fall hatten wir bei dem Forschungsgraben V des Jahres 1902. In dem dort gefundenen einen Aufbau befanden sich gleichfalls nur Bruchstücke der Bronzezeit, in der Hütte aber solche der Bronze- und Hallstattzeit. Im gleichen Graben wurde ein zweiter Aufbau gefunden, der aus Hallstattzeit-Gefäßbruchstücken bestand, und in der Hütte ein Gemisch von Hallstatt- und La-Tène-Scherben<sup>1)</sup>. Aus diesem ersichtlich scheint der Schluß berechtigt zu sein, daß der Aufbau der Feuerstelle immer bereits bei Anlage der Hütte errichtet und nur der obere Verputz von Zeit zu Zeit erneuert wurde.

Der Umstand, daß in den Hütten mit Bronzezeit-Aufbau sich jüngere auf diese Zeitstufe folgende Gefäßbruchstücke finden, und daß bei Hallstattzeit-Aufbau nicht selten in der Hütte die La-Tène-Zeitstufe angetroffen wird, ist unzweifelhaft und unbedeutend ein sehr wichtiger Beleg für die Kontinuität in der Besiedelung des Ortes und zugleich nicht minder ein Beweis dessen, daß die am Orte ansässige Bevölkerung immer dieselbe blieb und ohne neue Einwanderung nur die Kulturrichtung allmählich änderte. Die Hütte der Voreltern dient auch dem späten Naefkommen, sie wird von diesem bewohnt, da sie seinen Anforderungen gleichfalls vollkommen entspricht.

Einen weiteren Beleg zur Kontinuität der Besiedelung bietet das Vorkommen von Erosions- oder fruchtlosen Schichten, die in Kulturschichten-Lagerungsabfolge nur zwischen zeitlich getrennten Schichten zu beobachten sind. So finden sie sich z. B. nur unter der La-Tène-Schicht in Fällen, wo dieselbe auf eine ältere Hallstattzeit-Schicht zu liegen kommt. So auch zwischen jüngerer Hallstatt- und La-Tène-Schicht, wenn letztere eine der zweiten Periode angehörende ist. Zwischen reiner Bronzezeit-Schicht und reiner Hallstattzeit-Schicht wurde hingegen noch

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXXIII, 1903, S. 35.

nie eine Erosionsschicht vorgefunden, vielmehr immer eine jener Übergangsschichten, die einen unausgesprochenen Charakter hatten, der abwechselnd ein Plus oder Minus der Bronzezeit- oder Hallstattzeit-Typen in sich schloß. Diese Übergangsschicht wurde auf Grund der in ihr vorkommenden Hallstattzeit-Typen immer der Hallstattzeit zugezählt. Die Dicke der erwähnten fundlosen Schicht schwankt zwischen 10 bis 40 cm und ist immer reich an Steingeröll.

Die bereits erwähnte Umkehr des Schichtenlagerungsbildes in der Erosion dürfte ein weiterer Fingerzeig der Kontinuität sein. Professor Ludwig Bella fand z. B. im Jahre 1902 in einem durch Erosion angefüllten Ringwallabschnitt, bei einer Tiefe von etwa 200 cm dem gewachsenen Boden anliegend, Scherben der Slawenzeit, über diesen Spuren der Römer, dann der La-Tène-, Hallstatt- und endlich zu oberst Funde der Bronzezeit. Es ist dies fast genau das umgekehrte Schichtenbild der Grabung des gleichen Jahres, das ich bereits oben angeführt habe.

Ob nun auch das anthropologische Material diese Kontinuität und die Permanenz der Rasse am Besiedelungsorte beweisen würde, ist und bleibt noch derzeit eine offene Frage, da die zur Ansiedelung gehörenden Gräberfelder noch nicht gefunden wurden. Es handelt sich entschieden um Ort um Flachgräber, deren Aufsuchen wohl von einem glücklichen Zufall abhängen dürfte, indem keinerlei Merkmale weder nah noch fern die Lage derselben erraten lassen.

Fragen wir nach dem physischen und psychologischen Grunde, warum Velem St. Veit mit der Metallzeit jene Anschonung erhält, warum die Siedelung insbesondere in der Bronzezeit- und Hallstattzeit-Periode jene hohe kulturelle Wichtigkeit besitzt, so ist unbedingt der Grund nicht nur in der durch die Natur gegebenen günstigen Lage des Ortes zu suchen, sondern

zugleich auch in jenen Umstände, daß in leicht erreichbarer Nähe mächtige Antimonlager zu finden sind. Mit Recht sagt daher der leider für die Wissenschaft allzu früh verstorbene Dr. Otto Helm in seinem Bericht über Velem St. Veiter Bronzeanalysen <sup>1)</sup>: „Das hier vorliegende Teilstück eines größeren Gußstückes ist ein wichtiger Beleg für die Herstellung von Antimonbronze ohne Zinnzusatz in alter Zeit. Das Stück besitzt innen eine schöne helle Goldfarbe, ist härter als Kupfer und scheint auch in sonstiger Beziehung gleichwertig mit der vom Auslande bezogenen, oder doch vom Auslande abhlugenden Zinnbronze zu sein. Die heimische Industrie der alten Erzgießer in St. Veit hat schon damals mit ihrem in der Heimat gewonnenen Antimon als Ersatz von Zinn erfolgreich mit dem Auslande konkurriert<sup>2)</sup>. Und was Velem St. Veit als Gußstätte der Bronze bedeutete, das lehrt die Zahl seiner Gußformen und die von diesen herrührenden Bruchstücke, da deren Zahl heute 51 Stück beträgt.

Der Besitz des Antimonlagers, die Kenntnis der Metallbereitung und -legierung, ist der Grund, warum in Velem St. Veit ein und dasselbe Volk im Besitze der Ansiedelung während Jahrtausenden bleibt, warum sich dort sukzessive in der Metallzeit ohne neue Einwanderung auch eine neue Kultur entwickeln und der Ort später als deren Emporium dienen kann. Auch läßt die Bedeutung, Abnahme und Verfall der Ansiedelung eng mit der Geschichte der Bronzeindustrie zusammen. Die Stratigraphie Velem St. Veits lehrt uns dies, indem mit Rückgang der Bronze als des wichtigsten Metalls auch das allnähliche Schwenden der Kulturschichten Hand in Hand geht.

Köszeg, im Juli 1903.

<sup>1)</sup> Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte, 1900, S. 361.

### III.

## Die sogenannten magischen Spiegel und ihr Gebrauch.

Von

Prof. Dr. E. Bälz in Tokyo.

Unter magischen Spiegeln versteht man gewöhnlich die japanischen Metallspiegel, welche bei starker Belichtung auf ihrer Rückseite heftliche Figuren sichtbar auf eine matte helle Fläche projizieren. Diese eigentümliche und befremdliche Erscheinung war den Japanern selbst, mit wenigen Ausnahmen, unbekannt, und jedenfalls hatte sich nie ein Japaner mit derselben befaßt, als sie vor etwa dreißig Jahren die Aufmerksamkeit der in Japan angestellten fremden Gelehrten auf sich zog. Unter diesen gab der Franzose Berson zuerst die richtige Erklärung des Phänomens: die den Rückseitefiguren entsprechenden, also dickeren Stellen, sind nämlich auf der Vorderseite weniger konvex als die dünnere Umgebung. Muraoka bestätigte später die Bersonsche Erklärung, und zeigte als weitere Erläuterung derselben, daß durch langes Schleifen die Erscheinung um so deutlicher wird, je dünner die Metallplatte ist <sup>1)</sup>.

Die meisten Spiegel sind aber zu dick, um die Figuren zu zeigen, und ohne weitere Vorbereitung waren sie nur bei wenigen Exem-

plaren zu sehen, wie ich mich damals durch die Prüfung von Hunderten von Spiegeln überzeugte. Wenn trotzdem eine große Anzahl solcher Spiegel in Europa existiert, so rührt das davon her, daß denselben für den europäischen Markt die Eigenschaft der „Magik“ erst nachträglich verliehen worden ist. Freilich nicht in der von Muraoka beschriebenen Art des Dünnschleifens, die ebenso zeitraubend als kostspielig wäre, sondern in einer viel einfacheren und praktischeren Weise, welche einem die Händler freilich ungenügend verraten. Man braucht nämlich nur mit einem scharfen Meißel oder Stichel die Umrisse der Figuren auf der Rückseite nachzuhämmern und dieselben werden auf dem Reflexbild deutlich erscheinen, ohne daß man mit bloßem Auge auf der Spiegelfläche die geringste Unebenheit entdecken könnte. Ich besitze einen Spiegel, der auf diese Weise unter meinen Augen „magisch“ gemacht worden ist. Ich erwarb auch die Instrumente, mit denen das geschah, fand aber bald, daß doch ein zureichender Grad von Geschick und Übung zur Ausführung nötig ist, wenn die Umrisse der Figuren nicht leiden sollen. Dennoch wird mancher Sammler und manches physikalische Kabinet für diesen Wink dankbar sein. Denn für Demonstrationszwecke ist es ja besonders lehrreich, wenn man z. B. eine Figur um-

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel reflektieren auch manche der Metallspiegel des europäischen Kulturkreises die Verzerrungen auf ihrer Rückseite, wenn man ihnen durch Polieren und Amalgamieren ihre glänzende Fläche wiedergibt.

hämmernd und sie so auf dem Spiegelbild sichtbar macht, die anderen aber unberührt läßt, so daß sie nicht zum Vorschein kommen.

Diese Art von Spiegeln hatte V. Jäkel im Sinn, wenn er in Heft 5, 1903, des Centralblatts für Anthropologie die Frage aufwarf: „War der magische Spiegel im Besitztum der Vorzeit?“ Er erwähnt dann, daß Bötticher das Menetekel aus Daniels Erzählung als Produkt solcher Zauberspiegel auffaßt, und er nimmt nicht bloß selbst diese Auffassung an, sondern sucht sie noch durch Angaben aus der mexikanischen und japanischen Mythologie zu stützen. Es ist nun merkwürdig, daß sowohl Jäkel als Bötticher die Eigenschaften der Spiegel, denen sie einen soleh alten und wichtigen Gebrauch zuschreiben, gar nicht genauer zu kennen scheinen. Das Menetekel an der Palastwand konnte durch einen der uns bekannten Zauberspiegel nicht hervorgebracht werden; denn es fehlten zwei wesentliche Bedingungen: erstens eine so intensive Lichtquelle, wie sie die Alten nicht besaßen, denn selbst mit elektrischem Glühlicht gelingt das Experiment nicht; zweitens kann man selbst mit Sonnenlicht die Figuren nur auf wenig mehr als einen Meter Abstand ganz deutlich projizieren. Der Zauberer hätte also, selbst wenn die nötige Lichtquelle zur Verfügung stand, was nicht der Fall war, mit seinem Spiegel so nahe an der Wand stehen müssen, daß ihn jedermann sah, und das wäre in Daniels Erzählung sicher erwähnt worden. Übrigens spricht die Darstellung der Bibel selbst nicht für eine solehe Auffassung. Es heißt dort, daß eine Hand aus der Wand hervorkam und die Worte allmählich schrieb. Da wir nun keinerlei Angaben haben, daß die Alten Mittel besaßen, um so etwas durch Instrumente vorzutäuschen, so ist alles Reden darüber müßige Spekulation. Man darf aneh wohl fragen: Ist es richtig oder lohnt es sich, aus dem Wirrwarr von Wundern und Visionen, die das Bueh Daniel zusammensetzen, irgend ein besonderes Stück ernst nehmen und erklären zu wollen? Um so mehr, als wir wissen, daß das Buch vier Jahrhunderte nach den angeblichen Ereignissen verfaßt ist, und daß die Keilinschriften einen König Bel-sazar überhaupt nicht kennen!

Und ebensowenig kann man „durch einen geschickte gehandhabten Zauberspiegel allerlei Bilder auf den Spiegelwänden entstehen lassen“, wie das Jäkel in dem „Hans des Spiegel“ des Tezcatlipoca vermutet. Denn auf glänzenden Metallflächen kommen die Figuren nicht deutlich zum Vorschein. Überdies müssen die Spiegelwände aus zahlreicheren kleinen runden oder ründlichen Spiegeln bestanden haben, die zwischen sich noch zahlreichere nicht spiegelnde Stellen ließen und bei einem solehen Mosaik ist von der Hervorbringung irgendwie deutlicher Bilder schon an völlig für sich keine Rede. Jäkels Hypothese ist nnd für die Luft gegriffen, er zitiert nichts, was auf das Vorkommen von magischen Spiegeln deutet und die Angabe, daß der betreffende mexikanische Gott einen Spiegel besaß, in welchem er alle Vorgänge der Welt sehen konnte, bezieht sich auf ein ganz verschiedenes Phänomen, das wir nachher besprechen. Daß man aber aus dem einfachen Vorkommen soleher Spiegelbehänger Wände nicht gleich das Recht hat, so weitgehende Schlüsse zu ziehen, kann ich an einem Beispiel zeigen, das Jäkel um so mehr anerkennen muß, als es sich in Japan findet, wo der Metallspiegel das Symbol der höchsten nationalen Gottheit, der Sonnengöttin Amaterasu (= Himmlerleuchterin) ist. Im ältesten japanischen buddhistischen Tempel, in Horüji bei Nara, ist ein Zimmer, dessen Wände völlig mit Spiegeln bedeckt sind. Aber dasselbe hat mit Zauberei oder irgend welche frommen Betrug nichts zu tun, die Sache liegt viel einfacher: Es war in alten Zeiten Sitte, daß Frauen in Not oder aus Dank diesem Tempel ihr liebstes und wertvollstes Besitztum, ihre Metallspiegel, opferten, und diese Spiegel hat man an den Wänden aufgehängt, wie man es mit allen Weihgaben zu tun pflegt, z. B. mit Schwertern, Bildern usw. Liegt es da nicht nahe, dies auch für den Tempel in Mexiko anzunehmen?

In Jäkels Beweisführung spielt aber gerade die japanische Sonnengöttin eine große Rolle. Er erwähnt „die japanische Mythe, die von einem Spiegel redet, in dem man allezeit die Wahrheit zu schauen vermag“. Eine solehe japanische Mythe existiert nicht. Jäkel ist hier und in seinen folgenden Angaben



durch seine Quelle (Wliskoeki, Vom wandernden Zigeunervolke) getäuscht worden, also auch in der „aus mehreren Gründen höchst bemerkenswerten Erzählung“, nach welcher die Sonnengöttin sich aus Zorn über die Frevel ihres Bruders Susa no wo (= der grimme Mann, nicht Suzan) verbarg, und durch keine List noch Gewalt herauszulocken war, schließlich aber durch einen Spiegel, der vor ihrer Höhle aufgestellt wurde, verführt wurde, herauszuschauen, worauf sie von den Göttern vollends herausgezogen wurde.

Das alles stimmt nicht mit den Angaben der einzigen Quellen, die wir über die japanische Mythologie besitzen, mit dem Kojiki (alte Chroniken, 712 n. Chr.) und dem Nihongi (japanische Gesebichte, 720 n. Chr.). Nach beiden war es nicht die Anstellung eines Spiegels, was die Amaterasu herauslockte, sondern es war die stürmische Heiterkeit, in welche die „achthundert Myriaden Götter“ durch die mächtigen Gebärden und Gesänge der liederlichen Person im japanischen Olymp der Uzume oder Okame, versetzt wurden. Die Sonnengöttin, die bisher nur die Klagen und Bitten der anderen Götter vernommen hatte, war höchst erstant über dies frohe Lachen; sie steckte neugierig den Kopf aus ihrer Höhle heraus und sah, wie Uzume ihre tollen Tänze aufführte. Diese schob den nebst anderen Opfergaben an einem heiligen Sakakibaum (*Cleyera japonica*) aufgehängten Spiegel auf sie zu mit den Worten: „wir haben hier drin eine herrlichere Göttin als dich“, und als Amaterasu sich vorbeugte, um das glänzende Ding genauer zu sehen, ergriffen die Götter ihre Hand, zogen sie vollends heraus, und der „Kraftgott“ schob rasch einen dazu bereit gehaltenen Felsblock vor die Höhle, so daß Amaterasu nicht mehr zurückkonnte. Daß der Spiegel nebensächlich war, ist schon dadurch klar, daß die zweite Hauptquelle, das Nihongi, ihn bei dem Vorgang der Herausholung der Göttin mit keiner Silbe erwähnt. Vom Spiegel ist vielmehr nur gesagt, daß er bei der Vorbereitung zur Überlistung zugleich und gleichwertig mit Edelsteinen, mit bunten heiligen Bändern usw. an den Sakakibaum angehängt wurde. Chamberlain in seiner Übersetzung des Kojiki

sagt von Uzume: „ihre laute kecke Lustigkeit war die Hauptursache für das Hervorkommen der Sonnengöttin aus ihrem Versteck“. Es ist ja auch natürlich, daß auf die in ihrer Höhle völlig verborgene und verriegelte Göttin zunächst nur durch den Gehörs- nicht aber durch den Gesichtssinn gewirkt werden konnte. Auch die bildlichen japanischen Darstellungen (die im Vergleich zu buddhistischen Bildern recht selten sind) zeigen immer nur das Gesicht der Göttin, wie sie die Uzume tanzen sieht. Jäkel sagt dann weiter: „Als Amaterasu ihren Neffen, den Urgroßvater des ersten Kaisers von Japan, in die Welt sandte, um sie zu unterwerfen, gab sie ihm drei Geschenke; erstens den kostbaren Stein Magatama, eine Kristallkugel, Sinnbild der Seele des Weibes; ein Schwert, Sinnbild der Seele des Mannes, und den Spiegel, das Sinnbild ihrer eigenen Seele. Betrachte, sagte die Göttin zu ihm, diesen Spiegel als meinen Geist, bewahre ihn in dem Hause und in dem Zimmer, in dem du weilst, und verehre ihn, wie du mich verehren würdest. Meine Seele ist die Wahrheit, und wenn du in diesen Spiegel schaust, wirst du die Wahrheit schauen.“

Hier ist jeder Satz unrichtig. Amaterasu sandte nicht ihren Neffen, sondern ihren Enkel auf die Erde; nicht um diese zu erobern, sondern nachdem sie erobert war. Von den drei Geschenken, die sie ihrem Enkel gab, ist die Magatama nicht eine Kristallkugel, sondern ein plattes, kommaförmiges, durchlöcheretes Juwel, das mit Perlen usw. an einer Schnur getragen wurde; es ist ebensowenig das Sinnbild der Seele des Weibes, als das Schwert das Sinnbild der Seele des Mannes ist. Das heilige Schwert ist vielmehr das von dem oben erwähnten bösen Bruder der Sonnengöttin, Susa no wo, im Schwanz eines Lindwurms, den er tötete, gefundene Schwert, das später dem eohistorischen<sup>1)</sup>, halb mythischen Héros Yama-

<sup>1)</sup> Wir haben für Vorgeschichte und Urgeschichte bequeme, allgemein angenommene wissenschaftliche Ausdrücke in Prähistorie und Protolithologie; es fehlt uns aber ein kurzer Ausdruck für das verschwommene Übergangsstadium von Mythos und Legende zur wirklichen Geschichte; dafür dürfte sich das Wort Eohistorie (= Geschichts-dämmerung oder Morgenrote der Geschichte) als bequem und leichtverständlich empfehlen.

tolake gute Dienste leistete. Die für Jäkels Beweisführung wichtigste Stelle „meine Seele ist die Wahrheit, und wenn du in diesen Spiegel schaust, wirst du die Wahrheit schauen“, ist frei erfunden; keine Quelle gibt auch nur den geringsten Anhalt dafür. Damit fällt alles, was als Beweis für magische Spiegel im Altertum aus Japan angeführt wurde, in sich zusammen.

Nicht besser steht es mit den Belegen aus Pausanias. Dieser sagt auch Jäkel: „Rechts vom Ausgange ist im Heiligtum der Despoina in Arkadien in der Mauer ein Spiegel so künstlich angebracht, daß, wer in denselben hinein- schaut, sich selbst nur ganz undeutlich oder auch gar nicht, die Götterbilder aber samt ihrem Throne ganz deutlich sieht.“ Es ist wohl glaublich, daß bei den nach unseren Begriffen innerhin kleinen und schlecht reflektierenden Metallspiegeln der Griechen ein solcher Effekt schwer zu erzielen war. Da aber Pausanias ganz ausdrücklich von der künstlichen Anbringung eines gewöhnlichen Spiegels spricht und auch nicht den kleinsten Hinweis auf einen magischen Spiegel gibt, so ist es völlig unverständlich, wie durch diese Stelle die Böttcherische Vermutung von der Hervorbringung des Menetekel „zu einer halben Gewißheit (-sic!) erlösen“ werden soll!

Es war oben die Rede von dem Spiegel, in welchem der mexikanische Gott Tezcatlipoca alles sah, was in der Welt vorging, und Jäkel führt ähnliche Spiegel des Helios und des Deschemid an (den Spiegel der Amaterasu haben wir soeben eliminiert). Diese Gabe der Spiegelschnur hat aber mit magischen Spiegeln nichts zu tun; sie ist vielmehr eine besondere Form einer höchst merkwürdigen Erscheinung, die dem Gebiet der Autohypnose nahe liegt. Sie besteht darin, daß gewisse Leute durch Starren auf irgend einen glänzenden Gegenstand, einen Kristall, einen Ring, eine Glaskugel, einen Spiegel, eine Wasserfläche, ja selbst auf einen glänzenden Tintenfleck, räumlich ferne oder in der Zukunft liegende Vorgänge schauen oder zu schauen an- geben. Derartige wird aus allen Zeiten und aus den verschiedensten Ländern berichtet, aber es wurde nicht beachtet, weil die „exakte“ Forschung, die es unter ihrer Würde hielt,

sich damit zu beschäftigen, alle solche Dinge a priori für Unsinn oder Schwindel erklärte. Als aber die Londoner Gesellschaft für psychische Forschung die Sache aufnahm und prüfte, da kamen doch recht merkwürdige Dinge zutage, und selbst ein „Exakter“ wird sich jetzt besinnen, ehe er die auf eigener Beobachtung beruhenden Angaben ernster und kritischer, hervorragender Mitglieder dieser Gesellschaft mit einem Aehselzucken alut.

Wer sich für den Gegenstand interessiert — und es sollte sich jeder Gebildete für diese seltsamen psychischen Dinge interessieren — der lese das Kapitel über Kristall-Schauen (Crystal gazing) in Andrew Langs Buch: Geister und Träume (Ghosts and Dreams) nach. Er wird dann keinen Augenblick im Zweifel sein, das daß oben erwähnte „Spiegelschauen“ hierher gehört.

Was bleibt nun von all den Beweisen übrig, die den magischen Spiegel als ein Besitztum der Vorzeit nachweisen sollen? Nichts, rein nichts!

Bei dieser Gelegenheit sei dem Wunsche Ausdruck verliehen, daß doch bei der Erörterung urchenichtlicher, ethnischer und anthropologischer Fragen kritischer und nüchterner vorgegangen werden möge, als es vielfach der Fall ist. Es gibt Gelehrte, die in ihrem Erklärungsdrange aus Strohhalmen von Tatsachen durch Antosuggestion mächtige Balken machen, mit denen sie dann ihre luftigen Phantasiegebäude konstruieren. Das führt schließlich dazu, daß man aus ein paar Fingereindrücken in einem alten Scherben die Gestalt und die Rasse der Töpferin konstruieren will, oder daß man dem lebhaften und intelligenten Volk der Japaner Stumpf- und Mangel an Auffassung als nationale Charakterzüge andichtet. Die Ethnologie und die Anthropologie sind wahrlich schon genügend durch solche Methoden diskreditiert worden; es ist hohe Zeit, daß hier Wandel eintritt.

Jeder Forscher auf diesen Gebieten sollte sich die Worte zur Richtschnur nehmen, die Dickens einem seiner Charaktere in den Mund legt: „What I want is facts, hard facts“. Erst genügend feste Tatsachen, dann erst Deutung und Erklärung.

Es gibt nun aber doch eine Art von Spiegeln, die den Namen „magisch“ mehr verdienen als die bisher beschriebenen, und die in der Tat von Priestern zu frommem Betrug mißbraucht worden sind; ob im Altertum weiß ich nicht, wohl aber sicher in neuerer Zeit.

Diese Spiegel sind selten und sind so wenig bekannt, daß, als ich sie in der Deutschen Ostasiatischen Gesellschaft in Tokyo demonstrierte, sie allen Anwesenden neu waren, doch habe ich einmal darüber vor längerer Zeit in einer englischen Zeitung gelesen, und im Jahr 1898 sind sie von Dr. Milchner in der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte demonstriert worden. Es sind kleine Metallspiegeln von 4 bis 6 cm Durchmesser, welche bei völlig indifferenten Rückenfläche ein strahlenumkränztes BuddhaBild reflektieren, und zwar viel schärfer als die gewöhnlichen Zauberspiegel es mit den Figuren auf ihrer Rückseite tun. Meine Exemplare reflektieren am schärfsten bei 20 cm Abstand auf einem mattweißen oder hellgrauen Grund. Die Priester der mächtigsten buddhistischen Sekte in Japan, der Monto oder Shinshu, geben sie als besonders wertvolles Geschenk gut gläubigen und gut bezahlenden Schafen aus ihrer Herde. Von diesen werden sie als Talisman sehr geschätzt und nur höchst selten veräußert.

Die Nichirensekte soll ihre Gebetsformel „namu myō hōrekyō“ ebenso verwenden.

Die Erklärung der Erscheinung ist dieselbe, wie bei den anderen Zauberspiegeln, aber

man verfällt auf sie nicht so leicht und es ist daher um so mehr anzuerkennen, daß Dr. Milchner sie richtig gegeben hat. Der der spiegelnden Fläche nahe Teil ist nämlich ein sehr dünn geschliffenes Metallspiegeln mit einer Buddhafigur auf der von einem erhabenen Rand umgebenen Rückseite. Nachher lötet man auf diese Rückseite eine neue Bronzeschicht, die gerade den Rand anfüllt, so daß es scheint, als sei alles aus einem Guß. Der Spiegelfabrikant- und Händler, welchen ich damals nach der Herstellung fragte, verweigerte anfangs alle Auskunft; als ich ihm aber ins Gesicht sagte, ich wisse sicher, daß er die Spiegel auf die genannte Weise herstelle, fragte er höchst erstaunt, wer mir das Geheimnis verraten habe, gab also damit zu, daß diese Erklärung richtig war, auf welche dann Dr. Milchner ganz unabhängig kam.

Vermutlich ließen sich auch in China ähnliche Spiegeln finden, die gewöhnlichen magischen Spiegel sind dort längst bekannt.

Zum Schluß sei erwähnt, daß ein japanischer Volksglaube jedem Spiegel eine gewisse magische Kraft zuschreibt, insofern er nur Wirkliches, nicht aber durch Zauberei angenommene Gestalten reflektiere. In ganz Ostasien hat der Fuchs nach der Meinung des Volkes die Kraft, nach Werwolfart menschliche Gestalt, namentlich die schöner Frauen, anzunehmen. Hält man nun einer solchen Hexe einen Spiegel vor, so erscheint darin ein Fuchskopf, und der Betrug ist entlarvt.

## Neue Bücher und Schriften.

1. Rutot, A.: L'état actuel de la question de l'antiquité de l'homme. (Bulletin de la société belge de géologie etc., Tome XVII.) Bruxelles 1903.

Kaum ist das Hörnesche Buch über den diluvialen Menschen erschienen, sind auch die Ergebnisse der Forschungen A. Rutots über die Existenz des Menschen in der tertiären Zeit veröffentlicht worden.

Wie wir wissen, hat G. de Mortillet die Paläthnologie in drei große Abschnitte geteilt: in das Studium des tertiären Menschen oder des Ursprungs der Menschheit; in das Studium des quaternären Menschen oder der Entwicklung der Menschheit und in das Studium des rezenten Menschen oder des ersten Anschlusses der im engeren Sinne genannten Geschichte der Menschheit. Von G. de Mortillet rührt auch die Einteilung und Benennung der sogenannten Steinzeit in die colithische Periode (Pierre taillée par feu-tertiäre Zeit), in die paläolithische Periode (Pierre taillée-quartäre Zeit) und die neolithische Periode (Pierre polie-rezente Zeit) her.

Zur Aufstellung der colithischen Periode haben zunächst die von Bourgeois im Jahre 1867 am Pariser Archäologen- und Anthropologenkongress vorgelegten Silbestücke die größten Veranlassung, die in den untersten miozänen oder obersten oligozänen Lagerungen der Gemeinde Thenay (Loir et Cher) aufgefunden wurden. Diese Silbestücke von Thenay sind dadurch ausgezeichnet, daß ihre Flächen zickzackige Sprünge aufweisen (ähnlich einer Glasur von Porzellan, wenn dieselbe einem heftigen Feuer ausgesetzt war) und daß die Einschnitte (entailles) stets nur auf ein und derselben Fläche auftreten, während die Silbestücke aus der ältesten Quartärzeit (Chelléen) stets beiderseitig grob zugeschlagen sind.

Die Frage, ob an diesen Thenayschen Silbestücken der Stempel einer wirklichen Absicht zu erkennen sei, war schlichtweg nicht zu entscheiden. Von den 15 Mitgliedern der von dem internationalen Kongress in Brüssel (1872) mit der Entscheidung dieser Frage betrauten Kommission erklärten fünf: Steenstrup, Virchow, Neirgyack, Fraas und Desor, daß keine Spur einer menschlichen Arbeit an diesen Silbestücken zu erkennen sei; acht: d'Omalins, de Quatrefages, Cartailhae, Capellini, Worsaae, Engelhard, Waldemar Schmidt und Frank, hielten dieselben für zugeschlagene Silbestücke; da Vibray stimmte nur mit Vorbehalt für die absichtlich zugeschlagene Form dieser Silbestücke und endlich van Beneden hielt sich für nicht genug aufgeklärt,

um einen Anspruch tun zu können. G. de Mortillet faßte seine Ansichten über diese Frage (Le Préhistorique etc., Paris 1883, p. 126) im folgenden zusammen: 1. Es ist als festgestellt zu betrachten, daß in der tertiären Zeit solche intelligente Wesen existierten, um Steinstücke schlagen und um Feuer machen zu können. 2. Daß diese Wesen noch keine Menschen waren und sein konnten, sie waren Vorläufer des Menschen, Verbindungsglieder zwischen den jetzigen anthropoiden Affen und dem Menschen, welche wir als Anthropopitaken bezeichnen können. Endlich 3., daß wir bisher noch keine Überreste dieser Anthropopitaken aufgefunden haben, somit nach dieser Richtung hin noch bedeutende Entdeckungen zu machen sind. (E. Dubois hat die Überreste seines Pithekanthropus erectus erst in den Jahren 1891 und 1892 entdeckt.)

Es sei erlaubt, nur eine Bemerkung hinsichtlich der Mortillet'schen Auffassung hier einzuflechten. Wenn Mortillet behauptet: „il a existé des êtres assez intelligents pour . . . faire le feu“ und macher sagt: „quo ces êtres n'étaient pas et ne pouvaient pas être encore des hommes“, so kann man nicht genug Bedenken zu einem solchen Ratiocinament tragen. Bedenkt man einerseits, daß die Menschheit als solche ohne Erfindung des künstlichen Feuers auf Erden einfach sich nicht behaupten kann, und anderseits wie äußerst unständig und mühevoll schon das primitive Verfahren der Feuerentzündung bei den wilden Völkern war, so wird man doch einsehen müssen, daß ein solches Wesen, welches zuerst den gewiß höchst geräuschvollen Einfall hatte, am Feuer willkürlich machen zu können, die Würde der species „homo sapiens“ schon „in optima forma“ verdient hat. Treffend bemerkt Oskar Peschel: „An Scharfe des Verstandes war ein solcher Prometheus . . . nicht hinter den wahrhaftigsten Denkern der geschichtlichen Zeit zurückgeblieben.“ (Die Urzustände des Menschengeschlechtes, Völkerkunde, Leipzig 1893, S. 141.) Wie geistig hoch schon die klassischen Griechen die Frage des künstlichen Feuers bewerteten, beweist ja eben die Prometheus-sage, nach welcher der Feuerfunk gerade aus dem Himmel herabgestohlen wurde.

Der räumlich bekannte belgische Geolog A. Rutot beleuchtet nun die Frage des tertiären Menschen auf Grundlage seiner eigenen Forschungen von einem neuen Gesichtspunkte. Wie Rutot einleitend anführt, ist die Aufklärung von menschlichen Knochenresten gar nicht ausnahmslos, um die Existenz der Menschheit in den prähistorischen Zeiten nachweisen zu können; es genügt vollends der Nachweis von Werk-

zeugen, Wohnungsplätzen, Monumenten, um die Existenzfrage der Menschheit für diese Zeiten entscheiden zu können, ja man kann sogar aus diesen sich eine viel bessere Idee von den Sitten und von der Gedankenwelt der damaligen Menschheit verschaffen, als wir dies etwa aus den bestkonservierten schiedeländischen vermachten. Es ist eines der wertvollsten Merkmale des Menschen, daß er sich der Werkzeuge bedient, um seine schwachen Tatkraften multipliziert fördern zu können. Es handelt sich bei diesen Werkzeugen zumeist darum, dieselben behufs einer betrübten Kraftleistung anzuwenden zu können, weshalb dieselben aus harter, widerstandsfähiger Materie verfertigt werden müssen. Heutzutage wird hauptsächlich das Metall hierfür verwendet. Vor 500 Jahren war in Westeuropa das Metall noch unbekannt und wurden anstatt desselben Steine benutzt, welche unvergleichlich viel weniger zerstörbar sind als das Metall. Die allererste Industrie beruht demnach auf Gestein, und wir vermögen die Spuren des Menschen der Zeit nach soweit zu verfolgen, als wir instande sind, diese Steinindustrie nachzuweisen. — Man war in Estonien vorwiegend, als man zum ersten Male Silexfunde in den tertiären Erdschichten gemacht hat; leider wurden diese Funde nicht richtig aufgefaßt und fahrig, zweifeltlos interpretiert, so daß dieselben später gänzlich vernachlässigt wurden, ja sogar abgeschrieben wurden. Aber eine gute Idee geht nicht verloren. Dasselbe wurde von mehreren belgischen Forschern, wie auch in England, nach richtigem Aufgefaßt und schließlich zur Geltung gebracht.

Nach der isärischen allgemeinen Ansicht gilt als erstes Handfabrikat der mesolithischen „*coupe de pierre*“ aus der Chollesechen Epoche, welche aber je nachdem bald als Wafler, bald als Werkzeug diente, es war sozusagen ein Gerate für alles. Das Zeitalter dieses als erste Werkzeug der menschlichen Industrie betrachteten „*coupe de pierre*“ ist die untere quartäre Zeit (erste Zwischenzeit), deren Fauna außer dem *Elephas antiquus* auch durch *Rhinoceros merckii*, *Hippopotamus major*, *Machirostus cultriformis* und *Trogontherium* charakterisiert war. Aber alle diese vorerwähnten Konjekturen können heutzutage nicht mehr aufrecht gehalten werden.

Dank den ausdauernden Forschungen der englischen und belgischen Prähistoriker — die, ohne voneinander zu wissen, selbständig arbeiteten — hat sich die Existenz einer bedeutenden vor-Chollesechen Industrie, nämlich die sogenannte colthische Industrie, herausgestellt; infolge davon die ursprüngliche Einteilung der Steinzeit in die colthische, paläolithische und neolithische Periode abermals zur Geltung gelangt ist.

Das wichtige Unterscheidungsmerkmal zwischen den Steinwerkzeugen der zwei letzteren und der colthischen Periode besteht nach Rutot darin, daß, während bei jenen es sich um ein Behalten der Steinstecke handelt, bei die gewünschte zweckmäßige Form erlangt worden ist, es sich bei den colthischen Werkzeugen lediglich um rohe natürliche Bruchstücke (rogmons) handelt, welche direkt zum Schlagen oder zum Schaben benutzt wurden. Und zwar wurden die geeigneten, mehr oder weniger regelmäßigen Formen sofort als Handwerkzeuge gebraucht, die unregelmäßigen, unregelmäßigen Formen wurden einfach dadurch für die Handhabung brauchbar gemacht, daß man die Hand verletzenden Vorsprünge abgeschlagen hat oder daß man an den betreffenden natürlich geformten Steinarten mittels Hammerschläge scharfe Kanten abbrachte. Unter den natürlichen Bruchstücken des Silex waren welche mit scheidenden Kanten und diese letzteren, wenn sie infolge des Gebrauches schon stumpf geworden sind, wurden nachher mittels *Retouche* (retouche distillation) aufgearbeitet. Hierzu diente ein ähnlicher Steinhammer (ein sogenannter *retoucheoir*).

Die colthische Steinindustrie weist also keinen einzigen Typus der „geschlagenen“ Formen auf, bei welchen gewollte Lurisse, d. h. eine Zielstrebigkeit, aufzufinden sind. Diese Industrie hat es mit lauter natürlichen Bruchstücken zu tun gehabt, welche behufs einer Anpassung an aus dem Groltohen hergestellt wurden, welche Bearbeitung je nach Notwendigkeit gelegentlich auch erneuert wurde.

Rutot führt folgende Objekte und Fundorte für die colthische Periode an:

I. Silex du Pay-Cournoy. Wenn die Silexstücke von Thénay für nicht beweisend gehalten werden, so ist dies nicht mehr der Fall für die Silexstücke von Pay-Cournoy (bei Aarville, Département der J. B. Rances in dem durch die betreffenden Fossilien charakterisierten oberen (thivale) Miozän aufgefunden hat. Diese Silexstücke zeigen vollkommen der Definition der colthischen Industrie, sie stellen prächtige Muster für diese Industrie vor; die Retouche behufs einer Anpassung sind an ihnen auffallend rein und deutlich zu erkennen. Es muß demnach die erste Industrie der Menschheit viel weiter nach rückwärts, nämlich bis zur Zeit des oberen Miozän, verlegt werden.

II. Silex du Chalk Plateau du Kent. Diese Silexstücke, deren Kenntnis wir den Forschungen von J. Prestwich verdanken, sind in dem Kieselgiger am Boden eines Buxidus lehmigen Geschiebes (Brixit) aufgefunden worden, welches die oberste der kriechenden Hochplateaus von Kent (England) bedeckt. Dieses Hochplateau liegt überall mehr als 100 m höher als das heutige Meeressniveau. Diese hohe Lage beweist auch das hohe Alter, welches auf das mittlere Miozän hinweist. Es muß hier nämlich bemerkt werden, daß eine Lage von wenigstens 100 m aber dem heutigen Meeressniveau sowohl für Belgien wie auch für Nordfrankreich und Deutschland der sogenannten oberen oder hohen Terrasse entspricht. Da das Bestionische Meer oder das Meer des unteren Pliozän eine ziemlich weite Fläche des englisch-französisch-belgischen Bassins bedeckte, so konnte eine Ausbuchtung von Talern erst dann beginnen, als sich das Bestionische Meer zurückzog, d. h. als sich der Erdbojen erhob und die wilden Gewässer ihm sich zurückziehenden Meeres folgen mußten. Als der Rückzug des Meeres näher, hörte auch die ausblühende Kraft der Gewässer auf und begann die Kieselablagerung, deren Objekte von den uralten Bewohnern des Chalk-Plateaus zu Werkzeugen benutzt waren. Als später infolge einer Bodensenkung das Meer abermals einen Teil des Festlandes eroberte, mußte auch die Strömung der Gewässer nachlassen, infolge davon das Drift (Gietriebe) sich ablagern mußte, welches jetzt die Chalk-Plateau-Industrie bedeckt. Diese Industrie entspricht also der Zeit nach den Kieselablagerungen der oberen Terrasse unseiner Talern, was aber auf das Zeitalter des mittleren Pliozän hinweist. Wie die Silexstücke von Pay-Cournoy, so entsprechen auch diejenigen des Chalk-Plateaus vollends der Definition der colthischen Industrie, sie dienen zum Schlagen, Schaben, Raspeln und Bohren.

III. Silex de Saint-Prest. Die Silexstücke von Saint-Prest (bei Chartres im Euretal) sind bereits seit längerer Zeit (1867) und zwar durch die Forschungen von Bourgeois bekannt geworden, sie gliedern aber bald in Vergessenheit. Nennlich hat sich mit ihrer Untersuchung an Ort und Stelle Laville beschäftigt. Rutot fand unter den Objekten dieser letzteren Sammlung, deren Fundstelle dem oberen Pliozän (*Elephas meridionalis*) entspricht, charakteristische Exemplare der colthischen Industrie; es sind dies Steinambosse (*enclames*), Schläger (*percuteurs*), Schaber (*grattoirs*) und Raspeln (*racleurs*), mit deutlichen Retouche versehen.

III. 2. Silex des Forest Cromer-Beds. Lewis-Abbott (Saint-Leonards-on-Sea), einer der Entdecker der Silvestücke von Chalk-Platou, hat bei seinen Forschungen in den Cromer Forest-Beds (an der süd-östlichen Seeküste Englands) an Ort und Stelle in Gebrauch gewesene Silvestücke aufgefunden, von welchen eines in der Hölle eines Knochens von *Elephas meridionalis* festlag. Dieser Forscher hat einige von ihm beschriebene und veröffentlichte Silvestücke Rutot eingeschickt, wobei auch an diesen die Merkmale der eolithischen Industrie zu sehen. Die Cromer-Beds liegen ebenfalls im oberen Phlozium wie der Fandort der Saint-Prest-Silexe.

IV. Silex de Reutot. Rutot veröffentlichte im Jahre 1900 die Entdeckung der bedeutenden Lager von in Gebrauch gewesenen Silvestücken, welche im Lystale (Westfländer) am Grunde der quaternären Ablagerungen der mittleren Terrasse 25 bis 65 m oberhalb des heutigen Wasserstandes aufgefunden wurden. Das Studium der Ausbildung des Lystales ergab, daß diese Lagerstätte dem Ende des oberen Phloziums entspricht, somit die industrielle Ausbeutung dieser Kieselsücke dem ersten Beginn der quaternären Zeit, also der Ausbreitung der Gletscher (erste oder große Eiszeit der quaternären Zeit) entspricht. Der Typus dieser Silvestücke entspricht vollständig der Industrie der eolithischen Zeit (welches ebenfalls der mittleren Terrasse des Mesostales entspricht) vorgefunden. In dieser Menge dieser Silvestücke in der Umgebung des zur Gemeinde von Beaulieu gehörigen Weilers Reutot benannte Rutot diese Steinindustrie als die Reutotische Industrie (Industrie reutotienne). Diese Industrie hat Rutot neher auch in der mittleren Terrasse der Flandria (Fescuit, Haine, Sambro, Mous), sowie auf dem Platou von Couvel (welches ebenfalls der mittleren Terrasse des Mesostales entspricht) vorgefunden.

V. Silex de Maffies et d'Aiseau. Am Ende des Phloziums erlitt der Talboden der mittleren Terrasse eine Erosion von etwa 30 m Tiefe, welcher neue Talböden um einige Meter höher liegt als der heutige Wasserstand. Es war während dieser Erosion, als die Reutotische Silvestücke von dem jetzt ausgehöhlten Boden des Phloziums zu ihrem Gebrauche verwendet. Als der Wasserlauf sich verlagerte, hörte auch die Erosion auf und der neue Boden bedeckte sich mit Kieselsablagerungen, während die Böhungen cutbüt, angelegt wurden. Die damalige Bevölkerung mußte also, um das Wasser zu erreichen, von dem Kieselager der mittleren Terrasse zu dem neuen Kieselager herabsteigen, welches den heutigen Kieselager Boden der niedrigen Terrasse (basse terrasse) bildet, welcher um einige Meter höher reicht als der heutige Wasserstand. Die alten Bewohner setzten die Ausnützung des Silex auf dieser niedrigen Terrasse fort und verließen hier eine minder alte Industrie als diejenige der mittleren Terrasse, welche Rutot — wegen ihrer speziellen Ortsgabe und ihrer deutlichen Bestimmtheit — als die Reutotische Industrie (Industrie reutotienne-mesovinienne) bezeichnet. Auch diese Industrie gehört noch ganz zur eolithischen Zeit. Rutot konnte diese Industrie im Lystale, wegen der hier wenig entwickelten Kieselager in der niedrigen Terrasse nicht auffinden, hingegen fand er dieselbe im Dendretale (bei Maffies), in den Tälern der Haine, sowie an mehreren Stellen ihrer Nebenarme und ebenso im Sambrotale, in den Gräben des Bahnhofs bei Aiseau sehr reichlich vertreten vor. In dem Mesostale scheint diese Industrie nur schwach vertreten zu sein.

VI. Silex de Mesvin. Die Silvestücke von Mesvin sind bedäufig zur selben Zeit entdeckt worden, als Bourgeois diejenigen von Themy aufwand. Es war im Jahre 1868, als G. Neyrueckx, der beim Eisenbahnbau von Mont nach Binebe den Unterbau auf der Strecke zwischen Lyon-Cilly und Spicennes zu unter-

suchen hatte, in einer am Boden der quaternären Erdschicht liegenden Kieselschicht mit Knochen von Mammut, Rhinoceros tuchorhinus und von noch anderen Tieren dieser Fauna zugleich auch mandelförmig zugeschlagnene Silvestücke fand, welche ganz denselben Typus mit den Boneher der Perthischen Chelles-Silvestücken aufwiesen. Zwischen diesen entschieden geformten Stücken fanden sich aber auch solche Stücke in Menge vor, welche sich von den mandelförmigen charakteristisch unterscheiden. Von diesen mit Reutotischen versehenen Silvestücken hat Neyrueckx eine ganze Sammlung hinterlassen, welche (der sogenannten konglischen naturhistorischen Museum aufbewahrt ist. Wahrscheinlich wäre auch dieser Fund in Vergessenheit geraten, wenn E. Delvaux an den Arbeiten Neyrueckx' nicht teilgenommen hätte und wenn nach dem Tode Neyrueckx' Ceils sich für diesen Fund nicht interessiert hätte. Delvaux hat nämlich in dem Laufgraben von Mesvin ein Lager aufgefunden, welches direkt unterhalb dem quaternären groben Kieselager war und welches lauter reutotierte Silexe — ohne jedwede mandelförmige Silvestücke — einschloß. Er folgerte hieraus, daß diese größere Industrie älteren Datums sein muß als diejenige der mandelförmigen Steinindustrie und er nannte diese bis damals unbekanntes Industrie Mesvinien. Seitdem wurde der Erdboden von Mesvin ebenfalls in Ausbeutung vor genommen, in einer viel größeren Ausdehnung aufgedeckt, infolge davon man einen viel besseren Durchchnitt der Erdschichten erzielte, als dies bei dem erwähnten Laufgraben möglich war. Nunmehr konnte auch die Ortsgabe der rein mesvinischen Industrie viel präziser bestimmt werden. Die Untersuchungen lehrten Rutot, daß, während die Reutot-Mesvinien sich am Grunde der ersten quaternären Schicht (der sogenannten Mousien), also am Grunde der niedrigen (unteren) Terrasse vorfindet, die mesvinische Industrie stets in dem Kieselager anzutreffen ist, welches die höchste Schicht der Mousienschen Ablagerungen bildet; außerdem fand noch Rutot, daß im Lystale, wo das Mousien die untere und mittlere Terrasse bedeckt, die Objekte der mesvinischen Industrie sich auch in jenem Kieselager vorfinden, welches das Mousien der mittleren Terrasse bedeckt. Die mesvinische Industrie entspricht vollere der eolithischen Industrie, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß, während bei den vorausgegangenen Industrieperioden hauptsächlich die natürlich geformten Silvestücke in Gebrauch waren, in der mesvinischen Epoche viele Werkzeugobjekte von solchen Silvestücken herhürten, welche ganz betragsmäßig hergestellt wurde.

VII. Industria de Strépy. Auf der Ausbeutungsstätte von Helin (mit mesvinischer Industrie) verbreitet sich oberhalb des Mousienschen Kieselagers fluvialer Sand, welcher die sogenannte Campinesche Schicht (assise campinesque) bildet, mit einer ausschließlichen Mandelfauna; in diesem Sandlager trat man die ersten Spuren von mandelförmigen Belegen des Chelleschen und Saint-Arbouleschen Typus vor. Hier ist also schon die Chellesche Industrie vertreten. Es muß jedoch bemerkt werden, daß in diesem fluvialen Sandlager drei übereinanderfolgende Grenzlinien der Kieselsteine zu unterscheiden sind. Die unterste, etwa 30 cm oberhalb des mesvinischen Kieselagers, hierauf um 30 bis 40 cm höher die mittlere und endlich die oberste, welche das Niveau des einstigen schwarzen tuffigen Erdbodens begrenzte. In dieser obersten Partie findet man ebenfalls mandelförmige Steinwerkzeuge, die aber nicht mehr zur grob zugeschlagnen sind, wie diejenigen in der Tiefe des Sandlagers, sondern schon regelmäßig geformt sind und mit einer linearen schneidenden Kante versehen sind, was durch eine sorgfältige feinere Retouche erzielt wurde. Wir

|                            |                     |                                |                       |   |  |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| Tertiäres Terrain          | Eozän               | Unteres<br>Mittleres<br>Oberes | Eolithische Industrie | Industrie von Thénay? Frankreich                        |  |
|                            | Oligozän            | Unteres<br>Oberes              |                       | Industrie von Puy-Courry, Frankreich                    |  |
|                            |                     | Miozän                         |                       | Unteres<br>Mittleres<br>Oberes                          | Industrie von Chalk - Plateau, England<br>Industrie von Saint Prost, Frankreich<br>" " Forest-Cromer Bed, England                      |
|                            | Pliozän             | Mittleres (Pliozäne Eiszeit)   |                       | Unteres<br>Oberes                                       | Industrie von Reutel, Belgien<br>Industrie von Houtel-Mesvin } Belgien   |
|                            |                     | Erste Eiszeit                  |                       | Fort schreitung<br>Rückgang                             | Übergang von mesvinischer zur Chellesschen<br>Industrie von Chelles } Frankreich<br>" " Acheul }<br>Industrie von Moustier, Frankreich |
|                            | Quaternäres Terrain | Zweite Eiszeit                 |                       | Fort schreitung<br>Rückgang                             | der Gletscher<br>Paläolithische Industrie  |
| Dritte Eiszeit             |                     | Fort schreitung<br>Rückgang    |                       |   |  |
| Vierte Eiszeit             |                     | Fort schreitung<br>Rückgang    |                       |   |  |
| Industrie der Reuntierzeit |                     |                                |                       |   |  |
| Jetziges Terrain           |                     |                                |                       | Neolithische<br>Bronze<br>Eisen<br>Jetzige<br>Industrie |  |

haben also hier mit dem Acheulischen Typus zu tun. Sieht man also die hier vorkommenden Silex nach dem einzelnen Niveau, so ergibt sich folgendes: die zu oberst liegenden Silexwerkzeuge entsprechen dem Acheultypus, die mittleren dem Chellessen, während die untersten einen Übergang zwischen der mesvinischen und Chellesschen Industrie darstellen. Die Silexstücke dieses letzteren Niveaus sind jene ersten Specimina der mandelförmigen Werkzeuge von grober Bearbeitung, wo die natürliche Oberfläche noch die Hälfte oder noch etwas mehr des ganzen Formates anspricht. Mit dieser Klassifikation stimmen die von N. Dethlefs neulich entdeckten Lagerungen auf beiden Seiten des Hainetales, namentlich bei Estimes, Strépy, Saint-Vaast und Trivieres vollends überein. An allen diesen Fundstätten kommen zahlreiche Haispeln (racloirs), Schaber (grattoirs) als eine weitere Ausbildung der eolithischen Formen vor; wir befinden uns hier sozusagen an der Gekrattstätte einerseits des mandelförmigen Werkzeuges (durch grobe Bearbeitung von mandelförmigen, ovalen oder abgeflachten natürlichen Silexstücken), sowie andererseits der Steinbohle (durch Zuspitzung von länglichen, halbzyllindrischen natürlichen Silexstücken). Die aus zahlreichen Objekten bestehende Sammlung dieser Übergangsindustrie zwischen der eolithischen und paläolithischen Zeit befindet sich im Brüsseler königlichen Museum, deren

Studium von großer Bedeutung ist. Ihre Forschung lehrt uns, daß von den Zeiten des oberen Miozäns (Puy-Courry) bis zum Ende der Zeit des unteren Quaternärs oder des Mosens (Mesvin) die eolithischen Menschen ausschließlich nur Werkzeuge verfertigten; den ersten Übergang zur Verfertigung von Waffen (Totschläger, Dolehe) trifft man ganz deutlich am Grunde der Champineschen Schicht (Strépy) vor, wo man auch den ersten Auftreten des Mammut begegnet. Es fällt somit das erste Auftreten der menschlichen Waffen mit dem Auftreten des Mammut zusammen. Mit dieser Übergangstufe wird also die paläolithische Industrie eingeleitet. Unmittelbar auf diese Übergangstufe folgt die Chellessche Industrie, welche aber von der Mortillet'schen Industrie desselben Namens bedeutend abweicht. Außer dem „coep de poing“ findet man nämlich in derselben Lagerungslage prächtige Schaber, Haispeln, vollkommen eugelschlechte Dolehe und oberhalb der Übergangsschicht weiter vervollkommnete, schön angearbeitete mandelförmige Beile, monstrosche Spitzen, Lanzenspitzen, Wurfspielspitzen, gestielte Pfeilspitzen. Hieran folgt dann endlich die Industrie des Achenéens als letzte Vervollkommnung des Chellessen, deren weiterer Aufschwung aber hier das rauhe Klima infolge der zunehmenden Gletscherdecke der zweiten quaternären Eiszeit ein Ende bereitet hat.

Es geht also aus diesem Studium hervor, daß lango noch vor der Chellean-Äpoche, und zwar seit dem oberen Miozän, eine Industrie existierte, die sogenannte volthaische Industrie, welche dadurch charakterisiert ist, daß dieselbe ohne jedwede Modifikationen und Fortschritte sich immer gleich blieb. Es herrschte also in dieser primitivsten industriellen Zeit eine vollkommene Erstarrung der Technik, da die Bearbeitung der Silexstücke schon im Miozän dieselbe Höhe der Technik aufwies wie im obersten Miozän; man kann dieses für die erste Lebensgeschichte der Menschheit höchst beachtliche Merkmal etwa mit dem Merkmal des an und für sich sehr vollkommenen staatlichen Lebens der Ameisen und Bienen vergleichen, welches auch sich immer gleich bleibt, ohne Modifikation und Fortschritt. Diese Stagnation in der industriellen Tätigkeit der volthaischen Menschheit hat aber in der Neugeburtung der Campanischen Äpoche durch die Erfindung von Steinwaffen einen plötzlichen Fortschritt genommen, welcher seit dieser Zeit bis auf den heutigen Tag ununterbrochen fortwauerte. Der Fortschritt zur Erfindung der Waffen hat gewiß an sich etwas fremdartiges, rätselhaftes. Rutot erklärt dies bedeutungsvolle Erfindung aus rein geologischen Momenten. Wenn man nämlich einerseits bedenkt, daß die technisch veränderte Silexmateriale von der Tertiären bis zur quaternären Zeit stets an Ausdehnung gewann und reichlicher antrat, sowie andererseits bedenkt, daß, von dem Eintritt der quaternären Zeit angefangen, diese Silexlager sich nacheinander mit fluvialen Abladungen, mit Schlamm und Loß bedeckten und folglich das nutzbare Material bald stark abgenommen hat, so ist es nicht mehr rätselhaft, daß ein Kampf um das Bestehen dieses wertvollen Material ausbrechen mußte. Diejenigen Menschenstämme, die ihres uralten Silexbestandes auf diese Weise verlustig wurden, trachteten diejenigen Stämme zu vertreiben, die noch so glücklich waren, im Besitze von Silexlager zu sein. Gegen die Angreifer mußten sich die Besitzenden verteidigen und so mußte man auch auf die Idee von Waffen verfallen. Der Waffengebrauch hat sich aber dann sehr schnell in die menschliche Gesellschaft eingebürgert.

Wie wir sehen, haben die Forschungen Rutots zu wichtigen neuen Gesichtspunkten in bezug auf die prähistorische Lebensgeschichte der Menschheit geführt; wir begnügen uns hier Rutot für seine Forschungen und wir sehen der weiteren Fortsetzung derselben erwartungsvoll entgegen.

Rutot hat die Chronologie der menschlichen Industrie in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt. Prof. Aurel v. Tarok.

2. Gustav Retzius: *Crania saecula antiqua.*
3. Gustav Retzius und Carl M. Fürst: *Anthropologia saecula.*
4. Gustav Retzius: *Das Menschenhirn.*

Die Arbeiten skandinavischer Forscher über die Urgeschichte ihres Landes nehmen seit mehr als einem halben Jahrhundert die Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt in Anspruch. Dort erhielten die anfangs unsicheren Erfahrungen über die langsamen Kulturfortschritte der europäischen Menschheit, durch eine Steinzeit, durch eine Bronze- und durch eine Eisenperiode die besten, tatsächlichen Grundlagen. Auf dem internationalen Kongreß in Kopenhagen (1869) konnte daher der hervorragende Prähistoriker Worsaae mit Recht sagen, daß die neuen Entdeckungen auf dem Gebiet der Urgeschichte die Ideen der gebildeten Welt geradezu auf den Kopf gestellt haben. Noch kurz vorher waren nur die Zivilisationen Italiens, Griechenlands

und des Orients bekannt; darüber hinaus dachte niemand daran, daß sonst in der Welt, namentlich Europas, sich noch irgend etwas der Beachtung wertig ereignet habe.

Durch die auf den ersten Augeneblick unerschließbare Entdeckung dreier urchenichtlicher Zeitalter hat aber die Geschichte des Menschengeschlechtes eine Vertiefung erfahren, die sich nur vergleichsweise läßt mit der Erweiterung unserer Kenntnisse durch das Mikroskop. Während das Vergrößerungsglas uns neues Wesen ohne Zahl und mit den seltsamsten Lebensbedingungen aufzudeckt, deren Existenz sogar unser eigenes Wohlergehen täglich bedroht, hat die Entdeckung neuer prähistorischer Perioden der Menschengeschichte eine solche Fülle neuer Gesichtspunkte erschlossen, daß davon unsere Vorstellungen über die Entwicklung der Kultur und der sozialen Formen fast gänzlich umgewandelt werden sind. Ferner hat sich herausgestellt, daß der Mensch ein außerordentlich widerstandsfähiges Wesen ist. Im Herzen Europas hat er einst Mammut- und Nashorn gejagt und hat mit dem Hohlenbaren die Lagerstätte geteilt. Diese und andere große diluviale Tiere der Vorzeit sind zugrunde gegangen, der Mensch aber dauerte siegreich aus, und sein Geist schuf sich, langsam zwar, doch unabhättnlich immer höhere Kulturstufen. Dieser neue Einblick hat zunächst eine gewisse Bewegung innerhalb der gelehrten Kreise hervorgerufen, aber dann darüber hinaus eine Aufmerksamkeit gefunden, die noch immer im Wachsen begriffen ist. Heute interessiert sich die ganze gebildete Welt für die Forschungen, welche unter der Bezeichnung der Anthropologie zusammengefaßt werden.

Man behaupte sei erwähnt, daß auch der Norden Europas es war, wo zuerst reiche Museen für die Urgeschichte des Menschen entstanden sind. Sie erhielten den einmal gegebenen Anstoß dauernd trete heftiger Kämpfe. Es ist ein hartes Geoz, daß lange Jahrzehnte vergehen müssen, ehe die einfachsten Wahrheiten selbst von der Wissenschaft anerkannt werden.

Auch die großen Entdeckungen von dem Durchgang der Menschheit durch lange Kulturperioden der Stein-, Bronze- und Eisenzeit sind erst nach langen Kämpfen in unsern Wissenschaft aufgenommen worden. Heute freilich gilt es als selbstverständlich, daß nicht nur der Norden Europas, sondern ganz Europa und ein großer Teil Asiens diese Perioden durchgekämpft haben, welche C. J. Thomsen für Danemark, Sven Nilsson für Schweden, G. F. Lisch für Mecklenburg zuerst klar erkannten.

Mit den Entdeckungen der Urgeschichte nahm gleichzeitig die von Blumenbach begründete Kraniaologie einen neuen Aufschwung und zwar aus dem naheliegenden Grunde, um unsere eigene Herkunft und die verschiedenen Formen des europäischen Menschen überhaupt kennen zu lernen. Dieser Teil der Anthropologie hat noch heute mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, die in dem Objekte selbst, in der Natur des menschlichen Organismus begründet sind. Die Schwierigkeiten sind so groß, daß in der letzten Zeit selbst von solchen Männern, von denen man bessere Einsicht erwarten sollte, ein Verdrümmungswert in die Welt eingeschleudert wird: Die Kraniaologie, eine der wichtigsten Grundlagen der Anthropologie, sei auf Abwege geraten, ihre Methode sei unvollkommen und ihre Resultate seien wertlos<sup>1)</sup>.

Aber gerade die nobelsten Arbeiten, die wir hier eingehender berücksichtigen wollen, beweisen durch

<sup>1)</sup> So z. B. H. St. Chamberlain in „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“. München 1899. Myers Ch. S., *Journal of the Anthropological Institut.* Bd. I. London 1901. Klatzsch, Weltall und Menschheit. I. Bd.



die hervorragende Bedeutung, die ihren anthropologischen Resultaten für die Rassenfrage und für die große Germanenfrage überhaupt zukommt, daß diese Verurtheile mehr als gerechtfertigt sind und nur auf den Mangel eines genaueren Verständnisses dieser ausgedehnten Untersuchungen beruhen.

*Crania Svecica antiqua* von G. Retzius<sup>1)</sup>. Dieses umfangreiche Werk besteht aus zwei Bänden, einem Atlas und einem Textband, beide in Folio; in dem Atlas sind auf 100 Tafeln die in Stockholm im Königlichen Institut vorhandene Schädel aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit Schwedens in muster-gültiger Weise in Lichtdruck und in natürlicher Größe abgebildet worden.

Ich unterstelle ganz besonders den Ausdruck „natürliche Größe“, weil durch die volle Größe der Bilder die Rassenmerkmale auch weniger Geübten leichter erkennbar werden. Die Abbildungen in halber oder in ein Drittel Größe schwächen eben die charakteristischen Zeichen auch um die Hälfte oder um ein Drittel für das Auge ab und wirken deshalb weniger belehrend und überzeugend. Es ist eine dankenswerthe Tat, der Nachwelt im Bilde die noch vorhandenen Reste der Vorfahren Schwedens vorzuführen, denn die morsche Schädel gehen selbst in den Museen schließlichen Verfall anhaftend entgegen. Hier in diesem Werke sind sie nicht allein dauernd erhalten, sondern überdies dem weiten Kreis aller Kulturvölker zugänglich gemacht, die sich jetzt oder in den kommenden Zeiten für die Herkunft der europäischen Völker interessieren werden.

Item *Crania suecica antiqua* kommt dabei die nämliche universelle Bedeutung für die Geschichte der europäischen Menschheit von rassenanatomischen Standpunkt aus betrachtet zu, wie den Werken von His und Rtimeyer über die *Crania helvetica*, von Studer und Bannwart über die *Crania helvetica antiqua*, von Davis und Thurnam über die Schädel Altenglands und *Quatrefages* und Hamy über die alten Schädel Frankreichs und andere. Diese weitreichende Bedeutung wird sich am besten darlegen lassen, wenn wir die Auffassung der heutigen Generation über die Germanen als Rasse und als Nation beleuchten, die dringend einer Korrektur bedarf-tig ist.

Die falsche Vorstellung, welche Napoleon III. in die Welt geschleudert hat von „großen europäischen Völkerrassen“ ist fast allgemein zur Anerkennung gelangt.

Von reiner Rasse zu sein, schmeichelt Individuen und Völker.

Die romanischen, germanischen und die slawischen Völker wurden durch ihn zu besonderen Rassen gestempelt und die ganze Welt glaubte es: zuerst die Politiker, dann die politischen Journale und schließlich glaubten fast Alle an diese überaus schnelle Offenbarung.

Der Irrtum ist hervorgerufen worden durch eine Verwechslung der Begriffe. Die Franzosen, Italiener und Spanier sind romanische Völker mit einer Sprache, die einen großen Grad von Verwandtschaft besitzt, sie sind dadurch auch geistig nahe verbunden untereinander und alte Stammtradition verbindet sie durch eine feine Fäden. Das ist die gewaltige Wirkung der Sprache, derselben Art die Gedanken zu formen und sie auszudrücken, die alle Lebensbeziehungen durchdringt, unzahlmala verdrängt und vernachlässigt wird, und doch immer

wieder zum Vorschein kommt. Ebenso verhält es sich mit den germanischen Völkern, mit ihren germanischen Idiomen und ebenso mit den slawischen Völkern. Wie stark die Idee der Zusammengehörigkeit gerade in der Jetztzeit bei den slawischen Nationen sich in den Vorlergrund drängt, ist allgemein bekannt. Sprache, politische Ziele, der Gedanke der Zusammengehörigkeit ist wohl zu keiner Zeit stärker hervorgetreten als gerade in diesen Tagen.

Wie von der Eigenart der Sprache der eben erwähnten Nationen, so spricht man auch mit vollem Rechte von einem Nationalcharakter, von einer nationalen Dichtung und von einer nationalen Kultur. Das sind die Eigenschaften einer großen Gesamtheit stammverwandter Menschen, aber das sind nicht Merkmale einer Rasse. Rasse hat mit Kultur, Sprache, Staat gar nichts zu tun. Der Begriff der Rasse bezeichnet Brut, d. h. die zoologische Zugehörigkeit zu einer bestimmten Art, daher auch die Bezeichnung „Gesicht“, Herkunft von einer bestimmten Stammform mit ganz bestimmten somatischen, das sind körperlichen Eigenschaften.

Wenn nun von linguistischen Standpunkt die erwähnten Völker als sprachlich näher verwandt anderen gegenübergestellt werden, so ist dies vollkommen gerechtfertigt. Wenn aber gleichzeitig behauptet wird, jede dieser Nationen stelle auch eine besondere Rasse dar, jede Nation sei die Spätkult einer besonderen Grundstockes, und was als ihre besondere psychologische, politische und soziale Eigenart hervortrete, sei in Rassenverschiedenheiten begründet! so ist diese letztere Annahme völlig irrig.

Weder die slawischen noch die romanischen, noch die germanischen Nationen sind, für sich betrachtet, jede gleichwertig einer Rasse, sondern alle diese Völker sind aus der Vereinigung mehrerer Rassenstämme zusammengeführt worden schon in der Urzeit. Im Laufe einer langen Entwicklung wurden sie dann durch Gewalt, durch Not, durch gemeinsame politische Ziele, durch Kampf und Streit, kurz durch all das was wilde Horden schließlich vereinigt, zu Völkern zusammengesetzt. Oft nach kurzer Zeit fallen solche Nationen wieder auseinander, werden zertrümmert, Bruchteile an andere umliegende Völker angegliedert, selbst ihr Name verschwindet. So versanken unzählige Völker im gähnenden Schoß der Zeit, aber die Rassen, aus denen diese zerrißenen Horden und Nationen zusammengesetzt waren, blieben erhalten und lebten in dem neuen Verbande unverändert fort. Das lehrt die Geschichte unzähligen Varianten. Diese Zusammensetzung der Nationen Europas aus mehreren europäischen Rassen, schon so oft bewiesen und immer aufs neue bestritten, lehrt uns wieder das Buch über die *Crania suecica antiqua* und zwar in überzeugender Weise von der einen arischen Nation.

Der Beweis darf deshalb als erbracht gelten, weil Schweden ein bestimmt umgrenztes zum großen Teil vom Meer umspültes Land ist, in welchem sich die Bevölkerung seit Jahrtausenden ziemlich unverändert erhalten hat. Auch Schweden hat freilich Einwanderungen erlebt, aber sie waren offenbar nicht so zahlreich wie im Süden Europas, und dann vollzog sich ausnahmslos jene Erscheinung, die als Assimilation der Rassen bezeichnet wird.

Noch ein anderer Grund macht die schwedischen Forschungen über die Zusammensetzung der Bevölkerung so ungemein wertvoll, das ist die Kontinuität der Entwicklung. In anderen Ländern kam es zu Katastrophen, welche in den ruhigen Ablauf der Ereignisse verhängnisvoll eingriffen, ich erinnere nur an die Verwüstung der ersten Frühlingsboten, in Schweden ruhen sich dagegen die Grabstätten durch die Stein-, Bronze- und Eisenzeit in friedlicher Reihen-

<sup>1)</sup> *Crania suecica antiqua*, eine Darstellung der schwedischen Menschenschädel aus dem Steinzeitalter, der Bronze- und der Eisenzeit sowie ein Briefe auf die Forschungen über die Rassencharaktere der europäischen Völker. Mit 100 Tafeln in Lichtdruck. Stockholm 1900. Folio.

folge aneinander und die Kontinuität dieser Kulturperioden spiegelt sich in der Kontinuität der Hasen.

Schon im Jahre 1873 haben G. Retzius und O. Montelius durch Grabforschung die Überzeugung gewonnen, daß die Bewohner Schwedens in der Steinzeit aus einem Mischvolk von Dolichocephalen und Brachycephalen, also aus zwei verschiedenen Rassen bestanden, wozu auch die Dolichocephalen die entscheidende Majorität bildeten (S. 41, Textband). Die neue vorliegende Untersuchung bestätigte diese Tatsache und erweiterte sie durch eine reiche Sammlung des Material. Die Tafeln, die Multabelen und die Beschreibungen zeigen aufs neue, daß diese Schädel keine gemeinsamen Typus darbieten. Selbst der Beginn in der Steinzeit zeigt schon verschiedene Rassen, und diese Periode hat viele Jahrhunderte gewährt. Der gelehrte Reichsanwalt Hildebrand hat bei seiner Rede auf dem internationalen Kongreß für Anthropologie und Urgeschichte in Stockholm 1874 deutlich darauf hingewiesen, wie die nördliche Zivilisation durch Jahrhunderte bestand, und in den Gräbern, in den Torfmooren und in dem übrigen Boden des Landes zahllose Spuren hinterlassen hat. Weder die Zeit der geschliffenen Steine (neolithische Periode), noch die Bronze- und Eisenzeit waren etwa nur kurze, schnell vorübergehende Epochen, sondern ein tiegelartiges Zeitalter, während deren die Völker sesshaft blieben in Schweden, „ils y sont venus pour y rester“. Seit jenem Kongreß haben sich die Untersuchungsmethoden der Schädel, die Materialien für die Unterscheidung der Perioden wesentlich vervollständigt und der Einblick in den Verlauf der Urgeschichte hat sich ganz wesentlich vertieft. Aber heute wieder wie vor beinahe drei Decennien erklärt Retzius auf Grund der Schädelunde: „Die Bevölkerung der Steinzeit bildete keine in anthropologischer Hinsicht reine Rasse. Sie war zwar in überwiegender Menge dolichocephal und bot nur eine geringe Beimischung von anderen Rassen, von Mesoecephalen und Brachycephalen dar.“ Wir werden nun aber später sehen, daß die Dreizahl der Rassen nicht sogar auf die Fünfzahl steigt, denn die Dolicho- wie die Brachycephalen stellen Doppelrassen dar, die je aus zwei verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind. Also zusammengekommen sind also fünf verschiedene europäische Rassen seit der Steinzeit in Schweden sesshaft, fünf Rassen sind es, welche in die Einheit dieses germanischen Volkes eingegangen sind. An diesen auf den ersten Blick überraschenden Resultate der kranologischen Forschung der letzten 50 Jahre beteiligt. Beginnen wir zuerst mit Retzius.

Diesem vielseitig gesonnenen Beobachter konnte es bei genauer Untersuchung seiner wertvollen kranologischen Schätze nicht entgehen, daß unter den Dolichocephalen wie unter den Brachycephalen seines Landes je zwei verschiedene Formen unterschieden werden mußten. Die eine davon, längst bekannt, besitzt ein langes und schmales Gesicht, die andere ein kurzes und breites Gesicht. Ein vorzügliches Exemplar der Langschädel mit breitem Gesicht stammt aus dem Eisenzeitalter von Östergötland. Der Hirnschädel ist hervorragend durch eine Kapazität von 1670 ccm. Das Gesicht mit seinem weitangelegten Jochbogen (Tafel 28) ist breit, kurz und hat niedrige Orbitas und breiten Gaumen. Es wäre nun freilich schlimm nun den Beweis einer allgemeinen Bestandstheorie dieses Objektes für die germanische Völker herleiten, wenn nur der einzige Zeuge beigebracht werden könnte. Glücklicherweise gibt es noch zahlreiche andere. Vor allem, um noch nördliche Zeugen beizubringen, sei erwähnt, daß Larsen aus norwegischen Dolichocephalen neben solchen mit schmalen Gesicht auch solche mit breitem Gesicht gefunden, gemessen und abgebildet hat und

namentlich darunter auch einen aus der Steinzeit. Durch die freundliche Unterstützung meines Freundes Prof. Stieda konnte ich die breitgesichtigen Dolichocephalen in den Ostprovinzen nachweisen und zwar unter der Bevölkerung von heute. In Deutschland sind viele Schädel vom sogenannten Hügelgräbertypus Eckers dieser Rasse hinzuzuzählen. His und Rittmeyer haben schon vor sehr langer Zeit (1865) die nämliche Rasse in Schweizergräbern aufgefunden und als Stontypus bezeichnet. Vor fast 30 Jahren hat Hamy an den Schädeln aus der schwedischen Provinz Dalekelen diese Rasse bestimmt<sup>1)</sup> und weist auf darauf hingewiesen, daß zwischen dieser Rasse und derjenigen von Cro-Magnon eine unverkennbare Übereinstimmung vorhanden sei, eine Angabe, die vollkommen zutreffend ist. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß Hamy sofort die nebelige Konsequenz zieht, die europäischen Rassen seien seit der paläolithischen Periode unverändert, persistent. Er fügt noch bei, daß Broca, entgegen seiner früheren Ansicht, jetzt auch zu der nämlichen Überzeugung von der Dauerbarkeit der europäischen Neusecherrassen gelangt sei.

Zu weiterer Bestätigung der zweiten dolichocephalen Rasse sei hinzugefügt, daß jüngst Szombathy in einem seine bei Lättis aufgefundenen ausgezogen hat, der alle Eigenschaften derjenigen Rasse darstellt, auch das nämliche geologische Alter besitzt, insofern er aus dem Diluvium stammt, daß er, wie ich beifüge, ferner übereinstimmt mit den Langschädeln von breitem Gesicht, die in ganz Germanien, auch in den skandinavischen Ländern und auf dem englischen Inselreich verbreitet waren und noch heute in den skandinavischen Ländern<sup>2)</sup> verbreitet sind.

Über die Brachycephalen sind in den Crania suecica antiqua ebenfalls wertvolle Tatsachen enthalten, nicht gering an Zahl, aber durchschlagen durch den bedeutenden Wert eines gesicherten Zeugnisses.

Die Brachycephalen lösen sich, wie schon erwähnt, bei genauerer Untersuchung ebenfalls in zwei gänzlich verschiedene Rassen auf. Die eine ist gekennzeichnet durch ein langes und schmales Gesicht mit engangelegten Jochbögen, bekannt vom Norden bis zum Süden Europas, hinein bis in die alten römischen und griechischen Kulturländer. Zu dieser Rasse gehört z. B. der Schädel Nr. 74 aus Havor (Eisenzeit-Gotland). Die andere brachycephale Rasse ist durch ein kurzes und breites Gesicht von fast moogolischer Härte charakterisiert. In den Nachforschungen der zweiten brachycephalen Rasse bewahrt sich aufs neue die photographische Heratellung der Tafeln. Die naturgetreuen Abbildungen des Schädels Nr. 21 aus einem Ganggrab sprechen so deutlich, wie der Original selbst (siehe Tafeln 27 und 28). Die Beschreibung dieses Schädels dazu erwähnt die Breite des Gesichtes von 143 mm (Jochbogen-Distanz!) bei einer Gesichtshöhe von nur 113 mm, wozu sich ein Gesichtslängsmaß von 76,0 ergibt; „der Schädel ist ausgeprägt ephanothrop“, fügt ganz richtig der Autor hinzu. Nun war mit diesem einen Exemplar ja auch nicht allzuviel erreicht, obwohl der Mann aus der Steinzeit Schwedens einen höchst zuverlässigen Zeugen an sich unweifelhaft dar-

<sup>1)</sup> Congrès internat. d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique. Compt. rend. Stockholm 1876. 8°.

<sup>2)</sup> Zu weiterer Orientierung siehe Larsen, C. F., Norske Kranietyper. Wissenschaftliche Schriften der math.-nat. Klasse. Christiania 1901. Mit 5 Tafeln. 8°. Saubathy, Congrès international d'Anthropologie, XII. Session, Paris 1900. Compt. rend. 8°.

Kellen, aus, J., Archiv für Anthropologie, Bd. XIII, 1881; Bd. XIV, 1882. Ferner Mitteilungen der Wiener anthropologischen Gesellschaft, Bd. XI, 1882.

stellt, aber um von einer europäischen Rasse sprechen zu können braucht es ein ansehnliches Kontingent von Lebenden und Toten solcher Art. Glücklicherweise ist ein solches Kontingent zur Verfügung: Die slavische Brachycephale Virchows, der Type mongoloide Pruner-Bey, die Turanische Brachycephale Holders, alle sind identisch mit jener Rasse, die wir heute als brachycephale Breitgesichter Europas bezeichnen. Die erwähnten Forscher haben die auffallende Verschiedenheit dieser Rasse von jener mit langem Gesicht erkannt, aber man hat die Anerkennung der Tatsache von der faktischen Existenz solcher Breitgesichter Leute abgesehen, lediglich um der Beziehung willen. Man sträubt sich in germanischen Gauen Turanier, Mongolen oder gar Lappen unter seinen nächsten Verwandten zu besitzen. Die Lappentourne Schuchtschansens hat ganz besonders die Gemüther abgestoßen. Hierbei sind die gewichtigen Einwurfe der Historiker und der Sprachforscher von Erfolg gewesen, und ganz mit Recht — weil weder historisch noch linguistisch mit dieser Entdeckung von Turanern und Mongolen etwas anzufangen ist. Man kann ihre Spuren eben nicht nachweisen.

Aber man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet; Turanier sind nicht da, aber Leute mit breitem Gesicht und kurzem Schädel, die eine entfernte Ähnlichkeit mit Lappen und asiatischen Rassen haben, aber doch solche zu sein. Diese europäischen Breitgesichter sind seit mehr als 10000 Jahren, seit dem Beginn der neolithischen Periode, in Europa schaff, und das ist doch recht lange her, und zwar nicht vielleicht selbst nur in den östlichen Grenzgebieten des alten Germaniens, sondern mitten drinnen. Sie sind auch in Lande gebildet. Sie sind überall zu finden noch heute, vom Nordkap bis nach Sizilien. Sie haben sich das Bürgerrecht erworben und müssen zu den Germanen gerechnet werden, mit denen sie immer zusammengelebt haben. Ich habe ihnen einen antonischen Namen gegeben und sie eumprotoprope Brachycephale genannt, in der Hoffnung, damit die Anerkennung ihrer faktischen Existenz mitten unter uns vielleicht zu erreichen, was mit den ethnologischen Beziehungen nicht zu erreichen war. Die breitgesichtigen Leute sind doch einmal da und lassen sich nicht wegdisputieren. Die obengenannten Gelehrten haben trotz der unglücklichen Beziehung dennoch große Beweise ihres Scharfsinns abgegeben. Sie haben die Rasse erkannt, sie haben sie gefunden, wie sie auch G. Retzius gefunden und als charakteristische Form anerkannt hat. In dieser Hinsicht sei noch an einen interessanten Brief von Topinard erinnert, den er vor einigen Jahren an Garson schrieb und der im Journal of the anthrop. Institut (London) veröffentlicht ist. Auf einer Reise durch die Normandie ist Topinard dieser zweiten brachycephalen Rasse begegnet, was Schuppen für sie ihm von den Angern, und er erkannte mit Überraschung das Vorkommen einer zweiten karakypigen Rasse in Europa. So ließen sich noch viele Zeugnisse anführen, allein das Gesagte mag genügen, um dem von Retzius so vortrefflich abgeleiteten Schädel aus der Steinzeit seine wahre Stellung innerhalb der europäischen Rassen anzudeuten, die noch heute existieren — seit Jahrtausenden noch immer der alten Geschlechter\*.

In der Steinzeit Skandinaviens findet sich noch eine weitere Rasse. Ein Schädel wurde im Jahre 1875 ausgegraben und von Retzius in der nächsten lehrreichen Weise wiedergegeben wie die übrigen. Der Schädel ist — mesocephal. Die Knochen des Gesichtes,

auch der Unterkiefer, alles ist intakt erhalten; eine kräftige breite Stirn, stark vorspringende Augenbrauenwülste (Arens arculariales), niedrige Augenhöhleneingänge (Orbitae), große Joerbogendistanz mit kurzem Gesicht verweisen den Vertreter des steinzeitlichen Skandinaviens in die Kategorie der eumprotoprope Mesocephalen. Solche Schädel gehören einer fünften Rasse an, die in Europa seit der ältesten Zeit heimisch ist, wie die übrigen vier. Sie ist unverkennbar, gleichviel ob sie in alten Gräbern Schwedens oder Süddeutschlands, der Schweiz, Italiens und Ungarns vorkommt. Auch hier zeigt sich, wie bei den übrigen oben erwähnten Rassen, daß diese Mesocephalen mit breitem Gesicht ihre scharf geprägten Züge in Skandinavien<sup>1)</sup> wie in der ganzen übrigen europäischen Welt dauernd und unverändert erhalten haben seit — Jahrtausenden!

Fassen wir nach alledem das Ergebnis der kranziologischen Untersuchung über die alten Bewohner Schwedens zusammen, so lautet es folgendermaßen:

Die Bevölkerung des Landes bestand niemals, so weit wir seine Urgeschichte zurück verfolgen können, aus einer einzigen Rasse, sondern aus fünf bis sechs, die Trümmer fünf verschiedener Rassen.

Die Rassen mit langem und mittellangem Schädel, besonders die beiden dolichocephalen Rassen, waren dabei in der Mehrzahl vorhanden.

Alle Völker, deren Reste aus dem Dunkel menschlicher Vergangenheit erhalten blieben, wie die Botaver, Kaiten, Fresen, Götter, Übersaker usw., sie waren aus Trümmern dieser Rassen zusammengesetzt. Das beweisen die Graberfunde. Wenn wir einmal ahnliche Atlanten über diese Völker besitzen werden, wie wir einen solchen über die alten Bewohner Schwedens vor uns haben, dann kann jeder aus den Abbildungen die Beweise für diese unumstößliche Tatsache ohne Schwierigkeit heranziehen. Aus der zersplitterten und bruchstückartigen Literatur sich diese Überzeugung zu verschaffen, ist allerdings mühsam, und so wird es wohl noch lange dauern, bis die eben erwähnten Tatsachen anerkannt werden.

Wer aber in dieses Chaos von oft schwerverständlichen Angaben einzuordnen vermag, wird ferner erkennen, daß wir uns, die modernen Völker, aus diesen Rassen gemischt heraus entwickelt haben: die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, die Skandinavier, die Engländer usw., sie sind alle gleicher Abkunft, Blut vom Blut der Alten. Die Schweden dürfen sich nach dem vorliegenden Werke freilich rühmen, das Gepräge der alten Rassenmischung am treuesten bewahrt zu haben, trotz der ausgesetzten Kreuzung dieser Rassen unter sich und trotz mancher Zuwanderung. Man hat schon oft behauptet, in dieser beständigen Kreuzung und in der Zuwanderung derselben Rassen, aber aus anderen Gebieten, liege die Lösung des überraschenden Rätsels von der beständigen Verjüngung und der siegreichen Kraft, die in allen Rassen verborgen ist. Die Völker als politische und soziale Gruppen können untergehen, selbst ihre Namen können aus der Tradition spurlos verschwinden, aber die Rassen, aus denen die Völker zusammengesetzt waren, erhalten sich und vereinigen sich in neuer Kombination zu neuen Völkern.

Diese wertvolle Einseitigkeit lehrt die Kraniaologie und die verfehlte Schädelmeßkunst. Freilich muß zugegeben werden, daß es schwer hält, durch die verschiedenen Angaben den rechten Weg zu finden. Allein man darf dabei doch nicht vergessen, daß das Lesens kraniaologischer Werke eben auch solche Vorkeunisse erfordert wie das Lesen irgend einer chemischen

<sup>1)</sup> Kullmann, J., Der Mensch vom Schweinebild, Denkschrift der Schweiz 1904, Bd. XXIX. Naturforschervergesellschaft, Bd. XXXV, 1905, 2. Auflage, ebenda.

<sup>1)</sup> Lorenz hat auch aus skandinavischen Gräbern solche typische mesocephale Schädel beschrieben.

oder physikalischen Abhandlung. Unerlässlich sind dazu naturwissenschaftliche Kenntnisse und jene geistige Dreyheit, die vor allem auch Respekt vor den wissenschaftlichen Tatsachen eines beständig anderer Art als jeuer, der vor der Schwärzung seine Geltung hat, Konstruktionen über die Herkunft der Völker von irgend einem psychologischen Gesichtspunkt aus sind gänzlich wertlos. Linguistik und Historie haben mit der Bestimmung der Rassen in der Urgeschichte zum erstenmal nichts zu tun. Alles Sträuben hilft da nichts, entweder muß der Historiker sich die möglichsten positiven Kenntnisse zu verschaffen suchen, oder er muß den Sachverständigen, hier den Anatomen und den anatomisch-geschichtlichen Beobachtern das Wort lassen.

Es sei bei diesem letzteren berechtigten Wunsche gleichzeitig hervorgehoben, daß selbst das treffliche Werk von Retzius zum Verständnis spezielle Kenntnisse fordert, wie denn auch seine hier gegebene Darstellung des Inhaltes kein farbloses Referat darstellt, sondern eine Übersicht auf Grundlage selbstständiger und langjähriger Forschung.

Es ist wohl kaum zu erwarten, daß die von Retzius in seinen Werke niedergelegten Tatsachen die alten Zweifler beseitigen werden. Auch meine Ausführungen werden keinen großen Erfolg erzielen. Noch darf die Erinnerung nicht vergessen werden, daß die Gedanken befruchtend können, die Nationen von heute seien aus Rassenkomplexen entstanden und dieser Vorgang habe sich schon im gramesten Altertum abgespielt. Die falsche Napoleonische Idee von der Identität der Völker und der Rassen hat zu tief Wurzel gefaßt. Die Vorstellung, daß sich Menscherrassen durch andere Umstände heranzüchten lassen, so ungefähr wie die Reindrücke, ist silbweit verbreitet und deshalb noch nicht ausgerottet, weil selbst manche Naturforscher hierüber verkehrte Ansichten besitzen; aber ein kleiner Fortschritt wird doch zu verzeichnen sein nach etlichen Jahren. Die in dem Atlas abgebildeten Schädel erzählen es jeden, der es hören will: wir sind uralt und wir sind rasshaft verschiedene Leute gewesen seit Jahrtausenden. Unsere lang- und kurzschädlichen Rassenränder schlagen sich schon mit den diluvialen Tieren herum. Wir, die namentlich Lang- und Breitgesichter, liegen in den steinzeitlichen Höckergräbern, haben die neolithischen Höhlen bewohnt, die Pfahlbauten bevölkert und fort und fort uns in Europa erhalten. In der Neuzeit sind allerdings unsere beiden dolichocephalen Rassen in Mitteleuropa zu weit reduzierter worden, aber die beiden brachycephalen Rassen und die Mesoecephalen behaupten noch unverändert das Feld als Nachkommen der Alten, die einst das Renn und den Ur jagt. Sie haben alle Kulturperioden miterlebt, das beweist jede genaue Vergleichung, die ohne Vorurteil durchgeführt wird.

Das alles erzählt die vielverlorene Schädelmesserei, und sie wird es immer wieder erzählen und immer neue Beweise dafür anführen, bis diese Tatsachen die gebührende Anerkennung gefunden haben.

Nun gilt es manche, welche diese Tatsachen hinnehmen und sagen, ja, das wird wohl so gewesen sein mit den Lang- und Kurzschädigen usw., allein aber die Krenologie vermag die Wirkung des Milieus nicht. Es hat einen gewaltigen Einfluß auf die Menscherrassen wie auf die ganze Schöpfung: „Die Völker leben einige Zeit auf denselben Gebiet und mögen sie zusammen gesetzt sein wie sie wollen, sie werden schließlich nutzgezüchtet. Die änderen Verhältnisse machen die verschiedenen Rassen einander gleich, sie schmelzen schließlich eine einziger daraus und der Rassenunterschied ist fertig. Das sei so wird behauptet, ein Gesetz. Dasselbe Gesetz habe sich bei den Griechen bewährt

und bei den Römern und bei den Germanen gerade wie bei der Tierzucht.“ Dagegen ist stets wieder hervorzuheben: Die ganze weit verbreitete Lehre von der Wirkung des Milieus auf die Menscherrassen ist auf das äußerste einzuschränken. Das lehrt auf das klarste und lehrt unumstößlich der Atlas der Crania saecula. Die Rassen werden nicht umgezüchtet nach einer bestimmten Schablone, sie bleiben stets denselben.

Das Milieu hat allerdings eine Wirkung auf die Menscherrassen, aber nicht auf ihre Rassenmerkmale. Schlechtes Klima, ungenügende Nahrung, Alkoholismus und dergl. rufen eine unverkennbare Degeneration ganzer Bevölkerungsschichten hervor, die Menschen nehmen an Körperhöhe ab, zahlreiche Krankheiten des respiratorischen und des drüsigen Systems treten auf, die Hautfarbe verliert ihr frisches Inkarnat. Es ist ferner sicher und längst bekannt: günstige Lebensbedingungen erzielen das Gegenteil, aber niemals ändert sich die Komplexion, die blonde oder brünette Beschaffenheit der Leute, nie wird dadurch aus dem Lang- ein Kurzschädel, niemals aus dem ehemaligen Gesicht ein breites. Die Rassen eigenschaften bleiben unverändert, nur die sog. fluktuierenden Merkmale werden beeinflusst. Darauf hat schon der schweizerische Forscher und geistliche Reformator in einer verteilichen Arbeit Liédard, dann E. Schmidt, nousteau Houliquet und G. Hervé u. a. gezeigt also noch hervorragende Beobachter, welche die universelle Wirkung des Milieus bestreiten, so auf ein geringes Maß einschränken, nämlich auf die fluktuierenden Eigenschaft des menschlichen Organismus, die Umwandlung der Rassenmerkmale durch das Milieu aber nicht. Rechte sind entschieden ungenügend.

Andere Forscher verweisen neben den Wirkungen des Milieus noch auf die Variabilität und die Kreuzung. Die Variabilität ist allerdings vorhanden, aber eine neue Menschenrasse ist in Europa noch immer nicht entstanden. Das beweist wieder der Atlas der Crania saecula. Trotz der Variabilität sind die Schädelformen die nämlichen geblieben in Schweden wie anderwärts.

Was die Kreuzung betrifft, so ist noch von keiner Seite ein Beweis erbracht worden, daß durch die Vermischung neue Rassen entstehen; alle Beobachtungssprachen vielmehr dagegen. Weder in Australien, noch in Südafrika, noch in Amerika ist eine neue Rasse entstanden, nicht durch die Kreuzung der europäischen mit den dortigen Ureinwohnern, nicht durch die Kreuzung der weißen Rassen mit den weißen Europäern, obwohl manche dieser Mischungen seit 300 Jahren ununterbrochen stattfinden<sup>1)</sup>.

Alle diese Voraussetzungen von der Umwandlung der Rassen versagen ihren Dienst. Die einmal entstandenen Jahrtausenden „gewordenen“ Rassenmerkmale sind nicht mehr anzuerkennen. Das zeigen die Schädelausgrabungen die Atlanten, wie die Porträts der Römer und Griechen. Also neue Menscherrassen werden nicht mehr gezüchtet, trotz aller Kreuzung und aller Variabilität und trotz der Wirkungen des Milieus. Das ist für den Menschen wahrnehmbar auf ewig vorüber, wie es für tausende von Tieren und Pflanzen vorüber ist. Das „war einmal“ und wie dies wahrnehmbar zugegangen ist, hat Huxley in seiner Anthropogenie geistvoll auseinandergesetzt. Wies es zu neuen Menschenformen kommen konnte, haben dann Coqui und Koenigermann angeleitet, aber bis es tatsächlich so weit sein wird, sind unterdessen die vorhandenen Menscherrassen Europas, um die es sich

<sup>1)</sup> Dafür hat u. a. Bess zahlreiche Beobachtungen beigebraucht. Siehe meine Ausführungen im Globus, Bd. 97, Nr. 24 (Dezember.)

hier handelt, in ihren Rassenmerkmalen dauernd — persistirt.

Nationen, Völker, Stämme mit bestimmten politischen Zielen, die ihnen von „ihren Geistesfürsten“ vorgezeigt werden, die wieder herangezogen durch die großen Umstände, überall, aller Orten, klein und groß, aber Rassen, nein. Diese sind längst vorhanden! Das ist das sich gleichbleibende somatische Material, die sich gleichbleibende Grundlage der Völker seit jedenfalls eintausend Jahren, wahrscheinlich seit dem Ende des Diluviums.

Wir Kranziologen können keine anderen Rassen finden, und niemand hat es bis jetzt versucht, neue anzufügen zu machen.

Ihre Ungeduldrigen, welche mit dieser Tatsache nicht anfangen wissen, beharren trotz immer auf derselben Meinung: Die Kranziologen müßten sich irren. Man sehe doch die Nationen sich ändern, Kulturperioden sich unaufhaltsam folgen, neue Rechte und neue Gesetze und neue Lebensbedingungen entstehen, die sozialen Grundlagen eine fast völlige Umwandlung erfahren, und das sollten immer die nämlichen Menschensrasen Europas fertig bringen? Immer die nämlichen Laug- und Karzebeidel, die seit Jahrtausenden schon den Boden betreten? Ungläublich, nein, tausendmal nein, rufen sich abermals und Konsorten, die Kranziometrie kräftigt, die Methoden der Anatomen sind schlechter, die Kranziometrie ist auf Abwege geraten, sie ist entgleist: ein neuer Weg muß gesucht werden um dies Rätsel zu lösen; fort mit den endlosen Tabellen die nichts tragen. Die Rassen werden umgeändert, immer neue Rassen kommen, alles ist im Wandel begriffen — also auch die Rassen. — Aber all diese Behauptungen, auch diejenigen von dem Irrtum der Kranziologen, von der Fehlerhaftigkeit der Resultate sind falsch. Die alten Rassen sind es, die mit ihrem Hirn immer höhere Stufen erklimmen, die alten Rassen beherbergen dieses immer junge Hirn, das siegreich alle Hindernisse überwindet, den Wilden aus seiner Lage emporgehoben hat, ihn das Metall in die Hand drückte und klug machte, der Kälte des Nordens Trotz zu bieten, den Dampf in seinen Dienst zu zwingen und dem Himmel den Blitz zu entreißen. Dasselbe immer junge Hirn der alten Rassen hat seit Jahrtausenden an dieser großen Aufgabe gearbeitet, ohne daß doch die Rassen ihre charakteristischen körperlichen Merkmale eingebüßt haben.

Zu diesem Schlußse führen die von der Kranziologie gefundenen Thatsachen von der Dauerbarkeit der alten Rassen. Für diesen wichtigen Satz ist die Arbeit von G. Retzius ein Meilenstein, weil sie die alten Schädelformen wieder an Tageslicht gezogen hat, jetzt, gerade in dem Augenblick, wo die Rassenfragen brennend sind, und die Frage nach der Herkunft der Germanen das lebhafteste Interesse erweckt. Retzius ließ die Schädel von der Sonne zeichnen, und sie sind reproduziert nur durch optisch-mechanische Hilfsmittel. Wer nun noch länger die rassenhafte multiple Zusammensetzung der alten Germanen und die Dauerbarkeit der Rassen bestreiten will angesichts dieser Tafeln, der „bleibt auf Granit“.

Um dem bedeutungsvollen Ergebnis der Kranziologie von der multiplen Zusammensetzung der Germanen im schwedischen Altertum, und von der Dauerbarkeit der Rassen noch eine breitere Grundlage zu geben, ersehnen den schwedischen Forschern noch weitere Untersuchungen unerläßlich. Dadurch entstand die *Anthropologia suecica* und ist verfaßt von

G. Retzius und Carl M. Fürst<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Der volle Titel des Werkes lautet: *Anthropologia suecica*, Beiträge zur Anthropologie der Schweden. Nach den

Die sozialen Probleme des 19. und 20. Jahrhunderts, die Frage nach den Nationalitäten, nach ihrer Zusammensetzung und vor allem die Rassenfrage, fordern eine genaue Untersuchung der Völker. Es sind deshalb alle Kulturstaaten daran gegangen, anthropologische Untersuchungen anstellen zu lassen über die körperliche (somatische) Eigenheiten ihrer Einwohner, Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich, das europäische Rußland, die Schweiz, sind vortrefflich bekannt, die einen durch ihre Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut, die anderen hiernher und über die Körpergröße dazu, die einen an Kindern, die anderen an Erwachsenen.

Die Schwedische Gesellschaft für Anthropologie und Geographie beauftragte im Jahre 1896 die beiden Mitglieder ihrer Direktion Herren G. Retzius und V. Hultkrantz eine umfassende anthropologische Untersuchung der schwedischen Wehrpflichtigen zu bewerkstelligen. Erst nachdem Herr Retzius die dafür nötigen Mittel im Herbst desselben Jahres zur Disposition gestellt hatte, konnte, nachdem die Regierung ihren Beifall gegeben hatte, diese Untersuchung angefangen werden. Unter der Leitung der beiden Forscher und mit der Beihilfe einer Anzahl jüngerer Anatomen und Ärzte wurde dieselbe im den Jahren 1897 und 1898 an den künftigen Träger der Wehrpflichtigen dieser beiden Jahre im ganzen etwa an 45000 Individuen in einem Alter von 21 Jahren bewerkstelligt. Die Direktion der Gesellschaft beauftragte dann Herrn Retzius mit der Ausföhrung der Bearbeitung dieses großen Materials. Er assoziierte sich mit dem Herrn Carl M. Fürst in Lund, der von allen den Primäruntersuchern des verhältnismäßig großen Teils des Materials eingesammelt hatte. Die Resultate dieser ihrer gemeinsamen Arbeit ist das große Werk *Anthropologia suecica*, welches gewissermaßen als eine Fortsetzung und Kompletierung des oben besprochenen Werkes *Crania suecica antiqua* betrachtet werden kann. Bei der Ausarbeitung verteilte die beiden Verfasser unter sich die Arbeit wesentlich in der Weise, daß G. Retzius die Körpermaße, v. Fürst die Augen- und Haarfarben behandelnde Kapitel niederschrieb, während sie die Verbindungen der verschiedenen Körpercharaktere behandelnde Kapitel und den Rückblick auf die sämtlichen Ergebnisse gemeinsam verfaßten. Untereucht und besprochen sind folgende Charaktere: die Größe des ganzen Körpers, die Sitzgröße, die Beinlänge, die Armbröite, die Länge und die Breite des Kopfes, die Kopfform (bzw. die Höhe und die Breite des Gesichts), die Farbe der Augen und des Kopfhaares.

Was schon der Vater Anders Retzius festgestellt hatte, daß nämlich die dolichocephale Schädelform bei den Schweden ein Erbstück sei, das sich durch Jahrhunderte wohlwahr erhalten hat, ist durch die statistische Untersuchung an Tausenden der jetzt lebenden Bewohner des Landes unumstößlich erwiesen.

Das ist eine Tatsache von enormer Tragweite, die Grundlage der ganzen menschlichen Rassenlehre, ein Röchel der Bronze, an dem alle Behauptungen von der Umwandlung der Rassen auf immer scheitern. Dank den beiden Gelehrten, die diesen grautausend Satz an mehr denn 40000 Männern durch Messung festgestellt haben!

Was andere somatische Merkmale betrifft, so haben sich die Forscher mehr und mehr dahin geneigt, den

auf Veranlassung der schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Erhebungen angeeignet und zusammengestellt von Gustav Retzius und Carl M. Fürst. Mit 150 Tabellen, 14 Karten und 7 Probestreitungen in Fachdruck, vielen Kurven und anderen Illustrationen. Stockholm 1902.

Germanen hohe Statur, helle Augen, helle Haut und blonde Haar zuschreiben. Was nun von allen diesen Eigenschaften bisher noch an dieser oder nur unvollständig bekannt war, ist durch die vorliegende Untersuchung ausführlich und durch genaue Zahlen, Karten und Tabellen in der Anthropologie suecica belegt worden<sup>1)</sup>.

Aus ihnen soll folgendes Platz finden, was das schwedische Volk im ganzen betrifft, wobei ich lediglich die tatsächlichen Angaben und ihre Interpretation hervorhebe, ohne die interessanten Mitteilungen über die Geschichte des Landes, über die alten Einwanderungen, die Bodenbeschaffenheit usw. hier aufzuführen.

Infolge mancher Einwanderungen und infolge anderer Umstände ist jedenfalls gegen früher die dolichocephale Bevölkerung<sup>2)</sup> etwas reduziert worden, gleichwohl finden wir in Schweden noch mehr Dolichocephale, als in irgend einem europäischen Lande, aus welchem genaue statistische Angaben bekannt geworden sind<sup>3)</sup>.

Von Dolichocephalen finden sich in Schweden  
 noch . . . . . 30 Proz.  
 von Mesoscephalen nicht ganz . . . . . 57 „  
 von Brachycephalen . . . . . 13 „

Dieses Verhältnis der einzelnen Kategorien ist nicht in allen Provinzen des Landes das selbste, bald sind die Dolichocephalen in etwas größerer Zahl vorhanden, bald die beiden übrigen Kategorien. Eine Reihe von kolorierten Karten gibt dem Leser einen raschen Überblick, wobei ich bemerke, daß zum Beispiel die Karte 4 in dem mittleren Gebiete Schwedens, in Dalarna, Värmland, Västmanland, Södermanland und Ostergötland zwischen 34 bis 46 Proz. Dolichocephale aufweist. In der Provinz Södermanland ist fast die Hälfte der Bevölkerung noch dolichocephal. Die Södermanländer haben sich also die körperliche Erscheinung der Germanen, was den Schädel betrifft, am zahlreichsten erhalten. Brachycephalen sind dort nur in 5 Proz. zu finden.

Die Körpergröße beträgt für ganz Schweden im Mittel 173,6 cm. Das ist eine bedeutende Höhe, aber sie tritt noch mehr in den Vordergrund, wenn beachtet wird, daß nicht weniger als 32 Proz. der jungen 21jährigen Leute zwischen 170 und 174 cm besitzen, und Körperhöhen bis 186 cm vorkommen. Diese mittlere Körpergröße rückt erst dann in die richtige Bedeutung, wenn wir uns daran erinnern, daß die europäische Bevölkerung zwischen 160 bis 170 cm die kleinsten Soldaten anwies, deren Körperhöhe z. B. in Italien nach den eingehenden Untersuchungen von Livi zwischen 160 (Sardinien) und 166 (Venedig) schwankt.

Germanisch ist also in Schweden auch die Körpergröße der Männer, von denen Tacitus das trotzige blonde Auge, das rötlich blonde Haar und den mächtigen Wuchs hervorhebt.

Betrachten wir nunmehr die Resultate, zu denen

<sup>1)</sup> Ich beschränke mich auf die vorliegende Untersuchung, mochte dem Leser aber darauf aufmerksam, daß eine umfangreiche Untersuchung ähnlicher Art von dem norwegischen Armeesarzt A. B. Berg verlegt und daß J. Bergh (Christians 1895) eine genaue Untersuchung der alten norwegischen Schädel, u. a. derjenigen aus der Wikinger Zeit und dem Mittelalter, veröffentlicht hat.

<sup>2)</sup> Die charakteristischen Schädelklingen sind hier in diesen Ausführungen nach dem Schema der Frankfurter Verständigung festgehalten: Die Dolichocephalie schwankt zwischen 66 bis 74,9, die Mesoscephalie zwischen 75 bis 79,9, die Brachycephalie zwischen 80 bis 88 und mehr.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Fürst bezüglich der von Tacitus erwähnten Eigenschaften des Auges und des Haars gelangt ist.

Unter den 41985 untersuchten Männern hatten 47 Proz. blaue Augen und 19 Proz. graue Augen. Werden Blau und Grau zu Hell zusammengefaßt, so erhalten wir für Schweden 66,7 Proz. mit hellen Augen.

Was die Haarfarbe betrifft, so besaßen 23,3 Proz. blonde und 52 Proz. aschfarbene Haare (condré), also im ganzen 75,6 Proz. der 21jährigen männlichen Jugend helle Haare.

Auch hier in diesem Abschnitt illustrieren viele Karten und farbige sinnreich ausgedachte Diagramme die zahlreichen Unterschiede in den einzelnen Provinzen, wovon ich nur im Hinblick auf Tacitus Germania hervorheben will, daß in Jämtland bis zu 80 Proz. hellblaugrüne Männer gefunden wurden und in manchen Provinzen über 80 Proz. Blonde.

Die Rothhaarigen, die so viel Eigentümliches bieten durch die überraschende Farbe ihres Haars, vererben diese Eigenschaft sehr leicht, so daß nicht selten ganze Geschlechter durch rotes Haar ausgezeichnet sind. Auf der Insel Gotland ist die Rothhaarigkeit viel häufiger als in irgend einer anderen Landschaft Schwedens.

Die wertvolle Statistik über die jungen Männer Schwedens hat sich glücklicherweise auch auf die Gesichtsfarbe ausgedehnt, die am besten so sehr wohl ist, weil damit ein zahlungsfähiger Ausdruck gewonnen wird, in jenem interessanten Lande, das, wie kaum ein anderes, die körperlichen Eigenschaften der germanischen Vorfahren erhalten hat. Denn im Gesicht liegen mindestens ebensoviel Rassenzeichen als in der Hirnkapsel.

Betzler, der von der ganzen Bedeutung des Gesichtskleides durchdrungen ist, hat persönlich in zwei Provinzen die Messungen angestellt. Es wurden im ganzen 2377 junge Männer untersucht, das Resultat ist nach mehreren Seiten hin von dem allergrößten Interesse.

Es ergibt sich nämlich, daß auch in der Jetztzeit, wie einst in den alten oben erwähnten Kulturperioden, Leute mit langem schmalen und Leute mit breitem niedrigem Gesicht vorkommen und zwar so, daß die breite niedere Gesicht in beträchtlicher Zahl auftritt. Die Statistik stellte 76 Proz. von dieser breiten Gesichtsforn fest und 24 Proz. von der langen Gesichtsforn.

Drei Kurven und übersichtliche Tabellen geben diesem wertvollen Nachweis die erwünschte Ausführlichkeit in der Anwendung der Zahlen, so daß über die Richtigkeit jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Obgleich wurden nicht weniger als 452 Individuen aus anderen Provinzen gemessen und die Ergebnisse in besonderen Tabellen zusammengestellt, aus denen wir bei der großen Bedeutung gerade dieses Merkmal noch ein paar Zahlen herausheben.

Aus der Provinz Uppland sind unter 235 Individuen nur 42 Langgesichter (Leptoprosope), dagegen 193 Breitgesichter angetroffen worden.

In Värmland waren unter 83 Männern 22 leptoprosope und 61 echnoprosope; in den übrigen noch untersuchten Provinzen zeigte sich das gleiche Verhalten. Die Zahlen stimmen in auffallender Weise mit den bei der Bevölkerung von Dalarna und Västmanland gewonnenen Zahlen überein und sind umfangreich genug, um zu beweisen, daß man es bei dem Vorkommen dieser beiden verschiedenen Gesichtsforn mit allgemeinen Verhältnissen zu tun hat, welche für das ganze Land ihre Geltung besitzen. Durch die statistischen Erhebungen über die Form des Antlitzes ist zum erstenmal für die Eigenschaften des Kopfes der Lebenden eine breite zahlenmäßige Grundlage geschaffen worden, welche für die Kraniaologie so

wohl der schwedischen Nation als der alten germanischen Völker von der größten Bedeutung ist. Bisher kannten wir nur das Skelett des altswedischen Gesichts, soweit es durch den vorraglichen Atlas von Retzius festgehalten wurde. Jetzt besitzen wir einen tiefen statistischen Einblick, der uns lehrt, daß die Länge, die Mittel- und die Kurzhöhe sich durch zwei erorbte charakteristische Gesichtsformen unterscheiden. Die Statistik und die Beleuchtung in allen Ländern erzählen also übereinstimmend, daß nicht nur die Schädelform durch Jahrtausende sich fortvererbt, sondern auch die Form des Gesichts. Niemand der Eingeweihten zweifelt daran, wegen der prompten Vererbung, daß die heutigen Gesichter von den schmalen rassenhaft verschieden sind. Die Umkehr in europäischen Familien, namentlich bei den östlich gelegenen Völkern, liefert dafür Tausende von Beweisen. Das schwedische Volk von heute ist also, das lehren die vorausgegangenen Betrachtungen, sowohl der Kraniaologie als der Statistik, auf einer multipeln Rassen-grundlage entstanden.

Mit dieser Tatsache wird sich wohl noch am ehesten die Sprachforschung befriedigen können. Die Theorien über die Urheimat der Germanen geraten aber in manche Schwierigkeit. Denn sie stehen vor der großen Aufgabe, mit einer multiplen Rassengrundlage rechnen zu müssen und noch dazu unter Berücksichtigung der fundamentalen Tatsachen, daß Völker nicht durch physische Zeugung entstehen, sondern durch politische Erziehung, und daß die blonden Rassen schon viele Jahrtausende früher sich auf europäischer Erde befanden, (es das Wort Germanen in der Geschichte genannt wird). Die Frage von der Urheimat der Germanen ist schon von vielen Gelehrten mit Geschick in Angriff genommen worden, und sollte nur vorbereitend Erwähnung finden, sofern auch für diese Frage der Kraniaologie und der Statistik eine entscheidende Bedeutung zukommt.

Hier sei in erster Linie die große Tragweite der Erkenntnis hervorgehoben, welche auf Grund der Kraniaologie, des Atlas von Retzius und der Anthropologia suecica von Retzius und Fürst gewonnen worden ist. Das Aussehen des germanischen Stammes, der vor zwei Jahrtausenden in Schweden saß, spiegelt sich mit fast vollkommener Reinheit in den Bewohnern des Landes von heute wieder. Abgesehen von einer unbedeutenden Verschiebung der Prozentzahlen ist das Bild, das Tacitus von den Germanen entwarf, vollkommen zutreffend und durch die Statistik aufs neue erwiesen: helles Ange, das rötlich blonde Haar und der mächtige Körperwuchs. Aber diesem Porträt des germanischen Volkes sind neue wertvolle Züge jetzt durch die Statistik hinzugefügt worden. Langschädel besaßen die Germanen mit schmalen und breiten Gesichtern. Ferner waren Brachycephale darunter, ebenfalls von verschiedenem Gesichtsschnitt, nämlich solche mit breitem Gesicht und endlich Leute mit mittellangem Schädel<sup>1)</sup>, die ein breites Gesicht besaßen.

<sup>1)</sup> Auf die brünetten Individuen Europas und ihre Urheimat ist hier keine Rücksicht genommen, ebensowenig auf die Semiten.

<sup>2)</sup> Die große Zahl der schon in den alten Gräbern vorkommenden Mescephalen und scharf geprägten Schädel, welche in des Retzius'schen Atlas abgebildet sind, bestätigt jedes Zweifel an der Richtigkeit meiner schon vor 20 Jahren gemachten Annahme, daß die heutigen Mittelköpfe eine besondere europäische Rasse darstellen, die ihre Merkmale seit Jahrtausenden streng vererbt. Es kommen nur mittellange Köpfe mit orbicularem Gesicht vor, aber sie sind wahrscheinlich aus der Kreuzung der übrigen Rassen hervorgegangen.

Die Statistik bestätigt auf neue, was der Atlas durch die Macht seiner Zahlen erkennen ließ:

Das politische und sozial einheitliche Volk der germanischen Schweden des Altertums bestand aus mehreren blonden Rassen Europas.

Diese wichtige Erkenntnis ist der siegreiche Erfolg der neuen wissenschaftlichen Untersuchungs-methode, die man Statistik nennt. Wie in allen Fällen, so hat sie auch hier die quantitativen, meßbaren Massenerscheinungen gesammelt, geordnet und den weitesten Kreisen zur Verfügung gestellt. Sie hat durch zahlenmäßige Feststellung zu sicheren Tatsachen erhoben, was ohne sie eine vorworse Mutmaßung war; der aus der unmittelbaren Anschauung geflossenen Seltzung hat sie den genauen Zahlenausdruck gegeben.

Und nun kehre ich zurück zu der Thesen, wegen der ich so heftig schon geschmäht wurde, daß an dem Kulturfortschritt, den die germanischen Länder erlangten haben, allen jenen, die seit Jahrtausenden miteinander verbunden sind, ihr Anteil zukommt. Es liegt nach meiner Erfahrung auch nicht der Schatten eines Beweises vor, daß die spezielle Kultur der germanischen Völker nur den Langschädeln zu verdanken sei. Aber selbst dann, wenn er erbracht werden könnte, müßte man sofort fragen, welcher Rasse der Langschädel denn diese unermeßliche Kulturarbeit zuzuschreiben sei, denn mit einer Masse oder dergleichen mit der kurzen? Nennen fernst die in so großer Zahl vorkommenden Mescephalen mit ihren wichtigen Schädeln, die uns Retzius in seinem Atlas der *Crania suecica antiqua* gezeigt hat, und sollen die Brachycephalen von damals, die Vater der heutigen Brachycephalen, nur bedeutungsloser Ballast gewesen sein?

Nachdem es sich herausgestellt hat, daß Dolicho-, Meso- und Brachycephale dort oben als blonde Leute einst die schwedischen Lande bevölkerten und daß diese Rassenmenschen nach und nach ins Grab sanken und untereinander in gleicher Weise mit denselben Waffen und mit dem nämlichen Schmuck bestattet wurden, so müssen wir doch alle als Germanen betrachten und können nicht gegen die augenscheinlichen Beweise ihrer noch im Tod bezugten germanischen Stammesart uns versündigen und behaupten, nur die Langschädel seien Germanen. Nennt man doch heute auch die seit Jahrtausenden süßhaften Leute dort oben mit Recht „Schweden“, gleichviel ob sie Dolicho-, Meso- und Brachycephale sind, warum sollen die alten Besiedler des Landes, alle die Blonden und Hellhaarigen, nicht auch zu den Germanen gehört haben, ob sie nun einen langen oder einen kurzen Hirnschädel auf dem Nacken umhertrugen. Alle, die uns Retzius in seinem Atlas vorführt, haben zu den Germanen gehört, nach der Art ihrer Bestattung, nach den Waffen und nach dem Schmuck, den die trauernden Genossen ihnen ins Grab gelegt haben.

Und damit ergibt sich nach meiner Meinung unauflösbare wie dies die Graberschädel aus Süddeutschland, vom Rhein, aus dem Gian der Friesen und in England deutlich zeigen, daß die ethnischen Einheiten der Germanen aus einer komplizierten Rassendurchmischung hervorgegangen sind.

Waher diese ethnischen Rassen kamen, wann sie sich zusammenfanden, wird sich wohl nach und nach ebenfalls noch erforschen lassen; dazu ist vor allem

<sup>1)</sup> Ich habe einst den Ausdruck „Pecentration der Rasse“ gebraucht, um damit das Eindringen rasenhaft verschiedener Elemente in ein und dasselbe Land und in eine und die nämliche ethnologische Einheit markant hervorzuheben.

wichtig, daß jetzt ihre charakteristischen Merkmale genau bekannt geworden sind. Nach dieser Seite hin werden die skandinavischen Forschungen stets einen hervorragenden Platz einnehmen, und in erster Linie anschlagen bleiben. Die Auflösung der ethnischen Einheiten in ihre anthropologischen Rasselemente, wie hier geschehen ist, liefert allein die Bürgschaft, den Aufbau der Völker in der Vergangenheit zu begreifen, sowie ihre wahre Zusammensetzung in der Gegenwart aufzuzeigen. Der Anthropologe fällt dabei die Aufgabe zu, in streng analytischer Methode die einzelnen Rasselemente herauszufinden. Es wird dann nach und nach möglich werden, Hand in Hand mit den ethnologischen Wissenschaften den tieferen Ursprung der Völker aufzudecken.

Zunächst sind folgende wichtige Tatsachen geworden:

1. Daß die Schweden von heute das Bild der alten Germanen uns vor Augen führen;
2. die komplexe, multiple Rassenzusammensetzung des Volkes aus mehreren Rassen und
3. die unveränderliche Dauerhaftigkeit dieser Rassen, ein Rassenerfolg, bewiesen durch die Untersuchung von mehr als 40000 Männern, erkrankt durch zielbewusste Arbeit und große jahrelange Hingebung vieler Gelehrten.

#### Das Menschenthum. Von G. Retzius.

Es ist ein grundlegender Gedanke der historischen Anthropologie, die soziale, politische und geistige Entwicklung als das Ergebnis eines physiologischen Prozesses aufzufassen. Heute, wo scharfer als je die Fähigkeit der Menschenseelen abgewogen wird, gibt es viele angesehenere Schriftsteller, welche den Schwerpunkt des Völkerlebens in die Eigenschaften der Rasse verlegen möchten. Es spitzt sich also die große Rassenfrage auf eine Frage nach dem Rassencharakter und seinen Eigenschaften zu. Früher, denn dieser Streit ist schon alt, hatte man dabei in erster Linie die farbigen Rassen im Auge, und schloß folgendermaßen: Die farbigen Rassen leben zum größten Teil noch im Zustande der Wildheit und Barbarei und sind nur zum geringsten Teil zu einem gewissen Maße der Zivilisation und höheren politischen Organisation fortgeschritten. Dieser große Unterschied beruht lediglich auf den verschiedenen Eigenschaften der Rasse, und zwar sollte die Entscheidung über höhere und geringere Leistungsfähigkeit in dem Gehirn liegen.

<sup>1)</sup> Diese wichtigen Ergebnisse über die somatischen Eigenschaften an den Schweden sind nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Die somatischen Zeichen bedeuten freilich für manche recht wenig, weil sie bei den zügellosen Spekulationen händers im Wege stehen. So sind sie für Chamberlain nichts — er greift dafür in die Tiefen der Volksseele, Bd. I, S. 472 und alle Rätsel lösen sich ihm spontan.

Da sind a. B. die Serben. Sie haben nach ihm eine tiefgewurzelte Familienähnlichkeit mit den Kelten und Germanen, allerdings nicht körperlich, aber dafür in der poetischen Anlage. Ihre Helden und Heldinnen fühlen und denken durchaus germanisch, also sind sie germanen. — „In der russischen Färbung findet sich im ganzen zwar Blutwerk derart, doch aus Biederstedts poetischer Phantasie, die braven Züge heraus, die klipp und klar bescheiden, die ist unverkennbare germanische Eigenart.“ — Das-selbe könnte man gerade so gut von den Indianern und ihren Liedern und Sagen herausbuhlen, aber Chamberlain will nun einmal beweisen, daß Nerven und Germanen zu der nördlichen Rasse gehören und darum wird die Anthropologie, welche für diese phantastischen Kombinationen keine Unterlage liefert, als ein Haufen von „Konfusionen“ und „Wahngelüsten“ in die Ecke geschleudert.

Solange es sich nur um die farbigen Rassen bei dem Streit handelte, war Europas weniger interessiert, obwohl der amerikanische Bürgerkrieg in die ungeliebteren Konsequenzen des Fas und Wilder deutlich gehen vor Augen führte. Jetzt aber handelt es sich um unser eigen Fleisch und Blut: die Rassenfrage berührt uns jetzt direkt. In dem Streit sind jetzt europäische Rassen hineingezogen worden; sie sollten psychisch verschieden angelegt sein, wird von vielen Seiten behauptet. Wie nun aber, wenn bei allen Rassen die Leistungsfähigkeit des Geistes die gleiche wäre und es auf die äußeren Umstände vor allem ankäme, wie bei den einzelnen Individuen, ob die Energie und der Nachahmungstrieb und die Spannkraft des Geistes angeregt werden, oder ob dies nicht der Fall ist? Die moderne politische Anthropologie legt den Schwerpunkt in die Rassenmerkmale, sie führt das Rassen-temperament ins Feld, denn sie eine hervorragende politische Bedeutung zuschreibt, und rechnet so mit lauter imaginären Größen, von denen niemand Genaueres anzugeben vermag, denn von Untersuchungen in dem Nervensystem der Menschenrassen weiß man heute so viel wie — nichts.

Wie weit diese Rassenlehre die Geister schon verführt hat, zeigt ein Artikel von H. Driesmanns, der ohne Bedenken erklärt: Das alte Gesetz, das gegen das Volk Israel war ein „Rassengesetz“; das alte Testament ist ein „Rassenbuch“ und sein Verfasser haben schon vor etlichen tausend Jahren die Rassenfrage akut gemacht. Die glattegelehrten Rassenforscher des Grafen Gobineau lassen vielen Schriftstellern schon keine Ruhe mehr; erst Chamberlain, dann Driesmanns usw. Man sieht es deutlich, wie ansteckend die Theorie wirkt in den Worten Driesmanns: „Was ein Gobineau in seinem Versuch über die Ungleichheit der Menschen für den Germanismus angestrebt, das hatten Moses und die Propheten schon vor Urzeiten für den Judaismus im Werk gesetzt (sic).“ Zum Beweis für diese ungeheuerlichen Behauptungen spricht man von „Rassencharakter“, von „Rasseninstinkten“, und mit solchen Schlagworten glänzt man irgend etwas erklärt zu haben, und selbst bessere Köpfe finden solche Stöße höchst interessant und lehrreich. Sie nickten gläubig Beifall und denken dabei an Rassepferde, die im Zirkus tanzen und Hinduarise überspringen, Pistolen loschießen, kurz die reize — Überferde darstellen. Der Rassenangal ist das Paradigma.

Von somatisch-anthropologischen Erfahrungen aus ist keine einzige Tatsache vorzulegen, welche beweisen würde, daß die Höhe der politischen Kultur abhängig sei von der Beschaffenheit des Rassencharakters. Es ist denn auch dieser Theorie, die in Europa von Herder, Burdach, Klemm, Carus, Gobineau, Woltmann u. a. vertreten wird, von manchen Seiten ein Widerspruch entgegenzutreten. „An den Unterschied der Rasse ist immer in letzter Linie zu denken“, meinet Ratzel. Vor allem kommt die äußeren Umstände in Betracht und die Entwicklung eines Volkes. Diese Auffassung beurteilt entschieden tiefer das Wesen des Menschengeschlechtes, als jene Rassenlehre, welche den Menschen zur willenlosen Maschine ausgediehener Rasseigenschaften herabstößt. H. Th. Buckle weist in seiner Geschichte der Zivilisation darauf hin, daß für ein Volk das Klima, die Nahrung, der Boden auf dem es lebt, vor allem in Betracht komme und die Anhäufung von Reichtum in mancher Hinsicht das Wichtigste darstellt. So lange jeder nur damit beschäftigt ist, die Notdurft für seinen Unterhalt anzuschaffen, wird weder Mühe noch Sinn für höhere Bestrebungen vorhanden sein, es kann unmöglich eine Wissenschaft entstehen und das Ansehen, was erreicht werden kann, wird sein, durch so rohe und unvoll-



kommene Werkzeuge, wie sie auch das ungebildete Volk erfinden kann, eine Arbeitersparnis zu versuchen.

Ich kann kein Werk, das einen tieferen Einblick in die Geschichte der menschlichen Kultur gewährt, als das Werk dieses englischen Denkers, Auffallenderweise ist seine Wirkung schwach geblieben, denn wie in England, so haben auch in Deutschland fast alle, besonders der Klerus und die Gesetzgeber und die Philosophen seine Bedeutung verkannt oder verlegt, das Buch verfolgt und es dahin gebracht, daß es fast in Vergessenheit geraten ist. Statt dessen ist die falsche Lehre der Rassenstünkte aufgetreten, die von ganz irrigem Prämissen ausgeht und nichts zu erklären vermag, sondern lediglich verwirrt und Unheil stiftet, wie die wilden blutigen Ausbrüche des von Guten wie von Bösen gleich geschürten Rassenbasses täglich beweisen. Während für die Entwicklung der Kultur eine große Zahl wichtiger Beweise in der Wirkung der äußeren Umgebung auf die Völker und ihre Geschichte von Buckle und von seinen Anhängern beigebracht worden sind, haben die Anhänger der Rassenstünkte noch nicht einmal den Versuch gemacht, am Gehirn des Menschen Zeichen der Rassenkultur aufzudecken, obwohl sie sich beständig darauf berufen. Ich halte es deshalb für wichtig, im Zusammenhang mit den Forschungen über die somatischen Eigenschaften der Germanen an ihrem Hirn hinanzutreten und einige neue Bemerkungen beizufügen, welche das Studium des Werkes von G. Retzius dem objektiven Beobachter anfrängt.

Zunächst über die Anlage des Werkes, damit die Bemerkungen, welche sich daran anknüpfen will, hinreichend begründet erscheinen.

Das Menschenhirn, die größte Tat der ganzen Schöpfung, ist in diesem Werk durch einen Atlas von 96 Tafeln in Folio in der vollständigsten Weise illustriert worden. Diese Tafeln sind entstanden im Anschluß an eingehende Untersuchungen, die in einem besonderen Textband von dem nämlichen Form vereinigt sind. Retzius war u. a. darauf bedacht, auch die Variationen, die an dem Gehirn so zahlreich sind, zu berücksichtigen und hat deshalb eine ganze Reihe von Gehirnen in antärlischer Größe durch direkte Photographie abbilden und durch Lichtdruck wiedergeben lassen. Es sind nur solche und unverletzte Präparate abgebildet worden, um der Vergleichung untereinander keinerlei Sehwerkzeuge zu bereiten. So liegen denn Abbildungen des Menschenhirns vor, die man als Meisterwerke bezeichnen darf, zu deren Herstellung die besten Methoden und die besten Hilfskräfte der schwedischen Hauptstadt verwendet wurden sind.

Die Furchen und Windungen wurden dann noch statistisch behandelt und zwar in folgender Weise: Hundert Hemiisphären, an denen diese Einzelheiten gut untersucht werden konnten, wurden ohne Auswahl bezüglich der Anordnung studiert, und die Varietäten tabellarisch zusammengestellt. Die Hemiisphären wurden ferner in den Tabellen in männliche und weibliche und in rechte und linke gesondert. Bei dem Umstände, daß Retzius dolicho- und mesocephale und brachycephale Gehirne abbildete, sollte man erwarten, daß die Rasse sich auch in dem Ausmaß der Hirnwindungen bemerkbar mache. Lange Schädel zeigen selbstverständlich ein längeres Großhirn, kurze ein kurzes und mittellange ein mittellanges, aber im übrigen scheint jeder Versuch, eine rassensomatische Beschaffenheit unter den Windungsvarietäten zu entdecken. Man muß dabei wohl beachten, daß Retzius die ausgezeichnete Literatur über die Hirnwindungen wohl herbeizieht hat, und daß jetzt die Topographie des Gehirns und seiner einzelnen physiologischen Provinzen in der Hauptsache wohl bekannt

ist, und dennoch ist es nicht gelungen, innerhalb der einzelnen Provinzen an der Oberfläche des Gehirns Rassenmerkmale aufzufinden. Retzius, einer der ersten Gehirn-anatomen unserer Zeit, hat dadurch gleichzeitig seinem fundamentalen Werk eine anthropologische Richtung gegeben. Denn die Schweden-gehirne, die in so tadelloser Weise konserviert und abgebildet sind, sind ja die Gehirne der direkten Nachkommen der Germanen. Das Hirn eines germanischen Volkes ist so vollkommen als denkbar zum erstenmal der gesamten wissenschaftlichen Welt zur Ansicht vorgelegt. Dieses Werk wird für alle Zeiten nicht nur ein Ausgangspunkt für weitere Vergleichung sein können, es läßt gleichzeitig auch das Gehirn der alten Germanen wieder vor uns stehen, denn die Langkopfe Schwedens von heute sind nun einmal die direkten Nachkommen des alten germanischen Nordstammes. Wie sich die Augen, die Hirsarkie vererbt haben und die Körpergröße, so auch die Form des Gehirns.

Um nicht des Schein einseitiger Beurteilung auf mich zu laden, soll hier Weinberg an Worte kommen, der die Gehirne von Esten, Letten, Polen verglichen hat mit der Gehirne einiger anderer Völkerverheften. Im Besitz der Kenntnisse der vorausgegangenen Forschungen von Sernoff über das Slawen, Giacomini über das Italienerhirn, war er zur allem erstrebt mit dem schwedischen so recht komplizierte Methode der Vergleichung, ohne die kein gleichliches Resultat zu erreichen ist. Das anatomische Institut in Dorpat hat unter der Leitung Kaubers schon seit Jahren Material gesammelt, um dieser Frage näher zu treten, die Weinberg dann weiterverfolgt und auf dem internationalen Kongreß in Neuchâtel 1890 darüber berichtet hat, wie folgt:

Die übereinstimmenden Züge in dem Oberflächen des Gehirns sind von eklatanter Art, daß man vermehrt sein könnte, auf Grundlage der Beobachtung zwei einander sonst so fremd gegenüberstehende Völkerverheften, wie die Letten und Polen, geradezu als rassenverwandt, ja unmittelbar als Brüder zu erklären. Geschiehe eine Versetzung der Gehirne in den zur Aufbewahrung bestimmten Gläsern so würden über die Zugehörigkeit der einzelnen Stücke oft Zweifel entstehen. Werden die Furchungsformen nur vom statistischen Standpunkt der relativen Häufigkeit aus in Betracht gezogen, so ist es überraschend, wie weit die ziffermäßige Übereinstimmung einer gegebenen Formvariante bei zwei oder mehreren Völkerverheften geben kann. Weinberg hat Formen kennen gelernt, deren Häufigkeit bei zwei dichteren, nicht augenscheinlich wohl charakterisierten Völkerverheften nicht einmal um  $\frac{1}{4}$  Proz. differierte. Ebenso eklatante negative Resultate hat Prof. Sernoff schon vor nahezu 20 Jahren an den Hirnen der Russen und Italiener erhalten. Diese Tatsachen sind in anatomischer wie in sozial-anthropologischer Hinsicht von dem größten Werte. Sie ergeben, daß Völker, die auf sehr verschiedener politischer Stufe stehen, im Gehirn gleich organisiert sind. Es besteht zwar bei jedem Volk ein ganz bedeutender Grad von Variabilität, aber Rassenunterschiede sind ebenso wenig zu finden wie in Hirngewicht, das bekanntlich ebenfalls bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. Ob unter diesen von Sernoff, Cunningham, Retzius, Weinberg u. a. aufgedeckten zahlreichen Variationen vielleicht auch Rassenmerkmale verborgen sind, läßt sich zurzeit nicht entscheiden. Der letzterwähnte Autor bemerkt ganz zutreffend: Die vergleichende Anthropologie fällt gegenwärtig in erster Linie das normale menschliche Gehirn ins Auge, sucht erst die Grundlagen zu einer Rassenlehre des normalen Gehirns zu gewinnen und muß zunächst die Frage nach der Bedeutung der

Hirnanomalien als Rassencharaktere zukünftigen Untersuchungen überlassen?

Das magen die Rassen-theoretiker auf sozial-anthropologischem Gebiet wohl beachten, dann werden sie angestehen müssen, daß der Satz, den ich oben ausgesprochen habe, mit voller Berechtigung hinzugefügt werden darf: Alle europäischen Rassen haben ihren Anteil an der Entwicklung der europäischen Kultur. Das lehrt die ganze Entwicklung der Völker, der Nationen, der Stämme, wie immer die politischen und sprachlichen Gliederungen beiden magen. Zu dem nämlichen Ergebnisse kommt auch die Sprachforschung, wie jüngst Winternitz am Schlusse einer Artikelserie in der Allgemeinen Zeitung treffend ausgeführt hat<sup>1)</sup>.

Das Organ des Geistes ist in seinem Aufbau und in seinem Gewicht zwar sehr variabel, aber Rassenunterschiede hat man bis jetzt bei den europäischen Menschen vergebens gesucht.

Man vergißt heute leider den Satz der unbedingte Geltung hat: daß Nationen nicht durch physische Zeugung entstehen, sondern durch historische Erziehung. Die Verschiedenheit liegt begründet in der Verschiedenheit der historischen Vorgänge, die, so klein sie sein mögen, auf die sozialen Formen den entscheidenden Einfluß erhalten und ausüben. Und dazu kommt das Milieu mit seinen zahllosen Wirkungen auf die physiologische Tätigkeit des Gehirns. Hier liegen die wahren Wurzeln der Verschiedenheit der Völker.

Das Gehirn hängt in seiner physiologischen Arbeit nicht von einer imaginären Rassenkonstruktion ab, sondern ist frei von dem sklavischen Druck der Rassen. Die Sozialanthropologie muß also nach meiner Überzeugung die anstößvollen Wege Henry Thomas Buckles wandeln, will sie tiefer in das Wesen der Nationen eindringen und die folgende allbekannte Tatsache vor allem berücksichtigen: Ein Kind, das in einem zivilisierten Lande geboren wurde, übertrifft als solches das Kind eines Barbaren nicht. Der Unterschied zwischen dem, was beide Kinder tun werden, wird, soviel wir wissen, nicht durch die Rasse, sondern einzig und allein durch den Drang äußerer Umstände zuwege gebracht werden, nämlich durch die Vorstellungen, den Umgang, die Umgebung, mit einem Worte, die ganze geistige Atmosphäre, von der die beiden Kinder genährt werden. Ebenso ist es mit den Völkern. Die Summe der Intelligenz ist anfangs gleich groß, wie der Aufgang der Kultur — der gleiche ist. Überall auf der Erde beginnt die Menschheit mit den Steinwerkzeugen. Der Unterschied, der schließlich zum Vorschein kommt im Laufe der weiteren Entwicklung, folgt aus dem Drang der äußeren Umstände, der Vorstellungen, der geistigen Atmosphäre, die sich fortwährend ändert. Man vergleiche die Völker in den langen Zeiträumen ihres Weltens, man so sehen wie Meinungen, die jetzt populär sind, später verschwinden, wie Widerstand und Ketzerei durch Jahrhunderte herrschen, um vor der Freiheit des Gedankens schließlich zu verschwinden. Tatlosigkeit wechelt mit Tatkraft, und doch ist das angebliche Rassenwahrnis stets das nämliche. Hier spielen offenbar andere Faktoren ihre Rolle, nicht etwa heimliche Rassen-eigenschaft, von der niemand nichts weiß.

Mit diesem Hinweis auf das Hirnwerk von Retains und auf verwandte Arbeiten wollte ich zur Voricht mahnen, einen Rassenstypus im Gehirn anzunehmen. Bis heute ist jeder Versuch gescheitert,

<sup>1)</sup> Beiträge zur Allgemeinen Zeitung vom Oktober und November 1903 mit dem Titel „Was wissen wir von den Indogermanen“.

diesen Typus zu entdecken<sup>1)</sup>. Die Wunderblume „Kultur“ ist, in Europa mindestens, unabhängig von dem unbestimmten Schatten eines Rassenhirns.

Man rühmte den Germanen und ihren Nachkommen alle nur denkbaren edlen Eigenschaften nach, man mahnte den Wunsch, sie der höchsten Kultur entgegenzuführen und kämpfte mit allen Waffen des Geistes dafür, lasse aber dabei die gefährliche und gänzlich falsche Rassen-theorie von heute aus dem Spiel. Denn die komplexe Rassen-natur der Völker in der Urzeit, die nämlich multiple Rassen-mischung der Völker von heute, die lange Dauerbarkeit der verschiedenen Rassen seit Jahrtausenden, endlich die tiefe Übereinstimmung des Hauptorgans aller Rassen, des Menschenhirns — sprechen entschieden gegen diese Theorie.

Mindestens sind alle europäischen Rassen, die erwähnt wurden, gleichgültig für die höchste Kultur-entwicklung. — Das beweisen überzeugend die kranologischen Arbeiten der vergangenen Jahrhunderte und vor allem die ausgezeichneten Werke der nordischen Forscher.

Kollmann, Basel.

5. Steinmetz, Dr. J. R. Rechtsverhältnisse von eingeborenen Völkern in Afrika und Ozeanien. Bearbeitungen des Fragebogens der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin. Berlin (Julius Springer) 1903. VII und 455 S. 8\*.

Die kaum zu überschätzenden Wirkungen des modernen Verkehrs und die gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts mit zunehmender Stärke geltend gemachten Kolonialbestrebungen sind am Leben der Naturvölker nicht spurlos vorübergegangen. Wenn es auch nicht immer der „tote Hauch“ des weißen Mannes war, der sie berührte, wurden doch überall da, wo sie mit Europäern intensiver in Berührung kamen, ihre sozialen und rechtlichen, ihre religiösen und wirtschaftlichen Zustände dadurch beeinflußt, mehr und mehr mit fremden Elementen durchsetzt, welche die ursprünglichen Daseinsbedingungen verwickelten. Es ist daher zu begründen, daß neuerdings mit Erfolg versucht wurde, diejenigen, die zuerst und noch vereinzelt mit Urvölkern berufsmäßig in Berührung kamen, wie Missionäre, Kaufleute, Kolonialbeamte, zu deren Beobachtung anzuregen und zur Niederschrift der von ihnen gefundenen Erfahrungstatsachen systematisch anzuregen. Die internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin schrieb im Jahre 1896 Fragebogen über Rechtsverhältnisse der Urvölker aus, die in der Hauptsache von dem leider früh verstorbenen Landrichter A. H. Post, dem weitblickenden Systematiker der vergleichenden Rechtslehre, zusammengestellt waren. Die so veranstaltete Umfrage hat zu 17 Bearbeitungen durch Männer geführt, die infolge jahrelanger persönlichen Umgangs mit dem betreffenden Volkstüben vertraut erschienen. 14 Beobachtungen betreffen afrikanische Völkerschaften, eine erstreckt sich auf eine kleine Inselgruppe bei Madagaskar, die zwei letzten schildern Lebensgewohnheiten der Bewohner des Bismarck-Archipels und der Marshall-Inseln.

<sup>1)</sup> Selbst die Vergleichung der Japaner, der Negere und der Australierhirne mit denen der Europäer ist bis jetzt resultatlos verlaufen. Siehe über das Hirngewicht der Japaner Prof. K. Taguchi, Zentralblatt für Neurologie 1903, S. 463, dann: Über das Australierhirn und Bemerkungen über einige Negerhirne, von J. P. Karplus, in Arbeiten aus dem neurologischen Institut an der Wiener Universität. Bd. IX, S. 118, 1903.

Mit der Herausgabe der eingeleiteten Arbeiten war der Dozent an der Universität Leiden, Dr. Steinmetz, betraut worden. Im Gegensatz zu Köhler, der die Resultate seiner „Fragebogen“ sofort in systematischer Verarbeitung veröffentlichte, bringt Steinmetz soweit als irgend möglich den Urtext der Originalantworten zum Abdruck, geleitet von dem Gedanken, daß dieses Material als einziges Objekt, worauf sich alle Auslegung und alle Vergleichung beschränkt muß, ausserhalb und unversetzt zwecks späterer Nachprüfung zu erhalten sei, „weil die Sitten in der Zeit sich ändern und andere Beobachter bei andern Teilen desselben Volkes andere Tatsachen wahrnehmen werden.“ Wir erhalten so die wortgetreue Wiedergabe der eingezugenen Blätter, bei der nur Frage und Antwort zu solchen Gängen zusammengeordnet sind und — vielleicht schon zu weitgehend in Behandlung der Originale — die französischen und englischen Antworten in deutscher Übersetzung zum Abdruck kommen. Durch den Herausgeber ist der Beschreibung des Rechtes jedes Volkes eine dankenswerte kurze Einleitung über das betreffende Volk zur Orientierung der Leser beigegeben. Ferner sind durch Steinmetz zu der Erleichterung der Verarbeitung des Gebotenen an zahlreichen Stellen dem Texte kurze ethnographische und ethnologische Glossen angefügt worden. Erstere sollen den Benutzer durch Hinweise auf die schon bestehende Literatur das gewonnene Bild vervollständigen oder auf gelegentlich zutage tretende Widersprüche zwischen älteren und den jetzigen Beobachtungen aufmerksam machen, wobei hätte so wohl genügt, Literaturzusammenstellungen für eine Erscheinung nur einmal im Buche zu geben und dann wieder, soweit dies notwendig erschien, auf sie zu verweisen, statt sie bei verschiedenen Völkern zu wiederholen. Die ethnologischen Bemerkungen wollen „den Kontakt zwischen dem beobachteten Ethnographen, dem Banatensienferanten, und dem theoretisierenden, von ihm abhängigen Ethnologen, dem Banatensienler“, indem sie auf ethnologische Theorien und Probleme, und dann wieder auf besonders empfindliche Lücken in unserer Tatsachenkenntnis hinweisen.

Die Antworten, inhaltlich natürlich ungleichwertig und nicht frei von Widersprüchen, berühren auf Grund der etwa 400 gestellten Fragen zunächst einige allgemeine Punkte, wie Name des Landes und der Bewohner, und suchen sodann Aufschluß zu geben über Familienverhältnisse, Erträge, politische Organisation, Gerichtswesen, Rechte, Buße und Strafe, Grund- und Bodenverhältnisse, Rache an beweglichen Sachen und Verkehrsverhältnisse. Wie schon diese einfache Aufzählung der Kapitelüberschriften erkennen läßt, trägt die Umfrage, die für die „Rechtsgewohnheiten der afrikanischen Völker“ nach wirklich sehr schätzenswertes und interessantes Material einbringt, einen überwiegend juristischen Charakter. Lehaft zu bedauern ist nur, wie dies auch schon vom Herausgeber andeutungsweise geschieht, daß den Tatsachen des sozialen Lebens so wenig bei der Fragestellung Rechnung getragen ist. Alle wirtschaftlichen Erscheinungen können mehr gelegentlich an zerstreuten Stellen zur Aufführung. Wichtige Organisationsfragen des Wirtschaftslebens sind kaum gestreift, über die elementaren Tatsachen des Volkswesens, Zunahme und Abnahme der Stämme, Verhältniszahl der Geschlechter, Zusammensetzung nach Altersklassen, erhalten wir nur ganz gelegentlich einmal Aufschluß, über Entwicklung technischer Fertigkeiten und deren Einwirkung auf den Produktionsprozeß ist kaum etwas dem dicken Buche zu entnehmen. Auch die Bevölkerungswanderung innerhalb der Wirtschaftskörper sind allzu stichförmlich behandelt. Über Wert und Preisbildung etwas erfahren wir eben nur so viel, als aus

den Antworten auf die beiden einzigen dürftigen Fragen, „welche Gegenstände die Stelle des Geldes vertreten“ und „ob gemünztes Geld im Umlauf sei“, zu erwarten war. Ich verkenne deshalb nicht, daß es sich bei all den angedeuteten Punkten um Probleme und Erscheinungen handelt, deren Erfassen durch Beobachtung vielleicht wohl schwieriger ist, wie das Feststellen juristischer Verhältnisse, ich verleihe mir auch nicht, daß die weitere Ausföhrung des Fragebogens — nach diesen Richtungen grob-Schwierigkeiten machen wird; aber die internationale Vereinigung, die sich durch Herausgabe dieses Bandes dem warmen Dank der Forschung verdient hat, wird bei späterer Anwerbung und Anweisung der Beobachter doch den Schwerpunkt etwas mehr nach der ökonomischen Seite verschieben müssen. Damit wird sie ihrer Doppelaufgabe, Pflege der vergleichenden Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, in noch weitgehenderem Maße genügen, als dies im vorliegenden Bande schon geschehen ist.

Chr. Eckert, Köln a. Rh.

6. Ludwig Katona. Die Literatur der ungarischen Volksmärchen. Kelet-Szemle (Revue orientale, redigiert von Dr. Ign. Kúnos und Bernh. Mukácsy. In Komm. bei Harrasowitz Leipzig) II (1891) X, S. 138 u. 283.

7. Katona Lajos. A Remete és az Angyal. (Ludwig Katona, Der Einsiedler und der Engel. Separatdruck aus der Zeitschrift „Ethnographus“ Jahrg. 1900. Budapest, Victor Hornyanszky, S. 24.)

8. Katona Lajos XVII. Századbeli őrdögök könyveke. (Ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Teufelsbeschwörungsbüchlein. (Geschöpf aus einer Handschrift der dem Franziskanerorden gehörenden Gyongyösiuchen Bibliothek. Separatdruck aus der Zeitschrift „Ethnographus“ Jahrg. 1902. Budapest, Victor Hornyanszky, S. 21.)

9. Katona Lajos. A Virginia-Codex Ferencz-Legendái. Katona, Die Franziskanerlegenden aus dem Virginia-Codex. (Sonderabdruck aus den Berichten der ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1903. Budapest, Victor Hornyanszky, S. 15.)

Ludwig Katona gehört zu den bedeutendsten ungarischen Forschern auf dem Gebiete der Linguistik und der Folk-Lore. Wir wollen es versuchen, seine Arbeiten, welche namentlich vom Standpunkte der Erkenntnis des ungarischen Volkswesens von hervorragender Bedeutung sind, einer näheren Erörterung zu unterziehen und zu diesem Behufe seine in den drei letzten Jahren erschienenen Aufsätze über die ungarischen Märchen in ihrer Gesamtheit besprechen.

Katona teilt vor allem mit, daß vor ungefähr 80 Jahren, also 10 Jahre nach dem Erscheinen der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen, die erste ungarische Märchenammlung veröffentlicht wurde. (Märchen der Magyaren, bearbeitet und herausgegeben von Georg v. Gál. Wien, Wallishausser 1822. Mit einem Titelkupfer S. 454. S. 87.) Leider waren die meisten dieser Märchen höchst unrichtigen Quellen entlehnt, oft sogar nachweisbar deutschen Ursprungs. An demselben Übel krankt eine Märchenammlung, welche im Jahre 1825 erschien (Die magyarischen Sagen und Märchen von Johann Grafen Mailbáth, Braun), 1827 bearbeitet und herausgegeben wurde und deren Inhalt teilweise nachweisbar deutschen Erzählungen entlehnt ist. Einer ähnlichen Veröffentlichung in deutscher Sprache, welche 1828/29 erschien (U-



Zeit, dank Ermittlungen, die auf einer methodischen Basis ruhen, zu erfreulicheren Resultaten gelangt ist, d. h., daß man den Quellen gefolgt ist, aus denen ein guter Teil des Marchenschatzes nachweisbar geschöpft wurde. Eine die bisherigen Ergebnisse zusammenfassende Erörterung der sämtlichen hierauf bezüglichen Fragen wäre sehr erwünscht, wurde aber noch nicht unternommen. Katona selbst beabsichtigt dieser Aufgabe gerecht zu werden und ist beabsichtigt sich mit Jahren mit ihrer Lösung. Er ist viel, wohl besetzt, daß das zu bewältigende Material sich nahezu im Ueberschaubaren gehäuft hat. Die wissenschaftliche Forschung muß sich eben auch hier auf eine viel bescheidendere Aufgabe beschränken und kann völlig zufrieden sein, wenn es ihr gelingt, die in den schmalen Lichtstreifen historischer Verhältnisse reichenden und auf Wegen baltischer Entwicklung nachweisbaren Wandlungen dieses Märchenstoffes zu erklären. Dieser Aufgabe mag mancher nach der ergebnisreichen Arbeit des Sammelers das eintüchtige Zusammenwirken aller hierzu berufenen Kräfte gewidmet sein.

Die zwei Aufsätze Katona's über das ungarische Folklore sind von gleich hohem Interesse und bezeugen den kritischen Geist des Verfassers.

Das selbste tschechisch: „Der Pilger und der Engel Gottes“ liefert schon wiederholt den Stoff zu Erzählungen. Die verschiedensten Schriftsteller berichteten über dieses märchenhafte Volksgedächtnis. Die einen behaupten, es wäre dem *Gesta Romanorum* entlehnt. Andere halten es für echt magyarischen Ursprungs. Wir verweisen den Leser desbezüglich auf die kritischen Erörterungen des Verfassers, welcher die verschiedenen Varianten seiner Erzählung eingehenden Untersuchungen unterwirft. Er führt bei dieser Gelegenheit ähnliche Motive aus Voltaire und Parnel an, welche interessante Streiflichter auf den Ursprung dieses magyarischen Märchens werfen. Der Einsiedler und der Engel war als volkstümliche Parallel schon im 14. Jahrhundert in Ungarn bekannt und der Verfasser führt verschiedene Motive an, welche in ihren Zusammenfügungen oder Varianten immer auf ein und dasselben Ursprung hindeuten. Die Schwierigkeit besteht eben darin, diesen Ursprung herauszufinden, und es gehört der Scharfsinn Katona's dazu, dieses Problem zu lösen.

Im Sommer des Jahres 1861 entdeckte Katona in der Bibliothek des Franziskanerordens zu Gyöngös ein kleines Buchlein, welches in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Kaschau erschien, aber Jahre lang die neuere Ausgabe eines viel älteren Buches war. Wir lesen in diesem Buchlein, daß im Jahre 1665 in Bayern (wo, wird nicht gesagt) ein 19-jähriges Mädchen von einer Legion, d. h. 6696 Teufeln besessen wurde und alle gebräuchlichen Mittel, die bösen Geister zu vertreiben, erfolglos blieben. Schließlich gelangte man mit der Kranken zu der heiligen Jungfrau in Alt-Öttingen. Dort sprach einer der Teufel, welcher das Mädchen besaß, daß nur ein in München predigender Franziskanermonch in stande wäre, es mit ihm und seinen Genossen aufzunehmen, und in der Tat gelang es dem Lukas Glöckner, welcher dieser Zeit in der Hauptstadt Bayerns predigte, nach allen möglichen Solvabilitäten die Teufel mittels einer Beschwörungsformel, welche im kleinen Buchlein aufgeschrieben ist, auszutreiben. Dieser Lukas Glöckner, früher Jesuit, war in Landshut geboren, später in den Franziskanerorden getreten und im Jahre 1672 in Kelheim gestorben. Die an und für sich sehr einfache Geschichte erhält nur durch die besondere Art der Beschwörungsformeln ein gewisses Interesse, da sie uns über die altherkömmlichen Gebräuche jener Zeit Aufschlüsse gibt.

Für diesen Exorzismus spielt ein zauberkräftiger

Zettel mit darauf geschriebenen Formeln, seinem Siegel, der Beschaffenheit der Schrift, der Tinte und der Feder eine große Rolle. Es wird auch die Einwirkung des Petachs und die übrige Vorgangsweise weitläufig erklärt und auf der letzten Seite des Buchleins werden wir über die stoffliche Zusammensetzung des Siegels ausführlich belehrt. Dieser Zettel kann auch als Talisman oder Amulett getragen werden und schützt gegen alle Heimtuckungen des Teufels. Der lateinische Text des Buchleins, welchen Katona wiederum veröffentlicht, enthält in Hülle und Fülle alle weiteren Aufschlüsse.

Von gleich gründlicher Fachkenntnis sprechen die Erörterungen Katona's über die Franziskanerlegenden aus dem Virginia Codex, welche er scharfsinnig mit anderweitigen Legenden vergleicht; er macht bei dieser Gelegenheit auf bestimmte, vorher verorgene Anknüpfungspunkte aufmerksam. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Katona's strebsame Forschungen allen denen erwünscht sein werden, die sich für die genaue Kenntnis des magyarischen Volkstums irgendwie interessieren. Carl v. Ujfalvy.

#### 10. Das Sonnenbild von Trundholm.

Vergl. Tafel VII.

Das Nationalmuseum in Kopenhagen, eines wunder-vollen Schatzkammer der nördlichen Vorzeit, ist vor kurzem abermals um eine Merkwürdigkeit ersten Ranges reicher geworden. Es ist dies ein bei Trundholm, nahe der Stadt Nykjöbing in Nord-Seeland, gefundener kleiner Bronzewagen mit einer senkrecht darauf stehenden Scheibe und einem Pferde davor, ein Werk, das mit einem Schläge helles Licht verbreitet über die religiösen Zustände einer dreitausendjährigen Vergangenheit. Die von Sophus Müller mit gewohnter Meisterschaft verfaßte Publikation („Nordiske Fortidsminder“, I, 5. u. 6. Heft) gibt Gelegenheit, es auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Die erste Frage, die sich bei einem solchen Funde aufdrängt, ist die nach der Zeitstellung und der Herkunft. Ihre Beantwortung wird im vorliegenden Falle sehr erleichtert durch die an allen Teilen des Werkes, besonders aber an der Scheibe angebrachten Verzierungen. Eine reine Liniennormanik von eigenartiger Schönheit tritt uns hier entgegen: konzentrische Kreise, fortlaufende Spiralen, mit Zielscheiben und Punkt-reihen angefüllte Bänder sind die Elemente, aus denen sie ihre reizvollen Muster bildet. Diese in der Fäustelwerk gebränderten Fingerringe sind charakteristisch für den strengsten Stil der älteren Bronzezeit des Nordens. Wir können sie aus zahlreichen Arbeiten des skandinavischen Fundgebietes, und es unterliegt keinem Zweifel, daß auch der Wagen von Trundholm innerhalb desselben entstanden ist. Andererseits fehlt es aber auch nicht an verwandten Erscheinungen in den Ländern des südosteuropäischen und orientalischen Kulturkreises. Auf Grund solcher Vergleiche ist man in der Lage, einen chronologischen Zusammenhang zwischen der älteren nördlichen Bronzezeit und der Mykenakultur anzunehmen und jene somit in die zweite Hälfte des vorletzten Jahrtausends v. Chr. zu setzen. Der in seinen Altersbeziehungen mehr als vorrichtige Sophus Müller hält es doch für sicher, daß der Trundholmer Fund spätestens aus der Zeit um 1000 v. Chr. stammt.

Die eine Seite der Bronzescheibe ist mit dünnem Goldblech bekleidet. Man hat die Ornamente zuerst in die Bronze eingeschlagen und sie dann auf dem Golde, nachdem man es festangedrückt hatte, mit einer späten Nadel nachgezogen. Die Scheibe steht quer zu Hinterachse des Wagens, auf der sie in gesenkter Weise befestigt ist. Von hier aus läuft eine lange Mittelstange unter den Hufen des Pferdes durch und



Das Sonnenbild von Trondheim.

Arbiter für Anthropologie, N. F. Bd. II.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

stellt eine solide Verbindung des hinteren Räderpaares mit dem vierwändigen Vorderteil her. Auf diesem steht das Pferd. Es ist über einen Tonkeru vollrand gegossen. So primitiv seine Ausführung ist, zeigt sie doch ein unverkennbares Streben nach Naturwahrheit und einen ausgesprochen nordischen Stil, und es ist im höchsten Grade bemerkenswert, daß keines der südlichen, von der mykenischen Kunst beeinflussten Länder in jener Epoche ein plastisches Werk von gleich trefflicher Arbeit aufzuweisen hat wie dieses in Skandinavien gefundene Bronze Pferd.

Für die Deutung des Fundstückes ist davon auszugehen, daß die runde Scheibe nichts anderes bezeichnen kann als die Sonne. Wo immer wir in so früher Zeit Darstellungen der Sonne finden, in Ägypten, Mesopotamien, Syrien, Griechenland, haben sie die Form kreisrunder, flacher oder schwach gewölbter Scheiben. Bei Bologna und in einem beachtlichen Gebiete der adriatischen Küste sind eine Anzahl Steinplatten mit so gestalteten Sonnenbildern ausgehauen worden, und einige davon waren von ganz denselben reinen und kräftigen Spiralarbannformen begleitet wie das von Trundholm. Wohl ist ein Teil dieser Steinplatten bedeutend jünger als unser Bildwerk. Aber die ganze Gruppe weist auf die Wende des zweiten Jahrtausends zurück. Hier liegt ein unverkennbar Zusammenhang religiöser Vorstellungen vor, deren gemeinsame Quelle man wohl in den arktischen Kulturkreisen östlich des Mittelmeeres zu suchen hat.

Vor allem aber ist es das Pferd in seinem Verhältnis zur Scheibe, was die Deutung der letzteren als Sonne die volle Sicherheit gibt. Pferd und Scheibe ruhen auf demselben Untergerüst und bilden somit ein Ganzes. Zwei entsprechende Ösen am Vorderende der Scheibe und am Halse des Pferdes waren offenbar zum Durchziehen eines Zugstranges bestimmt. Also die alte, weiterverbreitete Vorstellung der Sonne, die von Rossen gezogen am Himmel dahinfährt!

Indessen besteht doch zwischen der herkömmlichen Auffassung von Sonnenwagen und unserem Bildwerk ein wesentlicher Unterschied. Bei jener handelt es sich stets um einen von vier Rossen gezogenen Wagen; hier ist nur ein Pferd vorhanden, und man kann nicht eigentlich sagen, daß der Wagen von ihm gezogen wird, da es ja selbst auf dem Wagen steht. Dem kommt, daß der Sonnenwagen überhaupt eine verhältnismäßig späte Erfindung zu sein scheint. Homer kennt ihn noch nicht, obwohl bei ihm die Sonne in ihren verschiedenen Ausgestaltungen eine große Rolle spielt, und von den biblischen Darstellungen dürften die ältesten auf schwarzfigurigen Vasen, d. h. im 6. Jahrhundert, vorliegen. Von dieser Zeit an sieht man den persönlichen Sonnengott mit dem Wagen Schritt für Schritt die Sonnenscheibe aus der Kunst verdrängen, bis sie schließlich als Strahlenkranz auf das Haupt des Gottes beschränkt wird. Ähnlich liegen die Dinge in den anderen nördlichen Ländern. Ein so weniger haben wir Ursache, für den Norden ein höheres Alter anzunehmen. Die ganze Idee ist viel zu kompliziert, als daß sie ursprünglich sein konnte. Sicher ist ihr eine längere Entwicklung vorgegangen. Man versuchte, sich die Bewegung der Sonne klar zu machen. Das Nächstfolgende war, sie von einem Pferde gezogen zu denken, dem ältesten und schnellsten Tiere, das der Mensch zur Fortbewegung benutzte. Wie dies genau vor sich ging, wußte man nicht zu sagen: man ließ einfach das Pferd die Sonne an einer Leine ziehen.

Diese kindliche Auffassung ist in unserem Sonnenhilde verkörpert. Die Sonne ist auf Räder gelegt und wird, da sie selbst sich weder drehen noch rollen kann, an einem vier befestigten Bande geobolpft. Die Ornamentstreifen am Kopfe und Halse des Pferdes deuten auf ein Geschirr, dessen wirkliche Verbindung

mit den Zugsträngen dem Verfertiger freilich nicht gelungen ist. Das gemeinsame Untergerüst ist ein wirklicher kleiner, zum Fahren eingerichtetes Wagen, und er gleicht in seiner Konstruktion völlig den ältesten Wagen, die uns die Denkmäler erkennen lassen, von den ägyptischen Darstellungen aus dem 17. Jahrhundert v. Chr. bis zu den schwedischen Felsenzeichnungen. Welchen Zweck aber diese Aufstellung des Bildwerks auf einem Wagen hatte, ist nicht so einfach zu erklären, wie es auf den ersten Blick scheinen möchte.

Vor allem haben wir uns zu erinnern, daß es noch eine ziemlich große Zahl ähnlicher Miniaturwagen von den verschiedensten Fundorten gibt, die aber statt der Scheibe und des Pferdes einen Kessel oder allerlei Figuren tragen. Über ihre Bedeutung ist viel gestritten worden, darüber jedoch herrscht Einstimmigkeit, daß sie als sakrale Geräte anzufassen sind. Eine alte Überlieferung erzählt, daß in der thessalischen Stadt Krannon ein eherner Wagen, auf dem ein Wassergeäß und zwei Raben waren, in Zeiten der Dürre umhergefahren wurde, um Regen herab zu beschwören. Hiernach könnte man vermuten, daß die Beweglichkeit ein notwendiges Erfordernis zur Anwendung aller dieser heiligen Geräte und folglich auch des Sonnenbildes war: nur wenn bewegt wurde, äußerte es seine segenspendende oder Unheil abwehrende Kraft, und deshalb mußte es auf einem Wagen stehen.

Allein es erregt doch Bedenken, daß man zu diesen Zeremonien so winzige und gefährliche Gegenstände benützt haben sollte. Etwas klarer deutet man bei ihrem Abbild an die verkleinerten Wiedergabe etwas Größeren. Vielleicht sind es nur zu Votivzwecken angefertigte Nachbildungen von großen Kultgeräten, die bei feierlichen Umzügen auf Rädern mitgeführt wurden. Von solchen Umzügen gibt uns eine Reihe von Berichten im Norden wie im Süden Kunde. Man denkt z. B. an den Norðhavswagen des Tacitus, die Wagenfahrt des Gottes Freir in Schweden, an das Bild der Göttermutter in Gordien und der Magna mater bei den Römern, den persischen Sonnenwagen, der dem Wagen des Königs vorausfuhr, u. dgl. m. Ja, auf sionischen Münzen sieht man eigentlich ganz dasselbe, was unser Sonnenbild zeigt, nur mit Veränderungen im äußeren Apparat, die der wäite Zeitabstand mit sich bringt: auf einen Wagen, wie er bei religiösen Festen gezeigt wurde, steht die Sonnenscheibe überdeckt von einem temeligen Ueberzuge. Und doch hat auch diese Auffassung ein gewichtiges Bedenken gegen sich. Von den Zuständen der letzten Jahrhunderte vor Christus und am Anfang des Altertums kann man nicht ohne weiteres auf die um tausend und mehr Jahre zurückgehenden der nordischen Bronzezeit schließen. Wenn die Sitte der Gotterzahnung im Norden schon am das Jahr 1000 herrschend war, müßte sie sich, sollte man meinen, im Orient und in Süd-europa schon im zweiten Jahrtausend nachweisen lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Keiner jener Berichte und keine hierher gehörige Darstellung reicht in so alte Zeit zurück.

Wie dem auch sei, das eine ist klar, daß der Trundholmer Fund ein heiliges Tier, und zwar ein zur Verehrung bestimmtes Bild der Sonne darstellt. Es gab also im Norden während der älteren Bronzezeit einen Kultus dieses Himmelsgestirns, und man versteht jetzt, warum auf Felsenzeichnungen und Grabplatten jener Periode so häufig Figuren umgehört sind, die man schon immer als Sonnensymbole angesehen hat, aber erst jetzt mit voller Sicherheit dafür in Anspruch nehmen kann. Einige dieser Figuren haben die Form eines in einen Kreis eingeschriebenen Kreuzes. Man hat hierin ziemlich allgemein die Darstellung der Sonne

in Gestalt eines Rades erblickt wollen. Nach dem, was oben über die dem Trundholmer Bildwerke zugehörige Idee gesagt wurde, kann das nicht richtig sein, denn es ist unmöglich, daß gleichzeitig mit jener primitiven Auffassung der Sonne als einer unbeweglichen Scheibe die vorgeschrittene als eines rollenden Rades geltend war. In Wahrheit ist das Radkreuz nur eine der mannigfachen Formen, unter denen die Sonnenscheibe auf den Felszeichnungen und anderwärts dargestellt wird, und seine Ähnlichkeit mit einem vierseitigen Rade rein zufällig.

Die Religionsentwicklung im Norden mag nach dem bisher vorliegenden Stoffe etwa folgenden Verlauf genommen haben. Im jüngeren Steinalter — vom älteren wissen wir in dieser Beziehung nichts — und zum Teil noch im Bronzealter scheint wie bei fast allen primitiven Völkern ein Ahnen- und Naturkult geherrscht zu haben. Steine, Bäume, Erde und Wasser waren Gegenstand der Anbetung. Hierzu gesellte sich in der älteren Bronzezeit die Sonnenverehrung als ein wichtiges geistiges Element in der großen Summe von Kulturgütern, die der Norden damals von Süden her empfing. Die in der Sonne verborgene Gottheit war noch nicht persönlich gedacht. Ob man sich überhaupt im Norden während des Bronzealters zu einem persönlichen Götterglauben aufgeschwungen hat, läßt sich nach dem vorliegenden Material nicht entscheiden. Erst von der römischen Zeit an finden wir deutliche Anzeichen eines vollständigen Wechsels der religiösen

Vorstellungen in diesem Sinne. Die mächtige Sonnengottheit des Bronzealters tritt vor den neuen persönlichen Göttern zurück. Der Gott, der in der Edla den Sonnenwagen lenkt, ist von untergeordnetem Range und mit allen Zügen des griechisch-römischen Helios ausgestattet.

Das Trundholmer Bildwerk wurde im September 1902 beim Uftharneben einer vorher niemals bebauten sumpfigen Fläche, 300 m vom Rande eines Torfmooses, gefunden. Es war in viele Stücke zerbrochen, die etwa 6 Zoll tief, nur von der Vegetationsschicht bedeckt, auf einem 4 qm großen Raume zerstreut waren. Zwei wichtige Umstände wurden durch die vom Nationalmuseum sofort vorgenommene Untersuchung festgestellt: Die Zerstörung des Bildwerkes muß schon zur Zeit seiner Niederlegung absichtlich und gewalttätig am Fundorte erfolgt sein und die Stücke sind weder vergraben noch im Wasser versenkt, sondern unter freiem Himmel offen bingelegt worden. Die bedeckende Humusschicht hat sich im Laufe der Zeit darüber angeeignet. Hieraus ergibt sich, daß das Sonnenbild, gleich so manchem anderen kostbaren Funde, wie den berühmten Goldhörnern, dem großen Silberkessel von Gundestrup, den Isbjergwagen und dem Bronzefuß von Sophienberg, die alle ebenfalls die Spuren absichtlicher Zerstörung zeigen, nicht als verborgener Schatz, sondern als Opfergabe für die Götter aufzufassen ist.

Hans Seger.

## Aus der russischen Literatur.

### (Archäologie.)

Von

Professor Dr. Ludwig Stieda (Königsberg i. Pr.).

**A. A. Spizyn:** Kurgane mit gefärbten Skeletten. (Schriften der K. Russischen Archäologischen Gesellschaft, Bd. XI, 1. und 2. Heft. Neue Serie: Arbeiten der Abteilung für slawische und russische Archäologie, herausgegeben unter der Redaktion des Vorsitzenden der Abteilung S. Th. Platonow. 4. Buch. St. Petersburg, 1900, S. 53 bis 133.)

Ich muß vor allem begründen, warum ich über diese schon vor einigen Jahren veröffentlichte Abhandlung des verdienten russischen Archäologen erst jetzt hier berichte. Es geschieht das aus dem einfachsten Grunde, weil ich erst vor kurzem die Originalabhandlung vom Verfasser erhalten habe. Es sei Herrn Spizyn auch hier verbindlichst dafür gedankt. Ferner ist hervorzuheben, daß die Arbeit Spizyns sehr wichtig ist, weil die Frage nach den gefärbten Gräberknochen gerade in der letzten Zeit mehrfach erörtert worden ist, und zwar meist ohne Kenntnis der russischen Arbeiten. In der Sitzung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie und in einer Sitzung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher in Karlsruhe,

1902, und an anderen Orten ist darüber diskutiert worden. Eduard Krause-Berlin hat im „Globus“ (Dezember 1901, Bd. LXXX, Nr. 23) einen längeren Aufsatz („Zur Frage von der Rotfärbung vorgeschichtlicher Schädelknochen“) erscheinen lassen. Schließlich habe ich selbst in der Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Worms (August 1903) rotgefärbte Gräberknochen aus Südrussland vorgelegt und eine Erklärung der eigentlichen Tatsache der Rotfärbung gegeben.

Ich werde aus bestimmten Gründen an einem anderen Orte (Zeitschrift für Ethnologie, Berlin) eine zusammenfassende Darstellung der verschiedenen Ansichten, die in betreff der rotgefärbten Knochen ausgesprochen worden sind, demnächst liefern. Ich sehe hier von einer Übersicht und einer Kritik der bisherigen Ansichten, zu welcher die Abhandlung Krauses besonders heraufordert, vollständig ab und beschränke mich auf einen einfachen Auszug aus der oben zitierten Abhandlung Spizyns.

Die Abhandlung Spizyns zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teile gibt der Verfasser nach einer kurzen Einleitung eine Übersicht über die Gebiete, in denen



rotgefärbte Knochen in den Gräbern (Kurganen) gefunden worden sind, wobei er die charakteristischsten Eigentümlichkeiten der einzelnen Kurgane in den Begräbnisstätten hervorhebt. Er bezieht sich bei dieser Übersicht auf den zweiten Teil, in welchem er mit großer Sorgfalt und großen Fleiß 229 Einzelberichte, in denen rotgefärbte Knochen erwähnt werden, zusammenstellt. Es ist für den Referenten selbstverständlich ganz unmöglich, die Einzelberichte auszugeweiht wiederzugeben — davon muß abgesehen werden. Deshalb ist auch ein Hinweis auf die Einzelberichte fortgelassen worden. Ich werde mich schädeln nur einige Literaturangaben machen, insofern als A. Szpiryn sich in seinem zweiten Teil auf dieselben bezieht. Die Literatur über die Grabfunde in Rußland ist sehr groß, — über einen Teil dieser Literatur geben meine Berichte im Archiv für Anthropologie Auskunft.

Die Kurgane in denen sich rotgefärbte Skelettknochen finden, bieten ein großes Interesse dar. Das hohe Alter, die Eigenart der Kultur, die streng eingehaltene Begräbnisordnung, die große Menge, die weit Verbreitung, die bemerkenswerte Gleichmäßigkeit, die anthropologischen Eigenschaften des betreffenden Volkes, das plötzliche Verwehnen jener Sitte — alles ist sonderbar, rätselhaft.

Die Kurgane der Grabknochen sind über die weit Ausdehnung der südrussischen Steppengegend zerstreut; — in alten Zeiten dehnte sich das Steppengebiet noch weiter aus als jetzt. Vielleicht ein Drittel aller bisher aufgedeckten südrussischen Kurgane enthält rote Knochen, — allein es darf nicht übersehen werden, daß in so zahlreichen Denkmälern des Altertums sich auch ethnologische und ethnologische Verschiedenheiten finden lassen. Der Verfasser hat es daher für notwendig gehalten, zunächst die charakteristische Beschreibung der Kurgane mit roten Knochen nach den einzelnen Gegenden vorzunehmen. Er unterscheidet danach neun Bezirke: 1. den Terekbezirk, 2. den Kubanschen, 3. den Tamanschen, 4. den Krimschen, 5. den Jekaterinowskischen, 6. den Bielenesker, 7. den Kiewschen, 8. den Unter-Donnschen und 9. den Mittel-Donnschen Bezirk.

1. Der Terekbezirk. Hier sind ausgedehnte Aufgrabungen durch Prof. Samokwassow in der Nähe von Pjatigorsk und Kislowodsk gemacht worden.

Die betreffenden Kurgane liegen einzeln oder zu zwei oder drei heineinander; sie sind von beträchtlichem Umfang, 15 bis 20 Arschin (10,5 bis 14,0 m) hoch. Die Kurgane sind sorgsamste zusammengesetzte (Käfigkurgane), d. h. auf die ursprüngliche Erdaufsichtung sind später einzelne oder mehrere nachträgliche Erdaufsichtungen hinzugekommen. Die ersten einfachen Hügel lagen regelmäßig in einer Reihe; infolge der häufig-kommenden Aufschichtungen ist die Form unregelmäßig geworden. Mitanter haben die Kurgane die Gestalt eines verlängerten Walfens. Die eigentlichen Gräber finden sich entweder 1. in der festen Erde (Muttererde), 2. unmittelbar darauf oder 3. in den Aufschichtungen. Die in dem festen Erdboden (in der Muttererde) befindlichen Gräber (sie will sie Grundgräber nennen) sind im allgemeinen nicht umfangreich: sie haben eine Länge von 1 Sashen (2,1 m), eine Tiefe von 1 Arschin (0,90 m). In einem bestimmten Kurgan (Nr. 5<sup>1)</sup> hatte die Grube eine Tiefe von 2 Arschin (1,8 m); wie es schien, hatten die Toten am Boden der Grube in einem besonderen hölzernen Grabgewölbe (Grabkammer) gelegen, während der übrige Raum mit Steinen angefüllt war.

Die Skelette, die in den Erdaufsichtungen sich fanden, lagen größtenteils in Steinkisten, die aus großen Steinplatten oder Fliesen bestanden, oder in Grabräumen, deren Wände aus kleinen Kalksteinen oder Tonart zusammengesetzt waren. Gräber, unmittelbar auf dem Erdboden, sind selten, aber charakteristisch. Ein solches Grab hatte folgendes Aussehen: Auf dem festen Erdgrunde stand eine aus Fliesen bestehende Kiste, in der das Skelett lag; auf der oberen Wand, dem Deckel der Grabkiste, befand sich ein aus kleinen Fliesen gebildeter Raum, der zwei Pferdeköpfe enthielt. Alles lag auf einer geringen Schicht von großen Steinen, deren Durchmesser von 4 bis 8 Arschin (2,8 bis 5,6 m) schwankte. Ein anderes Grab hatte die Form einer steinernen, sehr geräumigen Grabkiste (8 × 5 × 4 Arschin = 5,6 × 3,5 × 2,8 m), die sowohl seitlich wie von oben durch Kieselsteine und Fliesen begrenzt war. Es lag ein Skelett oben auf einer Lehmschicht und war bedeckt von zwei Reihen Fliesen, auch seitlich lagen Steinblöcke. Darunter befand sich eine dicke Schicht von Steinen, und darunter lag unmittelbar auf dem Erdboden noch ein Skelett mit roten Knochen. Die Skelette liegen alle ausnahmslos auf dem Rücken, die Extremitäten ausgestreckt. Der Kopf ist bald nach Osten, bald nach Westen, Nord oder Süden gerichtet. Bei einigen Skeletten lagen Stücke einer roten Farbe, bei anderen Skeletten von den Knochen gefolgt. An Gegenständen fanden sich: Hämmer aus Knochen oder Nephrit, kupferne und knochenne massive Nadeln mit verziereten Endknöpfen, kupferne Messer, steinerne und kupferne Meißel, silberne Spiralarms, kupferne und knochenne Perlen; Obsidian- und Feuersteinplättchen, Muscheln, verschiedenartige Gefäße. Knochen von Schafen und Pferden. Sehr interessant ist, daß bei einzelnen Skeletten so wie auch in den Erdaufsichtungen einiger Kurgane, vereinzelte menschliche Knochen gefunden wurden; die Knochen zeigten mitunter Spuren, die von scharfen Instrumenten herrühren.

2. Der Kubaubezirk. Die betreffenden Kurgane sind durch Reichtum der Funde ausgezeichnet; ihr Bau weist besondere originale Züge auf. Sie sind aufgedeckt durch N. J. Wesselowski im Jahre 1886/87, in Maikop und in verschiedenen Stanzien (Kostromskaja, Andrukowskaja, Psebniskaja, Zarskaja, Tschamlykskaja). Der Kurgan bei Maikop, der einzig in seiner Art ist, enthielt wahrscheinlich das Grab eines Königs oder eines Herrschers. Die Grube hatte einen beträchtlichen Umfang, war aber nicht tief. Am Boden der Grube, die mit Steinen ausgelegt war, lagen drei Skelette zusammengerückt auf der rechten Seite. Ein Skelett, offenbar das des Herrschers selbst, war bedeckt mit einer großen Menge verschiedenartiger goldener Plättchen, auf denen Löwen und Stiere dargestellt waren, ferner bedeckt mit vielen goldenen Ringen und Perlen, darzwischen lagen viele Edelsteine (Sardonyx und Türkisen). Am Skelette lagen eine große silberne ausgemessene Stäbe mit verzäglig gearbeiteten goldenen Knäufen, die Tiere darstellten. An anderen Stellen der Grabkammer lagen viel bronzenne Waffen (Hämmer, Meißel, Messer), ferner tönerner, bronzene, goldene und silberne Gefäße; doch wurden auch steinerne Gegenstände dabei gefunden: Pfeilspitzen aus Feuerstein, ein Steinmeißel, eine Keule. Die beiden anderen Skelette waren arm an Gegenständen, — sie gehörten wohl einem Sklaven und einer Sklavin. Alle drei Skelette waren dicht bestreut mit Meunige. Alle goldene Schmuckstücke sind sorgfältig gearbeitet, sie zeigen die Eigentümlichkeiten der assyrischen Kunst. In den übrigen sechs Kurganen des Kubanbezirks wurden 11 Gräber aufgedeckt, zwei im Erdboden, drei auf dem natürlichen Erdboden, sechs in der Aufschichtung.

<sup>1)</sup> Die Zahlen beziehen sich auf das am Schluß der Abhandlung gegebene Verzeichnis aller Kurgane mit roten Knochen.

Die Gruben im Erdboden sind nicht tief (Nr. 8 und 130): die eine Grube ist mit altem Steinschutt aufgefüllt — hier lag ein ungarbares Skelett mit allerlei bronzenen, silbernen und goldenen Beigaben. Das andere Grundgrab (Grab im Erdboden) enthielt ein Skelett, dessen Knochen dunkelbraun gefärbt waren, daneben lag nur ein Feuersteinmesser und eine Tonsehre.

Unter den drei Gräbern, die sich auf dem natürlichen Erdboden befinden, enthielt das erste ein ungarbares Skelett mit reichen Beigaben; in den beiden anderen lagen die Skelette mit dem Kopf nach Süden zusammengekehrt (Nr. 11 a und b) auf festgestampften Erdboden — die Skelette waren mit dunkelrotem Farbstoff bedeckt, am Kopfe lagen zwei kleine goldene Spiralfingerringe. Unter den Gräbern in der Erdaufschüttung selbst bestand das eine aus einem hölzernen Grabgewölbe und enthielt ein gekrümmtes gefärbtes Skelett (Nr. 13 b), die beiden anderen Gräber wurden durch große Steinblöcke gebildet, in denen gekrümmte Skelette lagen; das eine Skelett war mit Deker, das andere mit Mennige rot gefärbt; daneben lagen sehr mannigfache Gegenstände aus Bronze, Gold, Knochen und Steingefäße, Pfeilspitzen usw.

3. Tamaulapbezirk. Hier sind 17 Kurgane mit gefärbten Knochen der Jahre 1854/56 aufgedeckt worden. Die Erdhöhlen sind von geringem Umfang und enthalten größtenteils nur ein Grab. Im Bereich der Aufschüttung befanden sich — abgesehen von einer Steinkiste — keine Gräber; die Mehrzahl der Skelette lag in Gruben im natürlichen Erdboden, die meistens mit Holz, bisweilen mit Seesgras, in einem Eisen (Kurgan Nr. 1 b) mit einer großen Steinplatte zugedeckt sind. Die Gräber sind nur von geringem Umfang, sowohl für Erwachsene wie für Kinder. Unter einem Skelett (Nr. 18a) entdeckte man eine Schicht Seesgras, nach anderen Skeletten (Nr. 16, 25, 26) eine Schicht Baumrinde; die Schichten waren in einem Falle rot und blau gefärbt, in anderem mit Kalk vermischt. In einzelnen Fällen erschienen nur die Schädel rot (24, 26), in anderen Fällen lagen Stücke Farbe neben den Knochen (20, 29). Die Beigaben der Toten sind sehr gering; bei einem Toten wurde ein steinerner Hammer, bei einem anderen ein tonerner Krug und ein anderes Gefäß gefunden. Auf dem natürlichen Erdboden fanden sich drei Grabkammern mit einem Steinplattendeckel (Nr. 21, 22, 23) und eine Grabkammer aus Holz (Nr. 27). Die Beigaben waren im allgemeinen gering; in einem Grabe lag ein irdenes Gefäß, ein bronzenes Messer; im anderen ein Steinhammer, zwei bronzene Messer; im dritten Tonsehre und Farbreste. Nur der Kurgan Nr. 30 beherrschte in geringer Tiefe der Erdaufschüttung ein Steingrab von  $1\frac{1}{2}$  Arschin (etwa 3 m) Länge und 2 Arschin (1,4 m) Breite; die Dicke der Steinplatte betrug fast 70 cm.

4. Der Krimische Bezirk. Hier sind ziemlich viel Kurgane mit gefärbten Knochen, größtenteils durch N. J. Weselowski und J. A. Kulkowski, aufgedeckt worden. Man kann 30 Kurgane mit 50 alten Gräbern aufzählen. Die Mehrzahl der Toten (61) war in Grundgräbern (im natürlichen Erdboden) bestattet worden, neun Tote auf dem natürlichen Boden, 18 in der Erdaufschüttung. Die überwiegende Anzahl der Knochen enthielten die Gräber 2 bis 7, und 15 Kurgane enthielten je ein Einzelgrab.

Der größte Teil der Grundgräber hat mittlere Maße: Länge  $2\frac{1}{2}$ , bis 3 Arschin (= 1,8 bis 2,1 m), Breite  $1\frac{1}{2}$ , bis 2 Arschin (1 bis 1,4 m), Tiefe 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Arschin (0,7 bis 1 m), nur einzelne Gräber sind umfangreicher, z. B. Nr. 23 hat die Maße  $2 \times 3\frac{1}{4} + 3\frac{1}{4}$  Arschin (= 1,4 m  $\times$  2,3 m + 2,3 m, und

hält sechs Skelette. Die Gräber waren größtenteils von Holz, nur ein einziges Kindergrab außerdem noch mit Stein bedeckt. Ein kleiner Teil der Gräber, neun an der Zahl, war nur mit Steinplatten versehen. Ein Kinderskelett (Nr. 34 c) lag auf einer Steinplatte am Boden des Grabes, in drei Gräbern (Nr. 33 a, 36 b und 47) war der Boden mit einem dünnen, dünnen Schicht von rotem Farbstoff bedeckt, hier und da waren noch einzelne größere Farbkümmen bemerkbar. Die Wände eines kleinen Kindergrabes (Nr. 56 d) waren sorgsam geglättet und mit roter Farbe überzogen. Ein kleines Kindergrab (Nr. 39 a) war mit Kieselsteinen gefüllt, mit Holzstücken zugedeckt, auf denen noch ein Haufen großer Kalksteine lag. Zwischen den Kieselsteinen steckte ein Feuersteinmesser. Am Boden des Grabes Nr. 36 b war neben dem roten Farbstoff noch ein weißer Farbstoff zu erkennen. Die Toten lagen mit wenigen Ausnahmen auf der linken Seite, mit gebeugten Armen und Beinen, den Kopf nach Osten oder Nordosten gerichtet. Nach einer allgemeinen Übersicht ist etwa der vierte Teil aller Skelette entweder rot gefärbt (18-Skelette) oder es finden sich zu Haupten des Skeletts Stücke roter Farbe; in einem Falle war ein Fuß, in einem anderen Falle nur der Schädel gefärbt. Der Farbstoff ist öcker. In einigen Gräbern lagen auch Kohlen und Asche.

Die Beigaben der Toten in den Grundgräbern sind sehr mangelhaft; zwei bronzene Messer, zwei kieselne Nadeln, einige Perlen, durchlöcherter Tierzähne, ein Feuersteinmesser, Pferdezähne, Tonsehre usw.

Unter der Zahl der Grundgräber waren nur zwei, die die Form von Grabkammern hatten (Nr. 64 und 65); die Grabkammern waren aus großen Steinblöcken gerichtet. Neben einem ganz veränderten Skelett lag eine bronzene Platte und ein polierter Stein; an dem anderen Skelette waren zu Haupten einige rote Farbreste erkennbar, und an der linken Seite lag ein messerähnliches Feuersteinmesser.

Auf dem natürlichen Erdboden befanden sich sieben Steingräber (Steingräber) und zwei gewöhnliche Gräber. Die sechste Steinkiste beherrschte der Kurgan Nr. 63; sie war aus großen, innen angemalten Steinblöcken aufgebaut, die Bemalung war schwarz und dunkelrot. Das Grab war bereits zerstört, nur die Reste eines gefärbten Skeletts und ein bronzener Ring waren übrig geblieben.

In dem Kurgan Nr. 71 stand unmittelbar auf dem Erdboden eine Grabkammer, deren Wände und Decke aus unbehauerten Steinplatten aneinandergesetzt waren. (Dimensionen:  $7 \times 2 \times 1$  Arschin, =  $2,1 \times 1,40 \times 0,7$  m.) Das Skelett lag mit angezogenen Beinen auf der Seite, darunter eine Unterlage aus Gras und Baumrinde, vermischt mit Kalk, als Hülle ein schwarzes irdenes Gefäß. Im Kurgan Nr. 53 a hatte die annähernd kubische Grabkammer nur eine Ausdehnung von 1 Arschin (0,70 m). Der Tote war in sitzender Stellung bestattet, bei ihm stand ein Gefäß.

In der Erdaufschüttung befanden sich sieben Bestattungen in Steingräbern (Kammern) und elf freien. Das besterhaltene Steingrab ist das in Kurgan Nr. 36 c. Es bestand aus vier großen, schwarz und rot angemalten Steinplatten, und war mittels einer großen, grob bearbeiteten und nicht angemalten Steinplatte zugedeckt. Das Skelett lag in gekrümmter Stellung auf einer Unterlage von kleinen Steinen, zu Haupten eine Menge Seesgras. In den anderen Gräbern waren die Toten entweder in sitzender oder gekrümmter Stellung bestattet, die Knochen der Skelette leicht gefärbt, in den meisten Gräbern Reste von Kohle und Asche. — Die Steingräber in der Erdaufschüttung sind einander nicht gleich; man darf vielleicht drei

Arten unterscheiden: 1. Grabkammern aus Steinfliesen, 2. kleine Irakhkammern (Kisten) und 3. sehr große mit Wänden aus Steinplatten. Die freie Erdbeeckung war offenbar eine einfache, mit Brettern (Holz) zugedeckte Erdkammer wurden benutzt. Die liegenden Skelette waren gefärbt, bei einem Skelett befand sich ein Steinbeil.

5. Bezirk von Jekaterinoslaw. Die betreffenden Kurgane mit gefärbten Skeletten nehmen den dreieckigen Raum zwischen den Dnjepr-Strasshöhlen Ingul und Moletschnja ein. Es sind in dem Zeitraum von 1861 bis 1870 meist durch die Herren von Sahelin, Dr. Nankowassow und durch andere im ganzen 16 Kurgane aufgedeckt worden. In nur große Kurgane aufgetragen wurden, so ist es selbstverständlich, daß man in jedem Kurgan mehrere Gräber antraf. Man kann in sämtlichen Kurganen 69 Gräber zählen, also durchschnittlich vier in jedem Kurgan. Nur ein Kurgan enthielt ein Einzelgrab, die übrigen enthielten 2 bis 14 Gräber. Unter den 69 Gräbern sind 45 im Erdhoden (Grundgräber), 6 auf dem Erdhoden. 13 in der Aufschüttung, darunter einige Ganggräber (Katakomben).

Die Grundgräber (im Erdhoden) zeigen eigentlich nichts Charakteristisches, so haben im allgemeinen die Dimensionen der Gräber des vorhergehenden Bezirks, doch sind einzelne tiefer ( $2\frac{1}{2}$  bis 3 Arschin = 19 bis 21 m), einzelne sind sehr flach, nur 35 cm. Die Gräber sind bedeckt mit Rundsteinen, auf welche Stroh und verschiedene Stranchwerk gelegt war, nur einzelne Gräber sind mit Steinfliesen gedeckt. In den Kurganen Nr. 95 a und 99 d sind die Wände der Gräber mit Lehm angesehmert und geglättet. In 17 Gräbern sind die Skelette zusammengekrümmt, in dreien gefaltet, in vieren einzelne Farltücken. In einem Grabe (Nr. 79) war der Hoden mit Kalk bedeckt; 12 Tote hatten eine besondere Unterlage aus dunkelroter Lehmschicht von  $\frac{1}{2}$  Werschok (etwa 1 em) Mächtigkeit (Nr. 95 und 100 h), in einigen Fällen (Nr. 98 a und b) bestand die Unterlage aus Farlatoff; in einem anderen Fall (Nr. 99 d und i) war die Unterlage doppelt, rot und weiß. Die Toten lagen in verschiedenen Richtungen. — Die Beigaben der Toten sind nämlich: Feuersteinfeldspitzen und Lanzenspitzen, Flußmuscheln, Vogelsknochen, Topfe. Zu den Füßen des Toten (Nr. 94 f) lag ein Pferdeskelett und daneben zerstreut die Knochen anderer Tiere, auf dem Grabe Nr. 96 lag zwischen Stroh- und Holzstücken der Körper eines jungen Kindes.

Unter den Katakomben ist die beste im Kurgan Nr. 96 g erhalten. Ein Schacht (mit Balken, mit Stroh und Stranchwerk gedeckt, führt in die Tiefe. Auf einem Endabatz (Stufe) der Grube lag in gekrümmter Stellung auf der linken Seite ein Skelett, zu Häupten stand ein Topf, der zwei Knochen menschlicher Finger enthielt; daneben lagen Bein- und Unterkiefer eines Kindes. Es waren mehrere solcher Stufen oder Absätze erkennbar. Der Schacht (Gang) führte in einem geraden oval geformten Kamm, der sorgfältig mit Lehm ausgekleidet war. Hier lagen vier Skelette in gekrümmter Stellung. Unter zwei Skeletten war eine weiße Unterlage erkennbar; ein Skelett war rot gefärbt, bei dem anderen lagen Stücke roter und gelber Farbe.

Steingräber auf der Oberfläche des festen Erdhoden wurden nur in drei Kurganen entdeckt. Im Steingrabe 94 h (Höhe  $2\frac{1}{4}$  ×  $1\frac{1}{2}$  × 2 Arschin =  $1.9$  ×  $2$  ×  $1.4$ ), das mit drei Steinplatten bedeckt war, lag in gekrümmter Stellung auf der linken Seite, daneben standen drei Topfe; lange lagen die Knochen eines ganzen Pferdes.

Einfache Gräber ohne Steinplatten befanden sich in den Kurganen Nr. 93 und 96 a.

In der Erdaufschüttung selbst wurden keine Steinplatten aufgefunden. Die betreffenden Gräber (Nr. 89) haben nur einen Boden aus festgestampftem Lehm, Wände aus Brettern und Pfählen, so wie eine hölzerne Decke. Der Kurgan 94 enthält ein hölzernes Grab. Alle Skelette lagen in gekrümmter Stellung; ein Skelett lag auf einer dunkelroten Unterlage, bei einem anderen Skelett befand sich rote Farbe. An Beigaben wurde nur wenig entdeckt: ein bronzenes Messer, ein Gefäß und Köhlen.

6. Im Bezirk von Byeloezerki (Gouv. Clorson) sind 29 Kurgane mit gefärbten Skeletten aufgetragen; die Ausgrabungen sind durch Herrn Skadowski gemacht. In den 22 Kurganen fanden sich 55 Gräber.

Die Maße der 32 Grundgräber (im Erdhoden) sind die gewöhnlichen mittleren, die Gräber sind mit Holz gedeckt, selten mit Steinplatten. Die Form der Gräber ist verschiede: dreieckig, oval, unregelmäßig; der Boden der Gräber meist ausgestrichen mit graulichem Lehm; in einem Grabe befand sich eine 1 Werschok (4,5 m) starke Schicht von Schliffröh. Ein besonderes Aussehen zeigt das Grab Nr. 125. Eine große  $4\frac{1}{2}$  × 3 Arschin (3 bis 2 m) im Querschnitt haltende Grabe beherbergte teils unversehrte, teils angebrante Menschenknochen; auch die Wände des Grabes zeigten Brandspuren. In der Mitte der großen Grabe befand sich eine kleinere, welche ein gefärbtes Skelett, das auf dem Rücken lag, enthielt. Das Skelett lag zum Teil gekrümmt, zum Teil auf den Hüften gestreckt. Die Hälfte aller Skelette ist gefärbt, oft liegen Farbstücke neben dem Skelett. Beigaben sehr gering: einige Bronzespitzen, Nadeln, durchbohrte Tierzähne, Feuersteinwerkzeuge.

Weiler unter der Erdoberfläche noch im Bereich der Erdaufschüttung wurden Steinplattengräber entdeckt; die im Bereich der Erdaufschüttung befindlichen Gräber zeigen denselben Charakter wie die Grundgräber.

7. Im Kiwischen Bezirk sind 53 Kurgane mit gefärbten Knochen zu verzeichnen; die Ausgrabungen sind durch den Grafen A. A. Bobrinski vorgenommen. Unter den 114 Gräbern befanden sich 105 im Erdhoden, nur 2 auf dem Erdhoden und 7 in der Erdaufschüttung. Steinplattengräber sind keine entdeckt worden.

Da ich über die Ergebnisse der Ausgrabungen Bobrinskis bereits ausführlicher berichtet habe, so hebe ich hier aus der eingehenden Darstellung Spitzgen nur wenig heraus.

Die Gräber sind klein; die Skelette liegen meistens gekrümmt, nur einzelne wenige sind gestreckt; 26 Skelette erwiesen sich rot gefärbt, außerdem war an fünf Schädeln Farbe erkennbar. Bei 11 Skeletten lagen Stücke roten Farlatoffes; im ganzen konnte in 42 Gräbern, also in mehr als einem Drittel, die Anwesenheit von rotem Farbstoff nachgewiesen werden.

Die Beigaben sind nur ganz gering: Silber- und Bronzefunde sind selten, steinerne und knochenartige Gegenstände aber häufig.

8. Im Unteren Dnebgobiet sind nur 12 Kurgane mit gefärbten Knochen bekannt geworden; sie enthielten 24 Gräber, davon 17 Grundgräber, eines auf dem Erdhoden, drei in der Erdaufschüttung und drei in den Katakomben.

Nähere Angaben über den Bau der Grundgräber sind nicht überliefert, auch über die Stellung der Skelette wissen wir nichts. Sicher ist nur, daß in sieben Gräbern Farlatoffstücke gefunden wurden, und daß ein Skelett rot gefärbt war. In einigen Gräbern war am Boden eine weißliche Grundlage homerkl. Beigaben nur gering: Knochenperlen, durchbohrte Steinchen, Bronzespitzen und Pfeilspitzen.

silberne Spiralarms, Eisensteinnäse und einige Gefäße und Gefäßscherben. In einem Grab wurde ein Pferde skelett, in einem anderen ein Pferde schädel entdeckt.

9. Im Mittel-Donbezirk im Gov. Saratow (am Flusse Blowna) sind 11 Kurgane mit 20 Gräbern, davon 15 Grundgräber, 3 oberflächliche und 2 in der Erd aufschüttung, aufgedeckt worden.

Die Eigentümlichkeit der Grundgräber ist, daß sie verhältnismäßig tief im Erdbofen (3 bis 4 Arschin = 2 bis 3 m) liegen und daß sie abgerundete Ecken haben. Meist sind die Gräber kory, mit Holz zugedockte Kammern; einzelne erschienen als hölzerne Grabschilde oder als hölzerne Grabkammern. In einzelnen Gräbern lag etwas Asche. Die Skelette liegen gekrümmt auf der Seite. Die Skelette sind rot gefärbt (Nr. 220, c, 224 und 227 n), bei sechs Skeletten befand sich roter Farbstoff in Stücken. Im Grab Nr. 220a war der obere Teil des Skeletts mit einer wohl 3 bis 4 mm dicken Schicht roter Farbe bedeckt. Neben vielen Skeletten wurden Tierknochen (Pferd, Schaf usw.) gefunden. An Beigaben sind zu verzeichnen: bronzene Messer, silberne Spiralarms, ein Halschmuck aus Knochenstäben, kücherne Perlen, Feuerstein-Pfeilspitzen und einige Gefäße aus Ton.

Auf der Erdoberfläche befanden sich drei Gräber zu je einem Skelett, alle Skelette in gekrümmter Stellung, bei zweien rote Farbe.

An anderen Lokalitäten des Steppegebietes sind Kurgane mit gefärbten Skeletten nur zufällig entdeckt; besondere Fundgebiete lassen sich nicht namhaft machen.

In der Nähe der Stadt Nogaisk (Gov. Taurien) sind durch N. J. Wessolowski vier Kurgane mit rot gefärbten Skeletten (zwei Gräber) aufgedeckt; alle Skelette sind in gekrümmter Stellung, fast alle gefärbt.

In vier Kurganen, die durch Brandenburg bei Marijampol aufgedeckt wurden, befanden sich acht Grundgräber, von denen ein Grab mit einer Steinplatte geschlossen war, ein anderes Grab war durch eine Reihe Steine gedeckt. Die Skelette sind in gekrümmter Stellung und fast alle gefärbt. Begeben sind armlich.

Die beschriebenen Gräber sind am ehesten den Gräbern des Bezirks Jekaterinow anzugliedern.

Die Ergebnisse der Aufdeckung von Kurganen mit gefärbten Skeletten in den Gouvernements Cherson, Besarabien, Podolien usw. bieten nichts Charakteristisches dar; bemerkenswert ist nur, daß die Beigaben durchweg spärlich und armlich sind.

In den Gouvernements Poltawa, Tschernigow, Orel, Penza, Woroneß, Kursk und Charkow sind bis jetzt Kurgane, die rotgefärbte Skelette enthalten, nur in sehr geringer Zahl aufgedeckt worden. Besondere Eigentümlichkeiten sind an den Gräbern nicht zu bemerken.

Der Verfasser schreibt dann weiter: Die in den Kurganen mit rotgefärbten Skeletten beobachteten Bestattungsbräuche zeigen keinen lokalen Charakter. Man darf am ehesten meinen, daß der betreffende Begräbnisgebrauch (Anwendung des roten Farbstoffs) entweder direkt aus Kleinasien oder auf Umwegen aus Assyrien mit einem vorwärts wandernden Volke und unter einer gleichzeitig sich verbreitenden religiösen Anschauung weiter vordringen ist.

Bereits die älteren Ausgrabungen haben zu der Annahme geführt, daß die hier in Rede stehenden Kurgane eine gewisse Beziehung zu den Dolmen haben; die in jenen Kurganen aufgedeckten Steinkistengräber weisen direkt darauf hin; die neuen Ausgrabungen, durch welche wirkliche zweikammerige Dolmen in den Kurganen entdeckt worden sind, machen jene Annahme noch wahrerberechtigt. Die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Dolmenbestattungen sind auch die

Eigentümlichkeiten der ältesten unter Anwendung von rotem Farbstoff stattgefundenen Begräbnisse in den Kurganen, nämlich: eine Bestattung an der Oberfläche des Erdbofens, in Steinkammern, in sitzender Stellung.

Der Gebrauch, die Toten auf der Erdoberfläche in Kurganen zu bestatten, ist im allgemeinen selten, etwa 8 Proz. aller hierbei gerechneten Bestattungen (etwa 488); aber der Gebrauch ist in allen oben aufgezählten Bezirken beobachtet worden, am häufigsten in den Bezirken Kuban und Taman, fast gar nicht im Bezirke des Erdbofens, in Steinkammern, in sitzender Stellung. Die Gräber, die Toten auf der Erdoberfläche anzuweisen sind, sind im allgemeinen selten, etwa 8 Proz. aller hierbei gerechneten Bestattungen (etwa 488); aber der Gebrauch ist in allen oben aufgezählten Bezirken beobachtet worden, am häufigsten in den Bezirken Kuban und Taman, fast gar nicht im Bezirke Kiew; hier haben sich auf 114 Gräber nur zwei Gräber der obigen Kategorie gefunden, und von diesen ist es zweifelhaft, ob sie nicht vielleicht als Gräber in der Erdaufschüttung anzusehen sind. Wenn man die Gräber im Gebiete Kiew fürhält, so steigt die Zahl der Bestattungen auf der Erdoberfläche auf 11 Proz. Die Skelette liegen in Dolmen, in Steinkisten, in hölzernen Grabschilde oder auf besondern Erhöhungen. Wirkliche Dolmen sind nur zwei im Gouvernement Kuban (Nr. 110 und 112) entdeckt worden. Diese Dolmen sind zweikammerig; die eine hat eine Umfassung von Stein in Form eines Walfes. Um Platz für ein Dolmen zu schaffen, ist ein Teil des Kurgans entfernt worden, der andere Dolmen aber ist von oben her fast bis zur Erdoberfläche in den Kurgan hineingelassen worden. Zu den übrigen 30 Begräbnissen auf festem Erdbofen sind verwandt 21 Kisten aus großen Steinplatten, eine aus kleinen Steinplatten, eine durchweg aus Holz, eine aus Holz mit steinernem Deckel usw., von anderen Gräbern ist die nähere Beschaffenheit nicht bekannt.

Wenn man annimmt, daß der größere Teil der in der Erdaufschüttung befindlichen Gräber zu den ältesten zum ersten Grade anzugehörigen gehören, und nicht aus Gräbern besteht, die in der Erdaufschüttung nachträglich gemacht worden sind, so kann man alle diese Gräber zu demjenigen rechnen, die unmittelbar auf dem Erdbofen angelegt sind.

Gräber in der Erdaufschüttung selbst sind 66 (d. i. 16 Proz.) zu zählen. Unter diesen sind in dem Terekgebiete und in der Krim Steinkisten nicht selten; es ist dies offenbar die älteste Art des Begräbnisses. In den Kurganen der Krim lagen von 18 Skeletten 7 in Steinkisten. Die meisten der Toten wurden aber offenbar in hölzernen Grabkammern bestattet, die Spuren der Holzbekleidung sind in vielen Fällen deutlich erkennbar.

Der Gebrauch, die Toten in Gräbern im Erdbofen (Grundgräber) zu bestatten, ist wohl allgemein vorhanden. Vielleicht zeigte sich dieses Gebrauch zu derselben Zeit, als man von den Dolmen zu den Kisten-Gräbern überging, doch läßt sich darüber nichts Sicheres aussagen.

In den Kurganen, deren Gräber rotgefärbte Skelette aufweisen, sind die Grundgräber in der Mehrzahl, 72 Proz. In den Kurganen des Kiewschen Bezirks ist diese Bestattungsweise fast die ausschließliche.

Die Grundgräber sind im allgemeinen von mittlerer Größe: Länge etwa 3 Arschin (2,10 m), Breite 1 $\frac{1}{2}$ , Arschin (1 m), Tiefe 1 bis 1 $\frac{1}{2}$ , Arschin (0,7 bis 1 m) Die Kindergräber sind gewöhnlich kleiner. In einzelnen Gräbern sind die Wände aus großen Steinplatten zusammengeetzt — Gräber, deren Wände aus kleinen Steinplatten bestehen, sind bis jetzt nicht gefunden worden. Die Steinplatte des Grabes in einem Kiewschen Kurgan waren innen ausgemalt; es fanden sich darin zwei Tote in sitzender Stellung. Gräber, deren Wände aus Holz bestanden, finden sich nur in Kiewschen Kurganen, sonst nicht. Die Mehrzahl der Gräber ist zuerst durch Decken aus Holz verschlossen, dann liegen darauf kleine Rundsteine, Steinplatten oder Balken. Die Gräber einiger Kurgane im Gebiete von

Jakaterinowlaw sind durch Holzstücke bedeckt, die eine Art Zelt bilden. Bisweilen, aber doch nur selten, sind die Gräber (Kindergräber) durch ein bis drei Steinplatten verschlossen, und darüber liegen Massen von Steinen in einer Mächtigkeit von 1 Arschin (0,7 m) bis 1 Sasten (2,1 m) und darüber. Oft ist die eigentliche Grabhöhle zum großen Teil mit Erde oder Steinen gefüllt, aber auch in diesen Fällen bleibt stets ein unmittelbarer oder ein Ruhraum in der eigentlichen Grabkammer frei. Die Decke der Grabstätte ruht auf Vorsprünge oder Vertiefungen (Einschnitten) der Wand.

Mitunter sind statt des Holzes oder der Steine andere Materialien zum Zudecken der Grabkammern benutzt, z. B. Baumrinde, Seegras, Strauchwerk, Schutt und dergleichen. Einige wenige Kindergräber sind von allen Seiten durch Einfrühdungen in Form eines kleinen Walzes eingefüßt. Bei einigen Gräbern waren die Wände mit Lehm ausgeschmiert und rot oder blau angemalt. Am häufigsten war der Boden der Grabkammer aus Lehm hergestellt und rot oder weiß angemalt, oft mit Steinen ausgelegt. Eine besondere Eigentümlichkeit zeigten einige Kindergräber der Kiewischen Kurgane. Die Grabkammern sind von verhältnismäßig geringem Umfang, aber die hölzernen Wände springen über dem Erdboden vor. Merkwürdig beschaffen war das Grundgrab eines Tamanschen Kurgans; am Rande des Hauptgrabes befanden sich sechs kleine Gräber als Anhangsel.

Begräbnisse in Katakomben (Ganggräbern) sind in solchen Kurganen, die rotgefärbte Knochen enthalten, selten — sie erscheinen als etwas Neues. Solche sind ungefähr an 16 Stellen, also etwa 4 Proz., gefunden worden.

Der älteste Gebrauch, die Toten sitzend zu bestatten, ist in den betreffenden Kurganen mit rotgefärbten Skeletten außerordentlich selten, — meist handelt es sich dabei um Bestattung in Steinkisten. Viel häufiger ist die Lagerung der Toten auf dem Rücken mit gekrümmten und angewinkelten Beinen; natürlich liegen bei den Skeletten die Knochen auf- oder nebeneinander. In den Kurganen von Bjeloserki haben die Skelette dieselbe Lage; in anderen Kurganen ist diese Lage, so wie die Lage mit ausgestreckten Beinen, nur Ausnahme; offenbar sind derartige Bestattungen jüngerer Datums als die anderen. Die am meisten verbreitete Lagerung der Skelette mit rotgefärbten Knochen ist die stehliche mit gebeugten Knieen, d. h. bis zum Becken heraufgezogenen Beinen; die Arme sind entweder ausgestreckt oder in Ecklenge gekreuzt, so daß die Hände bis zum Kopf reichen. In betref der Richtung, in welcher die Toten liegen, ist eine große Mannigfaltigkeit zu beobachten, doch liegt der größte Teil der Toten in allen Bezirken mit dem Kopf nach Osten oder nach Nordosten, im allgemeinen in der Richtung zwischen Norden und Osten.

Doch sind bei weitem nicht alle Skelette rot gefärbt. In den Kurganen von Jakaterinowlaw und Tamas sind rotgefärbte Skelette sehr selten, in den Kurganen von Bjeloserki ist die Hälfte aller Skelette gefärbt, oder es sind Farbstoffreste vorhanden; in den Kurganen von Kiew ist ein Drittel, in den Kurganen der Krim ein Viertel der Skelette gefärbt. Skelette, die durchweg gefärbt sind, trifft man selten, — häufiger ist der obere Teil des Skeletts oder nur der Schädel allein gefärbt. Die Färbung der Knochen wurde dadurch hervorgerufen, indem die Leiche mit pulverisiertem Ocker oder Mennige bestreut wurde. Daß ein ungefärbtes Skelett auf einer Farbstoffschicht lag, ist nicht beobachtet worden. In den Saratowschen Kurganen konnte die Tatsache, daß die Leichen von oben her mit der roten Farbe bestreut wurden, ganz deutlich festgestellt werden. Die nach oben gekehrte

Fläche der Knochen war mit einer  $\frac{1}{2}$  cm mächtigen Farbschicht bedeckt, während die nach unten gekehrte Fläche der Knochen vollkommen weiß war. An einem der Skelette der Kobriner Kurgane hatte die anliegende Farbstoffschicht eine Mächtigkeit von 2 bis 3 mm. Sehr häufig sind die Toten nicht mit der Farbe bestreut worden, aber statt dessen liegen am Kopf oder an den Füßen kleinere oder größere Stücke des Farb-stoffs.

Es ist anzunehmen, daß die Toten infolge einer religiösen Sitte mit dem roten Farbstoff bestreut wurden; die Bedeutung dieser Sitte ist uns noch nicht bekannt. Es mag daran erinnert werden, daß in einigen Gegenden Indiens bis auf den heutigen Tag die Leichen rot gefärbt werden. Was das für eine Sitte war, ob eine alte oder eine verhältnismäßig neue, wann diese Sitte in die russischen Steppengebiete gelangt ist, wissen wir nicht. Bis jetzt haben wir noch keinen Grund, diese Sitte der Rotfärbung der Leichen für eine sehr alte zu halten, die erst allmählich verschwand. Auch in den Gräbern der Katakomben, sowie bei Toten, die in gestreckter Lage bestattet wurden, finden sich rotgefärbte Knochen.

Die Beigaben der Toten in den Kurganen mit gefärbten Knochen sind — abgesehen von den Kubanschen Kurgan — arm und einförmig. Es sind gewisse typische Gegenstände, die in den Kurganen aller Gebiete vorkommen: bronzene Messer und bronzene Schneideinstrumente (Meißelstutzen), bronzene, silberne und goldene Spiralarms, knöcherner und bronzene Nadeln, Hakenketten aus durchbohrten Knochenstücken, durchbohrte Zahne und Feuersteinwerkzeuge. Die Nadeln sind bis vier Werschok (über 17,5 cm) lang, sehr massiv, haben am oberen Ende zwei bis vier ornamentierte Köpfe. Die bronzernen Nadeln zeigen Spiralen, die knöchernen kleine Einschnitte. Die Pfeil- und Lanzenspitzen aus Feuerstein (in den Kubanschen Kurganen) sind im allgemeinen gut gearbeitet, sonst sind sie meist grob. In den Kiewischen Kurganen finden sich viele Gegenstände aus Feuerstein: Pfeil- und Lanzenspitzen, Schaber usw., aber die Bearbeitung ist nicht sorgfältig. In einem Donezker Kurgan ist ein Feuersteinmesser gefunden. In den Kurganen der Kuban-, Tamas- und Terokgebiete sind steinerne Hämmer entdeckt. In den Terok- und Donkruganen fand man Halsbein aus bronzenen Perlen und kleine bronzene, mannigfaltig gestaltete Plättchen. In den Donezchen, Krimkoben und insbesondere in den Kubanschen Kurganen sind vortrefflich gearbeitete Steinknöpfe gefunden. Im allgemeinen fanden sich bei den gefärbten Skeletten viel knöcherner Schmuckgegenstände und knöcherner Geräte; ferner durchbohrte Masseln und Bernsteinperlen, Amulette aus menschlichen Schädelknochen und verschiednen geformte, mit ornamentierterne Gefäße.

Einige Funde in den Kurganen mit gefärbten Knochen sind sehr wichtig für die Charakteristik des Volkes, das die Kurgane errichtete. Wiederholt sind Rinder- und Schafknochen gefunden. Die Rinder wurden so sehr geachtet, daß sie mitunter geordnet begraben wurden. In den Fundberichten ist auch oft die Rede von Pferdeknöcheln, doch ist deren Vorkommen nicht vollkommen sicher gestellt. Bemerkenswert ist, daß bei einem Skelett in einem Topfe die Reste von Hirse entdeckt wurden. Ferner sind nachgewiesen Eier, Fischschuppen und Flußmuscheln.

In den Kurganen einzelner Gebiete (Terok, Jakaterinowlaw, Kiew) hat man gelegentlich neben dem menschlichen Skelett bisweilen in einem Gefäß oder in der Erdumhüllung einzelne verzerrete menschliche Knochen und auch Knochen, an denen Spuren schneidender Werkzeuge sichtbar waren, gefunden. Der Verfasser drückt mit vollem Recht sich sehr vorsichtig

ans, indem er darin nicht den direkten Beweis von Anthropologie sehen will; doch meint er, daß mindestens die Knochen als Reste von Menschenopfern anzusehen seien.

Die Skelette, deren Einzelknochen gefärbt worden sind, zeigen gewisse anthropologische Kennzeichen. Sie gehören Leuten von großer Wuchse an, deren starke Knochen auf eine kräftige Muskelatur hinweisen, mit einem dolichocephalen Schädel, niedriger Stirn und stark entwickelten Arcus superciliares —. An einem Schädel, der in einem Kiewschen Kurgan ausgegraben wurde, zeigten sich die Spuren von Trepanation. In Folge der Bestattung in nichtgeschlossenen Räumen (Grabskammern) sind die einzelnen Knochen der gefärbten Skelette und deren weiße Farbe in einem guten Zustande. Auffallenderweise sind die Knochen bisher noch nicht von Anthropologen näher untersucht worden.

In betreff der äußern Ansicht der betreffenden Kurgane ist hervorzuheben, daß sehr häufig, ja meistens, die einzelnen Erdaufschüttungen (die Kurgane) von mittlerer Größe und unregelmäßiger Form sind, aber eine sehr breite Grundfläche haben. Diese Eigentümlichkeiten sind offenbar abhängig von der Nöte, Erdhügel, welche alte Gräber enthalten, auch für spätere Bestattungen zu benutzen.

Ein Kurgan mit mehreren Gräbern zeigt beispielsweise die bedeutende Höhe von 15 bis 20 Arschin (10 bis 14 m). Man darf wohl annehmen, daß alle „langen“ Kurgane Gräber mit gefärbten Knochen enthalten. Die betreffenden Kurgane stehen gewöhnlich einzeln da, seltener zwei bis drei beisammen. Durch ihr äußeres Aussehen unterscheiden sie sich von den Kurganen der späteren „sarmatischen“ Epoche. Bemerkenswert ist, daß die Schatzgräber jene alten Kurgane niemals berührten.

Der Verfasser gibt nun eine kurze Übersicht der Eigentümlichkeiten, durch welche sich die Kurgane der einzeln von ihm angezählten Bezirke auszeichnen oder voneinander unterscheiden. Auf diese Übersicht kann hier verzichtet werden, weil in dem vorangeschickten Auszug bereits die charakteristischen Eigentümlichkeiten hervorgehoben sind.

Man könne, meint der Verfasser, alle Gebiete, in

denen rotgefärbte Skelette vorkommen, zu vier Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe umfaßt das kaukasische Gebiet (Terek, Kuban, Taman). Die betreffenden Kurgane sind ausgezeichnet durch die Mannigfaltigkeit und den Reichtum der Beigaben und durch gewisse Bestattungsgebräuche. Die ältesten sind offenbar die Kuban-Kurgane, die folgenden die Terek-Kurgane und zuletzt die Taman-Kurgane. Zur zweiten Gruppe gehören die der Krim, des Gebirgs von Jakutskow und der beiden Dongebiete. Hier sind zwei aufeinander folgende Bestattungsepochen zu beobachten, eine ältere und eine jüngere. Die ältere Epoche wird durch die Kurgane mit Steinkisten, die jüngere Epoche durch die Kurgane mit Katakomben gekennzeichnet. Die dritte Gruppe wird durch die Kurgane von Bjeowerk gebildet, welche auch verhältnismäßig alt sind. Zu der vierten Gruppe gehören die Kiewschen Kurgane, die sich durch ihre Eigentümlichkeit von den Kurganen aller anderen Gruppen scharf unterscheiden. Das Fehlen von Gräbern auf dem Erdboden und in den Erdaufschüttungen, sowie die Einrichtung der Grundgräber (im Erdboden) und die Art der Beigaben läßt diese Kurgane zu den ältesten rechnen. Was eigentlich die ältesten Begräbnisse mit gefärbten Knochen zu suchen sind, ist bis jetzt noch nicht sicher; vielleicht daß die Kubanischen Kurgane die ältesten sind.

Der Verfasser gründet, wie er selbst betont, seine Schlüsfolgerungen auf ein verhältnismäßig kleines Material, nämlich nur auf die Ergebnisse der russischen Ausgrabungen; er weist darauf hin, daß die Sitte, die Leichen mit Farbstoff zu bestreuen, nicht allein im Gebiete des heutigen Rußland üblich war, sondern nur ein Teil einer ausgedehnten Kulturbewegung auszuweisen ist, die in der ältesten Zeit wurzelt und von allen Völkern der mittleren Zone der alten Welt geübt wurde.

Zum Schluß gibt der Verfasser eine gedrängte Übersicht aller bisher bekannten Ausgrabungen in geographischer Ordnung — nach Gouvernements und Bezirken des russischen Reiches, meist unter Hinzufügung der literarischen Quellen. Es handelt sich um 230 Gräber. Selbstverständlich ist es unmöglich, es auch nur einen Auszug aus dieser Übersicht zu liefern.

## IV.

## Die Ptolemäer.

Ein Beitrag zur historischen Anthropologie.

Von

weiland Freiherr Karl v. Ujfalvy.

Mit Tafel VIII bis XIV und 40 Abbildungen im Text.

In vorliegender Arbeit beabsichtigen wir ein wahrheitsgetreues Bild von der Körper- und Seelenbeschaffenheit der Lagiden Ägyptens zu entwerfen, welche wir zum größten Teil als die unmittelbare Folge einer fast dreihundertjährigen Inzucht zu betrachten gewöhnt sind.

Es ist in der That merkwürdig, mit welcher Raschheit die einer jugendlichen und kräftigen Rasse entstammende Familie der vollständigen moralischen Entartung zum Opfer fällt; wir werden uns bemühen zu beweisen, daß diese überraschend schnelle Entartung durchaus nicht von der Inzucht bedingt wurde, sondern vielmehr von der Verpflanzung einer gesunden, kräftigen makedonischen Familie in ein biologisches Milieu, welches der regelmäßigen Entwicklung ihrer somatischen und besonders psychischen Charaktere nicht entsprach.

Die Lagiden Ägyptens wie die Seleukiden Syriens waren echte „Entwurzelte“, sie wurden zu rasch in einen Boden verpflanzt, welcher die Urbeschaffenheit ihrer Rasse vollständig veränderte. Diese rasche Umbildung erscheint uns ein hochinteressantes Problem sowohl für die physische als auch psychische Anthropologie und wir wollen versuchen, dasselbe zu erklären. Der erste Teil unserer Aufgabe ist uns erleichtert durch die schönen Porträtmünzen der Ptolemäer, welche sich in den verschiedenen numismatischen Sammlungen Europas und besonders in Athen vorfinden. Veröffentlichungen

darüber liegen vor von Visconti<sup>1)</sup>, Stuart Poole<sup>2)</sup>, Feuardent<sup>3)</sup>, Imhoof-Blumer<sup>4)</sup>; der Direktor des numismatischen Museums zu Athen, Svoronos, ist im Begriffe ein Corpus der ptolemäischen Münzen zu veröffentlichen, dessen Tafeln über 3600 Münzen darstellen, von denen viele bis jetzt unbekannt waren. Dank der Gefälligkeit des Verfassers konnte ich die 63 Tafeln dieses prachtvollen Werkes eingehend studieren. Außer den Münzbildern besitzen wir noch eine Reihe von Bronzelisten im Nationalmuseum zu Neapel, wo auch eine Marmorbüste von Ptolemäus Soter II., bekannt unter dem Namen Lathyros, steht.

Svoronos hat eine in Ägypten gefundene Statue der Berenike II. veröffentlicht<sup>5)</sup>. Fügen wir zu diesen ikonographischen Dokumenten einige schöne geschnittene Steine des Pariser

<sup>1)</sup> J. O. Visconti, *Iconographie grecque*, 3 Bände. Paris 1811.

<sup>2)</sup> Reginald Stuart Poole, *Catalogue of greek coins, The Ptolemies, kings of Egypt*. Mit 32 Tafeln. London 1883.

<sup>3)</sup> *Numismatique de l'Égypte ancienne I. partie*. Paris 1869.

<sup>4)</sup> F. Imhoof-Blumer, *Porträtköpfe auf antiken Münzen hellenischer und hellenisierter Völker*. Mit 206 Bildnissen in Lichtdruck. Leipzig 1885. Siehe auch vom selben Autor „*monnaies grecques*“, 1883, S. 455 bis 457. — Siehe „*Könige von Kypros*“ S. 26 und 27 und der „*Kyrenaike*“ S. 63 und 64.

<sup>5)</sup> J. N. Svoronos, *Journal international d'archéologie numismatique*. Tome premier. *Revue trimestrielle* 1898. Taf. I.

Münzenkabinets, abgebildet bei Babelon<sup>1)</sup>, hinzu, so sind wir in der Lage, uns vom somatischen Typus der Lagiden eine genügende Vorstellung zu machen, zu der uns aber besonders die aufmerksame Betrachtung der Porträtmünzen verlohnen hat.

Weit schwieriger ist es, ihre psychischen Charaktere zu bestimmen, d. h. durch Angabe der unterscheidenden Merkmale zu definieren. Die einzige Quelle, die wir besitzen, ist die Geschichte. Wir sind der Anschauung, daß ihre organische Entwicklung dem Gebiete der Naturgeschichte des Menschen angehört und uns ähnliche Erscheinungen darbietet, wie wir sie in der uns umgebenden Natur beobachten. Während aber der Naturforscher sich damit begnügt diese Erscheinungen ohne vorgefaßtes Vorurteil aufzuflehen, wie es ein ruhiger und unparteiischer Beobachter tun soll, kann sich der lauterste Historiker nicht einer gewissen Leidenschaftlichkeit erwehren, die in engen und natürlichen Zusammenhänge mit seiner ethnischen Abstammung steht. Die Geschichte ist demnach oft noch so tendenziös, wie sie es zur Zeit der Ptolemäer war. Der Gedanke, die großen historischen Werke der Neuzeit herabwürdigend zu wollen, liegt mir fern, nur sei es mir gestattet zu bemerken, daß es unter ihnen wenige gibt, welche der naturwissenschaftlichen Entwicklung des Menschengeschlechts Rechnung tragen. Was aber die alten Historiker der Lagiden anbetrifft, so sind dieselben ausnahmslos von Parteilichenschaften besetzt und ihre Berichte erscheinen meist von der historischen Wahrheit so fern, daß wir sie persönlicher Voreingenommenheit oder persönlichem Interesse zuschreiben müssen.

Infolgedessen scheint uns bei Bestimmung der psychischen Charaktere die größte Vorsicht geboten und wir müssen die geschichtlichen Quellen einer scharfen Kritik unterziehen. Willamowitz hat vollkommen recht, zu behaupten, daß die rationelle Geschichte Ägyptens unter den Ptolemäern sich vor allem kategorisch jenes Hoffklatches entledigen muß, welcher sie eben

<sup>1)</sup> Ernest Babelon. Catalogue des monnaies antiques et modernes de la bibliothèque nationale. Ouvrage accompagné d'un album de 76 planches. Paris 1897.

so sehr wie diejenige der römischen Cäsaren entstellt<sup>2)</sup>. Wir haben übrigens noch eine andere Schwierigkeit zu überwinden. Keine Geschichte der alten Dynastien wurde bis auf die neueste Zeit so sehr vernachlässigt als diejenige der Lagiden. Der Fall von Alexanders Weltreich scheint das Interesse, das man der griechischen Welt entgegenbrachte, erschöpft zu haben. Man war nicht imstande, die außerordentliche Wichtigkeit der hellenistischen Epoche richtig aufzufassen und legte sich keine Rechenschaft davon ab, daß eben jene Epoche das zivilisatorische Werk Alexanders umfaßte, welches sie so zur vollen Reife brachte.

Was die Dynastie der Lagiden anbetrifft, so sind die Werke eines Champollion-Figeac, eines Letronne, eines Lepsius bekannt und vor allem Droysens Werk über die Diadochen und Epigonen<sup>3)</sup>. Leider finden wir in diesem Werke nur die ersten vier Ptolemäer erwähnt, aber von höchstem Werte sind die meisterhaften Porträts, welche Droysen von Antigonos dem Einäugigen, Demetrius Poliorketes, Lysimachus, Antipater und Kassander entwirft. In neuester Zeit haben uns die Arbeiten Lumbrosos<sup>4)</sup> und Mahaffys<sup>5)</sup> wertvolle Aufschlüsse über den alexandrinischen Hof gebracht.

Endlich ist noch die durch von Gutschmid's Anmerkungen gründlich aufgearbeitete deutsche Übersetzung von Sharpes Geschichte Ägyptens<sup>6)</sup> als wichtige Quelle zu nennen und Stracks<sup>7)</sup> vortreffliches Buch, welches uns eine methodische Chronologie, Aufschlüsse über das Protokoll des Hofes der Lagiden und ihre

<sup>2)</sup> Wilken, Deutsche Literaturzeitung 1896. Nr. 44.

<sup>3)</sup> Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus, 3 Teile. Gotha 1877.

<sup>4)</sup> Giacomo Lumbroso, L'Egitto al tempo dei greci e dei romani. Roma 1892.

<sup>5)</sup> J. P. Mahaffy, The empire of the Ptolemies. London 1895.

<sup>6)</sup> Samuel Sharpes Geschichte Ägyptens von der ältesten Zeit bis zur Eroberung durch die Araber 640 (641) n. Chr. Nach der dritten verbesserten Originalausgabe deutsch bearbeitet von Dr. H. Jolowicz. Revidiert und berichtigt von Alfred von Gutschmid. 2 Bände. Mit einer Karte und drei Plänen. Zweite Ausgabe. Leipzig 1862.

<sup>7)</sup> Max L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer. Berlin 1897.



Familiengesetzgebung liefert. Der sorgfältig aufgestellte Stammbaum, den Strack seinem Buche hinzugefügt, versetzte uns in die Lage, eine rationale Ahnentafel der Ptolemäer zu entwerfen.

Neben dem historischen Problem haben wir uns noch andere Aufgaben gestellt, die sich besonders an die Naturgeschichte des Menschen beziehen: so die Probleme der Anlese, der Variabilität, der Vererbung und des Atavismus. Ihr Studium bei den Lagiden bietet noch eine besondere, in der Geschichte vielleicht einzig dastehende Erscheinung, denn wir wissen, daß die Ptolemäer durch drei Jahrhunderte fast ausschließlich der strengsten Inzucht gepflogen haben und während der zweiten Hälfte des Bestehens ihrer Dynastie häufig Geschwisterchen schlossen.

Wir haben uns bemüht der Methode des deutschen Historikers Lorenz folgend eine Ahnentafel der Lagiden zu entwerfen, die in ihren unerwarteten Enthüllungen weit anziehender erscheint als der Stammbaum, welcher in seiner trockenen Aufzählung dem Forscher nur wenig tatsächlich Neues offenbart.

Von besonderer Wichtigkeit für unsere Forschungen sind die unlehgbaren Einflüsse der Amphimixis, denn sie haben sich ihre Wirkungen tatsächlich stärker geäußert als bei den Lagiden. Die maßgebende Rolle, welche die Frauen dieser Herrscherfamilie gespielt, war von hoher Bedeutung; schon seit Beginn der Dynastie berichtet uns die Geschichte von der sanften Berenike I, die Ptolemäus Soter allen seinen anderen Frauen vorzog, von der klugen Arsinoë II, der hochherzigen Berenike II, später von der hochbegabten ersten Kleopatra, der schrecklichen Kleopatra Kokke und endlich von der schändlichen, aber genialen Kleopatra VII, der letzten ihres Stammes, deren wahrheitsgetreue Geschichte wir heute noch nicht genau kennen.

Die Inzucht war für die Herrscherhäuser der Diadochen und Epigonen eine streng eingehaltene Regel. Die Lagiden blieben den Gebrüchern der alten Aristokratien treu, welche Alexander vergeblich zu brechen versucht hatte, und die Antigoniden und Seleukiden sowie die übrigen griechischen Herrscherfamilien

Athens taten desgleichen. Die Tatsache selbst, daß Philadelphus, den griechischen Gesetzen zuwider, die leibliche Schwester zur Frau nahm, steht nicht vereinzelt da. Soters I. Sohn folgte in dieser Beziehung Beispielen, die ihm andere griechische Herrscherfamilien Kleinasien gegeben, und der die Ägypter seit den ältesten Zeiten gehuligt. Übrigens blieb diese Ehe kinderlos. Philadelphus' Enkel, der schändliche Philopator, begann den Reigen der fruchtbaren Geschwisterehen, indem er seine Schwester Arsinoë III. heiratete. Seine Enkel Philometor und Physkon taten desgleichen und später folgten Lathyros und Alexander I. ihrem Beispiele sowie schließlich die ebenso berühmte als berüchtigte Kleopatra.

Während die erste Hälfte der Ahnentafel der Ptolemäer nichts Absonderliches bietet, konstatieren wir auf der zweiten infolge der vorherrschenden Geschwisterehen bedeutende Ahnenverluste, die auf die Vererbungsmasse gewiß einen merklichen Einfluß ausgeübt haben. Beim gegenwärtigen Stande der Wissenschaften behaupten zu wollen, daß die Heiraten zwischen Blutsverwandten a priori eine Gefahr für die physischen und psychischen Charaktere einer Familie bilden, ist der rationellen Auffassung der Naturgeschichte des Menschen zuwider, wie wir es in der Folge unseres Aufsatzes zu beweisen trachten werden.

Unserer Anschauung gemäß sind Ehen unter Blutsverwandten nur schädlich, wenn die beiden Gatten selbst körperlich und seelisch belastet sind, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß in diesem Falle eine Verbindung die Intensität der Belastung erhöht. Reibmayr<sup>1)</sup> hat nachgewiesen, daß die Inzucht allein es gestattet, bestimmte Eigenschaften sowie auch bestimmte Fehler zu züchten, und hat dies bei Völkern wie den Athenern und Spartanern erörtert. Leider muß man aber hinzufügen, daß, während die psychischen Fehler bei ihrer Vererbung von Geschlecht zu Geschlecht rasch in Lasterarten, die guten Eigenschaften hingegen sich bald abschwächen, in der Folge nur mehr intermittierend auftreten und sich als atavistische Erscheinungen erweisen.

<sup>1)</sup> Albert Reibmayr, Inzucht und Vermischung beim Menschen. Leipzig und Wien 1897.

Die Familiengeschichte der Lagiden wird unsere Behauptung erhärten und auch beweisen, daß die Amphimixis, die bis jetzt als eine unbedeutende Tatsache betrachtet wurde, einen gewaltigen Einfluß auf die Geschichte einer Familie auszuüben imstande ist. Unter den Lagiden waren die Frauen fast alle den Männern geistig überlegen und während der biederer Soter, der glänzende Philadelphus, der rätselhafte Euergetes weitaus in der Minderzahl sind, bilden die Bereniken, die Arsinoen, die Kleopatras eine glänzende Plejade.

### I. Stammbaum und Ahnentafel.

Allgemeines. Wesentlich sind die Unterschiede zwischen dem Stammbaum und der Ahnentafel. Vom anthropologischen Standpunkt aus ist der Stammbaum eine unvollständige, einseitige Urkunde, die uns ausschließlich Aufschlüsse über die männlichen Ahnen und ihre Geschwister gibt. Lange Jahrhunderte hindurch wurde der Stammbaum nicht nur als vernunftgemäß, sondern als unfehlbar betrachtet. Die genealogischen Forschungen der Neuzeit beweisen das Widersinnige dieser Auffassung. Der von den weiblichen Ahnen geübte Einfluß ist ebenso mächtig als derjenige der männlichen. Die Ahnentafel allein gibt Aufschluß über die Blutmischungen, aus denen ein Individuum entstanden ist. Die Ahnentafel der Lagiden gibt uns höchst wichtige Auskünfte über bestimmte physische und psychische Charaktere, welche den verschiedenen Mitgliedern dieser Familie gemein waren. Die heftigsten Verwandtenehen offenbaren sich in einer höchst eigentümlichen Erscheinung, welche man unter dem Namen Ahnenverluste bezeichnet<sup>1)</sup>. Wenn man nun die Übertragungsfähigkeit bestimmter physischer und psychischer Besonderheiten durch Vererbung zugibt, was für den Naturforscher außer Zweifel liegt, so ist wichtig zu beobachten, ob es unter den männlichen und weiblichen Ahnen solche gibt, die auf der Ahnentafel eines Individuums zu wiederholten Malen vorkommen; denn eine solche Wiederholung muß ganz natürlich einen wesentlichen

Einfluß auf die Intensität der Übertragung gewisser, sowohl physischer als psychischer Eigenschaften und Fehler ausüben. Nun sind diese übertragenen Charaktere einer Auslese unterworfen, die zwar nicht das vollständige Verschwinden gewisser unter ihnen bezweckt, wohl aber diejenigen, die im Gegensatz zueinander stehen, abschwächt, während sie die gleichartigen verstärkt. „Die ererbten Fehler und Eigenschaften bedingen das Leben des Menschen während seines ganzen Laufs“<sup>2)</sup>. Es scheint erwiesen, wie Lorenz bemerkt, daß für den Bestand einer Familie die Zahl der Ahnen weit wichtiger ist als die der Kinder<sup>3)</sup>. Dies bedeutet in wissenschaftlicher Redeweise, daß die strenge Inzucht zur Verminderung der Familien führt, während die Vermischung ihre Fruchtbarkeit und die Ersehung der Variabilität veranlaßt, welche sich bei den verschiedenen Arten als ebenso beständig erweist als die der Vererbung.

Der Ahnenverlust übt einen gewaltigen Einfluß aus<sup>4)</sup>, wenn es sich darum handelt, bestimmte physische und psychische Eigenheiten zu fixieren; denn es scheint als ganz natürlich, daß diese Eigenheiten, von einem Vorfahren übertragen, dessen Name wiederholt auf der Ahnentafel verzeichnet ist, an Vererbungsintensität gewinnen müssen, verglichen mit andern Besonderheiten, die nur sporadisch vertreten sind. Dieser Umstand gewinnt noch an Bedeutung, wenn der auf der Ahnentafel wiederholt verzeichnete Vorfahre eine hervorragende Persönlichkeit war.

Doch dies sind nur allgemeine Betrachtungen und wir wollen es nunmehr versuchen, Stammbaum und Ahnentafel der Ptolemäer genau zu analysieren.

### Stammbaum.

Betrachten wir den Stammbaum der Lagiden, so bemerken wir sofort, daß er zwei Zeitschnitte umfaßt, einen, der von Ptolemäus I.,

<sup>1)</sup> Dr. Ludwig Woltmann, Politisch-Anthropologische Revue, Leipzig und Eisenach 1902. S. 307.

<sup>2)</sup> O. Lorenz, loc. cit. S. 303.

<sup>3)</sup> Wenn man sich von der Bedeutung der Ahnenverluste Rechenschaft ablegen will, so genügt es, C. Devrients höchst interessanten Aufsatz über das Problem der Ahnentafeln zu lesen. Politisch-Anthropologische Revue. März 1903. I. Jahrg. Nr. 12, S. 956.

<sup>1)</sup> O. Lorenz, loc. cit. S. 203.

Soter I. bis zum Tode Ptolemäus III., Energetes reicht und ungefähr ein Jahrhundert begreift<sup>1)</sup> und einen andern von Philopator bis zur Kleopatra VII., von heilloßig zwei Jahrhunderten<sup>2)</sup>, mit drei Generationen für die erste Periode und sechs für die zweite. Wenn auch die Ehen der ersten Periode den Prinzipien der Inzucht gemäß geschlossen werden, denn die Könige wählen ihre Gattinen unter Verwandten oder Stammesgenossen, so ist die Inzucht bei weitem nicht so streng als während der zweiten Periode, wo die geschlossenen Verbindungen mit geringer Ausnahme Geschwister-ehen sind<sup>3)</sup>.

Betrachten wir die Heiraten der drei ersten Ptolemäer, so bemerken wir, daß Ptolemäus I., der Gründer der Dynastie, Alexanders Wünsche gemäß, im Frühjahr des Jahres 324 v. Chr. in Babylon, Atakama, Tochter des Persers Artabazes, zur Frau nimmt. Nach dem Tode des großen Königs heiratet der sinnliche Ptolemäus die Hetäre Thais<sup>4)</sup>, die er von Alexander übernommen hatte, welche ihm zwei Söhne und eine Tochter gebar, und welche seinerzeit den Brand der Königstadt Persepolis veranlaßt haben soll. Über das Schicksal der beiden Söhne, Leontiskos und Lagos genannt, wissen wir nichts, doch lehrt uns die Geschichte, daß die Tochter der Thais,

Eirene, einen unbedeutenden cyprischen Fürsten mit Namen Eunostos geheiratet und vielleicht eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassen hat.

In dritter Ehe heiratet Ptolemäus Euridike, Tochter des Antipater und Schwester des blutdürstigen Kassander. Fünf Kinder entsprossen dieser Ehe: der schändliche Ptolemäus Keraunos, d. h. der Blitz, dessen Sinesart mehr an die seines Oheims, als an die seines Großvaters mahnt, ferner ein ungenannter Sohn (Argaios)<sup>5)</sup> und drei Töchter, deren älteste, Ptolemäis, die Gemahlin des Demetrius Poliorketes wurde, die zweite Lysandra I. Lysimachus' Sohn Agathokles und die dritte, Lysandra II. ihren Vetter Alexander, Sohn des Kassander, heiratete<sup>6)</sup>.

Ptolemäis ward die Ahnfrau der Könige von Makedonien aus dem Geschlechte des Antigonos, indem sie ihrem Manne Demetrius den Schönen gebar. Über die Nachkommenschaft der beiden andern sind wir ungenügend unterrichtet.

Als Euridike an den alexandrinischen Hof kam, befand sich ihre Consine, die liebenswürdige und sanfte Berenike, die Halbschwester Ptolemäus' I. (väterlicherseits) unter ihren Begleiterinnen.

Jene Berenike war die Tochter des Lagos und seiner zweiten Gemahlin Antigone<sup>7)</sup>, Tochter des Kassander, Nichte des Antipater und Enkelin des Jollas. Sie hatte in erster Ehe einen edlen Makedonen mit Namen Philippus geheiratet und ward später die vierte Gemahlin des 51 Jahre alten Ptolemäus I. Ihrer Verbindung mit Philippus waren drei Kinder entsprossen, welche in der Folge von ihrem zweiten Gemahl adoptirt wurden. Es waren dies: Magas, später König von Kyrene, und zwei Töchter: Antigone, Gattin des Pyrrhus, König von Epirus, und Theoxene, Gemahlin des Agatbokles von Syrakus.

<sup>1)</sup> Wie wir aus dem Stammbaum der Ptolemäer ersehen, welchen wir, Stracks Werke entleidend, nachstehend wiedergeben, erhielt Soter I. die Satrapie Ägypten im Jahre 323 v. Chr. und ließ sich 19 Jahre später (304) zum König ausrufen. Energetes I. starb bekanntlich 221 v. Chr. Diese Periode repräsentirt demnach 102 Jahre.

<sup>2)</sup> Philopator bestieg den Thron im Jahre 221 v. Chr. und Kleopatra VII. starb im Jahre 30. Dieser Zeitraum umfaßt folglich 191 Jahre.

<sup>3)</sup> Wie Droysen bemerkt, ist der Hauptgrund dieser Inzuchthehen darin zu suchen, daß die Könige der zweiten Periode aus Furchtsamkeit oder Trägheit (bei ihrer Belebtheit ist das nicht zu verwundern), auch aus Verwickelungen mit fremden Höfen vorzubeugen, alle, mit Ausnahme eines, sich scheuten, ausländische Prinzessinnen zu heiraten. Was diese Ausnahme, d. h. Epiphanes, anbetrifft, so dürfte seine Ehe höchst wahrscheinlich dem Unstaude zuzuschreiben sein, daß er keine Schwester besaß.

<sup>4)</sup> Nach Stracks Anschauung war Thais niemals die legitime Gattin des Königs, aber dieser dürfte die Kinder, die sie ihm gebar, adoptirt haben. Strack entnimmt dies aus dem Umstände, daß Ptolemäus seine und Thais' Tochter Eirene mit einem Stadtkönig auf Cypern vermählte.

<sup>5)</sup> Droysen, loc. cit. III. Teil. Stammbaum der Lagiden.

<sup>6)</sup> Durch diese Heirat wurde Lysandra II. Königin von Makedonien. (Siehe Droysen, III. Teil. Stammbaum des Geschlechts des Antipater.)

<sup>7)</sup> Die erste Arsinoe war die Mutter des Ptolemäus I.

## Stammbaum der Ptolemäer.

## Lagus — Arsinoe

## Ptolemäus I. Soter I.

- (323) 394—285 (283), verm. m. I. Arsinoe, T. d. Artabazes, 324, Frühjahr  
 2. Hetro Thau, nach 223  
 3. Apydise, v. d. Andipater, 331  
 4. Herakleides, v. d. Phylakos, 331  
 5. Ugenannt?

- I. Kinderlos. 2. a) Leontiakus  
 b) Lagus  
 c) Erene, verm.  
 u. Eponotis, auf  
 Cyprien.
3. a) Ptolemäus Keraunos,  
 König v. Maked.,  
 281 Juni, 280 Nov.  
 b) Ugenannt (Arginae?)  
 c) Ptolemäus, v. d.  
 Demetrios Poliorketes,  
 verlobt 286,  
 verm. 287/86.  
 d) Lyandra I., verm. m.  
 Agathokles, S. d. Lys.  
 v. Jhr. 300.  
 e) Lyandra II., verm. m.  
 Alexander S. d. Kas-  
 ander, vor 283.

4. a) Magas | Kinder d. | geb. v. 301, ± 284.  
 | adops. v. |  
 b) Antigone | Maked. | verm. m. Pyrrhus v. Epirus 281,  
 | Soter | verm. m. Agathokles v. Syrak., ± 290?  
 c) Thioanna | Philippus | verm. m. Agathokles v. Syr., ± 290?  
 d) Arsinoe I., geb. v. 315, gest. 3., verm. mit I. Lysimachus v. Thr., ± 290.  
 2. Sicióforus Keraunos, ± 290,  
 3. Bruder Philadelphus.

- e) Philotera  
 f) Ptolemäus II. Philadelphus, geb. ± 304 (?)  
 frühestens 285, 2. XI. | — 246, verm. m. I. Arsinoe I., T. d. Lysimachus  
 spätstens 284, 2. XI. | sp. 20. X.  
 v. Thr., ± 285, vertrieben  
 zwischen 284—273;  
 2. Schw. Arsinoe II., zwischen  
 280—275, (Sohn Ptolem.)  
 3. Ugenannt. (Sohn Ptolem.)

## Kinder erster Ehe adoptiert von Arsinoe II.

- a) Ptolemäus III. Euergetes I.  
 246, sp. 23. X. — 221, sp. 15. X., verm. m. Berenike, T. d. Magas v. Ky-  
 r., ± 246, geb. v. 265, ermordet 221  
 durch Philopator.
- b) Berenike, geb. 258, März.  
 221, sp. 6. X. — 204, sp. 11. X.
- c) Ptolemäus IV. Philopator, verm. m. — d) Arsinoe III., nach 317? ermordet  
 durch Philopator zwisch. 210—206.
- e) Berenike, geb. v. 273, verm. m.  
 Antiochus II., ± 216, ermordet  
 246 durch Laodize v. Syrien.
- f) Magas, ermordet 221  
 durch Philopator.

Ptolemäus V. Epiphanes, geb. 269 od. 268, 9. X., verm. m. Kleopatra I. Syra, verlobt 196/98, verh. 183/92,  
 frühestens 205, 13. X. | — sp. 180, 5. X.

- a) Ptolemäus VI. Philometor verm. m. — b) Kleopatra II. 171, geb.  
 vor 181, gest. ± 118.  
 sp. 180, 5. X. | — 145 u. Mai-Anfang
- c) Kleopatra Thoa  
 verm. m. I. Alexander Bidas  
 156,  
 2. Demetrios II. Nikator  
 3. Antiochus VII.  
 156—121.
- d) Ptolemäus VII. Euergetes II., verm. m.  
 170—163 in Ägypten,  
 162—145 in Kreta,  
 145 nach Anfang Mai bis 116,  
 29. VI. in Ägypten u. Kyrene.  
 1. Schw. Kleopatra II., verm. m.  
 146, Kleopatra III.,  
 2. S. Nichte, Kleopatra III.,  
 143/74, Antiocherrsch. 116,  
 29. VI. — 116 1/2, Winter,  
 3. Ugenannt (freie?)  
 unehelichartig.

1. a) Memphis, geb. 144, ermordet durch Ptolemäus VIII, reg. 130.  
 b) Ptolemäus IX, Neos Philopator, König auf Cypern 121, gest. ± 119.

- 3) a) Urogenannt  
 b) Ptolemäus I, verm. m. 119 (7) — 116 (7) — 96.  
 König v. Syrien

- Ptolemäus X, Soter II, geb. 142? verm. m. 115, ermordet 106, 26. VI (115, Frühjahr) — 106/07 in Ägypten.  
 106/07 — 88 (Sommer) auf Cypern, es (Sommer) bis mind. 81, 2. XI, 1 in Ägypten späte 80 (Frühb.) u. Cypern.

1. oder 2. Kleopatra, Berenike III, verm. m. 1. s. ob.  
 2. Ptolemäus Alex. II, verm. m. 1. s. ob.  
 Alleinhercherin Frühb. 81, 2. XII — 80, Sommer.

1. Ptolemäus XII, Alex. II, 2. Eine Tochter.  
 2. Kleopatra, Berenike III, Tochter Soters II, 80, Sommer, ermordet 19 Tage später.

1. s. Schw. Kleopatra V, Tryphäus, stirbt 69 zwischen Aug. — Dezember.  
 2. Urogenannt, milderbärtig.

1. Ptolemäus, König von Cypern, Sommer — 56, Sommer XIII, Neos Dionysos, geb. ± 93, 80, Sommer — 56, Sommer in Ägypten, 46, Sommer — 34, Apr. — Winter, 30, April — 59, Mai in Ägypten

1. s. Schw. Kleopatra V, Tryphäus, stirbt 69 zwischen Aug. — Dezember.  
 2. Urogenannt, milderbärtig.

1. a) Kleopatra VI, Tryphäus, 56, Sommer — September — Anfang b) Berenike IV, verm. m. 1. Selenus Kyrenaktes, 56, Sept.-Auf. — 55, April, 2. Archelaos von Komanaos, 56, Herbst — 55, April.

2. / a) Kleopatra VII, geb. 69, Winter, gest. 30.  
 b) Ariadne IV, geb. zwischen 68 — 65, Königin 48, Herbst — Winter, ermordet Anfang 41 durch Antonius,  
 c) Ptolemäus XI, geb. 61, verm. m. Schweser Kleopatra VII, 58, Mai — 47, 14. I.  
 d) Ptolemäus XV, geb. 59, verm. m. Schw. Kleopatra VII, 47, Januar — 44, verm. m. 2. den Brüdern Ptolemäus XIV, XV, 3. (illegitim) Caesar, 4. Antonius.

3. Ptolemäus XVI, Caesarion, geb. 47, 23. VI, Mithridates 44, Alleinherzher 36, ermordet 30. Sept.

4. a) Alexander Helios, geb. 41, 40, verm. m. Julia — 29.  
 b) Kleopatra Selene II, o) Ptolemäus Philadelphos, geb. 38.

Ihren Halbbruder gebar Berenike drei Kinder, die berühmte Arsinoe II., neben Kleopatra VII. die größte ägyptische Königin, Philotera und Ptolemäus II., Philadelphus. Arsinoe II. heiratete in erster Ehe den großen Lysimachus, König der Traker, dem sie zwei Söhne schenkte, die ihr zweiter Gatte, Ptolemäus Kernanus in den Armen ihrer Mutter umbringen ließ. Nach dieser Mordtat floh Arsinoe II. nach Ägypten und ward die Gattin ihres Bruders Philadelphus, doch blieb diese Verbindung kinderlos.

Ptolemäus II. Philadelphus heiratete 283 v. Chr. zuerst Arsinoe I., Tochter des Lysimachus und der Nikia (Tochter des Antipater) die er zwischen 280 und 273 v. Chr. verstieß, nachdem sie ihm drei Kinder geschenkt hatte. In zweiter Ehe vermählte er sich mit seiner lieblichen Schwester Arsinoe II. und später soll er noch eine dritte Frau genommen haben, deren Sohn Ptolemäus Athenäus erwähnt. Philadelphus, geb. 304 (Strack), 309 (Droysen), bestieg den Thron 285 und starb 245 v. Chr. Er hatte mit Arsinoe I., Tochter des Lysimachus, drei Kinder gezeugt: 1. Ptolemäus III. Euergetes I., geb. gegen 283?, gest. 221, 2. Lysimachus, geb. vor 273, ermordet 221 durch Philopator und 3. Berenike, geb. 273, ermordet 246 durch Laodike, Schwester und verstoßene erste Gattin von Berenikens Gemahl, Antiochus II. von Syrien.

Ptolemäus III. Euergetes I. heiratete Berenike II., Tochter des Magus von Kyrene, und diesem Ehebündnis entsprossen vier Kinder: 1. Berenike, die gegen 238 vor ihrem Vater starb, 2. Ptolemäus IV. Philopator, gest. 204, 3. Magus, der ebenso wie seine Mutter Berenike II. im Jahre 221 v. Chr. durch Philopator ermordet wurde, und 4. Arsinoe III., nach 217 Gattin ihres Bruders Philopator, der sie zwischen 210 und 205 ermorden ließ.

Bis Ptolemäus IV., Philopator, bietet der Stammbaum der Lagiden nichts ungewöhnliches. Die Ehebündnisse werden nach den Prinzipien der Inzucht geschlossen, das unterliegt keinen Zweifel. Berenike I. war die Halbchwester Soters, aber Arsinoe I. vom makedonischen Blute war mit Philadelphus nur weitläufig

verwandt<sup>1)</sup> und Berenike II. war die sehr entfernte Cousine des Euergetes.

Mit Philopator tritt eine gründliche Veränderung im Stammbaum ein. Dieser Fürst heiratete seine leibliche Schwester Arsinoe III. und von diesem Augenblicke an wurden die Geschwisterchen zur Regel.

Die zweite Hälfte des Stammbaumes der Lagiden ist gleichzeitig einfacher und verwickelter. Einfacher, weil die Verbindungen mit nicht zur Familie gehörigen Frauen seltener werden, verwickelter, weil die direkte Thronfolge nicht mehr streng eingehalten wird, und die Quellen, aus welchen wir schöpfen, so ungewiß und dunkel werden, daß uns sogar die Namen der minderbürtigen Gattinnen des Lathyros und Auletes unbekannt sind. Gleichzeitig muß bemerkt werden, daß die Zählung der Ptolemäer fortan sehr unbestimmt wird, und wir ziehen es vor, uns hinfort teils der offiziellen Beinamen, teils der populären Spottnamen zu bedienen, um dadurch jeder Verwechslung vorzubeugen<sup>2)</sup>.

Der ersten Gesehwistererebi zwischen Ptolemäus IV. Philopator und Arsinoe III. entsproß ein einziges Kind, der körperlich seltsame, aber geistig entartete Ptolemäus V., Epiphanes. Dieser, 209 geboren, heiratete 193 Kleopatra I. Syra, Tochter des Antiochus III., des Großen. Epiphanes, der im Alter von 29 Jahren eines unnatürlichen Todes starb, hinterließ drei Kinder, Ptolemäus VI. Philometor, Kleopatra II. und Ptolemäus VIII. Euergetes II., bekannter unter dem populären Spottnamen Physkon, d. h. der Dicke. Philometor heiratete seine leibliche Schwester Kleopatra II., mit welcher er drei Kinder hatte: 1. Kleopatra Thea, vorerst Gattin des syrischen Usurpators Alexander

<sup>1)</sup> Sie war nämlich die Tochter des Lysimachus und seiner Gattin Nikia, Witwe des Perdikkas, Tochter des Antipater und Schwester des Kassander.

<sup>2)</sup> „Mit der Unterscheidung durch Beinamen hat sich das Altertum bei den Ptolemäern begnügt, wie bei den andern Königsstüben. Eine Scheidung durch Zahlen, wie sie uns geläufig ist, hat nicht stattgefunden, oder wenigstens erst dann, als die Kunde von der Herrschaft der Ptolemäer verfiel war, und die Hinzusetzung des Beinamens den Leser nicht mehr belehrte, als wenn man ihn überhaupt fortließ.“ Strack, loc. cit. S. 146.

Balas und später diejenige der beiden syrischen Könige Demetrius II. Nikator, und des Antiochus VII., 2. einen Sohn Ptolemäus VII. Eupator, dessen Geschichte in tiefes Dunkel gehüllt ist, — wir wissen nur, daß er gegen 162 geboren, 146 König von Cypern und im Jahre 145 von seinem Oheim Physkon ermordet wurde — und endlich 3. eine Tochter, Kleopatra III. Kokke, d. h. die Rote, welche später die Gattin ihres Oheims Physkon wurde.

Mit Physkon besteigt ein zweitgeborener Sohn den Thron, was sich schon zu Beginn der Dynastie ereignet hatte, als Soter den Sohn der Berenike I. dem älteren Ptolemäus Keraunus vorzog. Einige Historiker behaupten, daß der Gründer der Dynastie diese Wahl nicht nur aus Klugheit getroffen, sondern auch deshalb, weil Keraunus nicht im Purpur geboren wurde (d. h. er erblickte das Licht der Welt, bevor sein Vater zum König proklamiert worden war), und diese Ansicht hat viel Wahrscheinliches für sich, denn sonst fällt es schwer, zu erklären, warum Keraunus niemals Ansprüche auf den ägyptischen Königsthron erhoben.

Physkon war dreimal verheiratet: zuerst mit Kleopatra II., Witwe seines Bruders und seine leibliche Schwester, geb. vor 181, gest. gegen 119, darauf mit der Tochter seines Bruders und seiner ersten Frau, Kleopatra III., und endlich mit einer ungenannten Minderbärtigen (Irene[?]). Von seiner ersten Frau hatte Physkon zwei Söhne, Mephtites, den er 130 im Alter von 14 Jahren ermorden ließ, und Ptolemäus IX., Neos Philopator, den er zum König von Cypern ernannte (121) und der drei Jahre vor seinem Vater starb (119).

Kleopatra III., Kokke, schenkte ihrem Gemahl fünf Kinder: 1. Ptolemäus X. Soter II., unter dem populären Namen Lathyros bekannt, 2. Tryphäna, Gattin des Antiochus Gripus (123), ermordet zwischen 113 und 112, 3. Kleopatra IV., vorerst Gemahlin ihres leiblichen Bruders Lathyros, später diejenige des Antiochus Kyzikenes von Syrien, ermordet 115, 4. Ptolemäus XI. Alexander I. und 5. Kleopatra Selene, viermal verheiratet: mit ihrem Bruder Lathyros; mit Antiochus Gripus vor 102; mit Antiochus Kyzikenes und endlich mit Antiochus Eusebes. Aus seiner

illegitimen Ehe hatte Physkon zwei Söhne: einen, dessen Namen die Geschichte nicht verzeichnet hat und der 130 (?) ermordet wurde, und einen andern Ptolemäus Apion, König von Kyrene (116? bis 96), der sein Reich nach seinem Tode den Römern testamentarisch vermehrte. Was die beiden Nachkommen Physkons anbetrifft, so heiratete der ältere, Lathyros, geb. 142 (?), seine beiden leiblichen Schwestern Kleopatra IV. und Kleopatra Selene, die er auf Befehl seiner Mutter sofort wieder verstieß, und später eine ungenannte Minderbärtige. Bevor wir seine Kinder aufzählen, wollen wir uns mit seinem Bruder Alexander I. beschäftigen. Dieser letztere, der zuerst eine Prinzessin zur Frau nahm, deren Namen uns die Geschichte nicht überliefert hat, heiratete hierauf Berenike III., Tochter seines Bruders Lathyros. Seine erste Frau gebar ihm einen Sohn, der seinem Vater nater dem Namen Ptolemäus XII. Alexander II. auf den Thron folgte, seine zweite eine ungenannte Tochter. Ptolemäus XII. Alexander II., geb. 105 (Strack), heiratete seine Stiefmutter, gleichzeitig seine Cousine Kleopatra Berenike III. (80), die er 19 Tage nach der Vermählung ermorden ließ. Er wurde selbst sofort nach dieser rachslosen Tat niedergemetzelt. Mit ihm verschwand der letzte rechtmäßige König aus dem Stamm der Lagiden.

Doeh kehren wir zu den Kindern des Lathyros zurück. Aus seiner ersten oder zweiten Ehe (die diesbezüglichen Nachrichten sind unbestimmt) entsproß Kleopatra Berenike III., die aufeinanderfolgend die Gattin Alexanders I. und seines Sohnes Alexanders II. wurde, wie wir es oben gesehen, und die während eines Jahres Alleinherrscherin Ägyptens war (81 bis 80). Seine zweite Frau Kleopatra Selene schenkte ihm zwei Söhne, die beide ihrer Mutter nach Syrien folgten und dort zugrunde gingen. Seine illegitime Gattin gebar Lathyros ebenfalls zwei Söhne. Der ältere, Ptolemäus, regierte in Cypern vom Jahre 80 bis 58. Der Jüngere, Ptolemäus XIII. Neos Dionysos bekannt unter dem Namen Auletes, d. h. der Flötenspieler, geb. 95, hestieg nach Alexander II. den ägyptischen Thron.

Auletes vermählte sich zuvörderst mit

seiner Schwester (?) Kleopatra V. Tryphäna, welche im Jahre 69 starb. Es ist unbekannt, ob sie die leibliche oder nur die Halbschwester ihres Gatten war, aber ihre Existenz geht bestimmt aus den bei Strack angeführten Dokumenten hervor<sup>1)</sup>. Hierauf heiratete er eine unbekante Minderbärtige. Seine erste Gattin schenkte ihm zwei Töchter: Kleopatra VI. Tryphäna und Berenike IV., welche letztere durch drei Jahre 58 bis 55 den ägyptischen Thron innehatte und welche den falschen syrischen Prinzen Seleukus Kybiosaktēs und darauf Archelaos von Komana geheiratet hatte.

Aus Anletes illegitimer Ehe entsprossen vier Kinder: 1. Kleopatra VII., die große Kleopatra (69 bis 30), 2. Arsinoe IV., geb. zwischen 68 und 69, während einiger Monate Königin (Herbst bis Winter 48), ermordet Anfang 41 durch Antonius, 3. Ptolemäus XIV., geb. 61, der mit seiner Schwester Kleopatra VII. vermählt war und welcher im Jahre 47 in den Wellen des Nils den Tod fand, 4. Ptolemäus XV., geb. 59, vermählt (47) mit derselben Schwester Kleopatra VII., die ihn ermorden ließ (44).

Wie aus dem Ebengesagten ersichtlich, war Kleopatra VII. die Gattin ihrer beiden jüngeren Brüder und nach deren Tode diejenige des Markus Antonius.

Ptolemäus XVI. Cäsarion, geb. 47, war der illegitime Sohn Cäsars. Er wurde, nachdem sich seine Mutter vergiftet hatte, im Jahre 30 auf Augustus Befehl ermordet. Die drei Kinder Kleopatras VII. und des Markus Antonius kennen wir nur den Namen nach: 1. Alexander Helios zwischen 41 und 40, Kleopatra Selene II., geb. zwischen 41 und 40, vermählt mit Juha, König von Mauritien gegen 20 und Ptolemäus Philadelphus, geb. 36. Kleopatra Selene schenkte ihrem Manne zwei Kinder: Ptolemäus, König von Mauritien und Drusilla, Gemahlin des Antonius Felix.

Mit der Ermordung Ptolemäus XV. war das Geschlecht der Lagiden im Mannesstamme er-

loschen, aber höchstwahrscheinlich hat es noch durch lange Jahrhunderte in den Abkömmlingen der weiblichen Linien fortgelebt.

Der Leser, welcher unserer trockenen Aufzählung gefolgt ist, wird sofort konstatiert haben, daß die Geschwisterehen, fast die Regel bei den letzten Lagiden, nur äußerst selten mütterliche Nachkommen zur Folge hatten.

Philopator erzeugte mit seiner Schwester Arsinoe III. Epiphanes; dessen Sohn, Philometor, mit seiner Schwester Kleopatra II. Eupator, der schon im Alter von 16 Jahren ohne Nachkommenschaft starb; ein gleiches Schicksal ward dem Neos Philopator, Sohn des Physkon und seiner Schwester, derselben Kleopatra II., zuteil. Diese verschiedenen Geschwisterehen entsprossen Fürsten sind mit alleiniger Ausnahme des Epiphanes auf der Stammtafel der Kleopatra nicht verzeichnet. Zur Erklärung unserer späteren Forschungen war es absolut nötig, auf diesen Umstand hinzuweisen.

#### Abnennstafel.

Zur genaueren Bezeichnung der verschiedenen Abnennreihen haben wir es versucht, die vom Herold (XXVI. Jürg. 594) gebrauchten und von Lorenz im großen und ganzen gebilligten, teilweise modifizierten Bezeichnungen unserm Zwecke anzupassen. Die Lagiden im eigentlichen Sinne bilden neun Generationen von Kleopatra VII. aufwärts bis Lagos, doch kennen wir den Vater und den Großvater der Antigone, zweiten Gattin des Lagos und Mutter Berenike I. Zur Erleichterung des Verständnisses setzen wir neben jede Benennung in eine Klammer die Ordnungszahl der Generation. Wir werden uns demnach folgender Ausdrücke bedienen: Vater (I), Großvater (II), Urgroßvater (III), Ururgroßvater (IV), Altvater (V), Altgroßvater (VI), Alturgroßvater (VII), Altururgroßvater (VIII), Stammvater (IX), Ahn (X) und Urahn (XI) bzw. Mutter, Großmutter, Urgroßmutter usw. und noch häufiger Eltern, Großeltern, Urgrößeltern, Ururgroßeltern usw. Demnach war Lagos der Stammvater der Kleopatra VII. sowie ihrer beiden Brüder, und Jollas einer der Urahnen, was auch der historischen Wahrheit entspricht.

<sup>1)</sup> Strack, loc. cit. „Chronologische Tabelle“ S. 196 und Anmerkungen zur chronologischen Tabelle S. 207 ff.



Unterwerfen wir vorerst die Ahnentafel (s. S. 84) des Philopator bis zur vierten aufsteigenden Generation einer näheren Betrachtung. Diese Ahnentafel ist selbstverständlich auch die seiner Gemahlin und Schwester Arsinoë III. Von den Vorfahren des Philopator kennen wir fast alle und bei seinen Nachfolgern verschwinden diese Lücken fast vollständig mit Ausnahme des Auletes und der Kleopatra VII., deren Mütter unbekannt waren. Unter Philopators Urgroßeltern kennen wir nur 13 von 16; greift man nun in die fünfte Ahnenreihe hinauf, so kennen wir nur mehr 10 von 32, in der sechsten Generation sind uns nur 6 von 64 bekannt in der siebenten und achten sind uns alle unbekannt.

Bei Epiphanes und seinen Söhnen Philometor und Physkon, sowie bei Lathyrus und seinem Bruder Alexander I. kennen wir alle Urgroßväter und Urgroßmütter. Bei Epiphanes sind in der fünften Generation 26 (32<sup>1)</sup>), bei seinen beiden Söhnen Philometor und Physkon 29 (32), bei seinen Enkeln, Lathyrus und Alexander I. 30 (32), in der sechsten Ahnenreihe bei Epiphanes 20 (64), bei seinen Söhnen 51 (64) und bei seinen Enkeln 53 (64). In der siebenten Generation bei Epiphanes finden wir 12 (128), bei seinen Söhnen 57 (128), bei seinen Enkeln 92 (128). Während in der achten Generation auf der Ahnentafel des Epiphanes keine Ahnen mehr verzeichnet sind, finden wir bei seinen Söhnen noch 36 (256) und bei seinen Enkeln sogar 131 (256), ja bei letzteren kennen wir bis zur neunten Generation noch 116 (512). Der Zuwachs an bekannten Vorfahren ist demnach bei den beiden letzteren bedeutend.

Da wir weder die Mutter des Auletes noch diejenige der Kleopatra VII. kennen, so wird bei ersterem die Hälfte seiner Ahnen von der Mutter aufwärts unbekannt und bei Kleopatra drei Viertel. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sowohl die Mutter des Auletes als auch diejenige der Kleopatra VII., welche beide von sehr bescheidener Abstammung waren, nur ganz unbedeutende Ahnenverluste erlitten haben.


<sup>1)</sup> 32 ist nämlich die normale Zahl. Diese letztere ist auch den übrigen wirklichen Ahnenzahlen in den Klammern beigefügt.

Was den Ahnenverlust anbetrifft, so bietet uns bereits die Ahnentafel des Philopator interessante Aufschlüsse. So sehen wir Lagus und Berenike I. mehrmals verzeichnet und infolgedessen wiederholten sich auch ihre Vorfahren in aufsteigender Linie. Philopator besitzt demnach 7 Urgroßmütter (III) statt 8, 13 Urgroßeltern (IV) statt 16, und 26 Alternern (V) statt 32. Obsehon wir die Ahnen in der fünften Generation nicht mehr alle kennen, so sind wir doch imstande, den eventuellen Verlust nach den bekannten Verlusten in der dritten und vierten Generation zu berechnen. Philopator besitzt demnach nur 26 statt 32 Alternern (V), 51 statt 64 Altgroßeltern (VI), 102 statt 128 Alturgroßeltern (VII) und 204 statt 256 Alturgroßeltern (VIII), was anders gesagt einem Verlust von 1 Urgroßmutter, 2 Urgroßvätern und 1 Urgroßmutter, 6 Alternern, 13 Altgroßeltern, 26 Alturgroßeltern und 52 Alturgroßeltern entspricht, und wie wir es aus den Ziffern entnehmen können, von verhältnismäßig geringem Belang ist. Denn wenn wir einen Blick auf die Ahnentafel werfen, die Lorenz<sup>1)</sup> veröffentlicht hat, so werden wir uns sofort davon überzeugen, daß verschiedene europäische Herrscher weit größere Ahnenverluste erlitten haben als Ptolemäus IV. Philopator. Nach der Ahnentafel dieses letzteren Fürsten läßt sich schließen, daß die Intensität der Übertragungsfähigkeit bestimmter Charaktere nur um ein geringeres erhöht sein dürfte.


Ein ganz verschiedenes Bild bietet uns die Ahnentafel des Epiphanes, der, wie wir es wissen, einer Geschwisterehe entsprossen war, Philopator und Arsinoë III. Der Ahnenverlust übertrifft in Zahlen ausgedrückt die verbleibenden Ahnen. In der vierten Generation besitzt Epiphanes nur mehr 7 statt 16 Ahnen, in der fünften 12 statt 32, in der sechsten 25 statt 64, in der siebenten 50 statt 128, in der achten 100 statt 256. Dieser Verlust ist sehr bemerkenswert und selbstverständlich müssen seine Folgen ebenfalls bedeutend sein. Wenn wir nun das Geschlecht der Lagiden abwärts verfolgen, so konstatieren wir mit dem Eintritt

<sup>1)</sup> Lorenz, loc. cit. S. 310.


I. Ahnentafel des Ptolemäus IV. Philopator  
und seiner Schwester (Gemahlin) Arsinoe III.



II. Ahnentafel des Ptolemäus V. Epiphanes.



III. Ahnentafel von Philometor, Physkon  
und ihrer Schwester (Gemahlin) Kleopatra II.



der Kleopatra I. Syra in die Familie der Ptolemäer natürlich eine Erhöhung der Ahnenzahl, doch ist dieser Zuwachs durchaus nicht so bedeutend, als wir es anzunehmen berechtigt wären. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in dem Umstande, daß die Selenkiden selbst bedeutende Ahnenverluste erlitten haben. Antiochus III., Vater der Kleopatra I. Syra, hatte seine Consine Laodike geheiratet, da die

Mutter seiner Frau, die denselben Namen führte, die Schwester seines Vaters Selenus II. war. Überdies hatte der Großvater Antiochus III., Urgroßvater der Syra, gemäß dem Bericht des Historikers Polyänus, seine leibliche Schwester, die berühmte und schreckliche Laodike I., geheiratet. Diese Geschwisterehe hat natürlich die Zahl der Ahnen der Syra bedeutend vermindert.

## IV. Ahnentafel von Lathyros und Alexander I.

|                          |              |                |                 |                     |                         |                               |                     |               |  |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--|
| Euergetes I.             | Euergetes I. | Seleukos II.   | Mithridates IV. | Philopator          | Antiochos III.          | Philopator                    | Antiochos III.      |               |  |
| Berenike II.             | Berenike II. | Laodike II.    | Laodike III.    | Arsinoe III.        | Laodike IV.             | Arsinoe III.                  | Laodike IV.         |               |  |
| Philopator               | Arsinoe III. | Antiochos III. | Laodike IV.     | Epiphanes           | Kleopatra I.<br>Syr     | Epiphanes                     | Kleopatra I.<br>Syr |               |  |
| Epiphanes                |              |                |                 | Kleopatra I.<br>Syr |                         | Philometor                    |                     | Kleopatra II. |  |
| Physkon                  |              |                |                 |                     | Kleopatra III.<br>Kokke |                               |                     |               |  |
| Ptolemäus X.<br>Lathyros |              |                |                 | und                 |                         | Ptolemäus XI.<br>Alexander I. |                     |               |  |

## V. Ahnentafel des Aulotes.

|  |                     |                         |                     |   |   |   |   |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| Philopator                                 | Antiochos III.      | Epiphanes               | Epiphanes           | x | x | x | x |
| Arsinoe III.                               | Laodike IV.         | Kleopatra I.<br>Syr     | Kleopatra I.<br>Syr | x | x | x | x |
| Epiphanes                                  | Kleopatra I.<br>Syr | Philometor              | Kleopatra II.       | x | x | x | x |
| Physkon                                    |                     | Kleopatra III.<br>Kokke |                     | x |   | x |   |
| Lathyros                                   |                     |                         |                     | x |   |   |   |
| Ptolemäus XIII.<br>Aulotes Neos - Dionysos |                     |                         |                     |   |   |   |   |

## VI. Ahnentafel der Kleopatra VII. (der Großen), des Ptolemäus XIII. und des Ptolemäus XIV.

|   |                         |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Epiphanes                                       | Philometor              | x | x | x | x | x | x |
| Kleopatra I.<br>Syr                             | Kleopatra II.           | x | x | x | x | x | x |
| Ptolemäus VIII.<br>Physkon                      | Kleopatra III.<br>Kokke | x | x | x | x | x | x |
| Ptolemäus X.<br>Lathyros                        |                         | x |   | x |   | x |   |
| Ptolemäus XIII.<br>Aulotes                      |                         |   |   | x |   |   |   |
| Kleopatra VII., Ptolemäus XIII., Ptolemäus XIV. |                         |   |   |   |   |   |   |

Philometor und Physkon besitzen nur 10 Ururgroßeltern (IV) statt 16, 17 Ahnltern (V) statt 32, 32 Alturgroßeltern (VI) statt 64, 65 Alturgroßeltern (VII) statt 128, 130 Alturgroßeltern (VIII) statt 256, usw.

Unter den Lagiden sind es Lathyros und sein Bruder Alexander I., welche die größten Ahnenverluste erleiden, eine Tatsache, die sich leicht aus dem Umstande erklären läßt, daß ihre

Mutter sowie ihr Vater aus Geschwisterreihen entzogen und auch anderseits verwandt waren, wie es aus nachfolgender Tafel erhellt.

|                      |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Epiphanes            | Kleopatra I. Syr |              |
| Philometor           | Kleopatra II.    | Physkon      |
| Kleopatra III. Kokke |                  |              |
| Lathyros             |                  | Alexander I. |

Diese beiden Fürsten hatten 4 Urgroßeltern (III) statt 8, 6 Ururgroßeltern (IV) statt 16, 10 Alteltern (V) statt 32, 17 Alturgroßeltern (VI) statt 64, 35 Alturgroßeltern (VII) statt 128 und 65 Altururgroßeltern (VIII) statt 256<sup>1)</sup>.

derbürtige Frauen geheiratet hatten, deren Ahnentafel a priori als normal angenommen werden muß. Auletes besitzt 12 statt 16 Urgroßeltern (IV), 22 Alteltern (V) statt 32, 42 statt 64 Alturgroßeltern (VI), 81 statt 128 Altururgroß-

Zahl der unbekannt Ahnen.

| Generation                              | Bekannt |    |     |    |                               |    |                                 |      |     | Unbekannt |    |     |    |                               |    |                                 |      |     |
|---|---------|----|-----|----|-------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|-----------|----|-----|----|-------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|
|   | I       | II | III | IV | V                             | VI | VII                             | VIII | IX  | I         | II | III | IV | V                             | VI | VII                             | VIII | IX  |
| <i>Theoretische Ahnenzahl</i> . . . . . | 2       | 4  | 8   | 16 | 32                            | 64 | 128                             | 256  | 512 | 2         | 4  | 8   | 16 | 32                            | 64 | 128                             | 256  | 512 |
| Philopator . . . . .                    | 2       | 4  | 8   | 13 | 10                            | 6  | —                               | —    | —   | —         | —  | —   | 3  | 12                            | 64 | —                               | —    | —   |
| Epiphanes . . . . .                     | 2       | 4  | 8   | 16 | 26                            | 20 | 12                              | —    | —   | —         | —  | —   | —  | 6                             | 44 | 116                             | —    | —   |
| Philometor und Physkon . . . . .        | 2       | 4  | 8   | 16 | 29                            | 51 | 57                              | 36   | —   | —         | —  | —   | —  | 3                             | 13 | 71                              | 220  | —   |
| Lathyros und Alexander I. . . . .       | 2       | 4  | 8   | 16 | 30                            | 53 | 92                              | 157  | 116 | —         | —  | —   | —  | 2                             | 11 | 56                              | 125  | 392 |
| Auletes . . . . .                       | 1       | 2  | 4   | 8  | mehr als die Hälfte unbekannt |    |                                 |      | —   | 1         | 2  | 4   | 8  | mehr als die Hälfte unbekannt |    |                                 |      |     |
| Kleopatra VII. . . . .                  | 1       | 1  | 2   | 4  | 8                             | 16 | mehr als drei Viertel unbekannt |      | —   | 1         | 3  | 6   | 12 | 24                            | 46 | mehr als drei Viertel unbekannt |      | —   |

Ahnenverluste bei den Lagiden Ägyptens.

| Generation                              | Effektive Ahnen |           |             |               |          |                |                  |      | Ahnenverluste |           |             |               |          |                |                  |      |
|---|-----------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|------|---------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|------|
|   | I               | II        | III         | IV            | V        | VI             | VII              | VIII | I             | II        | III         | IV            | V        | VI             | VII              | VIII |
| <i>Theoretische Ahnenzahl</i> . . . . . | 2               | 4         | 8           | 16            | 32       | 64             | 128              | 256  | 2             | 4         | 8           | 16            | 32       | 64             | 128              | 256  |
| Philopator . . . . .                    | 2               | 4         | 7           | 13            | 20       | 51             | 102              | 204  | —             | —         | 1           | 3             | 6        | 13             | 26               | 52   |
| Epiphanes . . . . .                     | 2               | 2         | 4           | 7             | 12       | 25             | 60               | 100  | —             | 2         | 4           | 9             | 20       | 39             | 78               | 156  |
| Philometor und Physkon . . . . .        | 2               | 4         | 6           | 10            | 17       | 32             | 65               | 130  | —             | —         | 2           | 6             | 15       | 32             | 63               | 126  |
| Lathyros und Alexander I. . . . .       | 2               | 4         | 4           | 6             | 10       | 17             | 35               | 65   | —             | —         | 4           | 10            | 22       | 47             | 95               | 193  |
| Auletes . . . . .                       | 2               | 4         | 8           | 12            | 22       | 42             | 81               | 165  | —             | —         | —           | 4             | 10       | 22             | 47               | 91   |
| Kleopatra VII. . . . .                  | 2               | 4         | 8           | 16            | 28       | 54             | 108              | 200  | —             | —         | —           | —             | 4        | 10             | 20               | 47   |
|   | Vater           | Großvater | Urgroßvater | Ururgroßvater | Altvater | Alturgroßvater | Altururgroßvater |      | Vater         | Großvater | Urgroßvater | Ururgroßvater | Altvater | Alturgroßvater | Altururgroßvater |      |

Mit den beiden letzten Lagiden nimmt die Zahl der Ahnen bedeutend zu. Dies erklärt sich aus dem Umstande, daß Lathyros, sowie sein illegitimer Sohn Auletes unbekannt min-

eltern (VII), 165 statt 256 Alturgroßeltern (VIII) usw. Diese Ziffern beweisen, daß Auletes nichtstoweniger einen stärkeren Ahnenverlust erleidet als sein Ururgroßvater (IV). Philopator, der weiblicherseits sein Altvater (V) ist. Was nun Kleopatra VII. und ihre Geschwister anbetrifft, so besitzen sie 28 statt 32 Alteltern (V), 54 statt 64 Alturgroßeltern (VI), 108 statt 128 Altururgroßeltern (VII), 209 statt 256 Altururgroßeltern (VIII) usw. Sie erleiden demnach fast denselben Ahnenverlust als ihr Altvater V. Philopator. Wir fügen noch hinzu,

<sup>1)</sup> In dem schon früher erwähnten Aufsatze E. Devrients ist von dem verdienstvollen Werke Otto Konrad Rollers „Ahnentafeln der letzten regierenden Markgrafen von Baden-Baden und Baden-Durlach“ die Rede, welche einen überraschenden Ausblick auf die Ahnenverluste der Zähringer bietet: „Durch Berechnung aus den Stammlisten ließ sich auch annähernd feststellen, wie oft weiter zurückliegende Stammväter unter den Ahnen vorkommen. So ist Karl der Große mindestens 92487mal gezählt.“ loc. cit. S. 954.

daß diese letzteren Zahlen nur auf Wahrscheinlichkeit beruhen, da wir die Mutter und Großmutter der Kleopatra nicht kennen.

Lorenz glaubt, daß die Eltern der letzten Kleopatra Halbgeschwister waren; dies ist unrichtig. Dank den Fortschritten, welche die ägyptologischen Forschungen gemacht haben, wissen wir genau, daß Kleopatra VII. die Tochter des Auletes und einer Minderbärtigen war. Man vermutet, daß Auletes in erster Ehe seine Schwester geheiratet, aber die Frucht dieses Bündnisses sind Kleopatra VI. Tryphäna und Berenike IV., wie es Strack wissenschaftlich begründet<sup>1)</sup>. Von diesem unrichtigen Punkte ausgehend, nimmt Lorenz an, daß Kleopatra VII. in der achten Generation nur 76 Ahnen gehabt habe statt 256, was einen Verlust von 180 Ahnen repräsentiert, während sie in Wirklichkeit nur 47 verloren hat, wie wir es oben nachgewiesen; ein auffallender Unterschied. Die Berechnungen von Lorenz fußen übrigens alle auf einer falschen Grundlage, da er annimmt, daß Arsinoë II., Gemahlin und Schwester des Philadelphus, die Mutter des Euergetes gewesen sei. Diese Behauptung ist ebenfalls unrichtig, da die Ehe der Adelphe unfruchtbar geblieben war, was sich unter anderem aus dem bedeutenden Altersunterschied der beiden Gatten erklären läßt. Philadelphus war wenigstens um 11 bis 12 Jahre jünger als seine Frau. Lorenz verwechselt eben die beiden Arsinoë; Arsinoë I., Tochter des Lysimachus, mit Arsinoë II., Tochter des Ptolemäus Soter und der Berenike I. Arsinoë I., Mutter des Euergetes, war makedonischer Abstammung wie ihr Gemahl, aber nur sehr entfernt mit ihm verwandt.



Eine nähere Betrachtung der sechs Ahnentafeln, die wir oben im Texte selbst eingeschaltet haben, erlaubt uns die Feststellung von höchst interessanten Tatsachen.

<sup>1)</sup> Strack, loc. cit. S. 63.

Bei Philopator sehen wir äußerst wenige Ahnen mehrmals vorkommen.

Unter den Urgroßeltern steht Berenike I. zweimal verzeichnet, in der zweiten Generation Lagus dreimal und Antigone zweimal, in der fünften Kassander, Bruder des Antipater, zweimal, in der siebenten Jollas, den Stammvater der Sippe des Antipater, dreimal; sowohl Berenike I. als auch Antigone und Kassander sind vom Blute des Jollas<sup>1)</sup>.

Der Umstand, daß Lagus von Corduin wiederholt auf dieser Ahnentafel vorkommt, ist nicht von besonderem Interesse, da der Ahnherr der Lagiden, wenn auch nicht geradezu eine unbedeutende, so doch eine ruhmlose Persönlichkeit war. Dieses Urteil dürfte sich dadurch rechtfertigen, daß gewisse Historiker diesen Makedonen fähig hielten, die Maitresse seines Königs aus Gefälligkeit geheiratet zu haben, und dieselben Historiker fügen hinzu, „daß seine erste Gattin Arsinoë, Tochter des Meleager, von Philipp, Alexanders Vater, schwanger war, als Lagus sie zum Weibe nahm“<sup>2)</sup>. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Historiker diese Geschichte erfunden hatten, um Ptolemäus I. Soter zu schmeicheln, aber der Verdacht allein spricht nicht für die Charaktergröße des Lagus.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch drauf hinweisen, daß das Blut der Seleukiden und der Antigoniden bereits in den Adern des Philopator rollt. Seine Mutter, Berenike II., war die Tochter der Apama, Tochter Antiochus I. und der Stratonike. Wir wissen, daß Antiochus I., Sohn des Seleukus Nikator, Gründer der Dynastie der Seleukiden und daß Stratonike die Tochter des Demetrius

<sup>1)</sup> Wir kennen Jollas nicht, aber die Geschichte seines Enkels, des schrecklichen Kassander, Antipaters Sohn, der es sich zur Aufgabe gestellt, die Familie Alexanders des Großen auszurotten und den verschiedenen Historiker sogar besichtigten, den großen König vergiftet zu haben, war demnach der Oheim des schändlichen Philopator und seines ebenso verworfenen Sohnes Epiphanes. Seine Grausamkeit, seine Hinterlist, sein Blutdurst gingen auf seine Neffen über. Es ist dies ein sprechendes Beispiel der kolateralen Erblichkeit, welche Woltmann in seiner „Politischen Anthropologie“ behandelt.

<sup>2)</sup> Droysen, loc. cit. II, 1, S. 109. — Sharpe, loc. cit. I, S. 51.

Poliorketes, Sohn Antigonos des Einäugigen, war. Das persische Blut ist ebenfalls bei Philopator vertreten, denn die Gattin seines Ururgroßvaters Seleukus Nikator war Apama I., Tochter des Persers Spithridates, eines der Edlen am Hofe des Darius Kodomanus.

Als Alexander der Große gegen Ende seiner Herrschaft die Vermischung des makedonischen Blutes mit dem persischen beschlossen hatte, befand sich Seleukus Nikator unter diesen Makedonen. Das weitaus Bemerkenswerteste jedoch an der Ahnentafel Philopatros ist das Vorkommen von zahlreichen Ahnen aus dem Blute des Jollas, Antipatros Vater. Seine Urgroßmutter väterlicherseits war Antigone, Tochter des Kassander, des Bruders des Antipater, und letzterer ist gleichfalls sein Urgroßvater, da er der Vater der Nikäa, der Gattin des Lysimachus und Mutter der Arsinoë I., war. Mütterlicherseits besitzt Philopator ebenfalls zwei Urgroßmütter vom Blute des Antipater, dieselbe Antigone und ihre Cousine Phila, Gattin des Dometrios Poliorketes und Tochter des Antipater. Wenn wir uns die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern des Philopator zusammenzählen, so finden wir, daß sich unter diesen 30 Vorfahren 14 befinden, die von Jollas, Antipatros Vater, abstammen.

Die Ahnentafel des Epiphanes gleicht so ziemlich derjenigen seines Vaters, da aber Philopator, wie wir wissen, seine Schwester Arsinoë III. geheiratet, so ergibt sich eine Verdoppelung aller mehrmals verzeichneten Ahnen. In der dritten Generation figurieren Philadelphus und Arsinoë I., sowie Magas, König von Kyrene, zweimal, in der vierten Generation Soter zweimal, Berenike I. viermal, in der fünften Lagus sechsmal und Antigone viermal, in der sechsten Kassander viermal und sein Bruder Antipater zweimal, in der siebenten endlich Jollas sechsmal.

Es ist außer Zweifel, daß Antipatros Blut bei Epiphanes sehr stark vertreten ist. Andererseits finden wir die Namen der Apama II. sowie ihre Vorfahren Seleukus und Antigonos verdoppelt vorkommen.

Auf der bis zur vierten Generation verfaßten Ahnentafel dieses Königs sehen wir auf dreißig

Ahnen Antipatros Sippe 22 mal vertreten, während die Seleukiden nur achtmal vorkommen.

Wenn die beiden Ahnentafeln des Philopator und des Epiphanes keine auffallenden Eigentümlichkeiten darbieten, so wächst das Interesse zusehends bei Betrachtung der Tafeln des Philometor und seines Bruders Physkon. Wenn wir in der dritten und vierten Ahnenreihe für Euergetes und Berenike II., Philadelphus und Arsinoë I., Magas und Apama II. und Antiochus I. einfache Verdoppelungen feststellen können, so ändert sich dieses Bild vollständig in der fünften Generation. Wir lesen die Namen des Soter und des Lysimachus zweimal, den der Berenike I. viermal und denjenigen des Antiochus I. und seiner Frau, der schönen Stratonike, je achtmal.

In der siebenten Generation finden wir Kassander dreimal wiederholt, Mithridates achtmal. In der achten Generation endlich Philippus, Vater des Antigonos, siebenmal, Seleukus, Großvater des Nikator, achtmal und Jollas, Vater des Antipater, zwölfmal.

Wir kennen die Namen des Vaters und des Großvaters des Lagus nicht, sonst würden wir sie in der siebenten und achten Generation mehrmals wiederholt finden. Auf dieser Ahnentafel sehen wir auch zum erstenmal die Namen der Könige von Pontus, welche Perser waren, verzeichnet. Wir lesen die Namen von Mithridates IV., Ariobarzanes III., Mithridates II., Mithridates I. in der vierten, fünften, sechsten, siebenten und achten Generation. Mithridates IV. war in der Tat der Großvater der Kleopatra I. Syra, Tochter des Antiochus III. des Großen.

Wir gelangen nun zur Untersuchung der höchst interessanten Ahnentafel des Lathyros und seines Bruders Alexander I.

Während die dritte und vierte Ahnenreihe keine außerordentlichen Wiederholungen bieten, mit Ausnahme des Euergetes und seiner Frau, die in der vierten Generation viermal vorkommen, so lesen wir in der fünften Ahnenreihe Berenike I. viermal, Antiochus I. und seine Frau Stratonike sechsmal, Philadelphus und Arsinoë I. viermal, Magas und Apama II. viermal, Antiochus II. und seine Frau Laodike viermal; in der sechsten Generation Lagus

sechsmal, Seleukus und Apama I. sechsmal, Demetrius Poliorketes und Phila sechsmal, Soter viermal, Berenike I. siebenmal, Lysimachus viermal und endlich Antiochus I. und Stratonike zwölfmal. In der siebenten Generation steht Kassander viermal, Spithridates sechsmal, Antigonnus fünfmal, Antipater fünfmal, Lagus zwölfmal und seine Gattin Antigone achtmal, Seleukus Nikator und Apama I. zwölfmal, Demetrius Poliorketes und Phila zwölfmal verzeichnet. Endlich in der achten Ahnenreihe lesen wir Jollas elfmal, Kassander achtmal, Spithridates zwölfmal, Antipater elfmal und Antigonnus zwölfmal. Auf diese Weise kommen Antipater und sein Bruder neunzehnmal vor.

Aus all diesem ergibt sich, daß auf dieser Ahnentafel das Blut des Lysimachus, der Antigonniden und besonders das der Selenkiden weit bedeutender vertreten ist als das Blut der Lagiden selbst, eine überraschende Erscheinung, der wir um so mehr Wichtigkeit beilegen müssen, als ihr Einfluß auf den psycho-physischen Typus des Lathyros und Alexanders I. noch gesteigert sein muß.

Der syrische Einfluß ist bei diesen beiden Fürsten ebenso maßgebend als bei ihrem Vater und Oheim, und auf unsere genealogischen Forschungen gestützt, dürfen wir behaupten, daß die letzten Ptolemäer physisch und psychisch ihren syrischen Ahnen näher standen als ihren ägyptischen. Diese Behauptung erscheint auf den ersten Blick überraschend, aber die Ahnentafeln beweisen ihre Richtigkeit.

Da Antiochos und Kleopatra VII. unbekannte Mütter besaßen, so verdienen ihre Ahnentafeln keine nähere Berücksichtigung.

## Beschreibung des psycho-physischen Typus der Lagiden.

### I. Teil. Von Ptolemäus I. Soter bis Ptolemäus III. Energetes.

#### Ptolemäus I. Soter.

Ptolemäus I. Soter, ein wackerer Kriegermann und schlauer Politiker, ist unter allen Mitgliedern seiner Familie am genauesten bekannt. Verschiedene Historiker behaupten, daß dieser Vellblutmakedone ein natürlicher Sohn

Philippus II. und seiner Maitresse Arsinoe gewesen sei; der König hätte jene Arsinoe mit einem makedonischen Krieger namens Lagus verheiratet. Nichts schroffertiger diese Behauptung. In seinen schroffen Gesichtszügen mahnt nichts an die feine Physiognomie des schlauen makedonischen Königs<sup>1)</sup>. Soters I. Aussehen ist uns genau bekannt, denn alle seine Nachfolger rechneten es sich zur Ehre an, das Porträt des großen Ahnherrn durch drei Jahrhunderte auf ihre Münzen prägen zu lassen. Wir besitzen demnach eine Unzahl von Bildnissen dieses Königs. Svoronos' Werk enthält weit über tausend, und alle alexandrinischen Stempelschneider hatten sich bemüht, wahrheitsgetreue Porträts zu schaffen. Die Ausführung, die Technik, die Komposition selbst sind je nach der Zeitepoche verschieden, aber die charakteristischen Gesichtszüge sind stets vorhanden. Die 1755 in Herulanum angefundene Bronzehüste ist nicht das Porträt Soters I., wie Visconti geglaubt, noch dasjenige des Ptolemäus VI., wie die neapolitanischen Akademiker am Schlusse des 18. Jahrhunderts vermuthet, sondern das Seleukos Nikator, wie es ein deutscher Archäologe nachgewiesen. Das Alter der dargestellten Persönlichkeit entspricht nicht demjenigen Soters. Sie ist jugendlicher, hagerer, die Augen sind kleiner, die Nase schmäler und spitzer, die Mundwinkel herabhängend und das Kinn weniger mächtig; allein die stark vom Kopfe abstehenden Ohrmuscheln mahnen an diejenigen Soters, ein charakteristisches Merkmal, welches fast allen Lagiden gemein war, und welches durch Mischung mit syrischem Blute noch an Intensi-

<sup>1)</sup> Daß während der ganzen Diadochenzeit der angeblichen Abstammung des Ptolemäus von König Philippus nie auch nur im entferntesten gedacht wird, ist der sicherste Beweis, daß diese eine spätere Erfindung ist, die wahrscheinlich von Alexandriern ausging und die Ansprüche der Lagiden auf die Herrschaft legitimieren sollte. Da nach makedonischem Staatsrechte beim Abgange ehelicher Deszendenten die unehelichen Kinder sukzessionsfähig waren (man denke an Archelaos, Philippus Arridaos, Perseus), so würde Ptolemäus gewiß kein Bedenken getragen haben, seine Erbansprüche auf den makedonischen Thron geltend zu machen, wenn die Vaterschaft des Philippus begründet gewesen wäre oder auch nur mit einem Schein von Glaubwürdigkeit hätte pretendiert werden können. (Gutschmid bei Sharpe, loc. cit. S. 150, Anm. 1.)

tät gewinnen mußte. Wenn wir die Porträtmünzen näher betrachten, so werden wir sofort bemerken, daß diejenigen, welche zur Zeit Soters geschlagen wurden, weitens die besser geprägten und ähnlicheren sind (Fig. 1 u. 2). Die hohe,

Fig. 1.



Ptolemäus I. Soter. Tetradrachmon phönizischen  
Foltes (geprägt zur Zeit Ptolem. III. Evergetes I.).  
(Imhoof-Blumer, Taf. VII, 1.)

breite, etwas gewölbte Stirn bietet den bekannten makedonischen Typus dar, die Augenbrauenwülste ragen mächtig hervor. Die Stirn Soters unterscheidet sich von derjenigen Alexanders durch ihre Höhe und Breite. Ptolemäus I. hatte mächtig geschwungene Augenbrauen. Die Stelle, wo die Augenbrauenbogen sich der Schläfe nähern, ist scharf abgegrenzt;

Fig. 2.



Ptolemäus I. Soter.  
Goldstater. (Imhoof-Blumer, Taf. I, 2.)

er hatte große, ausdrucksvolle Augen, welche weniger tief in ihren Höhlen liegen als bei Alexander, aber der Augapfel ist nicht so hervorspringend wie bei einigen seiner Nachfolger (Ptolemäus IV. Philopator, Ptolemäus VIII. Physkon). Der offene freie Blick

hat etwas wohlwollendes; Soter besaß eine mächtige, leicht gebogene Nase, einen kleinen Mund; infolge des Alters schmale Lippen, die früher bestimmt nicht einer gewissen Sinnlichkeit entbehrten; er hatte ein kräftiges, hervorspringendes Kinn, voll seltener, ausdrucksvoller Tatkraft, welches wir in seinen charakteristischen Umrissen bei allen seinen Nachfolgern wieder finden; das Gesicht Soters ist knochig und tief gefurcht, wie das eines greisen Kriegers, die mittelgroßen Ohren heben sich stark vom Kopfe ab; dies ist ebenfalls, wie wir es schon erwähnt haben, ein typisches Merkmal der Ptolemäer, das dicke, lockige Haar entspricht in seiner Anordnung dem Gesichtsmaße der Zeit; es war ohne Zweifel blond wie dasjenige seines Sohnes Philadelphus und der Makedonen überhaupt; dieser Umstand ist uns durch die Reliefbilder des großen Sarkophags von Sidon gewährleistet, zwei andere Umstände erwecken in uns dieselbe Überzeugung. Verschiedene Geschichtsschreiber des Altertums sprechen von schwarzen Klitus, was zu beweisen scheint, daß das Haar seiner Waffengenossen von anderer Farbe war<sup>1)</sup>. Strabo endlich teilt uns mit, daß Soters Sohn und Nachfolger, Philadelphus, blond war.

Es ist zu bemerken, daß Ptolemäus I. einen weit höheren Schädel hatte als seine auf dem Sarkophag von Sidon abgebildeten makedonischen Waffengenossen, ohne deshalb die Höhe der modernen Schädel zu erreichen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Stempelschneider vor allem bemüht war, die charakteristischsten Merkmale der Physiognomie wieder zu geben: die Höhe und Breite der Stirn, die Offenheit und Herrlichkeit des Blicks, die Krümmung der Nase, die Sinnlichkeit des Mundes und die mächtige energische Entwicklung des Kinns. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, auf die kräftige Entwicklung des vom Panzer umrahmten Halses hinzuweisen, der eine mächtige Muskulatur des Körpers voraussetzt, sowie einen Hang zur Beileidlichkeit, welcher bei mehreren seiner Nachfolger in Fettleibigkeit ansartete (Physkon, Alexander I. usw.).

<sup>1)</sup> Diese Frage habe ich in meinem Werke *Le type physique d'Alexandre le Grand*, Paris 1902, näher besprochen.



Auf den Doppelmünzen, welche Philadelphus zu Ehren seiner Gemahlin und Eltern prägen ließ, erblicken wir Soters Züge besonders knochig und abgemagert, wie sie einem sehr alten Manne entsprechen (Fig. 3).

Wie wir oben schon erwähnt, rechneten es sich alle Nachfolger Soters zur Ehre an, die Züge des großen Ahnherrn auf ihre Münze prägen zu lassen. Diese Münzbilder sind nicht

Fig. 3.



Ptolemäus Soter I. und Berenike I.

Zur Zeit des Philadelphus geprägter ägyptischer Doppelgold statier. (R. St. Poole, Taf. VII, 1.)

ohne Interesse, obschon die Prägung von Regierung zu Regierung schlechter wird und die Ähnlichkeit mit dem Original oft gänzlich verschwindet. Wenn Philadelphus nun sehr schöne Münzbilder von seinem Vater prägen ließ, so lassen hingegen die Kupfermünzen seines Stiefbruders Magas sehr zu wünschen übrig<sup>1)</sup>.

Die unter der Regierung Energetes' geprägten Münzbilder Soters sind meist sehr

Fig. 4.



Ptolemäus I. Soter I.  
Zur Zeit des Philometor  
in Cypern geprägter  
Tetradrachmen. (Brit.  
Musum.) — (R. St.  
Poole, Taf. XIX, 7.)

ähnlich, sowie auch diejenigen, welche zur Zeit Philopators und Epiphanes' geschlagen wurden. Die Prägung verschlechterte sich unter Philometor. Die Form der Nase ist eine ganz andere, aber die abstehenden Ohren lassen sofort den Ahnherrn erkennen (Fig. 4). Zur Zeit Physkons begegneten wir den letzten guten Porträtmünzen Soters, später unter Lathyros, Alexander I. und Auletes schwächt sich die Ähnlichkeit immer mehr ab und ist oft nicht mehr zu erkennen. Nichtsdestoweniger gestattet uns eine aufmerksame Untersuchung aller dieser Münzbilder, uns eine sehr genaue Vorstellung von dem Stammvater der Lagiden zu machen. Unter allen Umständen sind diejenigen Münz-

<sup>1)</sup> Stuart Poole, loc. cit. Taf. 11, Fig. 8.

bilder, auf denen er bejährt dargestellt ist, die ähnlichsten<sup>1)</sup>. Wie wir wissen, starb er im Alter von 84 Jahren und bei seiner Krönung war er schon 63 Jahre alt. Alle Münzen, die er vor dieser Zeitepoche prägen ließ, sind mit dem Idealbilde Alexanders I. geschmückt.

Mahaffy charakterisiert sehr treffend den makedonischen Typus und macht auf die stark hervortretenden Augenbrauenwülste aufmerksam, aber die schöne Stirn Soters, die, verglichen mit derjenigen Alexanders, sogar hoch erscheint, hat keinen Eindruck auf ihn gemacht.

Ptolemäus I. Soter, Sohn des Lagos, war nicht nur der Gründer seines Herrschergeschlechtes, sondern auch weitaus der vorzüglichste unter den Fürsten seines Stammes.

Wie oben erwähnt, war er nicht der Sohn Philipps von Makedonien. Außer einer gewissen Schlaueit glich sein Charakter durchaus nicht demjenigen Philipps, noch demjenigen der Eltern dieses Königs Amyntas III. und der furchtbaren Euerdike. Nachdem er die Ungnade seines Jugendfreundes Alexander geteilt, wurde er später einer der festesten Stützen seines Thrones. Seine Tatkraft, sein persönlicher Mut und seine verständliche Sinnensart hatten frühzeitig Gelegenheit, sich zu bewähren. Er war, wie Mahaffy bemerkt, ein weitaus klügerer als glänzender Feldherr<sup>2)</sup>. Ptolemäus I. zeichnete sich besonders durch seine Mäßigung, Beharrlichkeit, Großmut, hohe Intelligenz und bedeutende geistige Entwicklung aus; sein Benehmen trägt den Stempel einer auffallend klugen Politik. Er zeigt eine Mäßigung nach allen seinen Siegen, und besonders nach Perdikkas Tode, der ihm gestattet hätte, die Nachfolge Alexanders für sich zu beanspruchen<sup>3)</sup>. Er zog es vor, sich mit dem Besitze Ägyptens zu begnügen, welches den Schranken seiner Tätigkeit entsprach. Voll Mäßigung nach einem Siege, war er ebenso standhaft nach einer Niederlage. Er verzagte niemals. Er war der Anhänglichkeit seiner Makedonen so gewiß, daß

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 107.

<sup>2)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 106.

<sup>3)</sup> Um so mehr, als Alexanders von Epirus Witwe Kleopatra, die leibliche Schwester Alexanders des Großen, ihm ihre Hand anbot. — Droysen, loc. cit. II, 2, S. 96 u. 99.

er den Augenblick nach der verlorenen Seeschlacht von Cypern dazu wählte, sich zum König anrufen zu lassen. Er bewies seine Klugheit bei der Wahl seines Nachfolgers, denn es scheint erwiesen, daß er bei dieser Gelegenheit nicht allein von dem Wunsche beeinflusst war, dem Sohne der geliebten Berenike den Vorzug zu geben. Ptolemäus, als vorsichtiger Vater, hatte Gelegenheit genug gehabt, den gewaltthätigen, grausamen und tückischen Charakter seines Erstgeborenen, Ptolemäus Keraunos, d. h. der Blitz, zu erkennen.

Was seine großmüthige Sinnesart anbetrifft, so finden wir in der Geschichte unzählige Beispiele davon. Es genügt, diesbezüglich zu erwähnen, daß er nach der Schlacht von Gaza dem Demetrius Poliorketes die gefangenen Freunde, sowie die Kriegsbeute zurücksandte. Er bewährte seine hohe Lautlosigkeit durch den Schutz, welchen er den Künsten und Wissenschaften angedeihen ließ.

Arrianus' Geschichte Alexanders des Großen ist ein Beweis mehr zugunsten Soters hoher geistiger Begabung; wir wissen, daß Arrianus seine geschiedlichen Belege besonders aus den Werken des Aristobolus und Ptolemäus Soters geschöpft.

Soter besaß auch eine hervorragende diplomatische Begabung, welche er durch mehrere Generationen an seine Nachfolger vererbte. Sharpe schreibt Soter die Ehre zu, in Ägypten die Militärkolonien eingeführt zu haben<sup>1)</sup>. Nach Gutschmid ist dies ein Irrthum, der wirkliche Gründer dieser Kolonien war Alexander.

Bis jetzt haben wir uns begnügt, die guten Eigenschaften dieses Fürsten anzuführen. Besaß er auch Fehler? Höchstwahrscheinlich ja, gewiß; aber es ist erwiesen, daß seine Fehler von geringer Bedeutung waren, wenn man sie mit den schändlichen Lastern seiner Nachfolger vergleicht.

Gewisse Historiker werfen ihm vor, er habe bei Besitzergreifung der ägyptischen Satrapie den makedonischen Heerführer Kleomenes ermorden lassen, weniger wegen seiner Erpressungen, als weil er eine Kreatur des Perdikkas gewesen. Es scheint wahrscheinlich,

daß ihn bei dieser Tat die beiden Gründe geleitet, aber es scheint ebenso erwiesen, daß eine gewisse politische Nothwendigkeit ihn dazu gezwungen. Wir wollen nur darauf aufmerksam machen, daß im Charakter Soters nichts dazu berechtigt, an eine Tat überlegter Grausamkeit zu glauben; wenn er wirklich blutdürstige Instinkte besessen, so hätte keine politische Rücksicht das Erwachen derselben verhindern können.

Es ist außer Zweifel, daß dieser große Fürst einen Hang zur Sinnlichkeit besaß, der später bei seinem Nachfolger in Ausschweifungen ausartete. Die Geschichte beweist mehr als einmal die Rieligkeit unserer Anschauung. Infolge seiner hohen Stellung verhandelte Alexander zuvörderst mit der persischen Prinzessin Artakama. Nach dem Tode Alexanders heiratete er die Hetäre Thais<sup>1)</sup>, welche die Mätresse seines Herrn gewesen war. Später hinderte ihn nicht seine Vermählung mit Antipaters Tochter Enydike, die sanfte Berenike zur Frau zu nehmen und die Kinder dieser vierten Ehe allen anderen vorzuziehen. Nach Strack hätte er noch eine fünfte Gemahlin gehabt, deren Namen uns die Geschichte nicht aufbewahrt hat. Doch was ist dies, verglichen mit den Ausschweifungen seiner Kinder und Kindeskinde. Man muß noch darauf hinweisen, daß unter den Diadochen, deren glänzendes Geschick in gar keinem Verhältnisse zu ihrem bescheidenen Ursprung stand, Soter der einzige war, welcher sein moralisches Gleichgewicht bis an sein Ende zu bewahren wußte.

Das makedonische Reis wurde in Ägypten auf einen mehrere tausend Jahre alten Stamm gepfropft; die Makedonen waren demnach, wie oben gesagt, echte „Entwurzelte“, um so mehr, als sie sich vor den griechischen Ansiedlern besonders durch kriegerisches Temperament scharf unterschieden; es gehörte Soters Genie dazu, um diese heterogenen Elemente aneinander zu kitten und ein solides Reich zu gründen, das eine Dauer von 300 Jahren erlebte, obschon die meisten seiner Nachfolger ihr Möglichstes thaten, um das Werk des großen Ahnherrn in seinen Grundpfeilern zu erschüttern.

<sup>1)</sup> Nach Stracks Anschauungen ist es nicht historisch nachgewiesen, daß Alexanders Buhle die legitime Gattin Soters gewesen. Strack, loc. cit. S. 190.

<sup>1)</sup> Sharpe, loc. cit., I. Teil, S. 156.

Man muß nichtestoweniger einräumen, daß diese selben Nachfolger die Überlegenheit ihres Ahnherrn richtig erkannt hatten, da sie seinen glorreichen Namen bis zu den Letzten des Geschlechts hochhielten.

Wir wissen nur sehr wenig von Soters Eltern; sein Vater Lagus, aus Cordaia stammend, war ein makedonischer Krieger von hoher Geburt, sonst hätte er nicht in zweiter Ehe Antipaters Nichte Antigone zur Frau bekommen und wäre sein Sohn Ptolemäus nicht zum Jugendgespielen Alexanders gewählt worden.

Was Arsinoe, Soters Mutter, anbetrifft, so wissen wir weiter nichts von ihr, als daß sie die Tochter eines gewissen Meleager gewesen.

Wenn man die Charaktere der Diadochen und Epigonen studiert, so fallen bestimmte Eigentümlichkeiten sofort ins Auge. Es genügt, diesbezüglich die psychischen Eigenheiten eines Perdikkas, eines Antigonos, eines Antipater, eines Seleukus, eines Demetrius Poliorketes, ja selbst eines Lysimachus und eines Kassander einer aufmerksamen Untersuchung zu unterziehen, um mit Erstaunen zu konstatieren, welche eine Anhäufung von Tatkraft aus jede einzelne dieser Persönlichkeiten bietet. Der Forscher ist demnach berechtigt, zu behaupten, daß die makedonische Rasse von bemerkenswertem Schlage war, um gleichzeitig eine so große Zahl von Besten erzeugen zu können. Strenge Inzucht allein vermochte solche Resultate zu erzielen. Als Alexander sein Weltreich gründete, besaßen die Makedonen noch alle jene Eigenschaften, welche ihre hellenischen Brüder zum ersten Volke des Altertums gemacht hatten. Wenn es der hohen geistigen Begabung der Griechen gelang, Vorderasien und Persien bis zur indischen Grenze zu hellonisieren, so wäre dieses Werk ohne die unbezwingbare Tatkraft der Makedonen nicht gelungen, denn Athen war damals schon in Verfall infolge der Vermischung seiner Bürger, und das der übertriebenen Inzucht tren gebliebene Sparta auf dem Punkte, seine Tatkraft einzubüßen und der Erstarrung zum Opfer zu fallen.

### Beronike I.

So deutlich und bestimmt die Züge Ptolemäus I. uns erscheinen, so blaß und verwischt

sind diejenigen seiner Gattin Beronike. Im Jahre 1759 fand man in Herculannum eine Bronzestatuette, welche Visconti für diejenige Beronikes I. erklärte, während die Akademiker von Neapel in derselben Ptolemäus Apion zu erkennen glaubten. Letztere Identifizierung erscheint gewagt; Apion bedeutet der Magere, im Gegensatz zu seinem Vater Physkon, der Dicke. Comparetti hält diese Statuette für das Bildnis des römischen Prokonsuls Aulus Gabinus (Taf. VIII).

Bei den Münzen des britischen Museums sowohl als auch bei denen, welche Syronos in seinem Corpus veröffentlicht und auf deren Avers die bekannten Züge Soters I. dargestellt sind, erblicken wir auf der Rückseite die Züge der Bronzestatuette aus Neapel mit ihrer ganz eigentümlichen kalamistrierten Haartracht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß weder das Bildnis Apions noch dasjenige des Aulus Gabinus zur Zeit des Magas oder zu jener des dritten Ptolemäus geprägt werden konnte, welche beide Fürsten die natürliche Absicht gehabt hatten, das Andenken ihrer Mutter und Großmutter zu ehren. Dieser Fraucenkopf ist die Personalisierung Libyens, und es hat nichts Überraschendes, daß man ihn die Züge Beronikes I. ließ (Fig. 5).

Fig. 5.



Zur Zeit des Magas geprägte kyrenaische Kupfermünze Beronike I. als Personalisierung Libyens. (Brit. Museum.) — (R. St. Poole, Taf. VI, 7, 8, 9, 10; Taf. XVII, 5, 6, 7, 8; Taf. XIX, 4.)

Auf den goldenen Doppelmünzen des Philadelphus erscheinen die Züge seiner Mutter verblaßt und gleichen denjenigen einer ältlichen beleibten Frau; die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter Arsinoe II. ist meist so groß, daß es oft

schwierig erscheint, einen Unterschied zwischen den Zügen der beiden Fürstinnen zu finden (Fig. 5).

Das britische Museum besitzt eine sehr merkwürdige Kupfermünze des Magas von Kyrene,



Kupfermünze des Königs Magas von Kyrene. Auf der Rückseite Berenike I. als Personifizierung Libyens. (Brit. Museum.) — (R. St. Poole, Taf. VI, 8.) — Die Züge des jugendlichen Prinzen, bei dem noch keine Spuren seiner späteren Beleibtheit zu entdecken sind, gleichen denjenigen seiner Mutter, nur hat er eine kürzere Nase und der untere Teil des Gesichts ist länger. Das von der königlichen Kopfbinde umspannte Haupt<sup>1)</sup> ist mit Ammonshörnern geschmückt, was aus dem Umstände zu erklären ist, daß Magas König von Kyrene war, zu welchem die Oase mit dem berühmten Orakel gehörte.



Intaglio mit dem idealisier- ten Bilde des Magas, König von Kyrene. (Visconti, Taf. LII, Fig. 9.) Athenaios erzählt uns, daß sie sowohl als ihre Tochter Arsinoe II. eine große

<sup>1)</sup> Obchon wir über die Einzelheiten der Regierung des Magas keine bestimmten Nachrichten besitzen, so sind wir doch berechtigt, anzunehmen, daß dieses Bild des Königs von Kyrene ein Anachronismus wäre, wenn wir nicht gleichzeitig dasselbe als eine idealisierte Darstellung betrachten. Dieser Stein, ein sehr schöner Amethyst, gehörte ursprünglich zur Sammlung des Herzogs von Orleans und besaß sich anfang des vorigen Jahrhunderts im Eremitage-Museum zu St. Petersburg. Visconti, loc. cit., Bd. 3, S. 203.

Vorliebe für wohlriechende Essenzen hatte; später unter Berenike II. wurde in Kyrene Rosenessenz hergestellt<sup>1)</sup>.

Dies ist eine sehr spärliche Auskunft; vielleicht besaß diese Königin einen Hang zur Ungezogenheit und Weichlichkeit, die wir bei mehreren Fürsten der Lagidenfamilie wiederfinden. Nichtsdestoweniger rollte in ihren Adern das Blut des Jollas.

Berenike kam an den alexandrinischen Hof in Gefolge ihrer Cousine Enrydike, Tochter des Antipater, dritte Frau Soters I. Sie hatte in erster Ehe den Makedonen Philippus (Sohn des Amyntas) geheiratet, der nach Arrianns im Jahre 334 eine makedonische Phalanx befehligte. Wenn ihr Sohn Magas die Königskrone von Kyrene erhielt, so verdankt er diese unerwartete Gunst dem Wohlwollen seines Stiefvaters Ptolemäus I. und den versöhnlichen Gesinnungen seines Halbbruders Philadelphus.

#### Ptolemäus II., Philadelphus und Arsinoe II.

Wir besitzen weit weniger ikonographische Dokumente von Ptolemäus II. Philadelphus als von seinem Vater Soter. Nichtsdestoweniger sind wir in stande, uns eine Vorstellung von seinem physischen Typus zu machen.

Das Nationalmuseum zu Neapel besitzt eine sehr schöne Erzbüste dieses Königs, welche im Jahre 1759 in Herculannum entdeckt wurde (Taf. IX).

Das dicke, lockige, von Blumen bekränzte Haar beschattet eine wohlgeformte Stirn, welche aber weniger edel als die Soters ist; die feine Nase ist von mittlerer Länge, die Nasenflügel scheinen zu brennen, das Auge wirft glänzende Blicke, der Mund mit seinen sinnlichen Lippen hat einen geringschätzenden Ausdruck, das volle Kinn springt mächtig hervor. Die hohlen Wangen mit den leicht vorspringenden Joehbögen machen sein Antlitz schmaler und unterscheiden es von demjenigen des ersten Lagiden. Vielleicht erinnert die Kürze des unteren Teiles des Gesichts an dasjenige Berenikes I. Es liegt in diesem Werke der Bildhauerkunst unbestreitbar ein gewisser Sinn und Schick, welchem jedoch die Porträthähnlichkeit mangelt. Auf den Doppel-

<sup>1)</sup> Athen, XV, 12.

münzen des Philadelphus (Fig. 3), auf welchen er mit seinen Eltern dargestellt ist, erscheint er uns bejahrter, und seine Züge wurden jedenfalls vom Stempelschneider idealisiert. Die absichtliche Übertreibung der Größe des Augapfels würde genügen, um jedwede Porträtähnlichkeit auszuschließen. Auf diesen Münzen hat Philadelphus wie sein Vater abstehende Ohren und sein Hals ist ziemlich stark. Glücklicherweise besitzen wir einen Golddrachmon dieses Königs, welcher aus der Sammlung L. v. Hirsch's stammt und welcher eine sehr

Fig. 8.



Ptolemäus II. Philadelphus. Golddrachmon aus der Samml. L. v. Hirsch's. (Imh.-Bl., Taf. VIII, 2.)

richtige Vorstellung von Philadelphus' Zügen liefert (Fig. 8). Unter allen Verhältnissen mahnt die Physiognomie des Philadelphus weit mehr an Berenike als an Soter, insofern die kleinen Abstände zwischen der Nase und dem Kinn. Mahaffy bemerkt jedenfalls: „daß er auf seinen Doppelmünzen schwächerer als sein Vater erscheint, aber seine Züge sind regelmäßiger. Er hat einen fleischigen Hals, der bereits den Hang zur Beliebigkeit ahnen läßt, welche so vielen Lagiden gemein ist“<sup>1)</sup>. Diese Bemerkung Mahaffy's ist richtig, insofern sie sich auf die Doppelbilder bezieht, aber sie findet keine Anwendung auf den Golddrachmon des Barons Hirsch, welcher, wie wir oben erwähnt, das heste Bildnis des zweiten Ptolemäus liefert. Es scheint wahrscheinlich, daß der Stempelschneider, der die Doppelbilder anfertigte, die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn hervorzuheben bemüht war. Der Schädel des Philadelphus scheint weder übermäßig lang noch hoch, wie auf der Bronzebüste; die Stirn läßt sich nicht mit derjenigen Soters vergleichen, besonders was die Höhe anbelangt, die Augenbrauenwülste sind mächtig entwickelt, die Nase ist lang, gerade und wohlgeformt, der Mund hat einen sinnlichen Ausdruck, das Kinn ist hervorspringend wie bei allen Ptolemiern; der kurze, mächtige, fette Hals verrät den Hang zur Beliebigkeit.

Wir kennen von diesem Fürsten überdies

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 162.

noch sehr schöne Darstellungen auf geschnittenen Steinen, die zur richtigen Erkenntnis seiner Physiognomie nicht unwesentlich beitragen und uns gestatten, unsere ikonographischen Studien zu ergänzen.

Das Wiener Hofmuseum besitzt einen herrlichen Cameo, welcher Philadelphus und seine Gattin und Schwester Arsinoë II. darstellt (Taf. IX). Dieses Kunstwerk bietet uns einen Philadelphus, dessen Züge vielleicht noch realistischer dargestellt sind als auf der Goldmünze des Baron Hirsch. Trotz aller Schwierigkeiten der Technik, die der Steinschneider zu überwinden hatte, ist es ihm gelungen, ein wahrheitsgetreues Bild des Königs zu entwerfen. Die Stirn, die Nase, die Lippen, das Kinn, bis auf den scharfen Zug um die Mundwinkel, den wir auch auf der Goldmünze von Hirsch erblicken, sind mit seltener realistischer Wahrheit gezeichnet. Überdies bemerken wir, daß die Züge des Königs einen gewissen schmerzlichen, leidenden Ausdruck haben, der nach Aussage der Historiker mit der wankenden Gesundheit des Königs vollkommen übereinstimmt. Eine aufmerksame Betrachtung dieser charakteristischen Physiognomie verrät uns die Seele des Fürsten, der trotz seiner Schwächen und seinem Hang zur Sinnlichkeit einen edlen Charakter besaß.

Fig. 9.



Intaglio. Jügendliches Bildnis des Ptolemäus II. Philadelphus. (Visconti, Taf. II, 2.)

Nach den Berichten der Historiker war er blond, von schwächlichem Körperbau und gegen Ende seines Lebens schmerzhaften Gichtanfällen ausgesetzt<sup>1)</sup>. Visconti's Atlas enthält einen Intaglio, der die Züge des Philadelphus vorstellen soll (Fig. 9). Wir haben einen sehr jugendlichen Philadelphus vor Augen, der vom ikonographischen Standpunkte aus ohne Wert ist; allein das mächtig entwickelte Kinn mahnt an die Lagiden<sup>2)</sup>.

Schließlich ist der Gonzaga Cameo zu nennen, der ursprünglich im Besitze der Kaiserin Jo-

<sup>1)</sup> Droysen, loc. cit., Bd. III, S. 262.

<sup>2)</sup> Dieser prachtvolle Hyazinth war zu Anfang des vorigen Jahrhunderts im Besitze des Pariser Münzkabinetts. Visconti, Bd. III, S. 212.

sephine, Gattin Napoleons I., war und sich gegenwärtig im Eremitage-Museum zu St. Petersburg befindet (Taf. X.). Das auf diesem Cameo dargestellte Doppelbild wurde anfangs für dasjenige Alexanders des Großen und seiner Mutter Olympias gehalten; später glaubte man Philadelphus und seine Gattin Arsinoë II. zu erkennen; gegenwärtig sind die kompetentesten Archäologen und darunter der Direktor des Pariser Münzenkabinetts geneigt, dieses Doppelbild mit dem syrischen Usurpator Alexander Balas und seiner Gattin Kleopatra Tea, Tochter des Ptolemäus VI. Philometor, zu identifizieren. Was unsere persönliche Meinung anbetrifft, so sind wir gern bereit zuzugeben, daß dieses Doppelbild weder Philadelphus noch seine Schwester Arsinoë II. darstellt, aber wir sind ebensosehr davon überzeugt, daß es uns nicht das Porträt des syrischen Emporkömmlings vergegenwärtigt. Es geüßt, diesbezüglich den behelmten Krieger des Cameo mit den Münzen des Alexander Balas und besonders mit seinem im Nationalmuseum in Rom befindlichen Standbilde zu vergleichen. Was das Frauenbild anbetrifft, so gehe ich gern zu, daß sie mit den charakteristischen Zügen Arsinoë II. nichts gemein hat, aber es gleicht ebensowenig der schönen Kleopatra Tea, die, ihren Münzen nach zu schließen, ihrer Großmutter Kleopatra Syra ähnlich sah. Nichtsdestoweniger geben wir die Abbildung dieses herrlichen Kunstwerkes, um den Leser in die Lage zu versetzen, sich von der Steinhaltigkeit unserer Anschauung zu überzeugen.

Nach seiner Simensart stellen wir mit anderen Soter neben David und Philadelphus neben Salomo. Der eine war der weise Gründer eines großen Reiches, der andere errichtete, was sein Vater gesät hatte, entfaltet während seiner Regierung den größtmöglichen Luxus und legte dadurch den Grundstein zu einem baldigen Verfall, wie Gutschmid bemerkt. Es ist leicht, den Vergleich auch andererseits zu begründen: David huldigte der Sinnlichkeit, Salomo der Ausschweifung. Zahlreich sind die Eigenschaften des Philadelphus; er war klug, vorsichtig, aufgeklärt, kunstliebend, sehr intelligent und hochgebildet, aber nebenbei war er erregbaren Sinnes, von außerordent-

lichem Empfangungsvermögen, dabei apatisch, skoptisch, ausschweifend und gegen Ende seiner Tage zum Mystizismus geneigt. Philadelphus hatte die Eigenschaften und Fehler seines Vaters geerbt, doch während Soters weise Mäßigung den kriegerischen Geist nicht ausschloß, sehen wir bei seinem Sohne eine Zunahme der Vorsicht, ein fast gänzlich Ver-schwanden des kriegerischen Geistes und nur durch die Umstände gezwungen faßte er willenskräftige Entschlüsse; die gelegentliche Großmut des Vaters artet beim Sohne in maßlose Verschwendung aus, und Alexandrien wird unter seiner Herrschaft die glänzendste Stadt der Alten Welt.

Die jüdischen Historiker behaupten, daß Philadelphus aufgeklärt und tolerant gewesen sei. Seine hohe Intelligenz steht über allem Zweifel, vielleicht war sein Verstand geläuterter als der seines Vaters, wie dies bei krankhaften Wesen oft zu sein scheint, und alle Handlungen seiner Regierung zeugen zugunsten seiner hohen Bildung.

Aber dieses erfreuliche Bild hat auch seine Schattenseiten. Die Sinnlichkeit seines Vaters verwandelt sich bei ihm in Ausschweifung. Die Gewandheit seines Vaters, die eine gewisse gesunde Philosophie nicht ausschloß, äußert sich bei ihm vorerst durch Skeptizismus, der in seinen alten Tagen lichterlichem Mystizismus Platz macht. So sinner er ohne Unterlaß über den Trauk der Unsterblichkeit nach bis zu dem Augenblicke, da er gänzlich enttäuscht seiner geliebten Gattin und Schwester, deren Vergötterung er anbefohlen, ins Grab folgte.

Philadelphus, der den Glanz und die Pracht über alles liebte, förderte vor allem die schönen Künste und Wissenschaften; er brachte in seinem Palaste die alexandrinische Bibliothek unter, die zahlreiche Manuskripte enthält und gründete eine Versorgungsanstalt für unbemittelte Schriftsteller. Philadelphus war selbst Künstler, er liebte die Musik, und einige Historiker berichten, daß er, von der Krankheit überwältigt, seine Tage mit philosophischen Studien verbrachte.

Die Geschichte berichtet uns, daß er zwei seiner Halbbrüder umbringen ließ. Soll man daraus schließen, daß er grausam und blutdürstig war? Diese beiden Prinzen hatten eine

Verschwörung gegen ihn angezettelt, und damals wie heute bestand das sicherste Mittel, eine Verschwörung im Keime zu ersticken, darin, daß man ihre Anstifter aus der Welt schaffte. Keine Handlung seiner Regierung berechtigt uns anders zu denken. Soll man ihm ein Verbrechen daraus machen, seine erste Frau Arsinoe I. verstoßen und verbannt zu haben? Auch das nicht, denn die ränkessüchtige Prinzessin hatte ebenfalls eine Verschwörung gegen ihn angestiftet. Soll man es ihm zur schweren Schuld anrechnen, einen freien alexandrinischen Dichterling, der anlässlich seiner Vermählung mit seiner Schwester Arsinoe II. Spottverse auf ihn gemacht, erdrosseln ließ? Ich glaube es nicht. Diese vielleicht übertriebene Rache stimmte wohl mit den Sitten der Zeit überein. Selbst wenn wir von den Aussagen der besoldeten Historiographen des alexandrinischen Hofes absehen, so war Philadelphus doch ein großer Fürst, der nichts getan, was seinen Ruf bei seinen Zeitgenossen hätte beeinträchtigen können. Die Griechen hatten dem Philadelphus seine Verbindung mit seiner leiblichen Schwester, Arsinoe II., die ihren Sitten und Gesetzen zuwider war, vorgeworfen. Wir wissen andererseits, daß Geschwisterchen bei den Ägyptern gebräuchlich waren und daß andere griechische Fürsten das Beispiel dazu gaben. Es ist uns unter anderem bekannt, daß Mausoleus und Artemisia, Dionysos, der Tyrann von Syrakus, und Sophrosyne, Antiochus II. von Syrien und Laodike leibliche Geschwister waren. Zur Zeit ihrer Vermählung war Arsinoe II. schon zweimal Witwe, um zwölf Jahre älter als ihr Bruder.

Philadelphus war ein guter Sohn und Vater; Soter, der zu seinem Gunsten abgedankt hatte, wurde von ihm bis zu sein Lebensende mit liebevoller Rücksicht behandelt; er begleitete seine Tochter Berenike, die er an den schwachen Antiochus II. von Syrien verheiratet hatte, bis an die Grenze seiner Staaten und sandte ihr täglich Nilwasser, damit sie kein anderes trinke<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Man darf in dieser Tatsache nicht allein die Laune eines orientalischen Fürsten erblicken, denn es genügt, das zweite Buch des Athenäus zu durchblättern, um sich von der Wichtigkeit zu überzeugen, welche die Alten der Wahl des Trinkwassers beizumessen pflegten.

### Arsinoe II., Gemahlin und leibliche Schwester des Philadelphus.

Arsinoe II. war, nach ihren vortrefflich geprägten Münzen zu schließen, eine Frau von seltenem Adel und zarter Feinheit in den Gesichtszügen, die besonders einen lebhaften, geistvollen Ausdruck haben. Wir teilen diesbezüglich Mahaffys Meinung nicht, der gemäß nach den Porträtmünzen diese Königin weder häßlich noch von auffallender Schönheit gewesen wäre<sup>1)</sup>.

Fig. 10.

Arsinoe II. Golddrachm.  
(Luhooß-Blumer, Taf. VIII, 3.)

Wir geben zu, daß Arsinoes Züge auf den ersten Blick ernst und anmutlos erscheinen (Fig. 10 und 11). Sie besitzt die leicht gewölbte Stirn, die hervorragenden Augenbrauenwülste der makedonischen Rasse. Sie hatte ausdrucksvolle Augen, eine schmale, vielleicht etwas lange Nase, schmale Lippen; das leicht hervorspringende Kinn hat zartere Umrisse als das ihres Bruders, dem sie übrigens so sehr ähnlich sieht, daß die charakteristische Falte, welche die Mundwinkel des Philadelphus beschattet, auch bei ihr vorkommt; der untere Teil des Antlitzes von der Oberlippe bis zur Kinnschuppe ist besonders

Fig. 11.

Arsinoe II. Cypricher Golddrachm.  
(Brit. Museum.) — (R. St. Poole, Taf. VIII, 4.)

kurz, wie bei Berenike I., bei Philadelphus und bei Magas, und dieser Umstand differenziert diese Physiognomien von denjenigen Soters.

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 141.

In ihrem Gesamteindruck sind die Gesichtszüge edel und vornehm und passen zu ihrem Charakter. Ihre Züge litten wenig vom Alter; auf mehreren Münzen, die Svoronos veröffentlicht, konstatieren wir, daß das Gesicht der Königin abgemagert erscheint und die Züge schärfer hervortreten. Aber wie Visconti bemerkt, verlieren die Züge dieser Königin mit den Jahren nichts von ihrem Ernst und ihrem Adel.

Was die Arsinoe des Wiener Cameo (Tafel IX) anbetrifft, so hat der Künstler ihre Züge idealisiert, während er diejenigen ihres Bruders realistisch dargestellt.

Es ist bei dieser Gelegenheit interessant zu bemerken, daß wir über die Gesichtszüge der Königinnen aus dem Hause der Lagiden fast besser unterrichtet sind als über diejenigen der Könige. Wir besitzen in der Tat prachtvolle Goldmedaillons mit den Bildnissen der beiden ersten Bereniken und Arsinoes II.; auch die Porträtmünzen der verschiedenen Kleopatras sind zahlreich vorhanden, nur sind sie minder gut geprägt.

Was die Sinnesart dieser großen Königin anbetrifft, so ist sie höchst eigentümlich. Man kann in ihrem Leben zwei Perioden unterscheiden, die voneinander sehr verschieden sind. Während der ersten begegnen wir einer ränke-süchtigen, neidischen, eifersüchtigen Frau, welche für ihren Stiefsohn, der gleichzeitig der Mann ihrer Halbschwester war, eine verbrecherische Liebe im Herzen trug, welche die Krone ihren eigenen Kindern zusichern sollte zum Schaden derjenigen, denen sie rechtlich zukam. Während der zweiten Periode, nach ihrer Vermählung mit ihrem Bruder Philadelphus, finden wir dieselbe Frau von sanfter und versöhnlicher Sinnesart, von hervorragendem Verstand, von merkwürdigem politischen Geist. Sie übte einen wohlthuenden Einfluß auf einen um zwölf Jahre jüngeren Gemahl aus, dessen Untreue sie in Schutz nahm, dessen Kinder sie adoptierte und mit wirklich mütterlicher Liebe erzog. Der Widerspruch zwischen diesen beiden Perioden könnte kein grellerer sein. Ihre guten Eigenschaften kamen ihr von ihrem Vater, ihre Fehler von ihrer Mutter, der sanften Berenike, in deren Adern, wie wir wissen, das furchtbare Blut des Jollas floß.

Bei fast allen Ptolemäern, selbst vor der Verbindung mit den Seleniden, sehen wir beständig jene kaltblütige Grausamkeit, welche bei Kassander, dem Enkel des Jollas, ihren Höhepunkt erreicht hatte. Gegen das Jahr 300, fast zur selben Zeit, als ihre Halbschwester Lysandra Agathokles zum Manne nahm, heiratete die sechzehnjährige Arsinoe dessen Vater Lysimachus, der über 60 Jahre alt war. Agathokles und seine Schwester Arsinoe I. (erste Gattin des Philadelphus) waren die Kinder der Nikaia, Tochter des Antipater.

Wenn daher Arsinoe Agathokles durch ihren Bruder Koranos ermorden ließ, so geschah dies einfach, um ihren eigenen Kindern den Thron zu sichern; es ist übrigens auch möglich, daß verschmälerte Liebe mit im Spiele war. Der einzige mildernde Umstand ist aus den Berichten des Historikers Lucian ersichtlich, der nach Droysen behauptet, Agathokles hätte sich mit Selenkus gegen seinen Vater Lysimachus verschworen, um sich des Thrones zu bemächtigen. Nachdem Lysimachus vor dem Feinde gefallen, ward sie die Gemahlin ihres Halbbruders, des schändlichen Koranos, der ihre beiden hoffnungsvollen Söhne in ihren Armen umbringen ließ. Es gelang ihr nicht ohne Mühe zu Ptolemäus Philadelphus nach Ägypten zu flüchten. Hat sich Philadelphus aus politischen Gründen geheiratet, wie Droysen es vermutet, oder hat Mabaffy recht, wenn er glaubt, daß das Motiv dieser Verbindung allein in einer nwidderstehlichen Sympathie zu suchen sei, die der König einer zwar älteren, aber höchst begabten Frau entgegenbrachte? Wir glauben, daß Droysen und Mabaffy recht haben, und daß sich Philadelphus von den beiden Gefühlen, die seiner besonderen Sinnesart entsprachen, leiten ließ.

Zahlreiche historische Belege berichten uns, daß Philadelphus ebensosehr für geistige als sinnliche Genüsse empfänglich war; diese kluge Frau machte ihm das Leben leicht, sie adoptierte seine Kinder und unterstützte ihn in der Wahl seiner Maitressen, um den König zu zerstreuen.

Arsinoe II. nahm nicht nur lebhaften Anteil an der politischen und finanziellen Leitung des Landes, sie behütete auch ihren Bruder vor der Gefahr, eine andere Ehe zu schließen



Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, daß Arsinoë II. einen hervorragenden Verstand besaß; sie wurde von ihrem Gatten und von ihren Stiefkindern hoch geschätzt.

#### Ptolemäus Keraunos.

Soters ältester Sohn, welchen dieser weilich von der Thronfolge ausschloß, war der wilde und rohe Keraunos. Dieses Schensal besaß nichts von der edlen Sinnesart seines Vaters und wir sind berechtigt, anzunehmen, daß ihm Grausamkeit und Blutdurst von den Ahnen seiner Mutter kam. Diese Mutter war Eurydike, die Schwester des schrecklichen Kassander, die Enkelin des Jollas, der, nach seinen Abkömmlingen zu schließen, ein wilder, makedonischer Krieger gewesen sein muß, der wohl in jene Zeit hineinpaßte, in welcher Eurydike, Gattin des makedonischen Königs Amyntas, vollständig bewaffnet, ihre Schwiegertochter, die nicht minder furchtbare Olympias, Mutter Alexanders des Großen, zum Zweikampf herausforderte. In der Tat, Keraunos, ein bereites Beispiel der kollateralen Vererbung<sup>1)</sup>, war der würdige Neffe seines Oheims Kassander. Er war tückisch, undankbar, grausam und blutdürstig; er ermordete den alten Selenkus, der ihn großmütig aufgenommen hatte; er ließ die beiden Söhne seiner Halbschwester Arsinoë, Witwe des Lysimachus, in den Armen ihrer Mutter niedermetzeln, nachdem er ihnen durch einen feierlichen Eid das Leben zugesichert. Glücklicherweise ward seine Herrschaft Ägypten erspart, wenn auch Philopator und Epiphanes ihn in vieler Beziehung gleichen, denn auch in ihren Adern rollte das Blut des Jollas. Jedenfalls wäre unter seiner Regierung der Verfall Ägyptens viel schneller eingetreten.

<sup>1)</sup> Diesbezüglich teile ich die Ansicht des Professors Lorenz nicht. Das Bestehen der kollateralen Vererbung kann nicht in Zweifel gezogen werden. Gewiß deutet sie auf einen gemeinschaftlichen Ahnen, den man oft nicht kennt, der aber unter allen Umständen existiert hat und dessen Existenz mathematisch nachgewiesen werden kann. Es ist ganz gut, von der Aszendenz auf die Deszendenz zu schließen, aber das umgekehrte Verfahren ist genealogisch ebenso richtig. Dr. Woltmanns Anschauung über diese kollaterale Vererbung teile ich vollkommen.

#### Ptolemäus III. Euergetos I.

Das physische Bild des großen Euergetos ist weniger in Nebel gehüllt als sein moralisches. Wir besitzen dank Svoronos eine Reihe ausgezeichneter Porträtmünzen dieses Fürsten. Auf diesen erscheint das Profil des Königs voll Adel und Regelmäßigkeit. Obgleich das volle Antlitz und der starke Hals den Hang zur Beleihtheit andeuten, besitzt die Physiognomie etwas besonders Vornehmer, der Mund ist fein geformt, das Kinn tritt willenskräftig hervor, die Stirn

Fig. 12.



Ptolemäus III. Euergetes.

Golddrachmon aus der Sammlung Imhoof-Blumers. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 4.)

ist mächtig gewölbt, die gerade Nase von ungemehrer Form. Diese Beschreibung entspricht dem Golddrachmon der Sammlung Imhoof-Blumers (Fig. 12). Das Corpus Svoronos enthält unter anderem einige höchst interessante Porträtmünzen dieses Fürsten, doch ziehe ich unter allen Münzen zwei vor, die sich im briti-

Fig. 13.



Ptolemäus III. Euergetes. Golddrachmon. (Brit. Museum.) — (R. St. Poole, Taf. XII, 3.)

Fig. 14.



Ptolemäus III. Euergetes. Cyprische Silbermünze. (Brit. Mus.) — (R. St. Poole, Taf. IX, 6.)

sehen Museum befinden, ein Golddrachmon (Fig. 13) und eine cyprische Silbermünze (Fig. 14). Erstere gleicht derjenigen Imhoof-Blumers, nur sind die Züge des Königs viel schärfer dargestellt. Letztere ist von besonders realistischer

Auffassung. Auf allen diesen Münzen begegnen wir den makedonischen Rassencharakteren, aber nebenbei auch den Familien-Besonderheiten der Ptolemäer: dem stark entwickelten Kinn, dem mächtigen Halse, den abstehenden Ohren.

Das Pariser Münzenkabinett besitzt einen schönen Cameo (Fig. 15), welchen Babelon

Fig. 15.



Ptolemäus III. Euergetes. Cameo.  
(Pariser Münzenkabinett.) —  
(Ernst Babelon, Taf. XXII, 230.)

auf Euergetes deutet. Seine rätselhafte Persönlichkeit zeigt sich verwischt am Horizont der Geschichte. Sein siegreicher Feldzug in Syrien, welchen der König unternahm, angeblich um seine Schwester Berenike zu rächen, die der schwache Antiochus der Rachsucht seiner ersten Gemahlin, der schrecklichen Laodike, geopfert, erscheint so geheimnisvoll als möglich in seiner Ausführung. Der König durchzieht Syrien mit unwiderstehlicher Gewalt, doch plötzlich erlischt sein kriegerischer Eifer ohne sichtbaren Grund, er kehrt ebenso rasch mit reicher Beute heim und gibt die Mehrzahl seiner mühseligen Eroberungen wieder auf.

Nach dem, was uns die Historiker erzählen, war Euergetes von hervorragender Intelligenz, hohem Adel der Gesinnung und nebenbei von einer Indolenz, die fast einer lässigen Gleichgültigkeit gleich, und überdies von einer Unentschlossenheit, die sich allein durch Charakterschwäche erklären läßt. Nichtsdestoweniger hat Visconti recht, wenn er sagt, daß dieser Fürst die Prachtliche seines Vaters und die Tapferkeit seines Großvaters geerbt hatte<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Alexander der Große war den Ägyptern ein Befreier vom Perserjoch und ein humaner Eroberer, der ihnen den Vollgenuß ihrer Gebräuche und ihrer Religion ließ; Ptolemäus Soter ein tapferer und gerechter König, der auswärtig Krieg führte und durch weise Gesetze den Grund zur künftigen Größe seiner Familie, Alexandriens und des gesamten Reiches legte; Philadelphus ein griechischer König, dessen Liebe

Eine Erzählung, welche Aelianus entlehnt ist, wirft ein helles Streiflicht auf die Sinnesart dieses Fürsten. Eines Tages, während des Würfelspiels, ließ er sich die Namen derjenigen vorlesen, deren Todesurteil er unterzeichnen sollte. Berenike II., seine Gemahlin, die dieser Szene bewohnte, warf ihm das Unstatthafte seines Benehmens vor, indem sie ihm sagte, daß der Moment schlecht gewählt wäre, um so ernste Entscheidungen zu treffen; Euergetes freute sich über die begründeten Vorwürfe seiner Gemahlin und faßte den Entschluß, nie mehr während des Würfelspiels Todesurteile zu fällen<sup>1)</sup>.

Mahaffy sagt, daß dieser König sonderbare Anwendungen von Tätigkeit und Lässigkeit, von Größe und Bedeutungslosigkeit gehabt. Er starb in verhältnismäßig wenig vorgeschrittenem Alter; doch war seine Tatkraft verschwunden und er gleich einem alten hinaffälligen Manne.

Trotz dieser Lässigkeit, die er an seinem Lebensabend gezeigt, scheint er den Wissenschaften ein Interesse entgegengebracht zu haben. Er berief z. B. Eratosthenes von Athen an seinen Hof und ernannte ihn zum Direktor der alexandrinischen Bibliothek.

Wir glauben nicht, daß Euergetes ein Eroberer in des Wortes eigentlicher Bedeutung war; er unternahm seinen syrischen Feldzug besonders in der Absicht, seiner Schwester Hilfe zu bringen. Die Raschheit, mit welcher er nach Ägypten zurückkehrte, scheint uns ein Beweis dafür. Euergetes war ebenso vortrefflich als Sohn wie als Vater und Bruder. Es ist absolut falsch, daß er seinen Bruder Lyaimachus hätte ermorden lassen, wie es einige Historiker behaupten und wie es ihnen Sharpe nachgesprochen; diese Gräueltat wurde von seinem stumpfsinnigen Nachfolger verübt. Euergetes hatte von seinem Großvater die Intelligenz, die Güte, die Großmut, die Klingheit und die hohe geistige Begabung geerbt. Soters Hang zur Sinnlichkeit scheint bei ihm durch eine un-

zur Wissenschaft und äußerlichem Schaugepränge das Volk bländete und Alexandrien zum Sitz der Museen machte. Euergetes aber, als der geringste dieser Könige, ward doch als geborener Ägypter von den Priestern als der größte erachtet. (Visconti, Iconographie grecque, loc. cit. S. 217 bis 219.)

<sup>1)</sup> Aelianus XIV, 43.

großfische Lässigkeit ersetzt; die Liebe für Kunst und Wissenschaften, welche der Regierung seines Vaters so viel Glanz verliehen, ist auch bei ihm vorhanden; die Indolenz des Philadelphus artete bei ihm in leidenschaftlose Gleichgültigkeit aus, welche ihn von seiner Großmutter, Beronike II., überkommen war. Er hatte glücklicherweise nichts von dem Geschlecht des Jollas ererbt, obschon dank seinen beiden Großmüttern das Blut jener grausamen Familie auch in seinen Adern floß. Wie es oft zu geschehen pflegt, übersprang diese Belastung zwei Generationen und Energetes sowie sein Vater Philadelphus blieben davon verschont.

### Beronike II.

Die Physiognomie der Göttin des Energetes erscheint uns viel deutlicher als die ihres Gemahls.

Fig. 16.



Cameo. Rückseite von Fig. 15 Beronike II. (Pariser Münzenkabinett) — (E. Babelon, Taf. XXII, 230.)

Profil Beronikes ist höchst charakteristisch. Ihr schönes blondes, leicht gewelltes Haar ist nach griechischer Sitte leicht über dem Haupte vereinigt. Die schöne Büste von Neapel mit ihrem ernststen und nachdenklichen Ausdruck entspricht ganz wohl dem edlen Charakter der Königin, welche nichts von ihrer infamen Mutter geerbt hatte.

Die zwei Cameos des Pariser Münzenkabinetts sind von sehr verschiedenem ikonographischen Werte. Während der eine, auf welchem die Königin als Göttin Isis dargestellt ist, wegen seiner Kleinheit nur geringes Interesse

bietet, ist der andere im Gegenteil ein kostbarer Behelf für unsere Studien, denn er bestätigt glänzend die Deutung der Büste von Neapel. Die Haartracht und das Profil sind auf beiden Kunstwerken gleich und verleihen den schönen Zügen der Königin jenes eigentümliche Gepräge des Adels, das sie kennzeichnet.

Auf einer kyrenaischen Silbermünze des britischen Museums gewahren wir denselben Ausdruck (Fig. 18).

Die zwei Golddrachmen aus Ephesus (Fig. 19) und Kyrene (Fig. 20) aus der Sammlung Imhoof-Blumers malen uns die Erzbüste und den Cameo. Von obigen beiden Golddrachmen ziehe ich übrigens die kyrenaische vor, denn die Physiognomie ist weitaus ähnlicher als die zu Ephesus geprägte. Es ist auch bemerkenswert, daß Beronike eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Manne besaß, dessen entfernte Cousine sie war. Diese Ähnlichkeit dürfte wahrscheinlich auf die gemeinsame Großmutter Beronike I. zurückzuführen sein.

Was die Sinnesart dieser Fürstin anbetrifft, so lehrt uns die Geschichte, daß sie standhaft,

Fig. 19.



Beronike II. Golddrachmon aus Ephesus aus der Sammlung des A. Loebbecks in Breslau. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 5.)

edel, willenskräftig, sehr intelligent, aber auch in hohem Grade ehrgeizig war. Ihren euergi-

Fig. 17.



Beronike II. Cameo. (Paris. Münzenk.) — (E. Babelon, Taf. XXII, 229.)

Fig. 18.



Beronike II. Kyrenaische Silbermünze. (Brit. Mus.) — (H. St. Poole, Taf. XIII, 7.)

sehen Charakter zeigte sie schon als junges Mädchen. Ihre Mutter, die berühmte Apama, Tochter des Antiochus I. von Syrien und der schönen Stratonike, Enkelin des einäugigen Antigonus, war ungehalten darüber, daß ihr Gatte Magas die Tochter, die sie dem Demetrius dem Schönen, Sohn des Poliorketes, bestimmt hatte, mit Euergetes verheiratet

Fig. 20.



Berenike II. Kyrenaischer, Golddrachmon aus der Sammlung de Luynes. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 7.)

wollte. Als die junge Berenike erfuhr, daß der ihr zuge dachte Bräutigam der Geliebte ihrer Mutter geworden, faßte sie den Entschluß, die beiden Schuldigen, die das Lager ihres Vaters geschändet, zu bestrafen. Sie wurden beide unerhörtlich niedergemetzelt. Droysen entnimmt die Bestätigung dieser Bluttat, die Justinus erwähnt, aus Versen, die Catull und Theokrit entlehnt sind<sup>1)</sup>.

Berenikes mutige Initiative äußerte sich durch die guten Ratschläge, die sie ihrem königlichen Gemahl gab, als sie, empört über die Missetaten ihres Sohnes, eine Verschwörung gegen ihn anstiftete. Diese lebenswerte Absicht kostete ihr das Leben; aber gewiß hat sie die Häscher ihres Sohnes mit derselben Standhaftigkeit und Seelenruhe erwartet wie seinerzeit Olympias, Mutter Alexanders des Großen, diejenigen des schändlichen Kassander. Glücklicherweise hatte diese hervorragende Frau nichts von den Ausschweifungen ihrer Eltern geerbt, sie gleich ihnen nur durch ihre Intelligenz. Alle Eigenschaften ihrer Vorfahren Seleukus Nikator, Antigonus des

<sup>1)</sup> Droysen, loc. cit. I, S. 346, Anm. 2.

Einäugigen und des Persers Spithridates lebten bei ihr neu auf.

Mit Euergetes und Berenike endet das große Jahrhundert der Lagiden. Sie waren die letzten Abkömmlinge einer nützlichen Leuchte; bei ihnen überwogen die guten Eigenschaften der Vorfahren, aber bald neigt die Wagschale zugunsten der Laster. Mit Berenikes Eintritt in die Familie der Lagiden kommt zum ersten Male syrisches Blut in die ägyptische Königsfamilie. Diese Tatsache darf nicht unerwähnt bleiben, denn sie übt einen nicht unmerklichen Einfluß auf die Ptolemäer aus, wie wir dies bei Philopator sehen werden.

## II. Teil. Von Ptolemäus IV. Philopator bis Kleopatra VII.

### Ptolemäus IV. Philopator.

Philopator gleicht ohne Zweifel sehr seinem Vater, jedoch haben die größeren Gesichtszüge weniger Ausdruck, das Antlitz ist das eines dicken Mannes. Nichts in der Physiognomie läßt die tiefe Verkommenheit dieses Fürsten ahnen; er besitzt einen besonders kurzen, starken Hals und mächtige Schultern; sein starkes Genick berechtigt uns anzunehmen, daß die Belebtheit des Vaters beim Sohne zur Fettsucht geworden ist. Weder sein stolzer Blick noch sein euergisches Kinn lassen den Stumpf-

Fig. 21.



Ptolemäus IV. Philopator. Goldoctadrachmon. (Brit. Museum.) — (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 9.)  
sinn dieses Königs erraten. Visconti findet eine besondere Ähnlichkeit zwischen Philopatens gelecktem Haupte und demjenigen seiner Mutter Berenike II.<sup>1)</sup>

Wir sind nicht dieser Ansicht. Es genügt, die kurze Nase Philopatens mit derjenigen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. III, S. 223 bis 226.

seiner Mutter, die lang und oval geformt war, zu vergleichen, um sich von der Unhaltbarkeit dieser Anschauung zu überzeugen (Fig. 21).

Philopators Sinnesart stimmt durchaus nicht mit Schopenhauers geistreichen Behauptungen über die Vererbung, denen auch Goethe beizupflichten scheint und denen gemäß man den Charakter vom Vater und den Intellekt von der Mutter erbt. Wie wir heute wissen, ist der Bestand der Erbschaftsmasse niemals eine Kombination, sondern eine Art von Mosaik, d. h. die Eigenschaften des Vaters und der Mutter vererben sich nicht zu gleichen Teilen auf die Kinder, sondern in ganz willkürlichen Mengen. Ich erkläre mir demnach die psychopathischen Belastungen folgendermaßen: Irgend ein Ahnherr ist irrsinnig. Die diesbezügliche Disposition vererbt sich zu ungleichen Teilen auf seine acht Kinder, deren keines aber genügend belastet erscheint, um einer ähnlichen Affektion zum Opfer zu fallen. Diese Erscheinung wiederholt sich durch mehrere Generationen. Es ist aber dabei ganz gut denkbar, daß eines der Kinder verhältnismäßig mehr von dieser Disposition ererbt hat als die anderen, und daß diese Disposition bei bestimmten Individuen der Deszendenz immer mehr und mehr anwächst, bis sie endlich nach vielen Generationen eine solche Höhe erreicht, daß wir plötzlich die Wiederholung der Belastung des Urvaters in ähnlicher Form vor uns sehen. Dies erklärt, warum die drei ersten Ptolemäer gesunden Sinnes waren, während der vierte und fünfte an Stumpfsinn litten, sowie an anderen erblichen Übeln, deren Wiedererscheinen wir bei den Nachfolgern zu konstatieren vermögen. Die diesbezüglichen genealogischen Forschungen führen noch zu folgenden unerwarteten Resultaten:

1. die Belastungsmasse vererbt sich mittels der Amphimixis, wie dies aus den genealogischen Forschungen, welche Lorenz bei den Habsburgern angestellt hat, hervorgeht.
2. der Ahnenverlust spielt wie immer eine bedeutende Rolle, wie man aus der Ahnentafel des gestörten Don Carlos ersieht, welcher vier statt acht Urgroßeltern und sechs statt sechzehn Urgroßeltern aufweist.
3. die Akkumulation der Belastungsmomente geschieht nur sehr langsam nach mehreren Gene-

rationen, und es kann demnach im allgemeinen von der unmittelbaren Vererbung des Irnsinns nicht die Rede sein, was für den Naturforscher wie für den Soziologen nur erfreulich ist).

Philopator war unter allen Fürsten seines Stammes der unfähigste und stumpfsinnigste. Besaß dieser König irgend eine gute Eigenschaft? Es ist überraschend, aber wir sind genötigt einzuräumen, daß er die Künste und Wissenschaften, wie seine Vorgänger und die meisten seiner Nachfolger, leidenschaftlich zu lieben schien. Die Lässigkeit seines Vaters hatte sich bei ihm in unverzeihliche Schwäche umgewandelt und die Unentschlossenheit in eine feige Entmutigung; die elegante Sinnlichkeit seines Großvaters ward bei ihm zu niedriger Ausschweifung. Dieser Fürst hatte den Blutdurst seiner Ahnen aus dem Geschlechte des Jollas geerbt, sowie die kalte, berechnende Grausamkeit seiner syrischen Vorfahren, von denen keiner eines natürlichen Todes gestorben war. Sosihus, welcher sich unter Euergetes als vortrefflicher Minister erwies, ward für seinen Sohn Philopator ein verwerflicher Ratgeber. Die scheue Sinnesart des jungen Fürsten ward ein williges Werkzeug in seinen Händen und auf Grund der Schwäche seines Charakters läßt er ihn die schändlichsten Verbrechen begehen.

Dank seinen Ausschweifungen fand dieser Fürst einen frühzeitigen Tod. Nachdem er in die Ermordung seiner Mutter, seines Bruders und seines Onkels eingewilligt, ließ er seine Gattin und leibliche Schwester Arsinoë III. meuchlings töten; er opferte sie wahrscheinlich der Eifersucht seiner Maitresse, der berühmtesten Agathokles.

Strabo betrachtet den Regierungsantritt Philopators als das Ende des Wollergehens, welches unter den drei ersten Lagiden den ägyptischen Reiche zuteil geworden.

Dieser seiner Handlungen unbewußte König besaß neben seinen moralischen Unförmligkeiten auch eine gewisse geistige Mißbildung. Jene feine und tiefe Bildung der Sinne und der Seele mangelte diesem Makedonen, der sich kaum drei Geschlechtern nach Ägypten ver-

<sup>1)</sup> O. Lorenz, loc. cit. 5. Kapitel: Vererbung pathologischer Eigenschaften, S. 429 bis 464.

pflanzt worden war. Nicht die Knechtsigkeit des vierten Ptolemäus, sondern die Feigheit der Griechen Alexandriens machten die tiefe Erniedrigung der Regierung, welche dem Günstling in die Hände gefallen, möglich; dieses moralische Versinken der griechischen Bevölkerung war eine der zahlreichen Erscheinungen des seit Jahrhunderten vollzogenen Verfalls der griechischen Rasse in Ägypten, in der man die Folgen übertriebener Inzucht erblicken darf. Was die Ägypter anbetrifft, über deren ungünstige Lebensverhältnisse uns Lumbroso erschöpfende Aufschlüsse liefert, so waren sie gewissermaßen schon erstarrt, als Kambyzes ihr Land eroberte.

Die schönen Künste und Wissenschaften litten nicht unter der Verderbtheit des Königs. Trotz seiner regellosen Sitten bezeugte er eine wirkliche Verehrung für das Andenken Homers und ließ zu seinen Ehren einen Tempel erbauen. Die Wissenschaften blühten in Alexandria trotz der schlechten Wirtschaft dieses Fürsten, dem das Volk allerhand Spottnamen gab, um ihm seine Verachtung zu bezeugen. Man nannte ihn Gallus, da er sich gern als Priester des Dionysos kleidete, und Aelianns berichtet, daß man ihm auch den Spitznamen Tryphon gegeben, infolge seines unerhörten Aufwandes<sup>1)</sup>.

Es dünkt uns wichtig festzustellen, daß dieser nichtswürdige König keineswegs die Frucht einer Geschwisterehe war, daß seine Eltern hervorragende Eigenschaften besaßen, daß sein Großvater und sein Urgroßvater unter die größten Könige ihrer Zeit gerechnet wurden; man muß demnach unter seinen mütterlichen Ahnen Umschau halten, um psychische Neigungen zu finden, welche den seinigen entsprechen. Die strenge Inzucht ist dem Entstehen dieses entarteten Wesens fremd.

### Arsinoe III.

Die Züge dieser Königin sind ebenso fein und ausdrucksvoll, als diejenigen ihres stumpfsinnigen Gatten jedweden Charakters entlehnen. Arsinoe gleicht in dieser Beziehung ihrer Mutter und ihrer Großmutter; ihre ziemlich

lange Nase gleicht derjenigen der ersten Berenike, wie wir aus ihren Porträtmünzen ersieht (Fig. 22 u. 23).

Fig. 22.



Arsinoe III. Golddrachmon aus dem Wiener Münzenkabinet. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 10.)

Was die Sinnesart dieser unglücklichen Fürstin anbetrifft, so wissen wir sozusagen nichts, und müssen, Mahaffys Beispiel folgend, uns begnügen anzunehmen, daß sie willenskräftig und charaktervoll war.

Fig. 23.



### Ptolemäus V. Epiphanes.

Die Züge des Epiphanes mahnen in ihren edlen

Arsinoe III. Golddrachmon. (Svoronos, Journ. International d'Archéologie numismatique, VI. Teil, 1899.)

Umrissen an diejenigen seiner Mutter und auch an gewisse Porträte seines Großvaters Euer-

Fig. 24.



Ptolemäus V. Epiphanes. Golddrachmon. (Brit. Museum.) — (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 11.) getes und nichts läßt seine Niederträchtigkeit ahnen. Die Münzporträte dieses Königs zeichnen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. S. 223 bis 226.

sich durch eine besonders schöne Prägung aus; die schlankte Gestalt des jungen Fürsten hebt sich von den Münzen, deren Kenntnis wir Svoronos verdanken, viel deutlicher ab als auf allen bisher bekannten (Fig. 24 und 25). Epiphanes war in jeder Beziehung der würdige Sohn seines schätzblichen Vaters.

Er bestieg den Thron im Alter von fünf Jahren unter höchst schwierigen Verhältnissen. Er kannte sozusagen fast nicht seine Mutter, die gute und intelligente Arsinoë III. Von frühester Jugend auf inmitten der Verschnittenen, Narren und Hofschranzen seines Vaters, wurde er unter der Leitung des Agathokles, der Agathoklea und ihrer ebenso schändlichen

Fig. 23.



Ptolemäus V. Epiphanes. (Corpus Svoronos.)

Mutter Oenante aufgezogen. Unter allen Umständen ist es schwer, wenn nicht unmöglich, die moralische Verkommenheit dieses Fürsten der Geschwisterehe seiner Eltern beizumessen. Die Instinkte des jungen Königs waren schlecht, denn er vermochte nicht die weisen Ratschläge seines Ministers Aristomenes zu befolgen, sondern zwang denselben, den Giftbecher zu leeren, weil er es gewagt hatte, ihn aufzuwecken, während er in Gegenwart eines fremden Gesandten schlummerte. Der König überließ sich ohne Rückhalt der Leitung des ränkesüchtigen Polykarpus, und es unterliegt keinem Zweifel, daß er ohne die Hilfe der Römer seinen Thron eingebüßt hätte. Epiphanes hatte einen grausamen Charakter, welchen er von Jugend auf offenbarte<sup>1)</sup>. Er starb im Alter von 29 Jahren eines gewaltsamen Todes.

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. S. 228 bis 232.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Epiphanes liebte alle Leibesübungen und frühete besonders dem Jagdvergnügen mit Leidenschaft. Mit den Jahren wuchs die Grausamkeit dieses Königs.

Diodorus von Sizilien berichtet uns, daß er beständig roher wurde, aller Gesetze spottend nach Tyrannenart regierte und den Ägyptern immer mehr verhaßt wurde<sup>2)</sup>.

Das einzige Verdienst dieses unwürdigen Fürsten bestand in der Wahl seiner Gattin Kleopatra I. Syra, Tochter Antiochus III. des Großen, in deren Adern das persische Blut der Könige von Pontus floß, während Epiphanes vom Geschlechte des Jollas den Blutdurst und von seiner Ahnfrau Apara, Königin von Kyrene, die Verworfenheit geerbt hatte. Nichtsdestoweniger scheint es unstatthaft, dieses traurige Bild noch abstoßender zu gestalten. Verschiedene Umstände im Leben dieses Fürsten erwecken den Verdacht, daß die Historiker ihm in keiner Beziehung Gerechtigkeit widerfahren ließen. Ohne den Geschmack seiner Vorfahren für Kunst und Wissenschaft zu teilen, ließ Epiphanes Bauwerke und Tempel errichten. Verschiedene Inschriften, unter anderen die von Rosette, legen dafür Zeugnis ab. Die Wahl seiner Gemahlin und der Umstand, daß er ihr nicht nach dem Leben getrachtet, scheinen zu beweisen, daß er trotz seiner geringen Intelligenz vielleicht weniger stumpfsinnig war als sein Vater. Bei Epiphanes sind alle guten Eigenschaften der ersten Ptolemäer gänzlich verschwunden, während alle ihre Fehler und Laster verstärkt vorkommen und noch durch diejenigen der Seleukiden, der Antigoniden und des Geschlechtes des Jollas und des Lysimachus vermehrt erscheinen. Wenn wir bei ihm keine Spuren vom Edelmut des Selenkus Nikator, vom politischen Geist des Antigonos, von der Tapferkeit und dem Witz des Demetrius Poliorketes, noch von der rechtlichen Mittelmaßigkeit des Antipater vorfinden, so begegnen wir bei ihm der kalten Grausamkeit des Kassander und der Tücke des Lysimachus. Doch selbst in seiner verbrecherischen Eigenart fehlt ihm die schreckliche Größe jener Ahnen.

<sup>2)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 311 bis 312.

**Kleopatra I. Syra.**

Bis auf Epiphanes einbegriffen, hat die Inzucht von Soter an den wichtigsten Zügen seiner Abkömmlinge eine gewisse Kontinuität bewahrt. Stirn, Nase, Mund und besonders Kinn und Ohren bieten eine unleugbare Familienähnlichkeit. Weder das persische und syrische Blut, noch dasjenige der Antigoniden und der Seleukiden hatten auf den physischen Typus der Lagiden einzuwirken vermocht. Dies ändert sich jedoch vollständig mit dem Eintritt Kleopatras I. in die Familie der Lagiden. Jene Tochter Antiochus des Großen war wohl eine der Schönsten, wenn nicht die Schönste, in dieser Reihenfolge hervorragender Frauen von der ersten Berenike bis zur siebenten Kleopatra. Mit ihrem Erscheinen ist das Gleichgewicht ge-

Fig. 26.



Kleopatra I. Syra. Cameo aus dem Pariser Münzenkabinet. (K. Babelon, Taf. XXII, 251.)

27 u. 28), die trotz ihrer minderen Prägung eine große Ähnlichkeit mit dem Cameo aufweisen. Auf

Fig. 27.



Kleopatra I. Syra. Cypriische Kupfermünze. (Brit. Museum.)—(R. St. Poole, Taf. XXI, 3.)

Willenskraft und verleiht der Physiognomie einen unaussprechlichen Reiz. Auf ihren Porträt-

brochen und das kräftige syrische Blut gewinnt die Oberhand über das verderbte Lagidenblut.

Das Pariser Münzenkabinet besitzt einen prachtvollen Cameo, welcher uns die edlen Züge dieser Fürstin vergegenwärtigt (Fig. 26), sowie verschiedene Porträtmünzen (Fig.

letzterem finden wir die edlen und stolzen Züge der Fürstin besonders ausdrucksvoll wiedergegeben. Welch eine schöne hohe Stirn, welch eine fein geformte Nase, welch anmutiger Mund, welch reizendes Kinn, welch herrlicher Blick! Alles in diesen edlen Zügen atmet Sanftmut und Willenskraft und verleiht der Physiognomie einen

münzen als Isis dargestellt, erscheinen die Züge der Königin in ihrer edlen Regelmäßigkeit weniger fein, aber der Adler auf der Rückseite mit seinen ausgebreiteten Fittichen entspricht in seiner stolzen Haltung dem edlen Porträt der Bildseite. Die Seele dieser Fürstin stimmt mit ihrer bemerkenswerten Schönheit überein. Die Interessen ihres neuen Vaterlandes lagen ihr mehr am Herzen, als diejenigen ihrer syrischen Heimat<sup>1)</sup>.

Diese Königin scheint nach Mahaffy eine verständige und gewandte Frau gewesen zu sein; sie genüß einen vortrefflichen Leumund in der ägyptischen Geschichte. Da ihr ältester Sohn beim Tode seines Vaters nur sieben Jahre alt war, so nahm sie die Zügel der Regierung in die Hand, und während der Dauer ihrer siebenjährigen Regentschaft geschah nichts, was Mahaffys Meinung über ihre politische Befähigung Lügen strafen konnte<sup>2)</sup>. Es scheint erwiesen, daß ohne den römischen Beistand Ägypten die Beute Syriens geworden wäre, aber es scheint ebenso gewiß, daß ohne den klingen Sinn dieser Königin der Schutz der Römer sich nicht als so hilfreich erwiesen hätte.

Wie schon oben erwähnt, gehört Kleopatra Syra zu den hervorragendsten Königinnen der Lagiden-Dynastie; sie war die erste im Reigen der Kleopatras und dürfte wohl auch die Edelste unter ihnen gewesen sein. Solange sie lebte, erhielt sie den Frieden zwischen ihrem Sohn Philometor und ihrem Bruder Antiochus Epiphanes und lenkte das Staatsschiff mit gewandter Hand. Nach ihrem Tode begann sofort wieder der Verfall des ägyptischen Reiches<sup>3)</sup>.

Fig. 28.



Kleopatra I. Syra als Isis. Ägyptische Silbermünze, geprägt unter der Regierung ihrer Söhne. (Britisches Museum.)—(R. St. Poole, Taf. XXII, 6.)

**Ptolemäus VI. Philometor.**

Wenn auch das Antlitz des Philometor in gewisser Beziehung an dasjenige Soters erinnert, bietet es doch vielmehr mit seinen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. S. 228 bis 232.

<sup>2)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 330.

<sup>3)</sup> Sharpe, loc. cit. I, S. 256.



sehroffen und knoeligen Zügen eine auffallende Ähnlichkeit mit denjenigen Seleukus Nikators dar, wie ein Vergleich der Porträtmünze Seleukus Nikators aus der Sammlung Imhoof-Blumers mit derjenigen des Haager Münzenkabinetts ergibt. Wir begreifen ganz gut, daß die Akademiker von Neapel die Ende des 18. Jahrhunderts in Herkulanum aufgefundenen Bronzebüste für die des Philometor hielten. Ptolemäus' VI. Profil hat für uns noch ein andres Interesse. Wir erblicken auf demselben das Kinn der Lagiden so stark hervorspringend, daß es dem König ein fast frazenhaftes Aussehen verleiht.

Wir dürfen nicht vergessen, daß nicht nur Seleukus Nikator, dessen Ebenbild Philometor war, ein mächtig hervorspringendes Kinn besaß, sondern daß auch ein anderer Ahnherr, Demetrius Poliorketes, sich durch ein ebensolehes charakteristisches Kinn auszeichnete. Die

Fig. 29.



Ptolemäus VI. Philometor.

Tetradrachmon aus Ptolemäus. (Münzenkabinettt zu Haag.) — (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 13.)

Münzhilder Philometors sind selten und der Tetradrachmon aus Haag ist ein um so kostbareres ikonographisches Dokument (Fig. 29).

### Ptolemäus VIII. Physkon.

Dank der Veröffentlichung des Corpus Svoronos besitzen wir ein wahrheitsgetreues Münzbild Physkons, welches von dem Viscontini wesentlich abweicht (Fig. 30). Die charaktervolle syrische Nase sowie die gewölbten runden Augen erscheinen zum ersten Male bei den Ptolemäern. Diesem Münzbild nach zu urteilen, wären die Züge Physkons ganz an-

genehm. Sein Biok sowie der untere Teil des Antlitzes sind im Einklange mit der hervorragenden Intelligenz dieses Fürsten. Hals und Wangen tragen Spuren seiner außerordentlichen Fettleibigkeit. Es ist nicht unnötig zu bemerken, daß dieser Fürst von den klatsch-süchtigen Historikern nicht nur wegen seiner psychischen Belastungen, sondern auch wegen seiner physischen Gebrechen stark verlemndet

Fig. 30.

Ptolemäus VIII. Physkon.  
Silbermünze (?). (Corpus Svoronos)

wurde. Kleopatra Syra, die eine reizende Nase besaß, übertrug auf die Lagiden die mächtige charakteristische Nase der Seleukiden, gemäß dem von Lorenz formulierten Gesetze, wonach gewisse typische Eigenheiten, die sich in der männlichen Linie vererben und in der Familie als fast eingewurzelt erscheinen, sich mittelst der Amphimixis weiter verbreiten. Der deutsche Historiker ist geneigt anzunehmen, daß gewisse Familientypen sich hauptsächlich in der männlichen Linie vererben, während sie vermittelt der Frauen, die oft diese typischen Merkmale nicht besitzen, an andere Familien übertragen werden.

Weiter kommt der Autor zu folgenden wichtigen Schlüsfolgerungen:

1. Die den Eltern gemeinsamen Eigenschaften vererben sie ohne Rücksicht auf die Intensitäten der Vererbungsmasse (Zeugung und Erhaltung der Art, Gattung oder Rasse).
2. Für Vererbung von Besonderheiten kommt eine Vererbungsintensität in der Vererbungsmasse in Betracht, wobei
3. die Weitervererbung der männlichen Vererbungstendenzen gesieher ist und deren Inten-

sität durch Häufung der Reproduktion gesteigert wird (Familiäntypus)<sup>1)</sup>.

Diese drei Punkte dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, denn wir werden noch oft Gelegenheit haben, auf dieselben zurückzukommen.

Physkon ist einer der seltenen Ptolemäer, von dem uns die Geschichte eine physische Beschreibung aufbewahrt hat. Justinus entwirft ein wenig schmeiçelhaftes Bild dieses Fürsten. „Er war häßlich, von geringer Körperhöhe, und sein fetter Wanst machte, daß er mehr einem Tiere als einem Menschen glich.“<sup>2)</sup>

Dieser Bericht Justinus' gewinnt an Bedeutung durch einen Absatz bei Athenäus, in dem es heißt: „Das Übermaß seiner Schlemmerei hatte beim ägyptischen König einen ungewöhnlichen Leibesumfang zur Folge, es war fast unmöglich, seinen Fettwanst mit den Armen zu umspannen. Er verbarg ihn unter einem weiten Gewand, das bis auf die Füße herabreichte und dessen Ärmel seine Hände fast gänzlich verbargen. Er giug niemals zu Fuße aus, ohne sich auf einen Stab zu stützen.“<sup>3)</sup>

Unter Soters Nachfolgern erreichte Physkon das höchste Alter; er starb in seinem 65. Lebensjahre.

Die Heirat Kleopatras I. Syra führte der Inzuchtfamilie der Lagiden frische Blutwellen zu. Die Untersuchung der Sinnesart der dieser Verbindung entsprossenen drei Kinder bietet daher von psychologischen Standpunkte aus ein besonderes Interesse. Kleopatra gebar dem Epiphanes zwei Söhne und eine Tochter: Ptolemäus VI. Philometor, Kleopatra II. und Ptolemäus VIII. Euergetes II., den seine Untertanen, Physkon, d. h. der Dicke und Kakergetes, d. h. Missetäter, benannt hätten.

Die beiden Brüder Philometor und Physkon unterschieden sich ebenso physisch wie moralisch wesentlich voneinander. Während der Ältere den Gesichtszügen nach seinen Ahnen Soter, Seleukus und Demetrius glich und gleichzeitig die Unentschlossenheit und den Mangel an Einheit seiner Sinnesart von seinen syrischen Vorfahren ererbt hatte, besaß der zweite das Äußere eines dicken Seleukiden und

die Seele eines Ptolemäers. Selten wurden Fürsten so verschieden und so ungerecht beurteilt als diese beiden Brüder. Wenn man sich eine Vorstellung von den voneinander abweichenden Meinungen der modernen Historiker machen will, so genügt es, Mahaffys und Guttschmids Äußerungen über Philometors und Physkons Charakter zu vergleichen. Mahaffy rühmt „Philometors wohlwollende und sanfte Sinnesart, der aber, dem Beispiele seiner Vorgänger folgend, sich rasch der Ausschweifung und der Weichlichkeit ergab und dadurch schweres Mißgeschick bewirkte“.

Von Ptolemäus Kakergetes Physkon berichtet er, daß ihn alle Historiker als ein Scheusal an Grausamkeit und Lastern bezeichnen. „Trotz seines schmachtvollen Privatlebens bewies er im öffentlichen Leben mehr Tatkraft als sein Bruder.“<sup>4)</sup>

Es scheint uns sehr wohl möglich, daß gleich dem verfaulten römischen Adel, der das Andenken mehr als eines Cäsars in den Staub zog, die Griechen und Juden Alexandriens, welche unter Ptolemäus VIII. Verfolgungen zu erleiden hatten, diesen Fürsten Physkon und Kakergetes benannten und seine Laster übertrieben.

Hören wir nun Guttschmids Meinung: „Philometor hat mehr als ein anderer Lagide durch sein erbärmliches Regiment es dahin gebracht, das Reich so gründlich zu ruinieren, daß auch die radikalen Heilmittel, die sein kräftiger Bruder Euergetes II. anwendete, es nicht mehr vor dem bodenlosen Verfall zu retten imstande waren.“ Philometor besaß viel an einem Privatmanne löbliche Tugenden, aber keine einzige von den Eigenschaften, die ein Fürst haben soll. Er war sanft und gutherzig (Polybins XL, 12, 3), im Glücke übermütig, sorglos, schlaf, dabei der Schweißerei ergeben (ibid. 55, 7); möglich ist, daß er persönlich tapfer war, gewiß, daß er keinen moralischen Mut besaß und im Unglücke verzagte, wie dies seine schimpfliche Flucht vor Antiochus IV. zur Genüge beweist.

„Die beispiellose Allmacht, welche Philometor den Juden einräumte, hatte dieselben

<sup>1)</sup> Lorenz, loc. cit. S. 411.

<sup>2)</sup> Athenäus XII.

<sup>3)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 386.

verderblichen Folgen für Ägypten, wie die Maßregel Kasimirs III. für Polen.“ „Ptolemäus Energetes II. war ganz das Gegenstück seines Bruders: als Mensch verworfen, aber ein musterhafter Regent. Er stieß die morsche und unhaltbare Verfassung des Reiches um und machte den Versuch, dieses zu regenerieren und auf einer neuen, absolutistischen Grundlage wieder aufzubauen. Für seine Tüchtigkeit zeugen die Maßregeln, die er zur Hebung des Handels ergriff, die Einschränkung der Juden, die Mäßigung, mit der er von dem Zeitpunkte an, wo er allen Widerstand überwunden hatte, verfuhr.“ Seine Regierung konnte für Ägypten ebensei segensreich werden, wie die Richards III. für England; aber es war schon zu spät<sup>1)</sup>.

Wir ziehen bei weitem die trockene Beurteilung Gutschmids vor, dessen erklärende Anmerkungen der historischen Wahrheit viel näher zu liegen scheinen. Einige Tatsachen, welche sowohl die Lobredner als ihre Gegner übereinstimmend berichten, bestätigen unsere persönliche Anschauung. Der wankende und lässige Charakter Philometors äußert sich bei jeder Gelegenheit. Seine überstürzte Flucht vor Antiochos IV.; der Umstand, daß er seine Tochter dem Usurpator Alexander Balas gegeben und wieder genommen, sind Beweise seiner Unentschlossenheit und seines Wankelmutes.

Was Physkon anbetrifft, so ist wohl niemand imstande, trotz seiner ausgesprochenen Verworfenheit seine hohe politische Begabung zu leugnen. Der Verfall Ägyptens war nicht sein Werk; er war wohl gezwungen, ihn über sich ergehen zu lassen, denn er hatte schon unter Philadelphus begonnen, und man muß sich wohl hüten, die Wirkungen mit den Ursachen zu verwechseln. Die Historiker rügen ihn besonders wegen seiner Heirat mit seiner Nichte, der unsittlichen Kleopatra III.<sup>2)</sup> Dieser Umstand hat nichts Ungewöhnliches und die

Geschichte würde denselben gar nicht erwähnen ohne die zahlreichen Verbrechen, welche der König beging, um sich die absolute Herrschaft zu sichern. Ein Kirehenvater benannte ihn wegen seiner Gelehrsamkeit Philologos und andere verglichen ihn mit Sulla, welcher sich durch seine unerhörten Frevel entehrt hatte und gleichzeitig die Römer durch die feinsten Sitten und geistvolle Unterhaltung zu bezantern wußte<sup>3)</sup>.

### Kleopatra III. Kokke.

Die Geschichte gibt uns nur wenig Aufschlüsse über Kleopatra II., die liebliche Schwester Philometors und Physkons, die sie nacheinander heiratete. Aus ihrer Ehe mit Philometor ent-prossen Kleopatra Thea, die Gemahlin Antiochos VII. von Syrien, von der wir Münzbilder besitzen (Fig. 31) und Kleopatra III.

Kokke, deren Schicksale eng verknüpft mit denjenigen ihrer Söhne Lathyros und Alexander sind. Das Porträt der Kleopatra Thea ist demjenigen ihrer Großmutter Syra sehr ähnlich.

Sie scheint von hoher, imponierender Gestalt gewesen zu sein, doch fehlte ihr der Reiz der ersten Kleopatra. Nachdem sie den syrischen Usurpator Alexander Balas geheiratet, wurde sie die Frau des Demetrius Nikator und endlich diejenige Antiochos' VII.

Ihre jüngere Schwester, welche ihr Oheim Physkon nach dem Ableben seiner Gattin und Schwester Kleopatra II. geheiratet hatte, spielt eine wesentliche Rolle in der ägyptischen Geschichte. Diese Königin, welcher die Alexandriner ihres roten Gesichts halber den Spottnamen Kokke, d. h. „die Scharlachrote“<sup>4)</sup>,

Fig. 31.



Kleopatra Thea, Königin v. Syrien, Tochter Ptolemäus VI. Philometor, Tetradrachmonas Syrien. (Britisches Museum.) (Jmhooft-Blumer, Taf. IV, 3.)

<sup>1)</sup> Sharpe, loc. cit. S. 266 bis 267, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Er sieht, ein Freund der Tafelfreunden zu sein. Athenäus liefert uns einen höchst merkwürdigen Bericht über ein Festgelage, welches der König in seiner Eigenschaft als Hoherpriester Apollon zu Kyrene gegeben (Athenäus XII, 12). Während seines Aufenthaltes in Rom hatte er sich um die Hand der Cornelia, der Mutter der Gracchen, beworben; natürlich wurde seine Bewerbung ausgeschlagen.

<sup>3)</sup> Sharpe, loc. cit. I. S. 274.

<sup>4)</sup> Gutschmid bei Sharpe, loc. cit. II, S. 9, Anm. 1.

gegeben hatten, besaß ein höchst charakteristisches Antlitz, auf dem wir die Nase der Seleukiden und das Kinn der Lagiden vereinigt erblicken (Fig. 32). Wir finden dieselbe Nase bei ihren Kindern wieder, deren Porträts uns die Numismatik aufbewahrt. Ihre feinen regelmäßigen Züge lassen nicht die Verworfenheit ihrer Sinnesart vermuten.

Wenn wir den Berichten der Historiker Glauben beimessen, so war diese Königin ehrgeizig, herzlos, grausam und lasterhaft; sie übte einen großen Einfluß auf ihren weit älteren Gemahl aus und trug hauptsächlich schuld daran, wenn er seine beiden Söhne erster Ehe hinwegschaffen ließ.

Nach dem Tode ihres Gemahls mit der Regentschaft des Reiches betraut, zieht sie vorerst die Aufmerksamkeit auf sich

Fig. 32.



Kleopatra III.  
Kokke. Cypriische  
Kupfermünze. (Britisches Museum.)  
(R. St. Poole,  
Taf. XXIII, 3.)

durch das sonderbare Gebahren gegen ihren erstgeborenen Sohn. Nachdem sie ihn mit seiner Schwester Kleopatra IV. verheiratet, nimmt sie ihm dieselbe wieder weg und vermählt ihn mit seiner anderen Schwester Kleopatra Selene, von der sie ihn ebenfalls wieder trennt. Mahaffy nennt sie eine furchtbare Königin und sagt, daß man in keiner gesitteten Gesellschaft eine ähnliche Lebenslaufbahn finden würde.

Ihre anderen Kinder waren Kleopatra Tryphäna, Gemahlin des Antiochus Gripus von Syrien, welche eine sehr begabte Prinzessin gewesen zu sein scheint. Die zweite Tochter, Kleopatra IV., heiratete Antiochus Kyzikenus; beide Königinnen starben eines gewaltsamen Todes. Die dritte Tochter endlich, Kleopatra Selene, heiratete, nachdem sie die Gemahlin ihres Bruders Lathyros gewesen, Antiochus Gripus, Antiochus Kyzikenus und endlich Antiochus Eusebes.

#### Ptolomäus X. Lathyros.

Dieser König, der selbst den Titel Soter II. annahm und welchen seine Untertanen wegen seiner Beleidigung Physkon nannten, ist besonders unter dem Spottnamen Lathyros bekannt, eines

erschengroßen Males wegen, das er auf der Wange hatte.

Das Nationalmuseum von Neapel besitzt eine Marmorbüste im jugendlichen Alter und eine Bronzestatuette dieses Fürsten (Tafel XI) in voller Manneskraft. Die beiden Büsten bieten nur wenige Berührungspunkte untereinander, allein die charakteristische Oberlippe mit der Furche und die Anordnung der Haare in der Schläfengegend bieten eine auffallende Ähnlichkeit und lassen auf die Identität der dargestellten Persönlichkeiten schließen. Wenn die Marmorbüste jedoch einen schwermütigen Ausdruck besitzt, so kann man der Erzbüste ein willenskräftiges Aussehen nicht absprechen, das sich besonders durch das hervorspringende Kinn äußert. Auf der Porträtmünze bei Visconti<sup>1)</sup> erblicken wir die Nase der Seleukiden und das Kinn der Lagiden; und besonders die gefurchte Oberlippe, von der früher die Rede war. Doch ist dieses Münzporträt unsicher. Um sich von der Sinnesart des Lathyros eine richtige Vorstellung zu machen, muß man sich vor allem von zwei wesentlichen Umständen Rechenschaft ablegen. Dieser Fürst bestieg den ägyptischen Königsthron im Jahre 115 v. Chr., d. h. im Alter von 27 Jahren. Sieben Jahre später, von seiner Mutter aus Alexandrien vertrieben, begnügte er sich durch 20 Jahre mit dem Königthum Cypren. Er kehrte erst nach der Vertreibung seines Bruders gegen 88 v. Chr. nach Ägypten zurück, wo er noch acht Jahre herrschte. Er starb demnach im Alter von 62 Jahren. Dies sind historische Tatsachen.

Nun muß man aber berücksichtigen, daß die Historiker, welche über ihn berichten, sehr verdächtig erscheinen. Ihre Parteilichkeit zu seinen Gunsten ist leicht erklärlich, denn man darf nicht aus dem Auge verlieren, daß seine illegitimen, aber direkten Nachkommen über Ägypten geherrscht haben und daß es im Interesse dieser Historiker lag, seine Mutter sowie seinen Bruder und seinen Neffen Alexander II., mit denen er stets in Fehde gewesen, als wahre Schmeichler hinzustellen, um auf diese Art seinem Sohne Antiochus zu schmeicheln. Bei dieser Gelegenheit ziehen wir abermals Gutschmid's Erklärungen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. 8. 246, Taf. LIV, Fig. 15 u. 16.

denjenigen Viscontis und Mahaffys vor. Visconti sagt uns, daß Lathyros seine beiden Frauen zärtlich geliebt habe. Er ist von der Sanftmut und Güte seines Charakters überzeugt.

Mahaffy, dem es an den Tugenden Philometers gelegen, vergleicht seinen Neffen mit ihm, er sagt von Lathyros, daß er ebenso liebenswürdig wie sein Oheim gewesen und daß ihm jedwede Grausamkeit fremd war; er wüßte dank seiner gesellschaftlichen Zuvorkommenheit politische Schwierigkeiten zu vermeiden, was ihn nicht hinderte, seine Feinde nötigenfalls mit dem Schwert in der Hand zu bekämpfen<sup>1)</sup>.

Der Umstand, daß ihn Plutarch mit seinem nichtswürdigen Sohne Auletes verwechseln konnte, spricht auch nicht für ihn<sup>2)</sup>.

Gutschmid fügt hinzu: „Es ist also kein Grund da, dem Porphyrios zu mißtrauen, wenn er versichert, Lathyros habe grausam regiert, die Vertrauten seines Vaters und seiner Mutter umgebracht, und aus diesem Grunde habe sich letztere gegen ihn gewandt. Dem Porphyrios standen anerkannt vortreffliche Quellen zu Gebote, während Pausanias der Darstellung der Athener folgte, die ihrem „Wohltäter“ Lathyros und seiner Tochter Berenike ehrene Bildsäulen vor dem Odeion errichtet hatten<sup>3)</sup>. Wir werden in der Folge sehen, wie wenig diese letztere Fürstin einer solchen Auszeichnung würdig war.“

#### Ptolemäus XI. Alexander I.

Physkons jüngerer Sohn gleicht in gewisser Hinsicht seinem Vater. Das Nationalmuseum von Neapel besitzt eine sehr schöne Bronzestatuette dieses Fürsten (Tafel XII). Die Stirn ist diejenige der Ptolemäer, die Augenbrauenwülste haben den makedonischen Charakter, die Nase gleicht der Physkons, der Mund ist regelmäßig, das Kinn kräftig, das Antlitz weniger voll als dasjenige seines Vaters; der Blick ist unstät und der Ausdruck des Antlitzes ein gedrückter, man möchte fast sagen ein leidender. Svoronos veröffentlicht mehrere Münzbilder dieses Königs, die der Büste von Neapel gleichen; auf den-

<sup>1)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 424.

<sup>2)</sup> Gutschmid bei Sharpe, loc. cit., 2. Bd., S. 4, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Gutschmid bei Sharpe, loc. cit., 2. Bd., S. 4, Anm. 1.

selben sind wie gewöhnlich die charakteristischen Züge stark markiert. Augenbrauenwülste und Kinn treten mächtig hervor und bekrunden die makedonische, speziell lagidische Abstammung (Fig. 33)<sup>1)</sup>.

Dieser Fürst war ebenfalls von einer außerordentlichen Korpulenz. Wir lesen bei Athenäus, der sich auf Posidonius stützt, „daß er sehr fett war“.

Es scheint keinem Zweifel unterworfen, daß der erste Ptolemäus einen Hang zur Bileitichtheit besaß, sonst hätte die von Berenike übermittelte Fettsucht nicht ein Familiencharakter werden können. Der feiste Magas<sup>2)</sup> ist uns ein Beweis dafür, daß jene Belastung von Berenikes erstem Gemahl herstamme.

Wie die habshurger Lippe pflanzte sich dieses Übel in der männlichen Linie mit seltenen Ausnahmen von Generation zu Generation fort und erreichte bei Physkon und dessen Söhnen seinen Höhepunkt.

Wir wissen nur wenig über die Sinnesart Alexanders I., denn den Berichten der patentierten Historiker ist nicht viel Glauben beizumessen. War er wirklich der Mörder seiner Mutter, wie aus der Vergleichung von Porphyrios und Trogus hervorgeht<sup>3)</sup> und wie es Athenäus bestätigt<sup>4)</sup>, oder beabsichtigte Kleopatra III. ihren Sohn aus der Welt zu schaffen und kam ihr dieser zuvor<sup>5)</sup>?

Die plötzliche Wut der Alexandriner gegen den Muttermörder scheint mir ganz unerklärlich.

<sup>1)</sup> Viscontis Atlas enthält ein Münzbild Alexanders I., auf welchem er mit dem Elefantentell auf dem Haupte dargestellt ist. Wir sind der Ansicht Eckhels, der zurzeit einen Frankenkopf darin erkannte, nämlich denjenigen der Kleopatra Kokke. Dies erklärt das Elefantentell, welches bekanntlich das Abzeichen der Stadt Alexandrien war. (Visconti, loc. cit. S. 252 bis 253, Taf. LIV, Nr. 18.)

<sup>2)</sup> Athenäus XII.

<sup>3)</sup> Gutschmid bei Sharpe, loc. cit., 2. Bd., S. 9, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Athenäus, XII.

<sup>5)</sup> Sharpe, loc. cit. II, S. 8 u. 9.

Fig. 33.



Ptolemäus XI. Alexander I.  
Silbermünze (?).  
(Corpus Svoronos.)

Wenn Kleopatra III. wirklich ein so schändliches Weib gewesen wäre, wie es gewisse Historiker erzählen, so hätte sie nicht durch fast ein halbes Jahrhundert die Herrschaft behaupten können. Die tugendhaften Alexandriner hätten früher oft Gelegenheit gehabt, ihre Entrüstung über Mutttermord zu äußern. Unter allen Umständen waren die Alexandriner aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. weniger verdorben und verworfen als diejenigen zur Zeit Alexanders I. In diesem Falle scheinen die Berichte der Historiker verdächtig, denn es lag in ihrem Interesse, Alexander und seine Mutter anzuschwärzen, um Ptolemäus XIII., dem natürlichen Sohne des Lathyros, zu schmeicheln. Auf alle Fälle scheint dieser König träge, fahrlässig, sinnlich und übermäßigen Tafelfreuden ergeben gewesen zu sein, aber er war weder schlechter als sein Vater, noch schwächer als sein Bruder. Sharpe's<sup>1)</sup> Urteil dünkt uns viel zu streng. Der englische Historiker sagt: „Mögen auch andere mehrerer Verbrechen sich schuldig gemacht haben, so hatte doch Alexander die wenigsten guten Eigenschaften von allen Mitgliedern der Lagidenfamilie.“

Der Umstand, daß nach Gutschmid dieser König den goldenen Sarg seines großen Namenvetters, dessen Kopfputz er auf seinen Münzen annahm, hatte einschmelzen lassen, wäre der modernen Weltanschauung würdig und beweist, daß er keinerlei Vorurteil besaß.

#### Ptolemäus Apion.

Physkon hatte mit einer Maitresse namens Irene (?) einen natürlichen Sohn gezeugt. Dieser Ptolemäus Apion, so benannt, weil er ebenso mager wie sein Vater dick war, erhält von Physkon das Königreich Kyrene, welches er bei seinem Tode den Römern testamentarisch vermachte. In Viscontis Atlas befindet sich eine Kupfermünze dieses Königs abgebildet; er hat ein hageres Antlitz, das mit seiner Habichtsnase an seine syrischen Vorfahren erinnert. Auf der Bildseite lesen wir *BALIAESZ PTOAEMAIΟΥ* und auf der Rückseite erblicken wir ein Silphiumreis mit der Umschrift *KOINKY*<sup>2)</sup>. Diese letztere Abkürzung beweist,

<sup>1)</sup> Gutschmid bei Sharpe, *Id.* II, S. 10.

<sup>2)</sup> Visconti, *loc. cit.*, Bd. III, S. 317, Taf. LVII, Nr. 17.

daß diese Münze in Kyrene geprägt worden ist, was übrigens auch die Ammonshörner, welche den Kopf des Königs schmücken, bestätigen.

#### Ptolemäus XIII. Auletos.

Es erübrigt uns, den physischen Typus des Auletes, sowie denjenigen seiner illegitimen Kinder, Kleopatra VII. und Ptolemäus XIV. näher zu betrachten, da wir von Ptolemäus XV., dem jüngsten Bruder der Kleopatra, keine Abbildung besitzen. Wir bemerken sofort, daß auf der Abhentafel des Auletes die Lagiden nur auf einer Hälfte verzeichnet sind, auf derjenigen der Kleopatra nehmen sie dagegen nur den vierten Teil ein.

In Stuart Pooles vortrefflichem Werke erblicken wir eine Porträtmünze des Auletes, der auch den Titel *Neos Dionisos* führte, welche in Askalon geprägt wurde. Auletes' Gesichtszüge sind hochinteressant, denn sie haben ein ausgesprochen syrisches Gepräge. Die starke Habichtsnase erinnert lebhaft an diejenige Antiochos' VIII. Grypus, der, wie wir wissen, ein Sohn der Kleopatra Thea gewesen war. Die Stirn des Auletes hat nichts vom Adel derjenigen der Ptolemäer, dagegen hat sein hervorspringendes Kinn einen echt lagidischen Ausdruck. Mit Lathyros' minderbürtiger Gattin hört die Inzucht im Hause der Lagiden auf und es genügt, einen Blick auf die Porträtmünzen des Auletes zu werfen, um sich von dieser Tatsache zu überzeugen (Fig. 34). In Viscontis Atlas befinden sich ebenfalls zwei Münzen, welche er dem



Fig. 34.

Auletes zuschreibt, die aber als unbestimmt betrachtet werden müssen, seitdem man diejenige von Askalon kennt<sup>1)</sup>.

Unter allen Lagiden war wohl Ptolemäus XIII., Auletes, d. h. der Flötenspieler, derjenige, welcher am wenigsten verurteilt wurde. Die Frucht einer illegitimen Ehe seines Vaters mit einer unbekanntem minderbürtigen Frau, erbte er die ägyptische Königskrone, auf welche er gar

<sup>1)</sup> Visconti, *loc. cit.*, Bd. III, S. 257, Taf. LIV, Nr. 19 u. 20.

Ptolemäus XIII.  
Auletes. Münze aus  
Askalon. (Brit. Mus.)  
— (R. St. Poole,  
Taf. XXXI, 4.)

kein Recht besaß und die er sich dank seiner Bestechungen nach der Ermordung Berenikes III. und Alexanders II. zu sichern wußte. Es gelang ihm, über Ägypten zu herrschen, während sein älterer Bruder sich mit Cypern begnügte und sein Oheim Apion in Kyrene regierte.

Viscontis Meinung gemäß waren Philopator, Physkon und Auletes die schlechtesten Könige, welche in Alexandrien geberrscht hatten. Philopator war der Stumpf sinnigste und der Ausschweifendste, Physkon der Grausamste und Auletes vereinigte mit den Lastern seiner beiden Vorgänger die niedrigsten Sitten <sup>1)</sup>.

Insofern es sich auf Physkon bezieht, wollen wir gegen Viscontis Urteil Berufung einlegen, aber für Philopator und Auletes ist es ganz zutreffend. Vielleicht könnte man an die Stelle Physkons seinen Vater Epiphanes setzen.

Auletes war falsch, schlecht, grausam, feige, stets bereit, andere zu bestechen, geldgierig, ausschweifend und in jeder Beziehung ein nichtswürdiger, verworfener Mensch. Was seine guten Eigenschaften anbetrifft, so snoben wir in der Geschichte vergebens nach ihnen, obwohl fast alle Historiker jener Zeit in seinem Solde standen. Seine Falschheit äußert sich in allen seinen Handlungen. Er täuscht sein Volk und versucht die Römer zu hintergehen. Seine Grausamkeit ämfort sich bei jeder Gelegenheit; er läßt ohne Bedenken seine Feinde sowie seine eigene Tochter ermorden. Letztere war übrigens ihres Vaters würdig. Seine Ausschweifung war von der niedrigsten Art und seine Verkommenheit so groß, daß er sich nicht schente, in der Gesellschaft von Histrionen und Dirnen auf den Brettern zu erscheinen. Sein Bruder, welcher auf Cypern herrschte, hatte ein würdigeres Benehmen. Da ihn sein Geiz daran gehindert hatte, dieselben Mittel wie Auletes anzuwenden, um sein Reich zu bewahren, so bemächtigten sich die Römer desselben, aber der König besaß Mut genug, sich vor ihrer Ankunft den Tod zu geben.

Auletes, welcher dem lächerlichsten Aberglauben ergeben war, liebte so sehr den Genuß des Weines, daß unter seiner Regierung die

Mäßigkeit für ein Verbrechen galt. Trotz seiner absehnlichen Laster besaß dieser Fürst ein gewisses politisches Verständnis, denn während seines Aufenthaltes in Rom legte er sich sofort Reehenschaft ab von den Zwigigkeiten, die unter den Regierenden jener Republik herrschten, und verstand es, dieselben sowie die Bestechlichkeit der Senatoren zu seinen Gunsten auszunützen. Infolge unerhörter Erpressungen wurde er aus Ägypten vertrieben; Pompejus, den er zu gewinnen wußte, ließ ihn durch einen gewissen Aulus Gabinus, der dem Könige bedeutende Geldsummen geliehen hatte, wieder einsetzen. Um seine Schuld zu tilgen, vertraute Auletes diesem Römer die Verwaltung seiner Finanzen an, doch Aulus Gabinus bedrückte die Alexandriner so stark, daß sie sich empörten und der König sich gezwungen sah, ihn ins Gefängnis werfen zu lassen, um ihn vor der Wut des Pöbels zu schützen. Als die Alexandriner Miene machten, das Gefängnis zu erstürmen, ließ der König ihn heimlich entfliehen. Auf diese Art gelang es ihm, sich eines lästigen Gläubigers zu entledigen. Wahrscheinlich hatte Auletes selbst die Empörung angestiftet.

Mahaffys Urteil über Auletes ist charakteristisch: „Träge, ohne jeglichen persönlichen Wert, ausschweifenden Gelagen zu Ehren des Dionysos fröhend, setzte er sich so herunter, daß er mit seiner Flöte an öffentlichen Wettstreiten teilnahm. Wenn man Cicero Glauben schenkt, so konnte Auletes unter dem Drange der Not von leksamer Sinnesart und überzeugender Beredsamkeit sein, stets geneigt, einflußreichen und reiehen Männern Versprechungen zu machen, aber tyrannisch, grausam und erbarmungslos, sobald er die Gewalt in Händen hatte. Ein Menschenleben galt wenig in seinen Augen, wenn es seine Interessen zu hemmen schien oder ihn auch nur während seiner Vergnügungen störte <sup>2)</sup>.“

Auletes hatte von seiner Schwester, Kleopatra V. Trypbäna, zwei Töchter. Wir wissen fast nichts von der älteren, Kleopatra VI. Trypbäna, die jüngere, Berenike IV., herrschte drei Jahre über Ägypten (58 bis 55), während ihr Vater aus Alexandrien geflohen

<sup>1)</sup> Visconti, loc. cit. III, S. 253 bis 254.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

<sup>2)</sup> Mahaffy, loc. cit. S. 439.

war; sobald der König dank römischer Hilfe sich seines Thrones wieder bemächtigt hätte, ließ er seine Tochter niedermetzeln. Berenike hatte sich zweimal verheiratet: zuvörderst mit dem syrischen Abenteurer Seleukus Kybiosaktas, den sie erdrosseln ließ, hierauf mit Archälaos von Commene.

Eine minderbürtige Gemahlin schenkte dem Auletes vier Kinder, unter diesen Kleopatra VII., der die Geschichte den Beinamen „der Großen“ verlieh.

#### Kleopatra VII. und ihre beiden Brüder.

Von den vier Kindern des Auletes und seiner minderbürtigen Gattin hat uns die Geschichte nur über zwei näher unterrichtet. Nach dem Testament seines Vaters sollte Ptolemäus XIV. die Krone mit seiner Schwester Kleopatra VII. teilen, sobald er das Alter erreicht hätte, sie zu heiraten. Wir kennen den physischen Typus dieses Königs dank einer Porträtmünze aus Askalon, die sich im britischen Museum befindet. Er gleicht außerordentlich seinem

Fig. 35.



Ptolemäus XIV.  
Münze aus Askalon.  
(Britisches Mus.) —  
(R. St. Poole, Taf. XXXI, 5.)

Vater, nur sind seine Züge feiner, ich möchte sagen verwehlichter (Fig. 35). Wir sehen bei ihm dieselbe stolz geformte syrische Nase, dasselbe mächtige lagidische Kinn. Die physische Ähnlichkeit mit dem ersten Ptolemäer ist fast gänzlich verschwunden, um so überraschender gleicht der Kopf demjenigen der syrischen Könige Antiochus VII., Antiochus XIII. und Seleukus VII. Von den bei Visconti publizierten und von Gutsehmid besprochenen Münzen dieses Königs sehen wir ganz ab.

Kaum den Kinderschuhen entwachsen, offenbarte dieser Fürst die Undankbarkeit, Grausamkeit und Falschheit seiner Sinnesart. Dieses Scheusal besaß keine guten Eigenschaften. Er ließ Pompejus, der sich nach der Schlacht bei Pharsalus im Vertrauen auf die großmütigen Gefühle eines Fürsten, dessen Vater er sich so oft verpflichtet, nach Ägypten geflüchtet hatte, er-morden, nachdem dieser sich kaum ausgesöhnt, und sandte das vom Rumpfe getrennte Haupt

an Julius Cäsar in der Hoffnung, auf diese Art dessen Gunst zu gewinnen. Da er sich hierauf seiner Schwester Kleopatra gewaltsam entledigen wollte, floh diese nach Pelmisim. Von Cäsar besiegt, wollte er sich scheinbar mit seiner Schwester versöhnen, wandte sich aber plötzlich entgegen seinen feierlichen Versicherungen wider die Römer und bedrohte an der Spitze der Söldlinge Cäsars Stellung im alexadrinischen Hafen. Doch abermals wurde er besiegt und ging darauf in den Wellen des Nils zugrunde. Sein Leichnam, an der goldenen Küstung kenntlich, wurde später herausgefischt. Trotz seiner Grausamkeit und Tücke kann man diesem jungen Manne — er war bei seinem Tode kaum 14 Jahre alt — eine gewisse stolze Willenskraft nicht absprechen.

Die Bildnisse Kleopatras VII., der berühmtesten unter den ägyptischen Königinnen, sind zahlreich vorhanden. Wir besitzen Büsten, geschnittene Steine und sehr viele Münzen von ihr. Vor allem sei bemerkt, daß, nach den Münzbildern zu urteilen, die, wenn auch lakuf von schlechter Prägung, sich doch alle untereinander gleichen, diese Königin durchaus kein klassisch schönes Antlitz besaß. Sie war ohne Zweifel schön gebaut, und wir räumen gern ein, daß ihre ganze Persönlichkeit einen unwiderstehlichen Reiz ausströmte, aber ihr hartes und intelligentes Münzprofil hat nichts Bestehendes. Wir erblicken eine mächtige Stirn mit hervorragenden Augenbrauenwülsten, ein tieflegendes Auge mit hartem Blick, einen sinnlichen Mund, einkräftiges Kinn, eine verhältnismäßig große Hahnen Nase, welche an diejenige der letzten syrischen Dynasten Demetrius III. und Antiochus XII. mahnt. Bei keiner anderen Königin, selbst nicht bei Kleopatra III. Kokke, sehen wir die

Fig. 36.



Kleopatra VII.  
Kupfermünze. (Britisches  
Museum.) —  
(R. St. Poole, Taf. XXX, 7.)

syrische Nase so scharf ausgeprägt als bei dieser letzten Fürstin ihres Hauses, sie sieht diesbezüglich ihrem Vater Auletes auffallend ähnlich. Die Münzen aus dem britischen Museum, sowie die Tetradrachmen aus Askalon aus der Sammlung



Kollin und Feuardent, sowie ein Tetradrachmon aus Syrien, aus der Sammlung Imhoof-Blumers bieten alle dasselbe charakteristische Münzporträt (Fig. 36, 37 n. 38). Unter allen Bildnissen dieser Königin ziehe ich dasjenige

Fig. 37.



Kleopatra VII.

Tetradrachmon aus Askalon. Aus der Sammlung Kollin und Feuardent in Paris. (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 14.)

aus Askalon vor, denn wenn auch nicht von der Schönheit der Züge gesprochen werden kann, so sind sie doch von Willenskraft und hoher Intelligenz beseelt. Im Corpus Svoronos finden wir ebenfalls zahlreiche Münzen der Kleopatra,

Fig. 38.



Kleopatra VII.

Tetradrachmon aus Syrien (?). (Imhoof-Blumer, Taf. VIII, 15.)

und das britische Museum besitzt eine ganz eigentümliche Kupfermünze aus Cypern, auf welcher die Königin mit Ptolemäus XVI. Cäsarion als Eros abgebildet ist (Fig. 39). Die Züge sind immer dieselben.

Das Pariser Münzekabinett enthält einen modernen Cameo<sup>1)</sup>, welcher gar keinen ikono-

<sup>1)</sup> Cléopâtre. Buste de face; les cheveux, partagés sur le front, recouvrent les tempes; sur la tête, un

graphischen Wert besitzt (Fig. 40); hingegen bieten zwei Werke der alten Bildhauerkunst ein gewisses Interesse.

Die Büste des Nationalmuseums von Neapel vergegenwärtigt uns eine sehr jugendliche, vielleicht 14 Jahre alte (?) Kleopatra. Sie scheint das Werk eines griechischen Künstlers, der nach der Natur gearbeitet haben dürfte, denn die Sinnlichkeit des Mundes und die Form der Ohren, welche an die ersten Lagiden erinnern, sind von höchst realistischem Effekt (Tafel XII, XIII). Die Züge tragen das Gepräge der Intelligenz und des

Lusters; ohne es zu wollen, denkt man an die Kleopatra, welche in Männerkleidung ihren Gatten Markus Antonius des Nachts in die verrufensten Spelunken Alexandriens begleitete. Eine andere Büste dieser Königin befindet sich im Saale der berühmten Männer des kapitolinischen Museums zu Rom

Burkhardt und nach ihm Bode betrachten sie als das einzige, jedoch ungewisse Porträt Kleopatras, welches uns überkommen. Sie scheint das Werk eines römischen Bildhauers (Taf. XIV). Die weit geöffneten

Augen enthalten einen Augapfel aus Agat, der sinnliche Mund erinnert an denjenigen der Büste von Neapel; die Haartracht ist verschieden und

gleichet der auf der früher besprochenen Münze des britischen Museums. Leider sind auf beiden Büsten die Nasen sehr schlecht wieder

voile qui revient sur les épaules et enveloppe les bras. La poitrine est nue; la main droite tient deux aspics dont les queues sont enroulées autour du poignet. — Travail italien du XVI<sup>e</sup> siècle. Calédoine à deux couches: cendrée et blanche. Hant. 54 mill., larg. 36 mill. (E. Babeloo, loc. cit. p. 317, Pl. LX, Fig. 671.)

Fig. 39.



Kleopatra VII. Cypri-sche Kopfermünze. (Brit. Mus.) — (R. St. Poole, Taf. XXX, 6.)

Fig. 40.



Kleopatra VII. Moderner Cameo aus dem Pariser Münzekabinett.

(E. Babeloo, Taf. LX, 671.)

ersetzt. Die Künstler, die diese Arbeiten ausführten, haben es versäumt, ein Münzporträt der Königin zu Rate zu ziehen. Die Nase der kapitolinischen Kleopatra ist viel zu fein und spitz; auf der Büste von Neapel ist sie zu kurz und nicht genügend gebogen, nähert sich aber mehr der wirklichen Form, besonders wenn man das jugendliche Alter der Fürstin in Betracht zieht.

Wir wollen versuchen, die trockene, aber wahrheitsgetreue Aufzählung der guten und schlechten Eigenschaften der großen Königin zu geben. Kleopatra besaß, wenn sie es wollte, einen liebenswürdigen, heiteren und herlickenden Charakter. Sie war äußerst intelligent, sehr reich an Kenntnissen jeglicher Art und vereinte mit einem überraschenden Scharfblick außerordentlichen Mut und eine ungewöhnliche Seelengröße. Wie aber bei fast allen großen Frauen, deren Lebensbeschreibung wir der Geschichte verdanken, erhielten wir neben glänzenden Lichtpunkten starke Schattenseiten. Kleopatra war ränkesüchtig, falsch, tückisch, grausam und ausschweifend. Sie hiewas den bestechenden Reiz ihres Wesens, indem sie Julius Cäsar und später Markus Antonius zu fesseln wußte. Ihre Begegnung mit Cäsar in Alexandrien ward für beide entscheidend, denn es gelang ihr, seine Liebe zu gewinnen, und ihr Verhältnis mit ihm währte bis zum Tode des großen Feldherrn. Nach Cäsar, so berichtet wenigstens gewisse Historiker, knüpfte sie ein neues Verhältnis mit dem Sohne des großen Pompejus an und vermählte sich schließlich mit dem schwachen und sinnlichen Markus Antonius, den sie mächtig zu fesseln wußte, oheon dessen Frau, Oktavia, jünger war als sie. Wir wissen aus der Beschreibung ihrer Porträtmünzen, daß ihre angebliche Schönheit nicht instande sein konnte, ihre überraschenden Erfolge zu erklären, aber bei näherem Verkehr wirkte sie unwiderstehlich durch den Reiz ihres Wesens und die anregende Art ihres Gespräches. Alles, was sie sagte und tat, trug das Gepräge einer bezaubernden Anmut. Es war ein Vergnügen, den Klang ihrer Stimme zu vernehmen, mit welcher sie, dem Tönwechsel des Saitenspieles gleich, von einer Mundart zur andern überging, ohne jemals eines Dolmetschers zu bedürfen. Sie bekundete ihre Intelligenz

und vielseitigen Kenntnisse durch die lebhafte Unterstützung, welche sie den Wissenschaften angedeihen ließ. Andererseits trugen ihre Pracht, ihr Aufwand und ihr guter Geschmack wesentlich zur Förderung der Künste bei. Während Cäsar sich im Hafen von Alexandrien gegen die Söldlinge Ptolemäus' XIV. verteidigte, verbrante ein Teil der kostbaren Bibliothek, aber Kleopatra erbat sich von Markus Antonius 200 000 Schriftrollen aus Pergamon, wodurch die alexandrinische Manuskriptensammlung noch durch lange Jahrhunderte die erste der Welt blieb. Dem tiefen Eindruck, welchen ihr Tod in Rom verursachte, folgte große Freude, ein Beweis, daß das römische Volk nicht über die hohe Begabung dieser Königin nicht getäuscht und in ihr seine gefährlichste Feindin erblickt hatte. Kleopatras stoischer Tod zeugt zugunsten ihrer Seelengröße und Seelenstärke. Es scheint, als habe sie eine Ahnung davon gehabt, daß nach ihrem Ableben die Dynastie der Lagiden ebenfalls verschwinden würde.

Die Geschichte ist erfüllt von ihren Ränken, ihren Tücken, ihrer Falschheit und Gransamkeit.

Die Ermordung ihrer Schwester Arsinoe IV. dagegen, die ihr einen Augenblick den Thron streitig gemacht und die bei dem Triumph Cäsars in Rom figurirt hatte, sowie die Vergiftung ihres jüngsten Bruders und Gatten Ptolemäus XV. hieten nichts Überraschendes in einer Familie, wo die Ermordung der nächsten Angehörigen eine Gewohnheit, wenn nicht eine Tradition geworden war. Ihre Ausschweifungen äußerten sich während ihres ganzen Lebens und sie fand in Markus Antonius einen würdigen Partner. Ihre Prunksucht und ihre maßlose Verschwendung erreichten ihren Höhepunkt, als sie demselben Markus Antonius die berühmte kostbare Perle, ein Familien-Erbstück, welches Alexander dem Großen gehörte und durch Thais an Ptolemäus I. gekommen war, in Wein aufgelöst zu trinken gab. Die Geschichte dieser Perle mag wahr sein oder nicht, sie paßt ganz gut auf diese makedonische Familie, deren männliche Mitglieder fast alle den Glanz, die Pracht und den Aufwand liebten, und deren Frauen sich so sehr durch die außerordentliche Mannigfaltigkeit ihrer Sinnesart auszeichneten. Es gab unter ihnen sanfte und liebenswürdige,

intelligente und geistreiche, sowie furchtbare und schreckliche, ja sogar eine geniale Königin, welche die Seele einer Dirne besaß.

Wenn Mahaffy uns sagt, die große Kleopatra strafe die Behauptung Lügen, daß Ehen zwischen Blutsverwandten der physischen und psychischen Entwicklung einer Rasse Schaden brächten, so ist das Beispiel schlecht gewählt, denn wie wir oben zu wiederholten Malen gesehen haben, war Kleopatra unter allen Lagiden diejenige, welche am wenigsten Inzuchtblut besaß.

#### Schlußbetrachtungen.

Die Makedonen, ein Volk von kräftigem Schlage, hatten, wie alle niten Völker, keine Abneigung gegen Ehen zwischen Blutsverwandten, denn höchstwahrscheinlich hatten sie keine Ahnung von erblicher Belastung. Während der hundert Jahre, in welchen die Familie der Lagiden gesund blieb, vererbte sich das Herrschertalent von Generation zu Generation wie etwas ganz Natürliches. Die Folgen einer strengen, aber normalen Inzucht offenbarten sich durch eine auffallende physische Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Mitgliedern. Diese Erscheinung steht nicht vereinzelt da, denn sie läßt sich bei den Seleukiden ebenfalls nachweisen. Reibmayr sagt uns, daß bei den Inzuchtsfamilien die geschlechtliche Reproduktionskraft abnimmt und die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens sich vergrößert, sowie die Gefahr, das Opfer erblicher Krankheiten zu werden und auf diese Art physisch und geistig zu verkommen. Reichthum und Luxus steigern den Verfall und die Familien sterben in ihren männlichen Abkömmlingen aus<sup>1)</sup>.

Ganz kürzlich schrieb ein bekannter französischer Rommschriftsteller, der sich ebenfalls als genialer Soziologe erweisen: „Wir gehören einer Rasse an, ohne es zu wissen, wir besitzen überkommene Instinkte, bevor wir sie kennen, d. h. wir besitzen die unumstößlichen Merkmale unserer Herkunft; wir sind weiter nichts als eine Fortsetzung, eine Verlängerung der vorangegangenen Geschlechter“<sup>2)</sup>. Die Feststellung dieser Tatsache trägt am meisten zur Differenzierung der Rassen untereinander bei und

veranlaßt die Ungleichheit der Menscherrassen, welche heute für jeden wahren Anthropologen außer Zweifel erscheint.

Von diesem neuen Standpunkte aus betrachtet, verändert sich der Geist der Geschichte der Menschheit vollständig und die Geschichte, wie sie bisher betrieben, erscheint eine mnemotechnische Übung oder tendenziöser Klatsch.

Man braucht nicht Darwinianer oder Kriminalist von Beruf zu sein, um sich von dieser Wahrheit zu überzeugen; es genügt, ernstliche genealogische Forschungen angestellt zu haben, welche uns auf dem Gebiete der Psychologie überraschende Aufschlüsse liefern. Wenn wir dem Studium der Lagiden fast zwei Jahre gewidmet haben, so geschah dies durchaus nicht in der Absicht, den Fatalismus der Muselmanen zu verherrlichen. Wenn wir die ursprüngliche Wichtigkeit der Vererbung einräumen, so müssen wir andererseits zugeben, daß ihre Gesetze noch in tiefes Dunkel gehüllt sind, wie Virchow bemerkt hat, und daß ihre Folgen durch verschiedene Einwirkungen beeinflußt werden.

Die wichtigsten dieser Erscheinungen sind die Ahnenverluste, die allen Arten eigene Variabilität und der Atavismus<sup>3)</sup>. Die Gesetze, welche den Atavismus leiten, sind uns unbekannt, nichtsdestoweniger sind wir täglich instande, sein Wirken zu beobachten. Ohne den Atavismus wären wir nicht in der Lage, eine große Zahl von somatischen und physischen Erscheinungen zu deuten, die wir bei einzelnen Individuen beobachten, denn das Studium der bekannten Ahnen bleibt uns die Antwort darauf schuldig.

Selbstverständlich trägt die ungenügende Kenntnis, welche wir von der Ahnentafel der meisten Individuen haben, dazu bei, diese Forschungen zu erschweren<sup>4)</sup>. Ohne die Kenntnis

<sup>1)</sup> Deniker bemerkt ganz richtig: „Die Variabilität ist die Reproduktion des Unähnlichen, während die Erbllichkeit die Fortpflanzung des Ähnlichen ist. (Deniker, loc. cit. S. 11.)“

<sup>2)</sup> Ein junger deutscher Mediziner, Dr. Alfred Waldenburg, hat vor kurzem eine sehr verdienstvolle Arbeit „über das leopcephale blonde Rassen-element unter Halligfriesen und jüdischen Taubstummen“ (Berlin 1902) veröffentlicht. Während eines mehrmonatigen Aufenthaltes auf vereinigten Inseln hat er Stammbäume in großer Zahl zusammengestellt. Es ist zu bedauern, daß er es nicht vorzog, Ahnentafeln zu verzeichnen.

<sup>1)</sup> Reibmayr, loc. cit. S. 248 ff.

<sup>2)</sup> Bourget, L'Étape 1903.

der Ahnentafel wäre uns wahrscheinlich die frappante Ähnlichkeit des Herzogs von Nemours mit seinem Ahnherrn Heinrich IV. niemals aufgefallen und ohne die jüngsten genealogischen Forschungen wüßten wir heute noch nicht, daß die den Medicis übertragene Habsburger Lippe von einer fast unbekanntem Prinzessin von Masovien her stammt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Beziehungen zwischen Verwandten in direkter Linie eine materielle Kontinuität bilden, aber wie de Lapouge sagt, „nie eine Kombination, sondern ein Mosaik, eine Vermischung wie die Haare eines scheckigen Kaninchens“. Wenn man dem Gesetze Galtons Glauben schenkt, so verteilt sich die jedem Individuum überkommene Vererbungsmasse in vier gleiche Teile: Vater, Mutter, väterliche und mütterliche Ahnen. Wir fügen dem noch hinzu, daß Lorenz für das quantitative Übergewicht der männlichen Ahnen eintritt, was uns aber keinen Aufschluß über das qualitative Übergewicht gibt. Unter allen Umständen wissen wir noch immer nicht, warum die verschiedenen menschlichen Mosaiken unter den Individuen desselben Stammes so viele Ähnlichkeiten bieten und ebenso oft so viele Unterschiede.

Was die Übertragungsfähigkeit der erworbenen Charaktere anbelangt, so wird sie von Weismann, de Lapouge und anderen fast absolut bestritten. Sie besteht jedoch beständig bei den Tieren. Vielleicht ist sie weit seltener beim Menschen, der auf der Höhe seiner geistigen Entwicklung angelangt, gewöhnlich nicht mehr in solche Zustände ist, zu zeugen.

Jedermann ist darüber einig, den Einfluß der Variabilität auf die Gesetze der Vererbung anzuerkennen, aber obschon die Tatsache an und für sich gewiß ist, so ist sie noch in geringem Maße aufgeklärt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Variabilität bestimmten Gesetzen unterworfen ist, doch bis jetzt haben wir von der Beschaffenheit dieser Gesetze kaum eine Ahnung, wie dies de Lapouge richtig bemerkt<sup>1)</sup>.

Es erübrigt uns, den physischen und psychischen Einfluß zu untersuchen, welchen der Ahnenverlust ausübt. Dieser Einfluß ist ein

bedeutender. Der Ahnenverlust erhöht zuvörderst die Wirkungen der Inzucht, andererseits verleiht er den physischen und psychischen Charakteren eine ganz besondere Intensität, die von jenen Ahnen übermittleit wurden, deren Namen auf den Ahnentafeln wiederholt vorkommen und numerisch unter den bekannten Ahnen die bedeutendsten Verluste veranlaßt haben.

Wenn uns die Ahnentafeln des Philopator und des Epiphanes ohne Interesse erscheinen, so erklärt sich das dadurch, daß wir die Verfahren des Seleukus Nikator und des Spithridates nur höchst unvollkommen kennen. Andererseits scheint das Blut des Jollas, dessen unheilbringende Wirkungen wir bei Antipators Sohn Kassander und bei Philadelphus' Halbbruder Kerannus zu beobachten imstande sind, auf die Charaktere des Philopator und Epiphanes einen bedeutenden Einfluß ausgeübt zu haben und erklärt uns hinlänglich die moralische Verkommenheit dieser beiden Fürsten. Es ist dies ein merkwürdiges Beispiel jener kollateralen Vererbung, deren Vorkommen „auf einen gemeinsamen, höher hinaufreichenden Vorfahren zurückweisen“<sup>2)</sup>.

Wenn wir uns von der sonderbaren Zusammensetzung des Charakters Physkons Rechenschaft ablegen wollen, so wird uns die Wahl nicht schwer. Wir begegnen bei diesem König der Beileibtheit der ersten Ptolemäer, die bei ihm sowie einst bei einem seiner Ahnen, Magas, zur Fettleibigkeit geworden ist.

Bei diesem Fürsten finden wir die Züge seines Urgroßvaters Energetes, dem er seinen Beinamen erborbt, als Fratze wieder. Wenn Physkon gleichzeitig die kalte Grausamkeit Kassanders, die Tücke des Lysimachus und den Wankelmuth Antiochus' III. mit dem Hang seines Vaters und Großvaters zur Ausschweifung vereinigte, so wurden alle diese Laster durch einen tiefen politischen Geist abgeschwächt, den er von seinem Altvater Ptolemäus I. geerbt hatte. Es gibt Historiker, welche behaupten, daß übertriebene Inzucht nichtsdestoweniger in solche Zustände ist, eine physisch so vollkommene und geistig so bemerkenswerte Erscheinung wie die-

<sup>1)</sup> de Lapouge, L'Aryen, loc. cit. S. 54.

<sup>2)</sup> Woltmann, Politische Anthropologie, loc. cit. S. 25.

jenige der letzten Kleopatra hervorzuhängen. Dies ist eine falsche Behauptung, welche vom Studium der wissenschaftlichen Genealogie Lügen gestraft wird, wie wir es oben gezeigt. Die Lagiden huldigten der Inzucht in demselben Maße wie die Seleniden.

Was die Dauer eines Geschlechts anbelangt, so üben Geschwisterehen nur einen unbedeutenden Einfluß auf dieselbe aus. Unter den sechs Geschwisterehen der Ptolemäer<sup>1)</sup> lieferte nur diejenige des Philopator mit seiner Schwester Arsinoë III. einen Sprößling, welcher faktisch regierte. Natürlich ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß Ptolemäus VII. Eupator, Memphites und Ptolemäus IX. Neos Philopator Kinder erzeugt hätten, wenn man ihnen die Zeit zu leben vergönnt haben würde.

Zu welchen Schlüssen berechtigen uns die Untersuchungen über die physischen und psychischen Charaktere der Lagiden? Die Antwort läßt sich in einigen Schlußfolgerungen zusammenfassen, die wir als wissenschaftlich erwiesen betrachten dürfen.

Die Inzucht, welche anfänglich für jede normale Entwicklung einer Rasse unumgänglich nötig ist, hat in ihrem Übermaße die Erschlaffung, den Stillstand, die Erstarrung derselben Rasse und schließlich eine physische und psychische Verkümmern und Entartung zur Folge. Die Eigenschaften werden zu Fehlern und die Fehler zu Lastern. Die Auslese zugunsten der Besten, wie sie anfänglich bestand, wirkt in umgekehrter Richtung. Wir sind in der Lage, diese Erscheinung bei den Lagiden, welche eng Inzuchterehen entsprossen sind, zu konstatieren. Wir wohnen dem Höhepunkt des Glanzes dieser nach Ägypten verpflanzten makedonischen Rasse bei, die sogar ihre Muttersprache vergessen hatte: Philadelphus und Euergetes folgen den ruhmreichen Spuren Soters und Berenikes I.; Arsinoë II. und Berenike II. machen dem makedonischen Blute, dem sie entstammen, Ehre. Doch schon in der dritten

Generation verändert sich dieses lachende Bild, und wir befinden uns plötzlich in Gegenwart des stumpfsinnigsten aller Ptolemäer. Der aufsteigende Gang der durch strenge Inzucht bedingten Ansehe hält plötzlich inne und zwei allem Anschein nach körperlich gesunde und geistig vollkommene Wesen zeugen einen Sohn, bei dem alle guten Eigenschaften verschwinden und alle Fehler an Intensität zunehmen, der „aus der Art schlägt“, obschon er physisch seinen Ahnen gleicht. Bei diesem Sohne haben sich die Eigenschaften der Eltern in Laster umgewandelt. Diese Umwandlung läßt sich nur durch die Amphimixis erklären; die Einflüsse von Jollas<sup>2)</sup> und Lysimachus<sup>3)</sup> Blute erlangen durch kollaterale Vererbung das Übergewicht und bei dem Sprößling der Geschwisterehe des Philopator, bei Epiphanes, gewahren wir die vollständige Entfaltung aller von Keraunus und Kassander überkommenen Laster. Nur fehlt den ererbten Lastern dieses Fürsten, der, nach seinen Münzbildern zu schließen, körperlich von auffallender Schönheit war, die schreckliche Größe, welche die furchtbaren Abhären ihren Gräueltaten zu verleihen wußten. Während Kassander und Keraunus an die Atriden mahnen, erinnert der Hof des Epiphanes an die Maitressenwirtschaft Ludwigs XV., die sich in einem Palast in Alexandrien mit Hofnarren, stummen Leihwächtern und Versehnittenen abspielt. Da brachte Kleopatra Syra frischen Saft in den bis aufs Mark verfallenen Stamm<sup>4)</sup>. Diese neuen Blutwellen beleben die fast erloschene Intelligenz, obschon plötzlich eine physische Verkommenheit mit großem Nachdruck auftritt. Soters Hang zur Beilichtheit wird zu einer fast ekelerregenden Fettleichigkeit. Physkon wird ein Gegenstand des Spottes für den ihn besuchenden Römer und sein Sohn Alexander wird von den alexandrinischen Philosophen erbarmungslos verhöhnt. Auch diese Belastung läßt sich auf kollateralen

<sup>1)</sup> Geschwisterehen:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Philopator | Arsinoë III.           |
| Philometor | Kleopatra II.          |
| Physkon    | Kleopatra II.          |
| Lathyros   | Kleopatra IV.          |
| Lathyros   | Kleopatra Selena.      |
| Auletes    | Kleopatra V. Tryphäna. |

<sup>2)</sup> In dieser Hinsicht teilen wir Stracks Anschauung nicht und pflichten vielmehr Mahaffy bei, der da sagt: „She certainly introduced new blood into a stock likely to degenerate from the constant unions of close blood relation“ (Mahaffy, loc. cit. S. 370), denn es handelt sich hier nicht um das syrische Inzuchtblut, sondern vielmehr um dasjenige des Geschlechtes der Mithridaten.

Einfluß zurückführen, denn wir wissen, daß schon bei Beginn der Dynastie Magas, der Halbbruder des Philadelphus, in seinem Fette fast erstücte.

Philometor und Lathyros, von denen ersterer dieser physischen Belastung entging, scheinen einige gute Keime ererbt zu haben. Jene sehr schwachen Keime sind ihnen vom großen Ahnherrn Soter überkommen, dessen Bildnis sie auf ihre Münzen schlugen, da sie ihm nicht anders gleichen konnten.

Der fettleibige Alexander I. fällt in den Stumpf sinn zurück und sein Sohn Alexander II. erleidet die gerechte Strafe seiner Gräueltat. Auletes endlich, ein ebenso erschreckender als lächerlicher Vorgänger Neros, dessen Ahnentafel zur Hälfte erneut erscheint, verfällt in die widerlichste Verkommenheit, vielleicht ebenso sehr hervorgehoben durch die dem Pöbel entstammenden mütterlichen Ahnen als durch die seines Vaters.

Bei seiner Tochter, der großen Kleopatra, „entbrennt die fast erloschene Leuchte von neuem und sprüht in hellem Glanze“, eine Erscheinung, welche sich nur durch die Wirkungen des Atavismus erklären läßt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Psychologie Kleopatras eine weit kompliziertere ist, als es den Anschein hat. Obschon in den Adern dieser Königin nur eine sehr geringe Menge von Lagidenblut fließt, sind wir erstaunt, bei ihr die Eigenschaften und Laster fast aller Ptolemäer wieder aufleben zu sehen. Sie heßte den gesunden Verstand Soters I., den Geschmack für Luxus und Pracht des Philadelphus, die rätselhafte Natur des Euergetes, den Hang zur Ausschweifung des Philopator, die kalte Grausamkeit des Epiphanes, den klugen politischen Geist des Ptolemäus, die Verworfenheit des Auletes und nebenbei die Anmut der beiden ersten Bereniken, den glänzenden Geist der zweiten Arsinoe, die Tatkraft der ersten Kleopatra, aber auch die gründliche Verderbtheit ihrer Urgroßmutter Kleopatra Kokke. Dank dem Einflusse der Amphimixis begegnen wir bei ihr dem unähnlichen Mute der Seleukiden, der Hartnäckigkeit und der guten Laune der Antigoniden, der Tücke des Lysimachus, der kalten Grausamkeit des Kassander, der

samseligen Selbstvernachlässigung und der sinnlichen Untätigkeit des persischen Blutes von Spithridates, Ariobarzanes und Mithridates. Diese Änderung des Atavismus ist um so überraschender, als der größte Teil von Kleopatras Ahnentafel ein Geheimnis für uns ist.

Wenn wir in der Geschichte der Diadochen und Epigonen Umschau halten, so erblicken wir bei den Zeitgenossen der Lagiden, den Seleukiden, den Antigoniden, dem Geschlechte des Lysimachus, des Antipater und den Molossern das Auftreten derselben Erscheinungen in erhöhtem Maße. Wie eine Pflanze, die nach einer üppigen Blütezeit verkümmert und verwelkt, so gleichen die meisten Abkömmlinge dieser berühmten Geschlechter keineswegs ihren Stammvätern, von denen sie weder die guten Eigenschaften noch die Laster besitzen, denn diese Ahnherren zeigten selbst in ihren Fehlern eine gewisse Größe.

Der Branch der Geschwisterehen war übrigens nicht allen gemein, denn wir suchen vergebens ein Beispiel dafür unter den Antigoniden oder bei der Sippe des Lysimachus<sup>1)</sup>. Hier scheint es am Platze, uns über die Opportunität der Geschwisterehen auszusprechen. Was die angebliche Schädlichkeit der konsanguinen Ehen anbelangt, so ist die Zahl der Ärzte und Fachmänner, welche über diese Frage geschrieben, eine sehr bedeutende. Mantegazza, welcher im Jahre 1868 eine Studie über diesen Gegenstand veröffentlichte<sup>2)</sup>, führt eine große Zahl derjenigen an, die sich für oder wider derartige Bündnisse aussprachen. Unter den 61 Namen der Gegner lesen wir diejenigen großer Schriftsteller, wie Josef de Majstre, berühmte Ärzte wie Trousseau, Aubé, Ollier, großer Naturforscher wie Buffon, Carl und Georg Darwin usw. Mantegazza selbst gehört zu diesen Geg-

<sup>1)</sup> Unter allen Umständen huldigten diesem Gebrauche die Ägypter. Strack schreibt diesbezüglich: Galt doch den Ägyptern eine Heirat unter Geschwistern auf Grund der glücklichen Ehe zwischen Osiris und Isis für etwas Gutes und Erstrebenswertes, die so häufig in späterer Zeit eingegangen wurde, daß unter Kaiser Commodus zwei Drittel aller Bürger der Stadt Arsinoe ihre Schwester zur Frau hatten. (Strack, loc. cit. S. 80.) Der Perserkönig Kambyzes hatte ebenfalls seine leibliche Schwester geheiratet.

<sup>2)</sup> Mantegazza: Studie su „I Matrimonii consanguinei“, II. edizione accresciuta, Milano 1868.

nern, da er die Heiraten zwischen Blutsverwandten vom Standpunkte der Hygiene aus verwirft. Unter den 16 Verteidigern solcher Ehen lesen wir die Namen Perier, Dally, Sanson, Lagneau, Voisin usw. Unter den Gegnern, deren Meinung Mantegazza wörtlich anführt, äußert sich de Ranke mit großer Vorsicht, und was die statistischen Belege Georg Darwins anbetrifft, so beweisen sie gar nichts. Abgesehen davon, daß man mit statistischen Daten alles beweisen kann, was man will, so muß noch bemerkt werden, daß sie einfachen Wirkungen vorstellen, ohne nach den Ursachen zu forschen. Diese letzteren vermag man nur mit genealogischen Untersuchungen zu ergründen. Mantegazza konnte natürlich die Urteile neuer bedeutender Forscher nicht voraussehen.

Otto Ammon und Reibmayr haben in dieser wichtigen Frage ebenfalls ihre Anschauung geäußert. Ammon sagt: Verwandtschaft der Ehen schränkt die Zahl der in den Kindern möglichen Neukombinationen ein und birgt außerdem die Gefahr, daß beiderseits vorhandene krankhafte Anlagen gesteigert werden<sup>1)</sup>. Was Reibmayr anbelangt, der sich bekanntlich seit Jahren mit genealogischen Studien erfolgreich beschäftigt, so gelangt er zu folgenden Betrachtungen, die besonders bei den Lagiden ihre volle Anwendung findet: „Mit der höheren Zivilisation und deren schädlichen Folgen treten für die wohlhabenden führenden Familien, wie wir gesehen haben, regelmäßig erbliche Nachteile, körperliche und geistige Schwächezustände und erbliche Krankheiten auf, und von diesem Zeitpunkte an müssen konsanguine Ehen anfangen, ihre schädliche Wirkung zu üben, da sich die schädlichen Anlagen gerade wie die vorteilhaften durch solche Ehen steigern. Man kann daher sagen: In gesunden Familien ist die konsanguine Ehe für die Züchtung gewisser Charaktere eher nützlich als schädlich. In Familien mit pathologischer Anlage ist sie stets mehr oder weniger schädlich<sup>2)</sup>.“

Als entschiedener Verteidiger konsanguiner Bündnisse ist in letzterer Zeit Salomon Reinach aufgetreten. Er schreibt: „Wenn man an

unterrichtete Menschen die Frage stellt, warum die Sitten, Gesetzgebungen und Religionen die Blutschande verdammen, so werden neun, wenn nicht alle unter ihnen, antworten: „Weil sie ungesund und schädlich ist“. Diese Antwort ist geradezu eine Albernheit und das aus verschiedenen Gründen. Vor allem ist es durchaus nicht erwiesen, daß die in Blutschande erzeugten Kinder mehr als andere ausgesetzt sind, Trottel, Taubstumme, Rachitiker usw. zu werden; es ist wahr, daß die Verbindung zweier auf gleiche Art belasteter Individuen gewöhnlich Kinder ergibt, bei denen die Belastung erhöht erscheint; ein Schwindsüchtiger, ein Gichtleider, ein Fallsüchtiger usw. soll oder sollte nicht eine Frau heiraten, welche Neigung zur Schwindsucht, zur Gicht oder zur Fallsucht hat. Aber zwei gesunde Individuen, mögen sie Bruder und Schwester sein, können sich ohne Nachteil für die Rasse paaren. Wenn der Gesetzgeber selbst physiologische Gründe vorschützt, um die Blutschande zu verdammen, so geschieht dies nur, weil er mit großem Unrecht wähnt, daß die Mitglieder derselben Familie regelmäßig dieselben Belastungen, dieselben krankhaften Neigungen besitzen. Die Tierzüchter wissen sehr gut, daß dies nicht der Fall ist und begünstigen ohne Bedenken die Blutschande ihrer Pflegebefohlenen<sup>3)</sup>.“

Lagneau drückt sich ebenso bestimmt aus: „Bei Verbindungen muß man die Konsanguinität von der krankhaften Erblichkeit unterscheiden. Die Heiraten zwischen Blutsverwandten können den erzeugten Kindern sehr schädlich werden, wenn die Blutsverwandten mit erblichen Krankheiten behaftet sind. Aber im Gegenteil kann die Konsanguinität vorteilhaft sein, wenn die Blutsverwandten keine krankhaften Neigungen besitzen. Dies wurde seinerzeit von Perier nachgewiesen, als er bei Besprechung einer Thesen zeigte, daß deren Verfasser, Bourgeois, auf seine eigene gesunde und kräftige Familie hinweist, obschon dieselbe nacheinander 16 konsanguine Ehen zwischen Vettern und Basen, Onkeln und Nichten usw. geschlossen, ohne eine Spur erblicher Be-

<sup>1)</sup> S. Reinach: La Prohibition de l'inceste et ses origines. L'Anthropologie, T. 10<sup>e</sup>, 1899, p. 59 et suivantes.

<sup>2)</sup> Otto Ammon bei Reibmayr, loc. cit. S. 249.

<sup>3)</sup> A. Reibmayr, loc. cit. S. 249.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

lastung <sup>1)</sup>.<sup>2)</sup> Voisin hat auf den guten anthropologischen Stand der Bewohner des Fleckens Batz in der Bretagne aufmerksam gemacht, die sich seit Jahrhunderten fast ausschließlich untereinander verheiraten <sup>3)</sup>. Hervé endlich sagt: „Es ist heute eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß die Ehen zwischen Blutsverwandten nicht der Konsanguinität halber schädlich sind und daß infolgedessen sie mit Ausnahme zufälliger Umstände, welche sie zu beeinflussen vermögen, keinerlei nachteilige Wirkungen haben <sup>4)</sup>.“

Aus all diesem ergibt sich, daß die Geschwisterhehen nicht eine Ursache des Verfalles sind, sondern vielmehr eine Wirkung, deren Grund besonders in einer gewissen Trägheit und Furcht des Unbekannten zu suchen ist. Die Verbindung zwischen Blutsverwandten, die körperlich und geistig gesund sind, haben absolut nichts Gefährliches für das Geschlecht, welches sie im Gegenteil nur verbessern. Sobald jedoch einer der beiden Gatten mit einem Erbfehler belastet scheint, verändern sich sofort die Ergebnisse und die physische und psychische Belastung verdoppelt sich in ihrer Intensität. Diese Intensität wirkt natürlich noch stärker, wenn beide Gatten belastet sind. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß bei häufigen Verwandtschaftsbehen die Wirkungen der Inzucht sehr schnell vorwärts schreiten, d. h., daß der Glanzpunkt und der Verfall eines Geschlechts rasch aufeinander folgen. Die Adelphogamic bildet daher in Wirklichkeit weder ein Element der Zerstörung noch ein Element des Aufschwunges, sondern eine verstärkte Erscheinung der Inzucht, die in ihrem verhängnisvollen Gang zweifellos die wohlthätige oder verbessernde Wirkung heraufbeschwört, im Einklang mit der geistigen Befähigung einer Rasse, eines Volkes, einer Familie.

Unserer Anschauung entspricht Holm, wenn er anlässlich der Geschwisterhehen der Lagiden sagt, „daß sie die vielfachen äußeren Nachteile

der Heiraten mit fremden Prinzessinnen zum inneren Schaden der Rasse umging — ein Beweis der Beschränktheit des geistigen Horizonts seiner Naebkommen<sup>5)</sup>. Strack bemerkt ganz richtig, Holm hätte hinzufügen können, daß die vielfachen äußeren Nachteile durch ebensoviele innere Vorteile aufgewogen würden und daß die Macht der Umstände, der persönliche Wille und die Intelligenz des Königs über die Vorteile oder Nachteile einer Verbindung mit einer fremden Prinzessin entschieden, ganz abgesehen von dem Thronrecht, das die überlebende Königin in der zweiten Hälfte der Dynastie hatte. „Ehrgeizige Fürsten wie Dæmetrius Poliorketes und Pyrrhus hatten stets mehrere fremdländische Fürstentöchter zu Frauen, eine Sitte, deren Grund Plutarch in seinem Pyrrhus bezieht <sup>6)</sup>.“

Lorenz gelangt in dem Kapitel über „Bevölkerungsstatistik und Ethnographie“ zu folgenden Schlußfolgerungen:

„Völker- und Stammesmischung ist die Grundlage der großen Revolutionen auf gesellschaftlichen und staatlichen Gebieten. Man darf daraus den Schluß ziehen, daß es gewisse Grenzen gäbe, wo Ahnenvermehrung schädlich und auflösend für Staat und Gesellschaft zu werden droht, Zunahme der Ahnenverluste dagegen als ein rettendes Moment der Verbesserung der Staats- und Gesellschaftszustände erscheinen müßte. Dieses Ergebnis der Betrachtung der Ahnentafel der Menschheit lastet wie ein Schwergewicht und Hemmschuh auf den Ideen des gesellschaftlichen und staatlichen Fortschritts, wie er von manchen Theorien verstanden zu werden pflegt <sup>7)</sup>.“

Was sich auf den Staat und die Gesellschaft anwenden läßt, bezieht sich auch auf die Familie, doch kann andererseits, was die Ahnentafel der Menschheit, einer Rasse oder einer Nation anbetrifft, auf eine Familie keine Anwendung finden, d. h. wenn der Staat zu seiner normalen Entwicklung der Inzucht bedarf, um zu einer höheren Kulturstufe zu gelangen, verhält es sich ganz anders bei Familien, wo übertriebene In-

<sup>1)</sup> Lagneau: Bulletin de la société d'Anthropologie de Paris 1891, p. 514.

<sup>2)</sup> Bei S. Reinach, loc. cit.

<sup>3)</sup> Hervé: Bulletin de la société d'Anthropologie, 1898, p. 314. — Letztere drei Zitate sind dem Aufsätze S. Reinachs entlehnt.

<sup>4)</sup> Holm: Griechische Geschichte 4, 237.

<sup>5)</sup> Strack, loc. cit. S. 89.

<sup>6)</sup> Lorenz, loc. cit. S. 331.





**Berenike I.**  
Neapel, Nationalmuseum, Bronzebüste „Ptolemäus Ägypten“.





**Ptolemäus II. Philadelphus.**  
Steinrelief, Nationalmuseum, Brnozebiaste.



**Ptolemäus II. Philadelphus und Arsinoë II.**  
Weich, Hofmuseum, Camers.



**Berenike II.**  
Neapel, Nationalmuseum, Bronzplast.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II



**St. Peterburg, Eremitage-Museum, Email.**

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig



**Professor X. Lathyros.**  
Naxos, Nationalmuseum, Bronzeplastik.



**Kleopatra VII.**

Neapel, Nationalmuseum, Marmorbüste.



**Ptolemäus XI. Alexander I.**

Neapel, Nationalmuseum, Bronzestätte.

.....

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig



**Kleopatra VII.**  
Sarkoph., Nationalmuseum, Marmorplatte.

Verlag für Anthropologie, N. F. Bd. II



Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.



**Kleopatra VII.**  
Rom, Kapitolin-Museum, Marmorbüste.

zucht in kurzer Frist Stillstand in der Entwicklung und den Verfall der Familie hervorruft.

Haben wir oben festgestellt, daß sich Lorenz bei Berechnung der Ahnen der großen Kleopatras geirrt hat, so hat der deutsche Geschichtsforscher doch vollkommen recht, wenn er behauptet, daß die Ptolemäer uns das sprechendste historische Beispiel der genauen Befolgung der Inzucht liefern.

Nichtsdestoweniger läßt sich in den oberen Generationen einer jeden Ahnentafel zwischen verwandten und fremden Familien eine stetige Vermischung voraussetzen.

Man kann daher mit Recht annehmen, daß die Ahnenverluste stets gewisse Grenzen haben, bei denen angelangt neue Mischungsverhältnisse auftreten und die Ahnenreihen sichtlich zu-

nehmen. Es ist demnach ganz richtig, wenn man mit Lorenz annimmt, daß die römische Legende vom Raub der Sabinerinnen nichts anderes bedeutet als den Zustand eines Volkes, welches durch die Inzucht an Zahl verringert, einen übertriebenen Ahnenverlust durch Aufnahme fremder Elemente sistiert.

Die vorliegende Abhandlung dürfte beweisen, daß allein die genealogischen Forschungen uns gestatten, den Ursprung der physischen und psychischen Eigenschaften und Fehler einer Rasse, eines Volkes, einer Familie sowie die Wirkungen der Inzucht und der Vermischung zu erkennen. Anders gesagt, es ist unmöglich, sich gründlich mit der Anthropologie der Menschenrassen zu beschäftigen, ohne daneben Forschungen auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Genealogie anzustellen.



## V.

# Die Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gufsstätte mit Berücksichtigung der Antimon-Bronzefrage.

Von

Kálmán Freiherr v. Miske.

(Mit 82 Abbildungen im Text.)

Neben der Gruppe von Altsachen aus Zinnbronze findet sich noch eine zweite, die in ihrer Zusammensetzung ein dem Zinn gleichwertiges Metall, das Antimon, führt. Diese Erscheinung ist für die metallurgischen Verhältnisse von Ungarn und für die der ostbaltischen Provinzen zu prähistorischen Zeiten von Bedeutung.

Die Kunde der Bronze, somit die Anregung zur Benutzung derselben als besseres Material für Manufakte, kommt durch Handelsverbindungen, die entweder mittelbar von Volk zu Volk oder durch unmittelbaren Tauschhandel stattfanden, in unser Gebiet. Als Bezugsquelle der Bronze wird Kypros angesetzt.

Es dürfte mit einigem Recht anzunehmen sein, daß jenen Zeiten der Handelsverbindungen eine andere Zeit voranging, in der Ungarn (Siebenbürgen) bereits das Kupfer kannte, es jedoch noch nicht als Metall behandelte, sondern als durch Seblag formbaren Stein zu seinen Zwecken verwandte.

Die Zeit der Handelsverbindungen suchte und fand das Gold, bot hierfür die Bronze zum Tausche und brachte dabei die Kunde der eigentlichen Metallverwendung in unser Gebiet.

Die aufzugs wohl nur von Volk zu Volk sich erstreckenden Handelsverbindungen, somit die indirekte Handelsverbindung zwischen Ky-

pros und Ungarn (Siebenbürgen), mußten sich sicherlich bei steigender Nachfrage nach Gold, mit Benutzung des See- und Donauweges zu direkten umgestalten. Diese direkte Verbindung brachte nicht nur Bronze in gesteigertem Maße als Tauschobjekt in unser Gebiet, sondern zugleich mit seinem metallurgischen Volke auch jene Kunde, daß das Metall der Bronze geschmolzen und gegossen werden kann, falls dies nicht schon dort eine bekannte Tatsache war.

Ungarn hatte nämlich nicht nur in Siebenbürgen, sondern auch in anderen Teilen seiner prähistorischen Provinz ein selten günstiges Feld für autochthone Bronzeentwicklung, da nicht nur metallisches Kupfer, sondern auch zugleich Antimon als ein aus reinen Erzen leicht zu schmelzendes Metall dort gefunden wird.

Da somit die natürlichen Vorbedingungen für eine autochthone Bronzezeit in Ungarn bei weitem günstiger als in Kypros standen, so dürfte die Annahme, daß in Ungarn bereits der cyprischen Zinnbronze-Impertzeit unmittelbar eine Neolith-Kupferzeit voranging, dahin zu ergänzen sein, daß ihr nicht nur eine solche, sondern eine Kupfermetallzeit, und an letztere sich anreihend, eine autochthone Antimon-Bronzezeit vorangingen.

Die Möglichkeit zu einer solchen Entwicklung ist auf Grund der in Ungarn anzutreffenden Kupferzeitfunde anzunehmen, da die Formen, wie sie unter Fig. 10, 1 a u. b, Fig. 11, 1 bis 4 und Fig. 14, 1 u. 6, Dr. F. v. Pulszky mitteilt<sup>1)</sup>, entschieden bereits gegossen sind. Daher erscheint die Annahme, daß zu jenen prähistorischen Zeiten das Volk Ungarns im wahren Besitze des Metalls gewesen ist, berechtigt.

Diese Annahme tangiert keinesfalls die Importtheorie der Zinnbronze aus Kypros. Die sicherlich direkten Handelsverbindungen zwischen diesen zwei Ländern hatten von seiten Kypros nur den Zweck der Goldbeschaffung, es reflektierte keinesfalls auf Antimonbronze, da diese nicht besser als die Zinnbronze ist. Ungarns Völker jedoch reflektierten gern auf Zinnbronze als Tauschartikel für Gold, da sie wegen der aus Norden und Westen gesteigerten Nachfrage nach Bronze diesen Zuwachs gern sahen.

Da auf Grund der Kupferaltsachen Ungarns die Kupferzeit nicht ausgeschlossen scheint, so ist dort neben dem Bergbau auf Kupfer auch eine Kupferergindustrie anzunehmen. Jene Kenntnis aber, daß das Kupfer schmelzbar sei, mußte unbedingt zur Folge haben, daß die Metallgießer jener Länder ihr Augenmerk auf verschiedenes Gestein richteten, um dieses auf eine allenfalls gleiche Eigenschaft wie die des Kupfers zu untersuchen und zu prüfen. Da nun die Antimonerze ein auffälliges metallisches Aussehen besitzen, so mußten sie in erster Linie zu solchen Versuchen benutzt werden. Die Eigenschaften des Antimons aber, so dessen leichtere Schmelzbarkeit als Kupfer, seine schöne silberweiße Farbe, führten unausbleiblich zu Mischversuchen mit Kupfer, also zur Bereitung einer Antimonlegierung.

Jene Sonderstellung der ungarischen Bronzezeitfunde, die während der gesamten Periode, jedoch insbesondere an deren Anfang, ins Auge fällt, und die sich selbst in seiner Hallstattzeit nicht verlangsamt läßt, dürfte mithin auch auf eine aus uralten autochthonen Antimonbronze-Metallzeiten stammende Selbstständigkeit zurückzuführen sein.

Leider kann Kypros aus dem bereits oben angeführten Grunde über die damaligen Verhältnisse und Zustände in unserem Gebiet keinen Aufschluß geben. Auch läßt uns der Mangel an brauchbaren stratigraphischen Aufzeichnungen über ungarische Funde der Metallkupferzeit und das Fehlen von systematisch durchgeführten chemischen Analysen bei einer eingehenden Behandlung dieser Frage im Stich.

Angenommen jedoch, daß Ungarn keine autochthone Antimonbronze-Metallzeit gehabt habe, somit die Kenntnisse seiner Bronze bloß Kypros verdanken würde, so rückt jener Zeitpunkt, wo das Antimon zur Bronzelegierung verwendet wird, natürlicherweise in eine jüngere Phase seiner Bronzezeitkultur. Jedoch auch dann tritt die unausbleibliche Folge ein, daß Ungarn durch sie von Kypros und seiner Bronze unabhängig wird. Ungarn bleibt dann wohl Zwischenträger für cyprische Zinnbronze, wird aber zugleich Bezugsquelle für eine Antimonzinnbronze werden, weil Gegenstände aus Zinnbronze bei öfterem Umschmelzen an Zinngehalt verlieren, der nun teilweise durch das aus Ungarn oder über Ungarn bezogene mehr oder minder antimonhaltige Rohmaterial ersetzt wurde.

Kyros bezog sein Zinn, wie angenommen, in zweiter Linie aus der Gegend des Fichtel- und Erzgebirges<sup>2)</sup>; der hierzu benutzte Handelsweg ging der Donau, Moldau und Elbe entlang<sup>3)</sup>, d. h. über Ungarn. Bei diesem Handel konnte Ungarn wohl nur entweder eine passive oder aber eine aktive Rolle haben. Angenommen, daß sie passiv gewesen, so mußten jene Handelsverbindungen unbedingt direkte sein, also ihre Zwecke verborgen bleiben. Hatte hingegen Ungarn als Zwischenhändler daran Teil, so mußte die Benutzung des Zinns auch zu eigenen Zwecken die Folge sein.

Die metallurgischen Kenntnisse der prähistorischen Völker Ungarns und nicht minder die in der Elbegegend gelegenen und schon zu jenen Zeiten verwerteten Zinnbergwerke des Erzgebirges mußten ihnen verhältnismäßig kurzer Zeit zur Folge haben, daß ganz Mittel-

<sup>1)</sup> Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthr., Ethn. u. Urgesch. 1899. M. Ohnefalsch-Richter, Neues über die auf Cypern usw., S. 393 und 394.

<sup>2)</sup> Dr. F. v. Pulszky, „A vizsok Magyarországon“.

Europa und der Norden sich mit eigener Bronze versehen konnte, demnach von dem epyrischen Bronzeimporte unabhängig wurden.

Tatsache ist und bleibt, daß insbesondere in Ungarn und in den osthalbischen Provinzen neben Zinnbronze eine solche Gruppe von Bronzegegenständen vorkommt, die nebst Zinn auch Antimon in der Legierung führen. Dieser Umstand ist für die Bronzebezugsquellen und somit für den Handel der prähistorischen Völker Europas von großer Bedeutung.

Unter jenen Gußstätten, die schon in epyrischen Importzeiten eine autochthone Bronze haben konnten, jedenfalls aber die Antimonbronze in späteren Zeiten verarbeiteten, ist an erster Stelle die von Velem St. Veit zu nennen. Über die Bedeutung und über die dort zum Export erzeugten Gegenstände der Gußstätte sei mir gestattet hier in Kürze zu berichten.

Velem St. Veit hatte in unmittelbarer Nähe reiche und ausgedehnte Lager des Antimonerzes

den prähistorisch metallurgischen Fragen den gewünschten Aufschluß zu geben.

Von keiner geringen Wichtigkeit ist, wie dies aus der nachstehenden Tabelle A ersichtlich, daß jede der sieben Analysen von Gußklumpen Antimon enthält. Der Gehalt an Antimon schwankt zwischen Spuren und 18,56 Proz.

Die unter Nr. 3 und 7 dieser Tabelle aufgeführten Gußklumpen sind eigentlich Bleihronzen mit Zinn, bzw. Antimonzusatz. Eine nicht minder interessante Zusammenstellung hat die Bronze Nr. 6 mit ungewöhnlich hohem Eisengehalt. Der Zusatz von Arsen ist, wie dies Dr. Otto Helm erwähnt<sup>1)</sup>, wegen der Technik des Härtens der Bronze von Bedeutung.

Diese in den Funden von Velem St. Veit vorkommenden Gußklumpen von verschiedener Größe und Gewicht dürften wohl wegen der wenig handlichen Form kaum so zum Export verwendet worden sein. Geeigneter erscheint die Form des Barrens für den Export von Rohmaterial und mag auch benutzt worden

Tabelle A.

| Nr. des Gußklumpen | Kupfer | Antimon | Zinn | Blei  | Silber | Eisen | Kobalt | Nickel | Zink | Arsen | Schwefel | Der Gegenstand wurde analysiert durch |
|--------------------|--------|---------|------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| 1                  | 98,06  | 1,34    |      |       |        | 0,22  |        | 0,24   |      |       | 0,14     | Dr. Otto Helm.                        |
| 2                  | 79,53  | 18,11   |      | 1,97  | 0,14   |       |        | 1,25   |      | 1,42  | 0,47     | Dr. Otto Helm.                        |
| 3                  | 45,54  | 13,02   |      | 37,87 |        |       |        | 2,20   |      | 1,75  | 0,12     | Dr. Otto Helm.                        |
| 4                  | 97,03  | 1,43    | 0,20 |       |        | 0,37  |        | 0,29   |      |       | 0,08     | Dr. Otto Helm.                        |
| 5                  | 74,30  | 18,56   |      | 1,10  | 0,94   | 0,17  |        | 0,38   |      | 4,05  |          | Dr. Otto Helm.                        |
| 6                  | 84,68  | 0,98    | 0,09 | 1,89  |        | 3,11  | Spur   |        |      |       |          | Prof. Dr. W. v. Wartha.               |
| 7                  | 66,22  | Spur    | 3,41 | 31,71 |        |       |        |        | Spur |       |          | Prof. Dr. W. v. Wartha.               |

zur Verfügung, die schon zu prähistorischen Zeiten für Bronzelegierungszwecke durch die dort ansässigen Metallgießer verwendet wurden, wie dies der leider allzu früh verstorbene Dr. Otto Helm durch seine Analysen bewies.

Ein interessantes und lehrreiches Bild der metallurgischen Kenntnisse, und der Legierungsversuche zu prähistorischen Zeiten liefern die von dort stammenden Analysen, die trotz geringer Anzahl schon jetzt die Benutzung des Antimons zu Legierungszwecken unzweifelhaft bekräftigen, aber leider noch nicht genügend sind, um zugleich über alle noch derzeit schweben-

sein. Auf Tabelle B bringe ich die Analyse zweier solcher, vermutlich zum Zwecke des Rohmaterialexportes dienenden Bronzebarren.

Die Analyse Nr. 1 hat neben dem hohen Zinngehalt auch zugleich einen nicht unbedeutenden von Antimon. Der zweite Barren ist trotz Anwesenheit des Zinns eine Bleibronze. Dieser Bronzebarren wurde in Hallstätter Schicht zugleich mit anderen verschiedenen Gegenstän-

<sup>1)</sup> Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthr., Ethn. u. Urgesch. 1900. Dr. O. Helm, Chemische Analysen vorgeschichtl. Bronzen aus Velem St. Veit in Ungarn, S. 363.

den in einem Bronzegefäß gefunden. Unter diesen Gegenständen befand sich auch eine einfache Doppelfibel ungarischen Typus (Fig. 1).

Die nachstehende dritte Tabelle bringt etliche Analysen von in Velem St. Veit gefundenen Gegenständen.

9,50 Proz. Kalk ( $\text{CaO}$ ),  
2,73 " Magnesia ( $\text{MgO}$ ),  
10,53 Proz. Eisenoxyl ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) = 7,37 Proz. Eisen ( $\text{Fe}$ ),  
27,03 Proz. Kupferoxyl ( $\text{CuO}$ ) = 21,60 Proz. Kupfer ( $\text{Cu}$ ).

Tabelle B.

| Nummer des Bronzebarrens | Kupfer | Zinn  | Antimon | Blei  | Nickel | Schwefel | Phosphor | Den Gegenstand analysierte |
|--------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|----------|----------|----------------------------|
| 1                        | 75,54  | 16,49 | 5,27    | 2,43  | 0,27   |          |          | Dr. Otto Helm              |
| 2                        | 22,40  | 22,19 |         | 53,68 |        | 1,25     | 0,48     | Dr. Ernst Söwy             |

Tabelle C.

| Gegenstand der Analyse                                    | Kupfer | Zinn | Antimon | Blei | Eisen   | Kobalt | Nickel  | Zink    | Arsen | Schwefel | Phosphor | Den Gegenstand analysierte |
|---|--------|------|---------|------|---------|--------|---------|---------|-------|----------|----------|----------------------------|
| 1. Bruchstück einer Fibel vom ungarischen Typus . . . . . | 90,37  | 6,07 | Spur    |      |         | Spur   | 1,20    |         |       |          | 1,60     | Prof. Dr. W. v. Wartha.    |
| 2. Nadel einer Fibel vom ungarischen Typus . . . . .      | 90,25  | 8,73 |         |      | Im Rest |        | Im Rest | Im Rest |       |          |          | Prof. Dr. W. v. Wartha.    |
| 3. Fibel vom Glasmactypus . . . . .                       | 85,37  | 9,08 | 2,52    | 1,86 | 0,21    | 0,08   | 0,29    |         | 0,09  |          |          | Dr. Otto Helm.             |
| 4. Zierscheibe . . . . .                                  | 80,22  | 8,11 | 10,15   | 0,45 | 0,21    |        | 0,62    |         | 0,06  | 0,18     |          | Dr. Otto Helm.             |
| 5. Mittel-La-Töne-Fibel                                   | 87,60  | 8,40 | 1,71    | 1,36 | 0,15    | 0,71   | 0,07    |         |       |          |          | Dr. Otto Helm.             |

Diese allzu kurze Analysenserie von Velem St. Veiter Gegenständen ist kaum geeignet, schon jetzt über viele Fragen Aufschluß zu geben. Sie bekundet und beweist aber bereits, daß die Antimonbronzelegierungen durch die alten Erzgießer von Velem St. Veit zu Gegenständen verarbeitet wurden.

Von Interesse und von Wichtigkeit für prähistorisch-metallurgische Darstellungsprozesse ist jene Analyse eines öfter in Velem St. Veiter Funden vorkommenden Kupfersteines, die ich Herrn Dr. Ernst Söwy, Chemiker der Domersmarchütte zu Zabrze, verlanke.

Die bei 100° C getrocknete Probe enthält:

34,12 Proz. Kieselsäure ( $\text{SiO}_2$ ),  
11,25 " Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ),

0,45 Proz. Schwefelsäure ( $\text{SO}_3$ ) = 0,19 Proz. Schwefel (S),

1,10 Proz. Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) = 0,48 Proz. Phosphor (P),

3,29 Proz. Alkalien ( $\text{K}_2\text{O}$  und  $\text{Na}_2\text{O}$ ).

Über diesen Kupferstein schreibt Dr. Söwy folgendes:

„Dieses Produkt ist ein sogen. Kupferstein, welcher sich bei der vorzeitlichen Gewinnung des Kupfers aus seinen Erzen ergab. Das Verfahren bestand darin, daß die Kupfererze gepocht, konzentriert und in Haufen oder Stüden erst abgeröstet wurden. Dann wurden die abgerösteten Erze in Herd- oder niedrigen Schachtöfen unter Einwirkung von Blasenbälgen, die von Menschen betrieben wurden, verschmol-

zen. — Bei diesem Betriebe war die Schlacke schlecht geschmolzen und sehr kupferreich und wurde daher mit frischem Erz wieder verar-

beitet. In Velem St. Veitsberge bilden jene sich massenhaft vorfindenden Bruchstücke von Bronzegegenständen, die im Tauschwege für fertige

Fig. 1.



beitet. Unzweifelhaft stellt dieses Produkt eine derartige kupferreiche Schlacke dar.“


Einen nicht minder wichtigen Beleg für die ausgelehnte Tätigkeit der Gußstätte an

Gebrauchs- und Schmuckstücke in die Ansiedlung kamen.

Die direkte Tätigkeit der Ansiedlung als hervorragende Gußstätte beweisen die nur zu

metallurgischen Zwecken dienenden Gegenstände, wie solche in den dortigen Funden vorkommen. Als unbedingt und ausschließlich zu metallurgischen Zwecken dienendes Gerät sei hier das Gebläse erwähnt. In den Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien hatte ich Gelegenheit solche zu publizieren<sup>1)</sup>. Es seien daher als Ergänzung des dort Mitgeteilten

Als gleichfalls für prähistorisch metallurgische Zwecke dienend sind hier die Gußformen zu erwähnen, deren bereits publizierte Serie ich hier um etliche vermehre. Es sind dies die Gußform eines größeren Ringes (Fig. 4), die eines Keiles (Fig. 5) und die für einen größeren Schmuckadelkopf (Fig. 6). Zugleich will ich die Gelegenheit benutzen, um ein wohl




nur zwei weitere Bruchstücke hier erwähnt (Fig. 2 u. 3). Diese Gebläse wurden in Verbindung mit Tierhäuten zu Blasebälgen verwendet, wobei die Tenröhre in das zu schmelzende Erz hineinragend das Endstück bildete.

weniger bekanntes Stück, den „Gußkeil“, zu erwähnen. Diese Gußkeile wurden beim Guss jener Gegenstände verwendet, die Tüllen hatten. Sie wurden in die bereits vollgegossenen Formen der Gegenstände hineingetrieben, als noch der Inhalt flüssig war. Von den dort gefundenen Gußkeilen bringe ich unter Fig. 7 u. 8 zwei Stücke zur Ansicht.

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien (Sitzungsbericht) 1899, S. 8 u. 9, Fig. 9, 10 u. 11. Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Auch an Werkzeug, das zur Bearbeitung der fertigen Bronze diente, ist kein Mangel in den Funden. Unter diesen ist von nicht geringer Bedeutung das Vorkommen von Hämmer, die auf Grund verschiedentlich gestalteter Schlagflächen auch zu verschiedenen Zwecken Verwendung fanden. Wir besitzen demnach in der von dort stammenden Bronzeshämmerserie

Gesellschaft bin ich zugleich in die Lage versetzt, die Abbildungen dieser Hämmer und zweier anderer nachfolgenden Werkzeuge hier bringen zu können. Es sei auch hier mein bester Dank für die Überlassung der Klüseschablonen abgestattet. Die Serie dieser Hämmer umfaßt je einen Ausschlicht- oder Polierhammer, Schweifhammer, Aufsatz- oder Schneidehammer



alle jene Typen, die überhaupt beim Treiben der Bronze gebraucht wurden. In den Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien hatte ich Gelegenheit, diese Serie zu publizieren<sup>2)</sup>, ich kann mich daher hier kurz fassen. Durch die Güte der Anthropologischen

und mehrere Tellerhämmer (Fig. 9 bis 14). Bei der Verarbeitung der Bronze fanden gleichfalls Verwendung der Schneidemeißel oder Abschrotter (Fig. 15) und der Biegestecken (Fig. 16).

Ein nicht minder wichtiger Beleg für die hohe Kultur und Entwicklungsstufe der Velem St. Veiter Metallindustrie ist der Umstand, daß die dortigen Erzgießer ihr Werkzeug selbst verfertigten. Es wird dies durch zwei Guß-

<sup>1)</sup> Mitteilungen der Anthropol. Gesellsch. in Wien (Sitzungsbericht), Bd. XXIX, S. 6 bis 11.

formen erwiesen, die ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Grafen Rezsü Széchenyi hier publizieren kam. Auch ihm sei mein bester Dank abgestattet. Die eine der interessanten Gußformen diene zum Gusse eines Hammers, die zweite aber für einen Schneidemeißel oder Abschrotter und zugleich für einen Biegestecken (Fig. 17 und 18).

In den Mitteilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft gab ich einst das Versprechen, über die in dortigen Funden vor-

ten. Dank Berthelot und Dr. O. Helm sind jetzt diese Zweifel vollkommen behoben, da sie erwiesen, daß die Bronze jenen Härtegrad durch den Zusatz von Arsen erreichte, der auf Bronze mit Bronzeinstrumenten das Ornament zu verfertigen erlaubte. Da nun in Velem St. Veit auch diese metallurgische Kenntnis eine den dortigen alten Erzgießer geläufige und bekannte gewesen (Gußklumpenanalyse Nr. 5), so ist das massenhafte Vorkommen von Punzen (mit Bruch etwa 130 Stücke) mit Rücksicht

Fig. 17.




Fig. 18.



kommenden Punzen ausführlich zu berichten. Um dem teilweise nachzukommen, will ich hier unter diesen bei der Verarbeitung der Bronze nicht minder wichtigen Werkzeugen wenigstens deren markantere Typen erwähnen.

Die Tatsache, daß das Ornament der Bronzegegenstände vermittelt Bronzepunzen verfertigt wurde, stieß einst auf großes Mißtrauen und Zweifel, um so mehr, da noch nicht bekannt war, daß die alten Erzgießer bereits Verfahren kannten, um ihren Erzen jenen Härtegrad zu geben, den solche Anforderungen nötig mach-

auf die Bedeutung der Gußstätte wohl nicht wunderbar.

Da nicht nur typische Unterschiede zwischen den Punzen bestehen, sondern auch einzelne Abweichungen in den Typenserien, so dürfte wohl diese Abhandlung nicht geeignet sein, eingehend alle diese Varianten aufzuzählen. Ich werde mich daher bloß auf etliche derselben beschränken.


Das reichlich zur Verfügung stehende Material an Punzen gestattet die Folgerung, daß sie zum Teil in Holzgriffe eingelassen verwendet,



andere aber angestiebt in freier Hand benutzt wurden.

Zur Gruppe der Punzen, welche gestiebt verwendet wurden, gehört unter anderem der Typus Fig. 19. Der Körper dieser Punze hat einen beinahe quadratischen Durchschnitt. Die Schneide ist etwas abgerundet, die Spitze kurz. Ein zweiter Typus, Fig. 20, hat zum

gestielten Punzen bilden diejenigen, deren Form an den Stäus erinnern. Sie sind bedeutend länger, auch ist ihre Spitze rund zulaufend und konnte wohl als Grabstichel Verwendung finden, Fig. 23. Die angestielten Punzen hatten entweder einen viereckigen Körperdurchschnitt, Fig. 24, oder aber einen runden, Fig. 25, und haben an beiden Enden Schneiden.



Unterschiede einen flachen Körper, wodurch die Spitze gleichfalls abgerundet ist; die Schneide ist abgerundet. Auch Punzen mit kurzem Körper kommen vor, von welchen der Typus mit breiterer Schneide als der Körper Fig. 21 und der eine schmalere besitzende, Fig. 22, genannt seien. Diese Typen haben eine gerade Schneide.

Den Übergang zwischen gestielten und un-

Außer diesen Punzen kommen, wie erwähnt, noch andere Typen in den Funden vor, doch würde deren Publikation hier zu weit führen. Es sei daher nur erwähnt, daß in den Funden auch Meißel mit so schmalen Schneiden vorkommen, daß wohl angenommen werden kann, sie hätten auch als Punzen Verwendung gefunden. Die Breite der Schneide beträgt bei solchen Meißeln 7 bis

8 mm. Ich bringe unter Fig. 26 ein solches Stück zur Ansicht.

Zum Punzen von krummen Linien hatten die alten Erzkünstler ein Instrument, das einem Hohlmeißel ähnlich ist, jedoch zum Unterscheiden keine zugeschärfte, sondern eine gedrungene Schneide besitzt. Auch ist die Ausbohrung hinter der Schneide bei dieser Punze eine seichtere als die bei den Hohlmeißeln vorkommende, Fig. 27.

Es fanden sich unter den Velem St. Veiter Gegenständen solche, die wohl als Rundfeilen zu betrachten sind. Sie dürften wohl schon aus dem Grunde Feilen gewesen sein, da eine entwickelte Metallindustrie kaum ohne Feile gedacht werden kann. Diese aus rundem Draht verfertigten Feilen haben abwechselnd rund um den Körper und um diese spiralförmig verlaufende, tiefere und seichtere Nuten, Fig. 28.

Auf Grund der Analysen und der vorgefundenen Werkzeuge muß Velem St. Veit eine vom Auslande unabhängige Gußstätte mit dort selbständig zur Blüte gelangter hoher Kulturstufe, also ein zu prähistorischen Zeiten in Europa gelegenes Kulturzentrum des Handels gewesen sein, das die ihm zukommende Stellung der Keutnis der Antimonlegierung verdankt. Es muß aus diesem Grunde auch als eine jener Stätten betrachtet werden, in welchen nicht nur die umliegenden Völker ihren Bedarf an Rohmaterial und fertigen Bronzeartikel deckten, sondern deren Handelsverbindungen auch noch bedeutend weiter reichten. Velem St. Veit verarbeitete daher seine Bronze nicht nur für die prähistorische Provinz, die im jetzigen Ungarn liegt, sondern auch für Nord und Süd, wie dies aus den dortigen Funden hervorgeht. So weisen, nur um etliches zu erwähnen, z. B. die Glasinacfibeln (vgl. Arch. f. Anthr., N. F. Bd. II, Heft 1, S. 35, Fig. 32) und nicht minder so manches Bronzemesser auf südliche Verbindungen, (I) Mitteilungen der Anthropol. Ges. in Wien, XXXIV. Bd., Sitzungsbericht (S. bis 10), Abb. 4 und 5, auf entschiedene nördliche aber das Votivschwert (vgl. Arch. f. Anthr., N. F. Bd. II, Heft 1, S. 31, Fig. 6) und die in bronzezeitlichen Schichten gefundene Gußform eines Keltes mit zwei Ohren (Fig. 31), dessen Typus in ungarischen Funden noch nicht vorgekommen ist.

Auch der Umstand weist auf rege Handelsverbindungen, daß abweichend von den meisten Fundstätten, in Velem St. Veit ein ungewöhnlich großer Reichtum an fertigen Bronzegegenständen in der Wohnstätte vorkommt, während sonst nur Überfluß in Gräbern herrscht.

Wenn nun der Ort einen so ausgedehnten Handelsverkehr hatte, so müssen die Funde neben den bereits oben erwähnten einzelnen Gegenständen, die auf fremde Verbindungen hinweisen, auch solche Stücke enthalten, die wegen der allen großen Anzahl an Orte kaum Verwendung finden konnten, also für den Export angefertigt wurden. Die derzeit noch durchaus nicht bedeckte Ausbeutung dieser wichtigen Fundstätte ergab in der Tat Serien solcher Fundgegenstände, die zweifelsohne solchem Export dienten. Abgesehen von ihrer Zahl weisen sie gleichzeitig in den Serien auffallende Unterschiede auf, die zu dem Schlusse führen, daß am Ort verschiedene Typen zugleich angefertigt wurden, wohl um verschiedenem Geschmack und Anforderung gerecht zu werden. Da es sich lohnt, einen Blick auf solche Serien zu werfen, so werde ich aus dortigen Funden als Beispiel für diesen Export die Serie zweier Gegenstände hier mitteilen.

Da die Statistik der Velem St. Veiter Funde eine große Anzahl Pfeilspitzen aus Bronze (etwa 80 Stück) aufweist, so scheint die Annahme, daß mit diesem Objekt ein lebhafter Export an unserer Gußstätte betrieben wurde, berechtigt zu sein. Bekräftigt wird diese Annahme noch durch den Umstand, daß in deren Serie die verschiedensten Typen auftreten.

Daß die aus Bronze verfertigte Pfeilspitze das Produkt einer jüngeren Entwicklungsstufe des Prähistorikums ist, wird auch durch die am Ort in situ gefundenen Stücke unzweifelhaft, und es dürfte auch nach den dort gemachten Erfahrungen deren erstes Auftreten in die letzte Bronzezeit zu verlegen sein.

Der Pfeilspitze gaben schon in grauer Vorzeit Zweck und Anwendung die bedingte Form, an der selbst das zur Anfertigung neu herangezogene Material, die Bronze, keine wesentlichen Änderungen hervorbringen konnte.

Das neue, jeder Form sich anpassende Material mußte sich auf kleine Verbesserungen beschränken, so in erster Linie auf eine zweckdienlichere und bessere Befestigung. Eine zweite Verbesserung sind die an mancher Pfeilspitze zu findenden rillenartigen Vertiefungen, die auch Dr. Hampel<sup>1)</sup> mit Recht als zur Aufnahme von Gift dienend bezeichnet.

Es ist für den konservativen Charakter der menschlichen Kulturentwicklung ein nicht unwichtiger Beleg, daß jene Verbesserungen an den Pfeilspitzen trotz vollkommener Gußtechnik nicht simultan mit dem neuen Material auftreten, sondern vielmehr jüngeren und entwickelteren Kulturstufen vorbehalten bleiben. Die letzte Stufe der Bronzezeit unserer Gegend benutzte keinesfalls einen anderen Typus als den der aus Bronze nachgeahmten Steinpfeilspitze mit Schaftdorn. Sie hielt sich an dieses aus Stein verfertigte Vorbild auch noch im Anfange der Hallstattzeit, wie aus Funden von Velem St. Veit hervorgeht.

Eine in engen Grenzen auf unwesentliche Unterschiede gestützte Klassifikation der Bronzezeitlichen Pfeilspitzen-Typen könnte kaum zu einem Ziel führen. Es gibt schwerlich einen zweiten prähistorischen Gegenstand, der so viele kleine unwesentliche Varianten aufweist als gerade die Bronzezeitliche Pfeilspitze. Bei einer in diesem Sinne aufgefaßten und durchgeführten Typeneinteilung würden selbst bei einem so ergiebigen Material wie dem von Velem St. Veit kaum zwei bis drei Stücke in je einen Typus einzureihen sein. Die Einteilung der Typenserien ist daher nur auf wesentliche Unterschiede, in erster Linie auf die Schaftung, in zweiter Linie aber zugleich auf die Form des Querschnittes zu gründen.

Ein Blick auf die Figuren 32 bis 62 wird die Stichhaltigkeit dieser Ansicht beweisen. Das mitgeteilte Material findet, je als einzelnes Individuum aufgefaßt, selbst in der auf gleichartige wesentliche Merkmale gestützten Typenserie, keine vollkommene Analogie.

Als Typen sind daher aufzufassen:

I. Der Pfeil mit Schaftdorn.

II. Der Pfeil mit Tülle.

Unterabteilungen des zweiten Typus sind:

A. Der Pfeil mit glatter Tülle.

B. Der Pfeil mit Knoten oder Dornfortsatz am Tüllende.

C. Die dreisehnige Pfeilspitze.

Die zum ersten Typus gehörenden Pfeilspitzen charakterisiert der den Steinpfeilspitzen gleichende Schaftdorn, der in das Holz des Pfeilrohres eingelassen und dort vermittelt Harz oder Werg befestigt wurde. Zu den ältesten Stücken dürften jene zu zählen sein, bei denen dieser Schaftdorn glatt ist, zu den jüngeren aber diejenigen, welche schon zur besseren Befestigung dienende Vorkehrungen besitzen.


Aus Velem St. Veiter Funden, erwähne ich hier drei solcher verbesserten Pfeilspitzen. Unter diesen Stücken besitzen Fig. 32 und Fig. 33 je einen kleinen Dorn seitlich am Schaftdorn, Fig. 34 hingegen eine zweiseitige Rinne, die jedenfalls zu seiner besseren Befestigung dienen sollte. Die Pfeilspitze der Fig. 32 ist nach Form und Ausführung noch recht primitiv, Fig. 33 aber bereits gefälliger und auch schon mit einer Mittelrippe ausgestattet. Alle diese Typenvarianten sind mit Widerhaken versehen.

Als eine abweichende Variante ist diesem Typus noch zuzuzählen eine ohne Widerhaken mit vierkantiger Spitze (Fig. 35). Diese Variante gehört zu jenen interessanten prähistorischen Gegenständen, welche nicht ausschließlich für einen bestimmten Zweck angefertigt wurden. Es ist eine Eigenschaft der bei primitiver Kultur erzeugten Gegenstände, daß sie neben einem Hauptzweck auch Nebenzwecke dienen können und selbst ganz heterogenen Zwecken oft zugleich dienen. Im gegebenen Falle ist neben der jetzt vermuteten Benutzung als Pfeilspitze auch jene anzunehmen, daß der Gegenstand bei entsprechender Schaftung zugleich als Pfriemen oder aber als Punzinstrument verwendet werden konnte.

Gestützt auf dies Beispiel dürften auch jene in Velem St. Veiter Funden massenhaft auftretenden und als Ahle oder Pfriemen zu bezeichnenden Gegenstände (Fig. 36) neben dieser einen Verwendung zugleich auch die von Pfeilspitzen, insbesondere zur Erlegung von Kleinvild, gehabt haben.

Der zweite Typus der Pfeilspitzen hat zum Unterschiede von der ersteren eine Tülle, die

<sup>1)</sup> Dr. J. Hampel, „Bronzkor“, 3, 108.



auf das zugespitzte Ende des Pfeilrohres aufgesteckt wurde. Bei diesem Typus kann auf Grund der Tülle das ganze zu dieser Form gehörende Material in drei Unterabteilungen eingereiht werden, deren erste eine glatte Tülle hat.

Die Pfeilspitzen mit glatter Tülle zeigen große Unterschiede in ihrer Form, die einerseits durch die Tülle selbst, andererseits aber durch die Ausstattung der Spitze bedingt wird. Unter den zumeist vorkommenden Varianten seien hier aufgezählt: Die Pfeilspitze ohne Widerhaken (Fig. 37); die mit breiten flachen Widerhaken (Fig. 38); als dritte eine am Körper schlanke Pfeilspitze mit dünnen, sich leicht nach hinten krümmenden Widerhaken (Fig. 39); weiter die Variante, die an der Tülle zur besseren Befestigung seitlich kleine Löcher für Nägel hatte (Fig. 40), und endlich eine mit lorbeerblattähnlicher Spitze (Fig. 41).

Zur zweiten Unterabteilung der Pfeile mit Tülle gehören diejenigen, die am Tüllenende entweder eine seitliche Verdickung, Knopf, oder aber im Verlaufe ihrer Entwicklung einen Dorn haben. Der Knopf diente vermutlich anfangs nur zur besseren Befestigung, hatte jedoch als entwickelter Dorn den gleichen Zweck wie der Widerhaken, nämlich die Erweiterung der Wunde beim Entfernen des eingedrungenen Pfeiles. Auch diese zweite Unterabteilung der Pfeilspitzen mit Tülle zeigt große Neigung zu Varianten, die gleich wie in der erst genannten Serie durch die verschieden geformten Spitzen, andererseits aber durch Unterschiede am Knopf und Dorn entstehen. Aus dieser Serie würde ich nennen: Die Pfeilspitze mit Knopf am Tüllenende und mit über die Tülllänge hinaus reichenden Widerhaken (Fig. 42); eine mit kurzen breiten Widerhaken (Fig. 43); die Variante mit langer Tülle, kleiner Spitze, kurzem Dorn (Fig. 44). So die Pfeilspitze mit breitem Kopfe, kurzer Tülle und Dorn (Fig. 45). Zum Schlusse dieser Serie bringe ich zwei Varianten der Pfeilspitzen mit langem Dorn am Tüllenende, deren eine bloß einen solchen (Fig. 46), die andere aber einen Ansatz zu einem zweiten Dorn hat (Fig. 47).

Die dritte Unterabteilung der Pfeilspitzen umfaßt diejenigen, welche eine dreiseitige

Spitze besitzen. Da diese Pfeilspitzen gleich den beiden vorgehenden Unterabteilungen beim Gebrauch auf das Pfeilrohr aufgesteckt wurden, so entstehen bei dieser dritten Unterabteilung dadurch Varianten, daß entweder an ihnen eine sich vom übrigen Pfeilkörper sichtlich absondernde Tülle besteht, oder aber, daß diese Tülle im Inneren der Pfeilspitze liegt und mit dieser einen Körper bildet. Zur ersten Variante gehört die Pfeilspitze unter Fig. 48 zur zweiten die unter Fig. 49. Bei dieser zweiten Variante kommt noch eine Abart vor, bei welcher an das Tüllenende kurze kleine Widerhaken zu finden sind, Fig. 50.

Eine zweite bereits oben erwähnte Verbesserung der Pfeilspitzen bestand darin, daß sie zur Aufnahme von Gift mit rillenartigen Vertiefungen versehen wurden. Auch diese Verbesserung ist zweifelsohne einer jüngeren Zeitstufe des Prähistorikums vorbehalten, da sie nur an bereits entwickelteren Typen anzutreffen ist. Zweifelsohne ist da anzunehmen, daß diese Ausparungen mit Vorbedacht an den Pfeilspitzen angebracht wurden, da kaum an fehlerhaft gegossene Stücke gedacht werden kann. Ob das zur Anwendung gelangende Gift ein mineralisches oder eher vielleicht ein Pflanzengift gewesen sei, ist nicht zu entscheiden. Doch würde ich meiner Ansicht nach dem letzteren den Vorzug geben, da Giftpflanzen nicht selten sind, deren Saft, z. B. *Atropa Belladonna*, *Digitalis purpurea*, mit dem kautschukähnlich eintrocknenden Saft der Wolfsmilch, *Euphorbia eyparissias* und *palustris* vermischt, sich vollkommen eignen würde, um in jenen Vertiefungen der Pfeilspitzen Platz zu finden.

Diese für Aufnahme von Gift ausgesparten Löcher kommen an den meisten Varianten der Pfeilspitzen mit Tülle vor; so finden wir diese unter den oben als Fig. 38, 39 u. 40 mitgeteilten Stücken vertreten, doch ist sie auch an jenen der zweiten Unterabteilung und auch selbst an den dreiseitigen anzutreffen, wie dies die drei Stücke Fig. 51 bis 53 beweisen.

Alle diese Typen der Bronze Pfeilspitzen, die erstens unter sich solche große Mannigfaltigkeit der Formen aufweisen, zugleich zweitens aber auch in großer Anzahl in den Funden anzu-

treffen sind, berechtigen zu dem Schluß, daß die Gußstätte sie für verschiedene Völker mit verschiedenem Geschmack erzeugt, daß sie also zu den dort für den Export angefertigten Gegenständen gehören.

Wenn ein in prähistorischen Funden sonst ziemlich selten vorkommender Gegenstand an einer Gußstätte massenhaft gefunden wird, ohne daß für dessen Masscuproduktion zugleich auch eine Verwendung am Ort begründbar ist, so kann für diesen Umstand überhaupt keine andere Ursache und Erklärung gefunden werden, als daß er für Exportzwecke am Ort angefertigt wurde.

Ein wohl klassisch zu nennendes Beispiel solcher Überproduktion liefert die Gußstätte am Velem St. Veitsberge mit ihren Funden an Heft- und Nähnadeln, über die ich bereits in dem *Archeologiai Értesítő* berichtete<sup>1)</sup>. Da dieser Gegenstand jedoch für die Bedeutung Velem St. Veits als Bronze- und Exportstätte ein wichtiger Beleg ist, so sei das bereits dort Gesagte zum Teil hier wiederholt.

Den Bodenverhältnissen, die insbesondere die Erhaltung von Bronzegegenständen begünstigen, verdanken wir, daß so mancher sonst anderswo den Unbilden der Zeit und mithin dem Verfall unwiderruflich anheimfallender Gegenstand in den Kulturschichten der Ansiedlung am Velem St. Veitsberge erhalten bleibt. Diesem Umstande ist ohne allen Zweifel auch die Erhaltung so manchen Stückes der Heft- und Nähadel zuzuschreiben, doch ist er kaum geeignet auch zugleich den in den Funden vorkommenden Überfluß an jenen Nadeln zu begründen. Die mit ihren Bruchstücken noch handerten zu zählenden Heft- und Nähadeln können demnach nur Gegenstände sein, mit denen Export verbunden und getrieben wurde, da die Annahme einer Kleideraufertigungswerkstätte, die allein den dort zu konstatierenden Verbrauch an diesen Gegenstand begründen würde, doch wohl zu jenen Zeiten keine Berechtigung haben könnte, demnach ausgeschlossen ist. Da aber die Nadeln, die diesem Zwecke dienten, zugleich nicht wenigen Typenvarianten angehören, so dürften dieselben auch jener Anforderung eines Exportgegenstandes Genüge leisten,

daß er verschiedenen Geschmacksanforderungen entsprechend am Ort zu finden sei.

Die mit den Bruchstücken über 400 Stücke zählende Serie dieses Gegenstandes erfordert unbedingt eine Klassifikation des Materials in zwei je nach den möglichen Arbeitsarten zu benennende Typen. Dieser Unterschied gründet sich auf den ganzen Habitus der Nadeln, und nicht minder auf Unterschiede der Größe und der Lage des Nadelöhres. Es sind demnach die Stücke entweder als Heftnadeln oder aber als Nähnadeln zu bezeichnen. Die Heftnadel ist aus dickem Draht gefertigt, das weite Ohr zur Aufnahme eines starken Fadens geeignet. Auch ist dieses Ohr bei mancher Variante vom Nadelkopfe entfernt angebracht. Der Gegenstand eignet sich daher nur für eine gröbere Arbeit, das Heften (Fig. 54). Die Nähadel hingegen wird aus dünnem Draht angefertigt, das Ohr liegt meist unmittelbar am Kopfe und eignet sich bloß zur Aufnahme eines dünnen Fadens. Die mit derselben gemachte Arbeit ist das Nähen (Fig. 55).

Auch hier dürfte das Anzählen aller Varianten der in den Funden vorkommenden Heft- und Nähadeln zu weit führen, ich will mich daher auf deren Haupttypen beschränken. Die eine Hauptvariante der Heftnadel, bei welcher das Ohr vom Kopfe entfernt angebracht zu finden ist, besitzt zwei Unterabteilungen, wobei deren eine einen stumpfen abgerundeten Kopf gleich der unter Fig. 54 besitzt. Die zweite hat einen Kopf, der zugespitzt ist, Fig. 56. Andere Varianten der Heftnadel zeigen zwischen Kopf und Ohr nur wenig Abstand, gleichen im ganzen Habitus der jetzigen Packnadel, jedoch ohne deren Lanzettenspitze zu besitzen, Fig. 57. Endlich würde die Nadel zu erwähnen sein, deren Kopf durch das in einer Schlinge liegende Ohr gebildet wird, Fig. 58.

In der Serie der Nähadeln sind so ziemlich die gleichen Varianten in betreff des Ohres vorzufinden. Auch hier kommt bei dünnerem und kürzerem Körper die Abart mit weit vom Kopfe abliegendem Ohre vor, im gegebenen Falle mit etwas zugespitztem Kopfe und rundem Ohr (Fig. 59). Eine andere Variante dieses Typus hat auch, gleich der Heftnadel auf Fig. 58, eine Schlinge zum Kopfe, wodurch zugleich auch

<sup>1)</sup> Arch. Ért. 1898, 18, 25 bis 29.

hier das Ohr gebildet wird, Fig. 60. Nähnadeln mit längerem Körper kommen auch vor, sie haben ein schön und scharf gearbeitetes Ohr, das ganz nahe am Kopf angebracht ist, Fig. 61. Sie bilden den Übergang zwischen den beiden Typen der Nadeln. Endlich kommen Varianten vor, die kaum oder nur wenig von den heute gebräuchlichen abweichen, wie wir dies auf der unter Fig. 62 mitgeteilten Nähnadel konstatieren können.

Das Fundverhältnis zwischen den zwei Arten der Nadeln ist bei weitem kein gleiches zu nennen, da es in Zahlen ausgedrückt so ziemlich 1 : 10 beträgt, wobei die kleinere Zahl auf die der Nähnadeln fällt. Ihrer Zeiteinteilung und Bestimmung nach, um auch endlich dies zu erwähnen, sind sowohl Heftnadeln als Nähnadeln Typen der Bronzezeit, die nebeneinander

in beiden Varianten in den Funden von Velem St. Veit auftraten.

Auf Grund des Mitgeteilten glaube ich den Beweis der Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gußstätte erbracht zu haben, die nicht nur für die nähere Umgebung, sondern auch für weiter liegende Völker als Bezugsquelle für Bronze von Wichtigkeit gewesen ist. Ob diese Handelsverbindungen mehr nach Norden oder nach Süden wiesen, ist jetzt bei nicht völliger Erforschung und dem recht fühlbaren Mangel an Gräberfunden noch nicht zu entscheiden. Doch liegt die Zeit vielleicht in nicht allzu großer Ferne, wenn auf Grund weiterer Funde im Vereine mit Vergleichsanalysen auch diese Frage ihre Lösung finden wird.

Köszeg (Güns), Januar 1904.

## VI.

### Die Datierung des Stonehenge.

Von

O. Montelius.

Schon in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts erwähnen englische Schriftsteller ein im südwestlichen England belegenes, aus mächtigen Steinen gebildetes und in Kreisform ausgeführtes

Denkmal. Ein Schriftsteller nennt es „den Tanz der Riesen“. Wenn die Abendsschatten sich über den Fluren ausbreiteten, glaubte das Volk in diesen Steinen Riesen zu erblicken, die einen Reigentanz ausführten. Die Angelsachsen nannten es


Stanhenge, die „hängenden Steine“. Jetzt ist es unter dem Namen „Stonehenge“ in ganz England und weit über seine Grenzen bekannt.

Die Stelle liegt anderthalb schwedische Meilen nördlich von Salisbury. Außergewöhnlich große, vierkantig zugehauene Steine bilden einen äußeren Kreis; viele sind jetzt gestürzt oder zerstört, besonders fehlen die meisten

der liegenden Steine, die zu diesem Kreise gehörten. Trotzdem macht dies uralte Monument, das sich auf der öden Heide erhebt, einen

so überwältigenden Eindruck, daß der Beschauer anwunderkürlich von Bewunderung erfüllt wird. Um eine Vorstellung von der Größe der pyramidenartigen Steine zu geben und von der Arbeit, die das Aufstellen derselben beansprucht, möge es genügen, wenn ich erwähne, daß der größte sich höher als 20 Fuß von der Erde erhebt. Drei aufeinander stehende große Männer erreichen diese Höhe nicht.

Die kleineren Steine, welche den inneren Kreis bilden, haben eine bläuliche Farbe und sind von einer Steinart, die sich nirgends in der Nähe findet. Man vermutet, daß sie aus Wales, der Bretagne oder einem gleichweit entfernten Ort zur Stelle geschafft wurden. Stone-





henge liegt mehr als fünf schwedische Meilen von der Küste entfernt, jedoch konnte der Transport der Steine wohl auf dem unweit des Monuments fließenden Avon veranstaltet werden. Auf jeden Fall beweisen diese weit hergeholtten Steine, daß beim Aufbauen dieses merkwürdigen Steinkreises keine Mühe gescheut wurde. Daß der Ort eine große Bedeutung hatte, geht ebenfalls daraus hervor, daß eine Menge Grabbügel in der Nähe liegen. Nirgends auf den britischen Inseln sollen sich so viele Grabbügel befinden, wie in der Gegend von Stonehenge.

Verwundert hat man lange nach der Bedeutung dieses mächtigen Kreises gefragt, und nach der Zeit, der er angehört. Die Antworten auf diese Fragen fielen sehr verschieden aus. Der eine glaubte, das Denkmal sei ein Grabmonument, der andere, es sei ein Tempel. Einer sagte, es stamme aus König Alfreds Tagen und sei also nur tausendjährig; andere erzählen, daß es ein halbes Jahrtausend früher aufgeführt sei, im vierten Jahrhundert, als Hengist und Horsa ihre angelsächsischen Scharen nach England führten. Vielleicht hat der Name „Stanhengest“ die Idee auf jenen Anführer gebracht, dessen Name den beiden letzten Silben gleicht. Wieder andere glaubten, es stamme aus der Zeit Alexanders des Großen, noch andere, daß es weit älteren Ursprung hat. Nun besteht kein Zweifel mehr, daß die letzte Ansicht die richtige ist.

Viele von den Grabbügeln um Stonehenge sind untersucht worden, wobei sie herausstellte, daß sie der Bronzezeit angehörten, die meisten sogar dem älteren Teil dieser Periode. Da die Bronzezeit im südlichen England um 2000 v. Chr. beginnt, haben wir durch diesen Umstand schon einen Anhalt dafür, das Stonehenge einer so frühen Zeit angehört. Dies hat sich auch dadurch besonders bestätigt, daß man in einigen Grabbügeln Stücke von den aufgestellten Steinen fand, selbst von den blauen, die ja erst aus anderen Gegenden hergesehafft wurden, als man das Monument anführte. Hieraus folgt, daß diese Hügel, die ebenfalls aus der älteren Bronzezeit stammen, zu der Zeit aufgeworfen sein müssen, als Stonehenge erbaut wurde oder später zu einer Zeit, als die Reststücke noch umherlagen.

Daß Stonehenge wirklich so alt ist, wurde

aneh durch die allerneuesten Untersuchungen unzweifelhaft festgestellt. Um einen dieser großen Steine aufzurichten, die lange schief standen, hat man nämlich vor kurzen rings um dessen Fuß gegraben und dort eine Menge Werkzeuge gefunden, die zum Behauen geeignet hatten. Diese Werkzeuge sind alle aus Stein, nicht ein einziges aus Bronze oder Eisen. Durch einen Versnob hat man sich davon überzeugt, daß die Wirkung dieser Steinwerkzeuge genau die gleiche ist, wie sie an der Bearbeitung der aufgeführten Steine zu erkennen ist, besonders zu den untersten Teilen, die in der Erde gestanden hatten und infolgedessen nicht verwittert oder einer anderen Veränderung ausgesetzt gewesen waren. Deshalb kann nunmehr kein Zweifel herrschen, daß Stonehenge zu einer Zeit entstanden ist, wo man allgemein Werkzeuge aus Stein benutzte, folglich also spätestens im Anfange der Bronzezeit. Das Metall war zu jener Zeit teuer und Stein wurde hauptsächlich verwendet zu Waffen und feineren Werkzeugen.

Daß Stonehenge ein Tempel war, wird jedem noch klarer, der die Periode kennt, welcher es angehört. Grabmonumente sahen nicht so aus. Wir können noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es war ein Sonnentempel, ein Ort, wo der Sonnengott angebetet wurde. In England wie in anderen Ländern in und außerhalb Europas war ja der Sonnengott Jahrtausende lang Gegenstand der Anbetung, wovon man die Spuren noch an vielen Stellen verfolgen kann.

Vor den beiden böosten, durch einen darüber liegenden Stein miteinander verbundenen Pfeilern liegt ein großer vierkantiger Stein, den man „Altar“ nannte. Steht man mitten davor, mit dem Rücken nach dem größten Pfeilerpaar, so hat man einen Weg vor Augen, der von dem Monument weg in gerader Linie nach Nordost führt. Auf diesem Wege, der rechts und links von einem niedrigen Erdwall und einem Graben begrenzt wird, ist etwas abseits vom Tempel ein hoher Stein aufgerichtet. Zu der Zeit, als der Tempel erbaut wurde, konnte man, wenn man bei Sonnenaufgang am 21. Juni, am längsten Tage des Jahres, am „Altar“ stand, einen Augenblick die Sonne links von diesem am Wege aufgerichteten Steine sehen. Daß man wirklich in der Vorzeit sich

im Tempel am genannten Tage zu versammeln pflegte, um die Sonne sich über dem Horizont erheben zu sehen, ersieht man am besten daraus, daß noch heute das Volk aus der Umgegend in dem nun weit von jeder menschlichen Wohnung gelegenen Stonehenge sich am 21. Juni versammelt, um den Sonnenaufgang zu sehen.

Nur sieht man die Sonne nicht mehr links vom Stein am Wege; infolge der veränderten Lage der Erde geht sie vielmehr jetzt weiter östlich auf. Einige von Englands größten

Astronomen sind nach genauen Beobachtungen zu dem Resultat gekommen, daß mehr als 3500 Jahre vergangen sind, seit jemand, der mitten vor dem „Altar“ in Stonehenge stand, die Sonne an der ersterwähnten Stelle aufgehen sehen konnte. Vor dieser langen Zeit müßte demnach der Tempel erbaut worden sein. Wir haben gesehen, daß dies gerade die Zeit ist, in welche der Altertumsforscher den Bau dieses merkwürdigen Sonnentempels verlegen muß.

## Neue Bücher und Schriften.

**Moritz Alnberg, Erbliche Entartung bedingt durch soziale Einflüsse. Unter Zugrundelegung seines auf der 75. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Kassel gehaltenen Vortrages. Kassel und Leipzig 1903. Th. G. Fischer & Co. 8<sup>o</sup>. 31 S.**

Das Studium der durch soziale Verhältnisse hervorgerufenen Entartungs- und Schwächezustände hat erst begonnen und es sind noch viele dunkle Punkte aufzuleuchten. Im Hinblick darauf will der Verf. nichts Fertiges, Abgeschlossenes bieten, sondern nur die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf Verhältnisse lenken, die bisher zu wenig Beachtung gefunden haben, obwohl sie für das Wohlbeyn unserer Nation von großer Bedeutung sind. Während einerseits die Kultur die Völker in gewisser Hinsicht vervollkommen, darf andererseits nicht die Frage mißlich nicht gelassen werden, ob nicht die zunehmende Kultur, sowie die durch die Vereinigung der menschlichen Individuen zu kleineren oder größeren Gruppen geschaffenen sozialen Verhältnisse unter gewissen Umständen die Körperkonstitution des Menschen in nachteiliger Weise beeinflussen.

Die Ergebnisse der Rekrutenmusterung in den verschiedenen Staaten gestatten, wie der Verf. darlegt, keine zureichenden Schlüsse darüber, ob in Europa eine durch körperliche Gebrechen sich zu erkennen gebende Entartung bzw. Rassenverschlechterung anzunehmen sei. Die Zunahme der Körpergröße läßt noch nicht den Schluß zu, daß der Gesamtgesundheitszustand sich verbessert hat, wie sich aus den Untersuchungen J. Jacobs über die körperlichen Eigenheiten der Juden der Londoner Westend ergibt. Der Verf. weist darauf hin, daß es möglich sein würde, die von der Deutschen anthropologischen Gesellschaft in Worms auf den Antrag von Prof. Schwalbe hin in Aussicht genommene anthropologische Rekrutenuntersuchung mit den für die Beurteilung des Gesundheitszustands und der körperlichen Entwicklung erforderlichen Feststellungen in einer für beide Zwecke vorteilhaften Weise zu vereinigen.

Unter Entartung versteht der Verf. jene Abweichungen von der Norm, die besonders geeignet sind, die der Fortpflanzung dienenden Keime zu schädigen und dadurch eine von Generation zu Generation sich vererbende Herabsetzung der Lebensfähigkeit hervorzurufen, für Krankheit, Verkümmern und Mißbildung die Grundlage abzugeben.

Als Ursache der körperlichen Entartung weist der Verf. darauf hin, daß die natürliche Zuechtwahl, nach der im Naturzustande die minderwertigen zur Entartung neigenden Angehörigen einer Rasse bzw. einer Bevölkerung frühzeitig zugrunde gehen und daher ihre

Entartungsanstöße nicht weiter vererben können, durch die kulturellen Verhältnisse entweder vollständig beseitigt oder doch wenigstens in ihrer Wirkung erheblich eingeschränkt wird. Im Naturzustande werden die mit Gebrechen behafteten Personen auch durch die geschlechtliche Zuechtwahl von der Fortpflanzung ausgeschlossen, während in den Kulturländern nicht die körperlichen und geistigen Eigenschaften, sondern vielmehr der Besitz und die Lebensstellung bei der Gattenwahl in der Regel den Ausschlag geben. Ick Strapazen und Gefahren der Kriege erliegen bei den Naturvölkern in erster Linie die schwächlichen Mitglieder des Stammes, bei den Kulturvölkern werden gerade die körperlich Tüchtigsten durch den Krieg dezimiert. Die durch die Industrie bedingte Art und Weise der Beschäftigung bedingt eine größere Sterblichkeit der erwachsenen Männer. Für die Erhaltung der körperlichen Tüchtigkeit eines Volkes ist die durch die Verhältnisse teilweise bedingte späte Verheiratung und gänzliche Ehelosigkeit körperlich Tüchtiger ein Schanden. Als Hauptursachen der die moderne Kulturwelt bedrohenden körperlichen und geistigen Entwicklung haben nach der Alkoholaßnahme sowie die verschiedenen geschlechtlichen Krankheiten zu gelten.

Als Entartungserscheinungen hebt der Verf. hervor das Anwachsen der Häufigkeit der Nerven- und Geisteskrankheiten, die Ausbreitung der Tuberkulose, die bei den Kulturvölkern weitverbreitete Kurzsichtigkeit und Zahnkaries, alle Unregelmäßigkeiten in der Schwangerschaft und der Geburt, sowie besonders die zunehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen.

Zum Schluß mahnt der Verf. noch einige Vorurteile, in welcher Weise der Vererbung der Entartungs- und Schwächezustände entgegenzutreten werden kann; er will, daß dieselben, wie er auch selbst betont, nicht als nun bestimmte, endgültig festgestellte Vorschläge aufgefakt werden, er stellt sie nur zur Diskussion.

Wir Menschen des 20. Jahrhunderts, schreibt er, können nicht wieder zu jenen primitiven Zuständen zurückkehren, wo die Tötung oder Preisgebung der körperlich Schwachen oder mit Gebrechen Behafteten als ein dem Gemeinwesen zu bringendes Opfer erachtet wurde und in unabweislicher Weise zur Ausführung kam. Wir müssen den schwächlichen und erkrankten Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft Hilfe ankommen lassen, soweit dies möglich ist. Aber in ihrer Fortpflanzung müssen sie verhindert werden, ebenfalls im Interesse der menschlichen Gesellschaft, die durch die erbliche Übertragung der Entartungs- und Schwächezustände aufs Hoche zu gefährdet wird. Speziell für eine Nation wie die Deutsche, deren Existenz auf dem Vordringen einer starken, schlagfertigen Land- und Seemacht, sowie eines zur Schaffung

des Heeres und der Flotte notwendigen, von Entartungsstadien und Krankheitsanlagen möglichst freien Menschenmaterials beruht, ist die Bekämpfung der erblichen Entartung und die darauf beruhende Erhaltung der Volksgesundheit und Volkstüchtigkeit gerade eine Lebensfrage, die den maßgebenden Faktoren zur völligen Erwigung und ersten Berücksichtigung nicht dringend genug ans Herz gelegt werden kann.

Müncheln.

Birkner.

**Koganei, Y.: Messungen an chinesischen Soldaten.** Separatdruck aus den Mitteilungen der medizinischen Fakultät der Kaiserlich Japanischen Universität zu Tokyo. Bd. VI. Heft 2. 1903. 28 Seiten.

Die Untersuchungen an Chinesen, speziell an Nordchinesen, waren bis jetzt sehr spärlich. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß während des japanisch-chinesischen Krieges 1904/1905 vom Seiten der Japaner die Gelegenheit benützt wurde, an den chinesischen Kriegesgefangenen anthropologische Messungen vorzunehmen. Koganei konnte dadurch die Resultate von Messungen an 942 Individuen über 20 Jahre alt finden.

Die Körpergröße der Japaner nimmt nach den Mitteilungen von Koganei ähnlich wie bei den Europäern bis zum 21. Jahre merklich zu und scheint nach Massenuntersuchungen erst im 30. Lebensjahre das mittlere Maximum (1696 und 1693 mm) zu erreichen. Die Nordchinesen (Janka) 1670,5 mm) sind größer als die Südhinesen (Weisch) 1630, Bretan<sup>2)</sup> 1628, Girard<sup>3)</sup> 1615, Hagun<sup>4)</sup> 1615,1 und 1614,1 mm, die Koreaner (1631 mm) und Japaner (Bälz<sup>5)</sup> 1680 bis 1500 mm).

Der Kopfdiöx der Nordchinesen (Janka 77,0), der sehr beständig schwankt, ist nicht erheblich von dem der Südhinesen verschieden (Hagen 82,8 und 81,8, Girard und Bretan 78,5). Für die Japaner gibt Balz einen Kopfdiöx von 76,3 (feine Männer), 78 (Studenten) und 79,1 (Arbeiter), sonst liegen keine genügende Vergleichsmaße vor, ebenso auch nicht für die Koreaner.

Der Längen-Ohrhöhlenindex ist bei den Nordchinesen etwas geringer als bei den Südhinesen (Hagen 68,5 und 66,5), Joehbogen-Gesichtsindex dagegen etwas größer (Hagen 84,0, 85,3).

Die Indizes scheinen nach den bisher bekannten Messungen wenig entscheidend für einen Unterschied der nördlichen und südlichen Chinesen, dagegen fällt dem Ref. an, daß die absoluten Maße im Norden größer sind als im Süden. Kopflänge (Koganei 188,5 gegen Hagen 180,3 und 183 mm), Kopfbreite (151,2 gegen 149,7 und 149,6 mm), Gesichtshöhe (Nasenwurzel bis Kinn) (123,5 gegen 118,5 und 120,2 mm), Joehbreite (141,3 gegen 141,1 und 140,8 mm), Horizontallumfang (533,6 gegen 537,2 und 539,4).

Die Körperproportionen sind bei Nord- und Südhinesen ziemlich gleiche mit Unterschieden von 1 bis 2 Proz. der Körpergröße. Von den Japanern kommen sie denjenigen der Arbeiter nach Hälfte am nächsten,

bei den feinen Männern und Studenten sind Arme, Beine und Brustumfang etwas kleiner im Verhältnis zur Körpergröße.

Die absoluten Maße und Indices bei chinesischen Soldaten nach Koganei.

|   | Mittlere Größe (mm) nach Koganei | Min.—Max.     | Zahl der gemessenen Individuen |
|---|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
|   |                                  |               |                                |
| <b>Kopf:</b>                                  |                                  |               |                                |
| Größe Länge . . . . .                         | 188,5                            | 164—210       | 942                            |
| „ Breite . . . . .                            | 151,2                            | 138—170       | 942                            |
| Ohrhöhe . . . . .                             | 123,5                            | 116—140       | 409                            |
| Stirnweite (kleinste) . . . . .               | 103,7                            | 91—115        | 313                            |
| Gesichtshöhe (Nasenwurzel bis Kinn) . . . . . | 125,5                            | 110—144       | 409                            |
| Joehbreite . . . . .                          | 144,3                            | 130—166       | 409                            |
| Nasenlänge . . . . .                          | 53,0                             | 44—63         | 409                            |
| Horizontallumfang . . . . .                   | 553,6                            | 500—605       | 942                            |
| Kopf-Index . . . . .                          | 80,2                             | 69,8—94,3     |                                |
| Längen-Ohrhöhlen-Index . . . . .              | 65,5                             |               |                                |
| Bretan . . . . .                              | 81,7                             |               |                                |
| Joehbreite-Gesichts-Ind. . . . .              | 87,0                             |               |                                |
| <b>Körper:</b>                                |                                  |               |                                |
| Körperhöhe . . . . .                          | 1676                             | 1480—1860     | 942                            |
| Klafterweite . . . . .                        | 1711                             | 1485—1955     | 927                            |
| Mittellingerhöhe . . . . .                    | 1383                             | 1230—1545     | 942                            |
| Mittellingerhöhe . . . . .                    | 625                              | 510—735       | 911                            |
| Arm länge (berechnet) . . . . .               | 757                              | 620—940       | 941                            |
| Trochanterhöhe . . . . .                      | 838                              | 710—980       | 942                            |
| Sitzhöhe bis Scheitel . . . . .               | 900                              | 805—1000      | 942                            |
| Schulterbreite . . . . .                      | 369                              | 260—420       | 941                            |
| Brustumfang . . . . .                         | 869                              | 790—1160      | 942                            |
| Exkursion des Thorax . . . . .                | 63                               | 15—123        | 929                            |
| Vitalkapazität . . . . .                      | 3214                             | 1300 linn     | 937                            |
|   | ccm                              | 5000 ccm      |                                |
| <b>Druckkraft der Hände:</b>                  |                                  |               |                                |
| rechts . . . . .                              | 37 kg                            | 15 bis 64 kg  | 837                            |
| links . . . . .                               | 35 „                             | 14 „ 63 „     | 836                            |
| Körpergewicht . . . . .                       | 64,394                           | 37,500 bis 94 | 942                            |
| <b>Körperhöhe:</b>                            |                                  |               |                                |
| Klafterweite . . . . .                        | 109,1                            |               |                                |
| Arm länge . . . . .                           | 45,2                             |               |                                |
| Trochanterhöhe . . . . .                      | 54,0                             |               |                                |
| Sitzhöhe . . . . .                            | 53,7                             |               |                                |
| Brustumfang . . . . .                         | 51,8                             |               |                                |

Müncheln.

Birkner.

**Ad. Bastian.** Die Lehre vom Denken. Zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Psychologie in Anwendung auf die Geisteswissenschaften. II. Teil. (Berlin, Ferd. Dummlers Verlag 1903).

Ganz allmählich, obwohl immer noch langsam und zögernd, kommt es unserer Zeit zum Bewußtsein, welche radikale Umgestaltung auf fast allen tiefsten wissenschaftlicher Erörterung die moderne Völkerkunde anbahnt: die ganze Kultur, worunter wir Religion, Mythologie, Recht, Sitten und Kunst begreifen, erhebt in ihrer psychologischen Begründung von hier die unabhätigen Impulse, basierte gilt auch von der Philosophie, sofern man darunter nur nicht die herkömmliche Darstellung der verschiedenen Lehren und Hypothesen (bzw. Systeme) versteht, die das alte

<sup>1)</sup> Weisch, Körpermessungen verschiedener Menschenrasen, Z. f. Ethnologie Bd. IX, 1877, Suppl. Berlin 1877, S. 79.

<sup>2)</sup> Kreis der österreichischen Preussische Novars um die Erde, Anb. Tbl., 2. Abt. Wien 1867, S. 12.

<sup>3)</sup> Bretan, Bull. de la Soc. J'Anth. de Paris 1879.

<sup>4)</sup> Girard, Note sur les Chinois du Quang-Si. L'Anthropologie, T. IX, 1909, p. 147.

<sup>5)</sup> B. Hagen, Anthropologischer Atlas ostasiatischer und melanesischer Völker, Wiesbaden 1898, S. 76.

<sup>6)</sup> Balz, Die körperlichen Eigenschaften der Japaner, II. Tbl. Mot. d. Mensch, Ges. u. Natur u. Völkerkunde Ostasiens 1885, Heft 32, S. 32.

dürstende Welttrübsal zu lösen versucht haben, sondern die Erkenntnis des menschlichen Bewußtseins selbst. Auch hier bedarf es einer reitlichen Scheidung des bloß Subjektiven und des Tatsächlichen, Objektiven, des in allen wechselnden Erscheinungen stets und überall wiederkehrenden Typischen. Der Altmeister der Ethnologie, der ja wiederum in seinem hohen Alter zum Wandelstern gegriffen, um in wärmeren, menschenwürdigeren Strahlen, wie er sich ausdrückte, neue Bausteine zu dem großen Dome der Menschheit zu setzen, wird nicht müde, von immer neuen Gesichtspunkten diese weitreichende Bedeutung seiner Wissenschaft zu beleuchten. Zunächst muß man sich hier machen, daß wir erst jetzt, wo wir eine ungehinderte Umfassung über den ganzen Globus gewonnen haben, imstande sind, die vielverfahrene Wissenschaft vom Menschen wirklich induktiv zu erfassen. Es handelt sich um die der Menschheit zur Aufgabe gesteckte Evolution, um die gesundheitlich normale Entwicklung des Menschen qua talis, und der Überhöhung des Menschengeschlechtes unter all seinen Variationen bildet also die erste unabweisliche Vorbedingung solcher Studien. Vornam war nur eine singuläre Entwicklungsstufe in Betracht gestellt, für jedes Geschlechtsvolk die seine, für uns dennem die der okzidentalen Kultur, die zwar in erhabener Höhe die übrigen des Erdballes überreicht, aber auf dem Rechenbrett der richtigen logischen Rechnung immer nur als einzige Eins zählt, mit der als solcher nichts anzufangen ist, solange proportionell entsprechende Vergleichen mangeln, zur Fixierung der Verhältnismerte für die Teilgrößen im ganzen. Daher das Unbefriedigende in den Aussagen über die Religion, trotz all der unablässig fortgesetzten Bemühungen, Klarheit zu gewinnen, in philosophischen geistlichen Auseinandersetzungen und den Ermahnungen glaubensnutziger Prediger (S. 127). Es leuchtet nämlich ohne alle weitere Beweisführung ein, daß, um ein abschließendes, sicheres Resultat zu gewinnen, wir ein möglichst umfassendes Material zur Vergleichung haben müssen, weil nur durch diese Untersuchung sich die verschiedenen Wertgrößen in ihrer gegenseitigen Beziehung bestimmen lassen. Nur auf diesem rein empirischen Wege können gewisse allgemeine Ideale für die Religion, Sitte, Recht, Kunst, ja für unsere psychologischen und metaphysischen Weltbilder gewonnen werden; denn stets geht zunächst der Weg vom Einzelnen zum Ganzen aus, und dann erst rückwärts zum Besonderen. Um sich davon eine konkrete Vorstellung zu machen, erinnere man sich, wie man neuerdings überall mit diesen induktiv-vergleichenden Forschung begonnen hat. Gegenüber der früheren, in der Hauptsache durch Hegel vertretenen Spekulation über die Entwicklung des Rechts nicht mehr nach dem Leitfaden einer allgemeinen Idee untersucht, sondern nach den sozialen Tatsachen, die uns die Völkerkunde auf allen Stufen menschlicher Gruppebildung zur Verfügung stellt; für die Kunstgeschichte gilt nicht mehr (wiewegstens nicht ausschließlich) das griechische ästhetische Ideal als maßgebend, sondern es handelt sich darum, die künstlerischen Instinkte auf ihre letzte, vielleicht sehr dürftige und unseinerbare Wurzel zurückzuführen, und so überall. Für diesen Standpunkt ist sodann eine zweite Voraussetzung maßgebend, auf die gleichfalls Bastian immerfort mit allem Nachdruck hinweist, die soziale Beschaffenheit des Menschen, ein Satz des Aristoteles, der aber erst in unserer Tagen recht in seiner Tragweite erkannt ist. Gewiß ist das persönliche Bewußtsein der große entscheidende Faktor für alles Geschehen, aber, was bislang viel zu sehr mißachtet ist, dies persönliche Bewußtsein wäre ein völlig toter Punkt, wenn es sich nicht fortwährend

speiste aus der jeweiligen Umgebung, von der es seine treibenden Kräfte empfängt. Das zeigt sich eben bei der Sprache, die man immer seltenerweise rein individuell, als Erfindung eines einzelnen fassen wollte, während sie umgekehrt ganz und gar ein soziales Produkt ist. Auf gesellschaftlicher Sprachschichtung wird die Umwandlung dadurch ins Dasein geführt, daß, von der Ergänzung des Antriebs (des rein somatischen Individuums) durch seine zoopolitische Organisation, die in jedwem sozialen Kreis angriffenen Konstituenten, auf einheitlich gemeinsamen Zweck zusammenwirkend, aus dem Durchkreuzen der zu psycho-physischen Entleerung verlängerten Funktionen kraft der untereinander substituierten Energien ein sonantiger Modus erzielt realisiert haben, und indem dieser nun, auf Grund der von den Gemeinbegriffen des Verstandes gebotenen Basis, in korrespondierende Wechselwirkung tritt zu individuell bereits eingetragenen Fähigkeiten, werden diese mittels der Vernunft zu regelrechter Entfaltung gebracht (S. 16). Das gilt, wie wir gleich noch genauer sehen werden, auch von der Logik, von der Lehre des Denkens und Erkennens, das wir ebenfalls auf seine einheitliche Wurzel zurückzuführen haben, anstatt uns lediglich bloß an formalen, dialektischen Kunststücken zu erfreuen; denn nur so lernen wir uns selbst verstehen, da, wie Bastian sagt, die vom Denken gestellte Aufgabe darauf hinaus kommt, das Unbekannte in die bisher umlagerte Nacht der Unwissenheit, bekannt zu machen, das Nichtwissen in ein Wissen zu überführen. Dies Problem wird in einer zweiten Schrift desselben Verfassers näher betrachtet.

Das logische Denken und seine Aufgaben. (Berlin, A. Asher & Co. 1908). Diese Schrift (freilich durch spätere Nachträge ergänzt) war der vorzüglicher Tagend der deutschen Naturforscher und Ärzte in Kasel unterbreitet, in Anbetriff einer brennenden Kernfrage unserer Gegenwart (wie es hier heißt), wieweit der erlähnte Aroop der Naturforschung in erster Linie berufen ist, sein Votum abzugeben. An und für sich stehen die Chancen für die Zukunft nicht schlecht: Der zeitliche Barometerstand der Kenntnisse steht auf schön Wetter und frohliche Fahrt, und mit akkumulierender beschleunigtem Fortschritt der Forschung mehrt sich der dauernd konsolidierte Wissensschatz von Tag zu Tag. Aber: Noch jedoch unlagern gewaltig bedrohende Wolkenbänke, aus denen es mit Wirbelstürmen und demnächst die Kontroversen einer zwiespältig zerrissenen Weltanschauung durcheinanderfahren. Es handelt sich nunmehr um eine naturwissenschaftliche, psychologische Entwicklung und Begründung unseres am Leitfaden der Kausalität sich abspielenden Denkens, die ihre Krone, wie Bastian es ausdrückt, in einer Lehre von der Noetik finden würde. Die gegenwärtige Verwirrung und Unklarheit ist noch Ansicht unseres Gewährsmannes in der Hauptsache entstanden durch eine unbedachte Übertragung der Psyche in aristotelischem Sinne als Seele, die im germanischen Idiome nur an Psyche ästhetisch das entsprechende Äquivalent bietet und in dieser bescheidenen Umschreibung ihr Beschäftigt ganz wohl zu verstehen befähigt sein würde. Ingegn fand sie sich als Mädchen für alles eingestuft und erhielt auch das Deutgeschäft aufgebürdet — l'âme pense toujours, Malebranche —, indem bei der Anna der ihr vermählte animus übersehn war, infolge der Geschlechtsabwischung in den römischen Filialen der aristokratischen somatischen Funktionen der Psyche theophrastisch streift es über auf die Gefühlsempfindungen der Psyche ästhetisch und weiter dann zu somatischen Bereich, wo die Psyche dialektisch in den Übergang vermittelt zur zoopolitischen Sprachschichtung" (S. 9).

Dieser Dianoetik, als einer streng erfahrungsgemäßen Logik, müßte wieder die führende Rolle zufallen, um allem leeren Wortstreit, dem Meinen und Scheinen, wie Bastian sagt, also dem bloß subjektiven Fährwahrhalten, den Bösen unter den Füßen zu entziehen, und das würde eben nur möglich sein auf Grund eines möglichst umfassenden Tatsachenkomplexes, der jedes gefällige Urteil sofort richtig stellt. In diesem Sinne soll jenes Rechnen mit bestimmten, feststehenden Größen verstanden sein. „Allgemeingültige Folgerungen werden dann sich ergeben, nachdem eine Erschöpfung der Denkmöglichkeiten hergestellt ist, mittels der dem logischen Rechnen logarithmisch gewährten Erleichterungen, aus den Elementargedanken, als Unitäten der Gesellschaftsgedanken. Durch frühreife Erklärungsversuche werden die richtig korrekten Proportionalitäten verschoben, aus subjektiven Fehlerquellen, während bei objektiv eingehaltener Zurechnung die Gesetzmäßigkeiten selber aussprechen haben, was von ihnen zu sagen, sie gewillt sein sollten“ (S. 69). Deshalb ist es auch so äußerst wichtig, als betreffenden Ausgangspunkt das Geistesleben der Stämme niedriger Gestalt zu wählen, wo auch alles streng gesetzmäßig abspielt und das Individuum sich noch nicht von der ursprünglichen sozialen Geländebildung losgerungen hat. „Auf primärem Niveau lebt der Wilde sein Denken subjektiv, bis der objektive Standort gewonnen ist, um die Vorgänge eigener Zugehörigkeit reflektiert sich zu vergegenwärtigen“ (S. 161). Deshalb ist, da ja bekanntermaßen die Tage der Naturvölker gezählt sind, Eile im Vorgehen, und Bastian läßt keine Gelegenheit vorbegehen, zur Eile im Borgen der durch die Sturmflut der europäischen Zivilisation bedrohten ethnographischen Schätze anzutreiben: „Der Alarmpfeif eines verhörend durch die Arbeitseifer der Völkerkunde dahinsausenden Großheuers bedarf stätiger Wiederholung und hat hiezhin eine wirksamste erhalten in diesjähriger Ansprache an das Anthropological Institute Londons: Each year sees a decrease in the lure, we might have gathered and this diminution of opportunity is taking place with accelerating

speed. Oh, if we could only agree to postpone all work, which can wait and spend the whole of our energies in a comprehensive and organized campaign, to save for posterity that information, which we alone can collect (1893). Ein Notschrei, wie er sein soll, zu richtiger Zeit gesprochen und am richtigen Ort, in demjenigen Inselreich nämlich, dessen Flotten am meisten beigetragen haben, um vormalis unbekanntete Forschungsfehler auf dem Globus zu erschließen und die Ethnologie durch herbeigeführtes Sammelmaterial, so wie die Berichte seiner Kolonialbeamten durchgreifend zu fördern, in Zeitläufen schon, wo die für künftiger Geschick der Menschheit maßgebende Lebensfrage noch in ihren Vorstadien schlummerte, ehe sie zur Bewußtheit dessen erwacht war, was aus kategorischer Imperativ pflichtgemäß hier aufliegt, um den obliegenden Aufgaben zu genügen, aus gemeinsamer Konsolidarität“ (S. 55). Wie Chamaissa, darin ein nur zu wahrer Prophet, über die Zukunfft der von ihm damals besuchten Inselgruppe Hawaii klagte, daß der Schlüssel zu einem der wichtigsten Rätsel in der Geschichte des Menschengeschlechtes in der Stunde, wo er aus in die Hand gegeben, ins Meer der Vergessenheit verwanzt werde. Es ist fast räuhrend zu sehen, wie der Altmeister der Völkerkunde, wie wir bereits bemerkten, noch jetzt in seinem hohen Alter wieder hinauszuflucht nach dem ethnographisch so überaus reichen Indonesien (das nächste Reiseziel ist freilich Ceylon), um mit größtem Späherauge das ethnologisch bedeutungsvolle Material aus dem Chaos, das auch dort allmählich durch die Kreuzung des Islam mit chinesischer und indischer Kultur eingetreten ist, zu retten. Moge ihm auch hier eine ähnlich wichtige Entdeckung beschieden sein, wie gerade in Honolulu, wo er Anfang der achtziger Jahre das uralte Tempigedicht: He pule heia auia und um zungänglich machte, wodurch sich ganz überraschende psychologische Einblicke in die Kosmogonie jenes so äußerst begabten Volkes herausstellten. Das würde für Bastian selbst der reichste Lohn sein.

Bremen.

Th. Achelis.

Aus der russischen Literatur.

Nachrichten (Iswestija) der Kaiserlichen Archäologischen Kommission.

Heft 1 bis 5. Mit 2 Beilagen. St. Petersburg 1901/1903.

Von

Prof. Dr. Ludwig Stieda (Königsberg i. Pr.).

Die Kaiserl. Russische Archäologische Kommission, die unter dem Präsidium des Grafen Alexei Alex. Bobrinskij steht, gab bisher nur Jahresberichte (Otschety) und Beiträge zur Russischen Archäologie (Materialy po Archeologii Rossii) heraus. Seit einigen Jahren ist eine neue Zeitschrift hinzugekommen. Unter dem Titel „Nachrichten“ (Iswestija) erscheinen in unregelmäßigen Zeitabständen einzelne Hefte, die über die Arbeiten der archäologischen Kommission berichten. Bisher sind fünf Hefte und einige Beilagen erschienen. Durch die Güte des Präsidenten Grafen Alexei Bobrinskij sind mir kürzlich die bisher erschienenen fünf Hefte nebst Beilagen, sowie die anderen Arbeiten der Kommission zugegangen. Ich bin daher in der Lage, über den interessanten Inhalt der Nachrichten zu berichten.

Herrn Grafen Bobrinskij aber sage ich auch hier meinen Dank für die Übersendung der Schriften der Kommission.

**Nachrichten  
der Kaiserl. Archäologischen Kommission.**

Heft 1. St. Petersburg 1901. 11 Seiten. — Mit 2 Tafeln und 116 Zeichnungen im Text.

In den einleitenden Worten ist gesagt, daß die Nachrichten folgenden Inhalt haben werden:

1. Berichte über archäologische Untersuchungen und Ausgrabungen, die auf Veranlassung und unter Beihilfe der Kommission ausgeführt wurden.

2. Wissenschaftliche Übersichten über einzelne Gruppen archäologischer Denkmäler und über einzelne Kulturen (Russische Altertümer, griechisch-römische Altertümer im Süden Rußlands, skythische, sarmatische, kaukasische, finnische Altertümer usw.)

3. Beschreibungen von Gräberinventarien, Schätzen und Einzelfunden, die der Kommission übergeben worden sind.

4. Mitteilungen über alte Bandenkunstler in verschiedenen Gegenden des Russischen Reiches, sowie Erörterungen über die Restauration der Bauwerke.

5. Mitteilungen aus dem Archiv der Kommission.

6. Anleitende Aufsätze über verschiedene archäologische Fragen, z. B. über die Vornahme der Ausgrabungen usw.

7. Erörterungen über den Schutz der Altertümer in Rußland und im Ausland.

Außerdem sollen zeitweilig bibliographische und andere Mitteilungen hinzugefügt werden.

Das erste Heft enthält (NB. das Inhaltsverzeichnis ist nicht allein russisch, sondern auch französisch):

1. **Kossulsko Walusynien, K. K.:** Auszug aus dem Bericht über die Ausgrabungen im Taurischen Chersones während des Jahres 1899. Mit einer Tafel und 53 Zeichnungen im Text. (S. 1 bis 53.)

Es sind hier die Berichte über die Fortsetzung der Ausgrabungen während des Jahres 1899 gegeben. Die letzte Mitteilung, an welche der vorliegende Bericht sich anschließt, umfaßt die Jahre 1895 bis 1898 und ist in dem Jahresberichte (Otschet) der Kaiserl. Archäologischen Kommission enthalten. Es handelt sich um eine sehr sorgfältige Untersuchung der ausgegrabenen Bauwerke, sowie um die Beschreibung der dahin gehörigen Kunststücken, die in vortrefflicher Weise dargestellt sind (s. Fig. 1 bis 23). Zum Schluß ist noch ein Register solcher Gegenstände angefügt, die im Anschlusse an die Gegenstände in den Grabgewölben gelegentlich bei den Ausgrabungen gefunden worden sind: epigraphische Altertümer, d. h. Gegenstände mit Inschriften und Zeichen, griechische und römische Münzen, allerlei Gefäße und Urnen aus altgriechischer, römischer und byzantinischer Zeit, allerlei Gerätschaften, Waffen, Instrumente usw. Ein großer Teil der Gegenstände ist abgebildet.

Einen Auszug an liefern ist nicht möglich.

2. **Latyschew, W.:** Eine Inschrift, die den Bau einer Mauer im Chersones betrifft. Mit einer Zeichnung. (S. 56 bis 59.)

Bei Gelegenheit der Ausgrabungen, über die im vorhergehenden Aufsatz berichtet wird, ist eine Inschrift gefunden, die in griechischer Sprache die Errichtung einer Stadtmauer meldet. Die Inschrift bezieht sich auf die Regierung Theodosius I. (379 bis 395 n. Chr.); sie ist nach der Ansicht des Verfassers wichtig als ein historisches Dokument, das auf eine der dunkelsten Epochen der Geschichte der Chersones ein Licht wirft. Wir erfahren daraus, daß unter der Be-

güring Theodosius die Stadt Chersones zum Kaiserreich gehörte, insofern die Sitze den Kaiser als ihren Herrscher (Despoten) anerkennt.

### 3. Röhrich, N.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Altertümern von Waldai und von Wod. Mit 8 Abbildungen im Text. Ein Bericht über die Ausgrabungen im Jahre 1900. (S. 60 bis 68.)

Mit dem Jahn'schen Kaiserl. Russische Archäologische Gesellschaft im Gebiet der Gouvernements Pskow und Nowgorod eine Reihe von Untersuchungen vornehmen lassen in der Absicht, den Typus der slavischen Begräbnisweise festzustellen. Die Ausgrabungen, über die hier berichtet wird, sind im Kreise Waldai (Gouv. Nowgorod) vorgenommen. Es handelt sich um einen Grabhügel und um vier Kurgane im Gebiete des Landtages Kotowo. Der auf Vorschlag des Herzogs Nik. Leuchtenberg untersuchte Grabhügel liegt 10 Werst (Kilometer) von der Station Okolowka am Ufer eines Sees, der dem Herzog. Gut Gory angrenzt. Die Gegend heißt „Woskressenkiy Nos“; man meint, dieselbe hätte früher ein Kloster gestanden, das zur Zeit der „Lithauischen Verheerung“ zerstört worden war. (Auf die Lithauische Verwüstung oder Verheerung werden alle Grabhügel zurückgeführt.) Der Grabhügel von Woskressenkiy ist ein Hügel von etwa  $3\frac{1}{2}$  Arschin (etwa 2,5 m) Höhe, bewaldet mit Stranowork und Büschen, bestreut mit kleinen und großen Steinen. Der größte Stein war so ansehnlich, daß man bis acht Menschen Muhe hatten, ihn zu bewegen. Die Steine lagen in ein bis zwei Schichten übereinander, an einzelnen Stellen lag die unterste Schicht der Steine fast unmittelbar auf den Skeletten. — Am Gipfel wurde unter dem Rasen ein Kreuz aus rötlichem Sandstein gefunden. Unter der oberen Steinschicht lagen viele Aschenreste, Scherben von Töpfen, meist ornamentierten Gefäßen, die auf einer Seite angefertigt waren.

In einer Tiefe von  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{2}{3}$  Arschin (0,60 bis 1 m) unter der Gipfelfläche befand sich eine ganze Schicht von Skeletten, etwa 30 Stück, die dicht nebeneinander lagen. Die Knochen sind gut erhalten; die Richtung der Skelette von Osten nach Westen, der Kopf nach Osten gewandt. Die Skelette gestreckt, die Arme ausgestreckt oder das Becken berührend. Neben den Knochen zahlreiche Kohlenstücke und Topfscherben — keine anderen Gegenstände. Bei weiteren Vordringen erwies es sich, daß der Sand unter der Skelettschicht nicht dem eigentlichen Erdbecken angehört, sondern aufgeschüttet war. Der Sand war untermischt mit Kohlen und Asche; in einer Tiefe von  $2\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{2}{3}$  Arschin (2,2 m) stößt man auf eine zweite Schicht von Skeletten, etwa 13 an der Zahl — in verschiedenen Gegenden der aufgeschütteten Erde — die Knochen brüchig, sehr viel schlechter erhalten als die der oberen Skelette. Die Schädel deutlich dreieckig; die Lage der Skelette sitzend, das Gesicht nach Süden gekehrt. Unter den Skeletten befindet sich keine Asche, keinerlei Gegenstände, nur bei einem einzigen Skelett wurden einzelne Topfscherben entdeckt.

In einer gewissen Entfernung von diesen zweiten Skeletten befand sich abermals eine Schicht von Kurben und Asche; die Mächtigkeit dieser Schicht schwankt zwischen  $2\frac{1}{2}$  bis  $5\frac{1}{2}$  Werschok (10 bis 22 cm). Es handelt sich offenbar um die Reste eines sehr ansehnlichen Scheiterhaufens, der sich über einen beträchtlichen Teil der Erdschüttung erstreckt hatte. Inmitten dieser Aschenhaufen entdeckte man die Reste von halberbrannten Eisenklötzchen, die Stücke eines halberbrannten Schenkelsknochens eines großen Säugtiers und einige Schelken von Eisen, vielleicht auch mit Beimischung von Kupfer. Unter den Aschenmassen lagert eine 2 bis 3 Werschok (8 bis 12 cm) dicke Schicht reinen, weißen Sandes in der ganzen Ausdehnung des

Hügels. Unter dieser Sandschicht liegt der feste rötliche Sand, der eigentliche Erdbecken bildet.

Aus diesem eben geschilderten Befund kann man folgenden Schluß in betreff des Aufbaues des Grabhügels ziehen:

Eine geringe natürliche Erhöhung ist zur Aufnahme eines gewaltigen Scheiterhaufens bergerechtigt worden; die Erhöhung ist mit einer gleichmäßigen Schicht weißen Sandes bestreut worden. Inmitten dieser gewaltigen Scheiterhaufen errichtet und angezündet — der Brand muß ein gewaltiger gewesen sein, denn sonst hätte nicht eine solche Masse von Asche übrig bleiben können. Auf diese Brandschicht ist dann eine fast ein Arschin (2 m) mächtige Schicht gelben Sandes aufgeschüttet worden — durch diesen gelben Sandeschieht ziehen sich Streifen von Asche und Kohle. Die ganz aufgeschüttete Erdmasse ist dann sehr dicht mit mächtigen Steinen belegt worden. Es muß hierbei bemerkt werden, daß die Mehrzahl der sehr oberflächlich liegenden Steine einen sehr starken Feuer ausgesetzt war, die Steine zerfallen sehr leicht; es läßt sich nun nicht feststellen, ob es das Feuer des ursprünglichen Scheiterhaufens war oder das Feuer, dem die oberen Kohlen- und Scheiterbänke ihrer Dasein verdanken. Diese den Kohlen- und Aschenbänken aufliegende Sandaufschüttung hat nun zu verschiedener Zeit als Begräbnisstätte gedient, sowohl für die sitzenden Leichen in der Höhe von  $2\frac{1}{2}$  Arschin (etwa 2 m) als auch für die liegenden Leichen in einer Höhe von 1 Arschin (0,7 m).

Die verschiedene Zeit der Bestattungen in dem beschriebenen Hügel kann in folgender Weise bestimmt werden. Die Errichtung des grundlegenden Scheiterhaufens geschah im X. Jahrhundert, die tiefen Bestattungen der sitzenden Leichen geschahen im XII. bis XIV. Jahrhundert und schließlich die oberflächlichen Begräbnisstätten der liegenden Leichen im XV. Jahrhundert, vielleicht auch zu Anfang des XVI. Jahrhunderts. Dabei bleibt es noch zu entscheiden, ob der Grabhügel von Woskressenkiy als Kurgan oder als ein gewöhnlicher Massengrabhügel aufgefagt werden soll. (Derartige Grabhügel werden in jenen Gebiete nicht Kurgane, sondern Shalniki genannt — Shalniki ist eigentlich ein Ort der Trauer). In der Nähe dieses großen Grabhügels liegt noch ein anderer kleiner mit gestreckten Skeletten. Die untersuchten zwei in der Nähe befindlichen kleinen Kurgane von etwa  $1\frac{1}{2}$  Arschin (1 m) Höhe ergaben nichts Besonderes, sie waren bereits einmal aufgeschüttet. Unmittelbar oberhalb des Boden waren Spuren eines Kohlenhaufens und darzwischen noch einige Beinnochen zu sehen, alles andere war zerstört.

Ausführliche Berichte über diese und andere Grabauffdeckungen werden in den Schriften des Archäologischen Instituts zu St. Petersburg veröffentlicht werden. Der Verfasser sieht sich zur vorläufigen, zwei Bände noch besonders hier zu erwähnen. In einem Kurgan, der etwa 2 Arschin (1,4 m) hoch war, lag die Begräbnisstätte etwa in der Höhe eines Arschins (0,70 m). An der Oberfläche der Erhebung waren zwei Schichten zu unterscheiden: erstens eine Schicht weißen Sandes, zweitens eine etwa 2 Werschok (9 cm) mächtige Schicht von Asche, die aber nicht der Rest eines Scheiterhaufens war. Auf dieser Aschenlage lag das sitzende Skelett, das stark vermodert war. (Der Berichterstatter spricht stets von sitzenden Skeletten; es scheint mir aus der Schilderung hervorzugehen, daß es sich um Skelette von Leichen, die in gekrümmter Lage bestattet sind, handelt.) Es werden die in solchen Stellungen befindlichen Leichen, wie mir erscheint, meist ganz richtig wohl auch als „Hoeker“ bezeichnet.) Bei jenem Skelett lagen: eine Fibula, ein Ring, ein eisernes Messer, ein Gewebefestern mit etwas Bronze, eine silberne Platte an rechten Arm, eine zerbrochene Silbermaske der



Stadt Naumburg aus dem XI. Jahrhundert. In runder Kurgan, etwa 2 Arschin (1,1 em) hoch, enthält auch ein sitzendes Skelett, aber nicht oben in der Aufschüttung, sondern unmittelbar auf dem festen Erdboden; darunter Kollon und Nand. Die schlecht erhaltenen Knochen weisen die Spuren von Braunfärbung auf, die Gegenstände selbst waren verschieden, nur eine silberne Münze des kaiserlichen Pilgrim aus dem XI. Jahrhundert wurde entdeckt. Auffallenderweise fehlten in beiden Kurganen menschliche Steine, sowohl in der Erdanföchtung wie an der Basis, sonst sind Steine überall vorhanden.

Ein in der Nähe des Dorfes Wjatliga befindliche Kurgangruppe ist bereits von Iwanowski untersucht worden, leider sind die darüber geföhrten Tagebücher sehr dürftig.

#### 4. Spizyn, A. A.: Bericht über Ausgrabungen im Jahre 1897 in der Nähe des Dorfes Baschmatschka (Kreis Jekaterinowlaw). Mit 2) Abbildungen im Text. (S. 69 bis 76.)

Der Verfasser besetzt hier Mitteilungen über die Ergebnisse des Aufschörens von 6 Kurganen. In es sich um eine ziemlich knappe Beschreibung handelt, so läßt sich ein Auszug nicht geben. Es erscheint mir jedoch der Bericht über den Kurgan Nr. 6 besonders bemerkenswert, weil, trotzdem daß der Kurgan bereits einmal von Ranber besetzt worden war, die Art und Weise des Aufbaues sehr klar aus dem Befund zu entnehmen ist.

Der Kurgan ist 10 Arschin (4 m) hoch, er hat eine Ausdehnung von Osten nach Westen von 21 Saschi (etwa 65 m); nach Norden fällt der Hügel steiler ab. Der Kurgan besteht aus drei übereinanderliegenden Schichten (s. Fig. 5 auf S. 73). Die unterste, tiefste Schicht besteht aus Basenstrümmern, die darauf folgende zweite Schicht besteht ebenfalls aus Basenstrümmern, während die dritte, oberste Schicht nur aus Schwarzeisen besteht. Die unterste Schicht hat eine Mächtigkeit von 3 Arschin (2 m), die mittlere eine Mächtigkeit von 4 Arschin (2,8 m), die oberste Schicht ist nur 3 Arschin (2 m) dick. Die einzelnen Schichten sind sehr deutlich voneinander getrennt. Die zweite Schicht ist im Grunde von einer steinernen Mauer von etwa 1 Saschi (2 m) Höhe umgeben. Der Steinkreis (Umfassungsmauer) hat einen Durchmesser von 18 Saschen (etwa 56 m) und besteht aus Kiesel und behauenen Steinen. Zwei übersichtliche Abbildungen (Fig. 5 und 6) erläutern den Aufbau des Kurgans; leider können wir diese Bilder hier nicht wiedergeben.

Die Auföckung des Kurgans geschah in der Weise, daß aus der Mitte heraus in östlicher Ausdehnung von 13 Saschen (26 m) Länge und 11 Saschen (22 m) Breite die Erde herausgehöht wurde und daß man von dem steinbleibenden Rändern an 21 Stellen (Minen) bis zur Umfassungsmauer vordrang. In der Auföchtung fanden sich vermaeltete Pferdeknöcher und Seherben von Amphoren.

Der Kurgan war freilich bereits einmal von einem Grabräuber heuchet worden, aber trotzdem ließ sich der eigentümliche Aufbau deutlich erkennen.

Fast im Mittelpunkt des Kurgans, d. h. etwas mehr nach Norden, wurde in dem festen Erdboden (Grund) eine tiefe Grube entdeckt, welche einen Eingang in zwei Grabkammern darstellte. Die Tiefe des Eingangeschachtes oder der Eingangsrube betrug etwa 7 Arschin (etwa 5,25 m), die Breite 3 Arschin (2,10 m), die Länge 4 Arschin (2,90 m). Die Grube war fast bis zum Rande gefüllt mit mittelgroßen ganzen Steinen und mit vielen Steinstrümmern, einige Steine hatten eine Ausdehnung von etwa 2 Arschin (1,40 m); der oberste Teil der Grube war etwa  $\frac{1}{2}$  Arschin (0,35 m) mit Erde gefüllt, es war offenbar die Erde durch ihre Schwere zusammen-

gesunken. Von dieser Grube oder diesen Gängen gelangt man in zwei Grabkammern (s. Fig. 7 auf S. 74), eigentlich ist es eine große Grabkammer und eine sich daran anschließende Nische, die durch eine  $\frac{1}{2}$  Arschin (35 em) dicke Wand voneinander getrennt waren, vorhanden, die eigentliche Grabkammer stellt einen unregelmäßig runden Raum von 9 Arschin (3,6 m) Länge und 8 Arschin (3,6 m) Breite dar; die Lage eines Winkels der Grabkammer war eingestürzt — die Höhe ist eine so beträchtliche gewesen, daß ein Erwachsener bequem darin aufrecht stehen konnte. Beim Eindringen in den Raum erwies es sich, daß die Kammer bereits ausgeraubt war, doch ließ es sich erkennen, daß offenbar 3 Leichen darin Platz gehabt haben. An einer Stelle (Fig. 7 I) lagen ein Menschenschädel, Wirbelknöchel und Gliederknochen auf einem Lager; dabei bronzezeitliche Pfeilsitze, einige knöcherne und eiserne Haken usw. An einer zweiten Stelle war ein weibliches Individuum bestattet worden und an einer dritten, wie es schien, ein kleines Mädchen. Dabei lagen neben anderen eisernen Sachen: 2 bronzezeitliche Ringe, auf denen gläserne und andere Perlen aufgereiht waren (Fig. 9, S. 75), ferner goldene Plättchen mit der Abbildung einer Chinnare (Fig. 12), mit dem Kopf einer Athene mit Helm (Fig. 13) mit dem Bild eines Iasos (Fig. 14) u. a. m.

Nah dem Ausgange der Grabkammer lagen einige Pferdeknöcher, Rippen, Schulterblatt, Beckenknochen (Fig. 7, III, IV), dabei allerlei andere silberne und eiserne Gegenstände, darunter auch eine Lampe (Fig. 19). Ferner fanden sich in dem unteren Teile der Grube Nadeln, davon noch zwei in der Wand stecken, ein eisernes Messer mit den Resten eines knöchernen Griffes. (Der Verfasser gibt auf Seite 76 hin 77 ein sehr genaues Verzeichnis über die gefundenen Gegenstände mit Hinweis auf die Abbildungen.)

Die Nische liegt im nordwestlichen Winkel des Einganges; sie ist etwa 2 Arschin (1,40 m) hoch, 2 Arschin tief und  $\frac{3}{4}$  Arschin (2,5 m) hoch. Der mittlere Teil ist durch die herabgestürzten Steine so gefüllt, daß man ihn nicht untersuchen konnte. Ein Absatz der Nische war geweiß, man fand darin den Griff eines silbernen Bechers (Kylis) und einige Schafknochen.

In einer Entfernung von 4 Arschin (2,8 m) von dem Schacht befand sich ein Grab, in dem ein Pferd bestattet war. Die Grube war  $\frac{3}{4}$  Arschin (2,5 m) lang,  $1\frac{1}{2}$  Arschin (3,1 m) breit und 2 Arschin (1,40 m) hoch. Das Grab war durch vier große Steinplatten geschlossen worden (drei davon sind herabgesunken) und dann hatte man eine Anzahl Steine darauf gelagert. An dem Boden des Grabes lag ein Pferd auf der rechten Seite, die Beine an den Humpen herangezogen. Zwischen den Zähnen des Pferdes befand sich noch das eisernen, gutgeformte Mundstück (Trense), dabei allerlei andere dem Geschirr zugehörige Sachen.

Der Kurgan war offenbar von einer geschickten Hand ausgeraubt. Der Grabräuber war von südlichen Abschnitt des Kurgans, oberhalb der Steinmwallung, bis zum festen Erdboden vorgedrungen und dann durch einen Minsengang gerade nach Norden zu vorgegangen, bis er auf den eigentlichen Grabhschacht stieß. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß das Herausziehen der Steine aus dem gefüllten Schacht mit zu großen Schwierigkeiten verbunden war, machte er neben dem Schacht eine ovale Grube mit drei Stufen, erreichte damit den Winkel der Nische und gewann dadurch den Eingang in die eigentliche Grabkammer (Katakomben).

Oberhalb des Grabhschachtes, nach Süden hin, wurde noch eine andere zu rauhersiehen Zwecke angelegte Grube entdeckt; ob die Grube von demselben Räuber herührte, der den Minsengang angelegt hat, oder einem anderen, läßt sich nicht entscheiden. In der Wand des rauhersiehen Minsenganges, etwas oberhalb der

eigentlichen Erdoberfläche, wurden noch Reste einer anderen Bestattung entdeckt: menschliche Extremitäten, Knochen, dazwischen bronzene und eiserne Pfeilspitzen, ein eisernes Messer usw. Der Wahrscheinlichkeit nach stammt dieses offenbar männliche Grab aus einer anderen Zeit als der, zu der der Kurgan errichtet ward, doch kann der Unterschied kein sehr großer sein. Zu denjenigen Sachen, die bisher noch nicht in den sog. Skythenkurganen gefunden worden sind, sind von den aufgezeichneten Gegenständen zu rechnen: einige Arten von gläsernen Perlen, Perlen aus Seelwieskies (?), goldene Plättchen mit der Abbildung von Chitaren mit dem Kopf der Athene mit dem Helm und mit einem Kopfe im Dinseln (Fig. 14 bis 16 auf S. 76).

5. **Duhmberg, K. E.:** Auszug aus einem Bericht über die Untersuchungen von Gräbern in Kertsch und in der Umgebung während des Jahres 1899.

Im Jahre 1898 hat Herr K. E. Duhmberg, Direktor des Museums der Altertümer in Kertsch, sowohl in der Stadt Kertsch, als auch in der Umgebung der Stadt einige zehn Katakomben und Gräber aufgedeckt. Die Gräber waren sehr verschieden, sie gehören ganz verschiedenen Epochen an. (Vom V. Jahrhundert v. Chr. bis zum IV. Jahrhundert n. Chr.) Der ausführliche Bericht Duhmbergs wird in dem Jahresberichte von Kertsch 1899 erscheinen. Die hier abgedruckten Notizen sind darin als ein von der Redaktion gemachter Auszug aus den Ergebnissen der Aufdeckungen in chronologischer Reihenfolge von Januar bis Dezember enthalten. Eine Wiedergabe ist nicht möglich.

6. Die Aufdeckung der Kurgane auf dem Suboweschen Landgut im Gebiet Kuban. Mit 31 Figuren im Text. (S. 94 bis 104.)

Im Gebiet von Kuban, zwischen den Flüssen Großer und Kleiner Selentschuk, 20 Werst (km) von der Station Tenginskaja, liegt das Landgut Subowa. Die Besitzer dieses Landgutes, eine Anzahl kleinrussischer Bauern, überließen gegen eine Entschädigung Herrn Sabrodin das Recht, einzelne auf ihrem Grund und Boden liegende Kurgane aufzudecken.

Sabrodin grub 1869 vier Kurgane auf, davon gab es zwei Kurgane interessanter Befunde. Die dieselbst gefundenen Gegenstände wurden durch die Kaiserl. Ehrenmitge angekauft und von G. Kiseritsky im Jahrbuch der Kaiserl. Deutschen Archäolog. Sammlung, Bd. XVI, 1901, Heft 2, Archäolog. Anzeiger, S. 55 ff. beschrieben.

7. **Wladimirow, J.:** Die Ruinen eines alten Tempels beim Flusse Amgata (S. 104 bis 106).

Wladimirow beschreibt die Ruinen eines alten christlichen Tempels im Kubaschen Gebiet (Kankaus).

8. **Spjatz, A.:** Eine silberne Fibel skandinavischen Typus, gefunden im Urgrabergrube des Dou. Mit 5 Abbildungen. (S. 107 bis 111.)

In der Sammlung der gelehrten archäologischen Kommission zu Orfel befindet sich eine bemerkenswerte Fibel, die das Mitglied der Kommission N. P. Petrov der Kommission geschenkt hat. Die Fibel ist 7 Werst von Nord-Och (Gauz, Orfel), am Flusse Worgia, in einem Gesteinspalt gefunden worden.

Leider ist die Fibel nicht vollständig; sie hat ursprünglich aus zwei seitlichen Halften bestanden, die durch einen gekrümmten Bogen miteinander vereinigt waren. Aber eine Hälfte ist verloren, die andere Hälfte ist zum Teil nur erhalten. Die Fibel ist aus massivem

Silber und zum Teil verguldet. Das Gewicht der noch erhaltenen Stücke ist 52 Solotnik, 72 Dojg (etwa 225 g). Daraus läßt sich das Gewicht der ganz unversehrten Fibel auf mehr als 80 Solotnik (etwa 311 g) berechnen; sie war 14 cm lang und gegen 6 cm breit. Der Verfasser gibt eine sehr genaue Beschreibung der sehr ornamentierten Fibel. Da die Abbildung nicht reproduzieren konnte, so hat die Wiederholung der Beschreibung keinen Wert; es sei nur hervorgehoben, daß die Verzierungen in allerlei hübsch angefügten menschlichen und tierischen Figuren, sowie einzelnen Köpfen bestehen. Nach dem Urteil der Stockholmer Archäologen gehört die Fibel in das X. Jahrhundert. Ähnliche Fibeln sind in den skandinavischen Museen vorhanden, aber eine Fibel von solchem Umfang, wie die Orfelche sie besitzt oder richtiger besessen hatte, ist bisher nicht bekannt geworden.

### Nachrichten (Iswestija)

#### der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 2. St. Petersburg 1902.

Mit einem Portrait (Baron Tiesenhausen), 6 Tafeln und 91 Zeichnungen im Text.

Dazu eine Beilage. St. Petersburg 1902/1903.

1. **Kosciuszko-Walujsyns, C.:** Bericht über die Ausgrabungen im turrischen Chersones während des Jahres 1900. Mit Tafel 1 bis 3 und 40 Textzeichnungen. (S. 1 bis 39.)

Eine Fortsetzung der im ersten Heft erwähnten Arbeit.

2. **Duhmberg, K. E.:** Auszug aus dem Bericht über die Ausgrabungen während des Jahres 1900 in der Stadt Kertsch wie auf der Halbinsel Taurien. Mit 19 Zeichnungen im Text. (S. 40 bis 61.)

3. **Latschew, B.:** Griechische und lateinische Inschriften, die während des Jahres 1900 im südlichen Rußland gefunden worden sind. Mit 20 Zeichnungen im Text. (S. 61 bis 72.)

Die betreffenden, hier beschriebenen und erklärten Inschriften sind zum Teil in Übersetzung aufgedeckt worden. Im Jahre 1899 hat C. Kosciuszko-Walujsyn 26 Inschriften gefunden, deren sind bereits 12 beschrieben in den kürzlich erschienenen vier Bände der „Inscriptions antiquae aere septentr. Pontis Euxini“; die anderen 14, die dort keine Aufnahme mehr finden konnten, sind hier beschrieben und abgebildet. Es sind Trakinschriften u. a.

4. **Pharmakowsky, B.:** Fragmenteinertöneren, mit einem Relief geschmückte Schale aus Olbia. Mit 3 Zeichnungen. (S. 73 bis 80.)

Das hier beschriebene Braueltaek, das mit einem Satyrkopf geschmückt ist, gehört zu einer Schale, die im 1861, wie in der Technik eine sehr große Ähnlichkeit mit einer Schale des Bonner Museums (Dragerdorff in „Bonner Jahrbuch XCVI bis CXVII, 1866“) hat; beide Schalen sind offenbar aus ein und derselben Werkstatt hervorgegangen; sie gehören wahrscheinlich in das III. bis II. Jahrhundert v. Chr.

5. **Lena, E.:** Waffen und Pferdgeschirr, gefunden in der Nähe des Dorfes Desjanowsk (Kreis Melitopol, Gouv. Taurien). Mit 15 Zeichnungen. (S. 81 bis 94.)

Im Oktober 1899 deckten die Arbeiter des Gutbesizers Bauman beim Pflügen ein mit großen, flachen Steinen verdecktes Grab auf; sie fanden darin einen menschlichen Schädel, sowie andere menschliche Knochen

und in der Nähe davon Reste eines Pferdeketts, außerdem allerlei Reste von Waffen, auch Pferdegeschirr.

Die Waffen und das Pferdegeschirr waren schlecht erhalten und zerbrochen, stark oxydirt, aber einzelne Stücke, z. B. die Reste des Helms, ließen doch gewisse Eigentümlichkeiten erkennen, die dem Verfasser vorzuziehen, Vergleiche mit ähnlichen Stücken anzustellen. Nach dieser Richtung bietet die vorliegende Abhandlung ein gewisses Interesse.

Zu den kleinen Gegenständen des Fundes gehören: drei Pfeilspitzen, vier Bruchstücke einzelner Köhren, deren Verwendung unbestimmt ist, zwei Bruchstücke eines kleinen eisernen, zwei ganz eiserne und sechs Bruchstücke eiserner Klammern mit anhängenden Holzresten, eine eiserne Klammer mit einem anhängenden Hing, zwei Steigbügel sowie zwei zweigliedrige Trensen, Reste eines aus kleinen Ringen zusammengesetzten Panzers. Bemerkenswert ist die Schwertklinge (s. Fig. 4), sie ist gebogen und 1.14 m lang, die Spitze und ein Teil des oberen Abchnittes sind abgebrochen. Die Breite der Klinge beträgt heute noch 3 cm. Sie steht am nächsten den Schwertklingen, die in den ungarischen Gräbern aus der Epoche der Arpad gefunden sind, allein die größere Krümmung weist eher auf das XIII. und XIV. als auf das XI. und XII. Jahrhundert, wobei die ungarischen Funde gehören. Eine gewisse Ähnlichkeit hat die Säbelklinge auch mit dem sog. Säbel Karl des Großen in Wien (Zeitschrift für historische Waffenkunde, Bd. 1. Hampel).

Der eiserne Helm (Fig. 6 und 7) ist von kaiserlicher Form, seitlich leicht zusammengedrückt und besteht aus dem unteren Band (Kranz), dem Mittelstück, dem eigentlichen Kopfstück und der Spitze. Der Kranz oder der Rand des Helms ist 1.5 bis 2 cm breit und war am eigentlichen Kopfteil angehängt; der eigentliche Helm (oder Kopfteil) bestand aus einer Anzahl zusammengesetzter Platten — der vordere Rand hat zwei bogenförmige Ausstülpungen, die den Augenbrauen entsprechen, zwischen ihnen mündet die Nasenschützende Nasenschild (Nasenschild, Nasenschirm) gewesen sein — er ist nicht mehr vorhanden. Es scheint, daß der Helm verziert war, doch lassen sich jetzt keine Verzierungen mehr erkennen. Am dem Rande des Helms war mittels kleiner Hinge ein sog. Nasenschirm (Borstenschild) oder Schulterstück befestigt gewesen.

Um die Epoche zu bestimmen, aus welcher die gefundenen Bruchstücke stammen, bespricht der Verfasser an der Hand einiger guter Abbildungen einige andere ähnliche russische Helme (Fig. 11 bis 15):

Helm Nr. 1, gefunden 1862 im Gouv. Woronesch; mit Hilfe der im Grabe gefundenen byzantinischen Münzen des VIII. Jahrhunderts ist eine sichere Zeitbestimmung möglich. Der Helm besteht aus einer kleinen Spitze, einem aus vier Stücken zusammengesetzten eigentlichen Kopfstück und einem nur angehängten Nasenschild mit dem anstehenden Streifen für die Augenbrauen.

Helm Nr. 2 (Fig. 13), Ursprung unbekannt, wird in der Erkenntnis zu St. Petersburg aufbewahrt. Gestalt konisch, besteht aus zwei zusammengesetzten Stücken, die Spitze geht in ein Rohren über, das zum Tragen eines Zapfens dient. Der Nasenschirm gerade. Am Rande sind etwa 10 bis 15 cm voneinander entfernt eine Anzahl Ösen zum Anhängen des Nasenschirmes. Dieser Helm ähnelt sehr dem Typus, den man im Westen Europas als Normannenhelm bezeichnet. Ein sog. Normannenhelm, der in einem nährischen Grabe gefunden ist und in Wien aufbewahrt wird, soll nach W. Buche in (Wien) im XI. Jahrhundert hingewandern.

Helm Nr. 3 (Fig. 14), gefunden im Gouv. Orel, besteht aus drei zusammengesetzten Stücken und zeigt

leicht vertiefte Langrinnen; er ist aus Eisen; aber mit dünnen vorgelöteten Silberplatten bedeckt. Am Stirnteil ist eine 16 cm breite Platte angehängt, die zwei Augenlöcher hat und einen nach unten zugespitzten Nasenschirm trägt. Am Rande dieser Gesichtplatte sind eine Anzahl kleiner Löcher sichtbar, die offenbar zur Befestigung eines das Gesicht schützenden Vorhanges (eine Art Kettenspann) dienen. Dieser Helm ist ähnlich einem in Moskau (Ordnichajna Palata) aufbewahrten, dem tiröfürsten Jaroslaw Waswolodowitsch 1216 zugeschriebenen Helm.

Helm Nr. 4 (Fig. 15), in der Sammlung der Eremitage in St. Petersburg, gefunden im Gouv. Perm. Die Gestalt ist nicht konisch, sondern halbkugelig kuppelförmig ohne Spitze. Am unteren Rande des Helms ist ein 2 bis 3.5 cm breiter Streifen befestigt, der eine große Anzahl kleiner Ösen trägt. Hieran hängen kleine Ringe, die miteinander in Verbindung stehen und dem einen Ketten- oder Ringpanzer ähnlichen Vorhang tragen.

Die Schlussätze des Verfassers lauten:

1. Der in Demjanowka gefundene Helm unterscheidet sich etwas von den kaiserlich Konföderationen europäischen Ursprungs, die man gewöhnlich als normannisch zu bezeichnen pflegt. Die normannischen Helme haben weder eine dem Helm aufgesetzte Helmspitze, noch einen besonderen, den Nacken (und das Gesicht) schützenden Anhang. Er gleicht mehr dem Helmen aus Orel und Wladimir; beide sind entweder im Orient angefertigt, oder mindestens unter dem starken Einfluß orientalischer Waffenmeister.
2. Der Ringpanzer ist wohlwoll erhalten, da kaiserliche charakteristische Eigentümlichkeiten hervortreten, um in betreff der Aufertigung eine bestimmte Aussage zu machen.
3. Die Säbelklinge gleicht am ehesten den Klingen, die in den ungarischen Gräbern aus der Zeit Arpad gefunden sind; die Klingen können mit Rücksicht auf ihre Krümmung und den Handgriff als orientalische bezeichnet werden. Hiernach ist es wahrscheinlich, daß die betreffenden Waffen orientalischen Ursprungs sind und aus dem XIII. bis XIV. Jahrhundert stammen.

6. Bpisy, A.: Kurgane beim Dorf Pakalinsk im Gouv. Kowno. Mit Tafeln 4 bis 6. (S. 95 bis 98.)

Zum Auszug nicht geeignet.

7. Petrow, N. J.: Über ein unterirdisches Gewölbe in der Stadt Kiew. (S. 99 bis 102.) Das Gewölbe und die damit in Verbindung stehenden Gänge und Räume sind offenbar neueren Datums.

8. Nikitin, W. P.: Kurze Beschreibung von Altertümern im Gebiet von Semipalinsk. (S. 103 bis 111.)

Es wird eigentlich nur ein Verzeihnis der Kurgane und anderer Altertümer und Denkmäler geliefert, die sich in einzelnen Kreisen des Gebietes von Semipalinsk bis jetzt haben auffinden lassen. Die betreffenden Kreise sind: Saisan, Uskamenogorsk, Semipalinsk und Pawodar. Die Aufzählung der Kurgane, der Steinfiguren sowie, mit Angabe der Standortorte hat hier keinen Zweck, dagegen führt sich folgende Legende an, die sich ein solches Denkmal knüpft.

Im Kreise Saisan steht in den Vorbergen des Altai an der Straße, die auf die Goldwäsen von Stepanow und Moskau führt, auf einem hohen, das ganze Gebiet mit allen seinen Bergen und Talern beherrschenden Gipfel ein altes Denkmal. Auf der dunklen, rötlichsten Felsplatte des Gipfels sind mit weißer Farbe einige

Bergziegen aufgemalt. Die Stellung der Figuren ist sehr verschieden; jede Figur ist etwa  $1\frac{1}{2}$  Wersch (etwa 6,6 cm) lang und 1 Wersch, (4,4 cm) hoch; die Länge der gebogenen Hörner ist  $1\frac{1}{2}$  Wersch, (etwa 6,6 cm), der Abstand zwischen den einzelnen Figuren ist sehr gering; die Figuren stehen in unregelmäßigen Reihen, drei bis vier in jeder Reihe, man zählt im ganzen fünf Reihen. Hinzufragen ist, daß in dem nächstliegenden Tal sich ein großer Kirgisen befindet.

Zur Erklärung gibt es folgende kirgisische Legende: Vor langer, langer Zeit wohnte im Saisantal ein kuhner Held (russ.-kirg. Batyr). Einst erheben sich infolge der Ränke seiner Feinde die ihm unterlegenen Kirgisen und wollen ihn töten. Der Batyr, der sich ohne Grund durch sein Volk so beliebt fühlte, entfernte sich mit seinen Freunden und den ihm treu gebliebenen Dienern und ging auf einen hohen Berg und sah von da herab auf die Kirgisen, die ihn beleidigt hatten und auf die ihm feindlich gesinnten Kalmlücken. Wehe denjenigen, die ihm vor die Augen kamen; wie ein Blitz stürzte er auf sie und der Tod war ihnen sicher. So gingen die Jahre hin, der beleidigte Batyr rieth sich schonungslos. Sowohl der bescheidene Wanderer wie die Waren des Kaufmanns waren gefährdet. Schließlich hatte der Batyr durch seine kühnen Überfälle einen solchen Schrecken den Kirgisen und Kalmlücken eingebracht, daß sie jetzt ganz feige und gar nicht bliken ließen. Endlich wurde der Batyr alt. Vor seinem Tode rief er seine Verwandten und getreuen Diener zu sich, befahl ihnen, seine Leiche in das Tal zu betten, in das man von oben herabsehen konnte. Ferner befahl er, auf dem Berggipfel „Bergegen“ aufzufahren, der Nachkommenschaft zur Erinnerung, daß es niemand je versuchen solle, einen Braven und Unschuldigen dürfte man nicht beleidigen. Er befahl, seine Leiche im Tal zu begraben, damit das Grab seine Feinde nahe sei und ihnen einen solchen Schrecken bringe, wie er ihnen während seines Lebens gebracht habe. — In dem Tal, zwischen dem entfernteren Berggipfel Bukambai und dem Flasse schwarzer Irtysh befindet sich tatsächlich ein sehr großes altes Grab.

Im Kreise Ustkamennogorsk liegen die sog. Ablaketskaja Palati, Ruinen einer im XVII. Jahrhundert aufgebauten und 1729 schon zerstörten Befestigung; sie sind von Reisenden erforscht und wiederholt beschrieben worden (s. Hagenmeister, Statistische Beschreibung Sibiriens, St. Petersburg 1854, I. Bd., S. 61 und Materialien zur Archäologie Rußlands, 15. Hft. 1894, S. 61 bis 66. Sibirische Altertümer No. 3).

Im Volke erzählt man sich, in der Ruine sei ein großer Schatz begraben: Einst stand hier eine unzugängliche Festung und im Inneren derselben ein Kloster. Vor 70 bis 80 Jahren sei es erzählt die Chinesen, kam ein reicher chinesischer Beamter hierher, er machte mit ihnen daselbst lebenden Kirgisen nahe Bekanntschaft und bat um ihren Beistand, um die Reichthümer zu suchen, die in der alten Festung begraben seien. Er hatte ein Dokument bei sich, ans dem er ersahen hatte, daß einer seiner Vorfahren einst Befehlshaber in der Festung Abkabet gewesen sei. Als die Chinesen, um ihre Feinde bedrängt wurden und sie die Festung überliefern mußten, begrub der Befehlshaber alle seine Schätze unter den Mauern der Festung und entfloh. In jenem Dokument sei der Ort, wo der Schatz begraben liege, angegeben, ebenso die Mittel, um ihn zu suchen. Aber auch sehr die Chinesen sich Mühe gab, den Schatz zu entdecken, Anseh die Kirgisen suchten vergebens nach jenem verlorenen Schatz.

9. **Baron Woldemar Tiesenhausen (Nekrolog):**  
Mit einem Porträt. (S. 112 bis 126.)

Aus am 2/16. Februar 1892 starb nach kurzem Kranken- im 79. Lebensjahre einer der hervorragendsten

russischen Orientalisten, der ehemalige Gehilfe des Vorsitzenden und Vizepräsident der Kaiserl. Archäologischen Kommission in St. Petersburg, Baron W. Tiesenhausen. Sein Name ist eng verbunden mit der Tätigkeit der Archäologischen Kommission während 39 Jahren; Tiesenhausen hat durch seine unermüdeliche Arbeit außerordentlich viel zur Entwicklung und Ausbildung der Kommission beigetragen.

Ernst Woldemar Baron Tiesenhausen ist 1825 in Narva (Gouv. Estland) geboren. Er studierte in St. Petersburg und besuchte den Universitätskursus als Kandidat der ersten Abteilung der damals sog. philologischen Fakultät. Er hatte sich bereits als Student für den Orient interessiert, sein eigentliches Arbeitsfeld war damals schon orientalische Literatur und Münzkunde. Tiesenhausen hatte, ehe er in die ihm eigentlich anziehende Beschäftigung hinein- gelangte, einen Lebensgang, wie er wohl nur in Rußland möglich ist. Tiesenhausen trat in den Betschendienst, d. h. er wurde Beamter im Jahre 1849, und zwar in dem Marinereport; er wurde Schriftführer beim Vorsitzenden des nördlichen Bezirks der Marinebanten. Nach vier Jahren, 1854, trat er in das medizinische Departement des Ministeriums für innere Angelegenheiten; im Jahre 1857 wurde Tiesenhausen zum „Beschreiber“ in der Bankkommission des Kaiserl. Hofministers ernannt und erst 1861, abermals nach vier Jahren, erhielt er die Stelle eines Schriftführers in der erst kurzlich (1859) gegründeten Kaiserl. Archäologischen Kommission. 1864 wurde er zum jüngeren Mitglied, 1876 zum älteren Mitglied der Kommission ernannt, aber erst 1894 erhielt er die merckwürdige Stellung eines Gehilfen des Vorsitzenden der Archäologischen Kommission, in der er bis zum Jahre 1900 verblieb. Das Alter und zunehmende Kranklichkeit nötigten ihn, seinen Abschied zu erlitten; bald darauf ist der arbeitsame und unermüdelich thätige Gelehrte heimgegangen zur ewigen Ruhe.

Tiesenhausen hat bereits als Student sich schriftstellerisch betätigt, er verfaßte eine Privatarbeit über gewisse Eigentümlichkeiten der arabischen Sprache. Im Jahre 1850 stiftete der Moskauer Kaufmann P. W. Golubkow bei der neugegründeten Kaiserl. Archäologischen Gesellschaft einen Preis für die beste Arbeit über die Münzen der Samaniden. Den vollen Preis erhielt Tiesenhausen im Jahre 1852 für seine die Samanidenmünzen behandelnde Abhandlung. Es später in den Schriften der Archäologischen Gesellschaft erschienen ist. Am 24. Dezember 1854 wurde Tiesenhausen zum korrespondierenden Mitglied der Archäologischen Gesellschaft gewählt und nahm von der Zeit an ein lebhaftes Interesse an den Arbeiten der Gesellschaft, die insbesondere durch den damaligen Sekretär Saweljew, sowie durch P. S. Lowen gefördert wurden. Für die Archäologische Gesellschaft war Tiesenhausen von großer Bedeutung, er leitete den Verkehr mit den Gesellschaften des Auslandes, insbesondere den Tauschverkehr der Zeitschriften, er unterstützte die Gründung eines Museums und war von 1861 der erste Konservator des Museums; er wurde als Bibliothekar die Buchersammlung der Gesellschaft. Im Jahre 1866 legte er das Amt als Konservator und Bibliothekar nieder. Aber auch an der Herausgabe der Schriften der Gesellschaft nahm Tiesenhausen regen Anteil, sowohl indem er die Anregung zum Druck der Protokolle der Sitzungen gab, als auch indem er seine eigenen großen und kleinen Arbeiten daselbst veröffentlichte. In diese Zeit fällt auch die Entstehung der Abhandlung über die Münzen der Chalfaten. Im Jahre 1854 wurde ein Preis für die beste Arbeit angesprochen, Tiesenhausen erhielt den Preis 1861; die Arbeit selbst aber konnte erst 1873 erscheinen. (In Museum des östlichen Chalfats. St. Petersburg 1873.)

Mit 4 Tafeln in russischer Sprache.) In die so spät gedruckte Arbeit viel umfassender war als die zuerst der Gesellschaft vorgelegt, so wurde dem Verfasser für die erweiterte Arbeit 1874 die große silberne Medaille zuerkannt. Für die Numismatik, die sich mit orientalischen Münzen beschäftigt, ist dieses Werk Tiesenhansens ganz außerordentlich wichtig. Ein englischer Numismatiker veröffentlichte ein speziell-russisch-englisches Glossarium, um seinen mit dem Russischen unbekanntem Landesherrn den Gebrauch des Werkes zu erleichtern. Im Jahre 1884 veröffentlicht Tiesenhansen eine „Sammlung von Materialien“, die auf die Geschichte der goldenen Horde Bezug nehmen. (Bd. I. Auszüge aus arabischen Schriften, St. Petersburg 1884, 88.) Für dieses Hauptwerk erhielt er von der Archäologischen Gesellschaft die große goldene Medaille. Im Jahre 1891 wurde Tiesenhansen zum Ehrenmitglied der Archäologischen Gesellschaft ernannt. Nachdem Tiesenhansen im Jahre 1890 seines Absehens genommen hätte, machte er sich noch an eine bedeutende wissenschaftliche Arbeit, die leider unvollendet geblieben ist. Er begann eine „Geschichte der Luxusgegenstände“ des muslimanischen Orients im X. bis XV. Jahrhundert; er arbeitete daran mit ungewöhnlicher Ausdauer und fieberhafter Eile, um das Werk zu Ende zu führen; der Tod unterbrach die Arbeit.

Seinen Wohnort hatte Tiesenhansen in St. Petersburg, aber abgesehen von einigen Reisen ins Ausland, war er vielfach unterwegs, weil er periodischen Anteil an den Ausgrabungen in Südrussland (Halbinsel Taurien, Krim usw.) nahm. Mit großem Interesse verfolgte er die Arbeiten des Moskauer Archäologen Gözz, der über die Ausgrabungen auf der Halbinsel Taman sehr bemerkenswerte Abhandlungen veröffentlicht hat, sowie später die Ausgrabungen bei Kertsch. Während seines Aufenthaltes in St. Petersburg widmete Tiesenhansen seine ganze Arbeitskraft der Kaiserl. Archäologischen Kommission, zuerst unter dem Präsidium des Grafen C. Stroganow, später unter dem Präsidium des Grafen G. Bobrinski. Sein kleines Arbeitszimmer in der Eremitage wurde gern und oft von allen Archäologen und Numismatikern besucht — es war daselbst eine Art archäologischer „Klub“. Allen Besuchern begegnete Tiesenhansen mit gleicher Freundlichkeit und Aufmerksamkeit, allen standen sein bewahrter Rat, seine bewährte Erfahrung, seine umfassenden Kenntnisse zu Gebote.

Zum Schlusse muß noch Tiesenhansens Mitarbeit an den berühmten „Berichten“ (Otschet) der Kaiserl. Archäologischen Kommission hier Erwähnung geschehen. Auf Tiesenhansens Schlußern lag die Zusammenstellung der Berichte, die Leitung des Druckes, die ganze unständliche Redaktionsarbeit, die Anwesenheit der Abbildungen. (Wie ich es aus den persönlichen Mitteilungen des Verstorbenen weiß, hat er auch einen großen Teil der Übersetzungen der Berichte bearbeitet. — Bekanntlich erscheinen die Berichte früher nicht allein in russischer, sondern in deutscher und französischer Sprache, später nur in russischer Sprache.)

Ein Verzeichnis der literarischen Arbeiten Tiesenhansens vom Jahre 1855 bis 1891 ist dem Nekrolog beigegeben. Auf Vollständigkeit macht das Verzeichnis keinen Anspruch. Alle kleineren und größeren Arbeiten Tiesenhansens, die in nicht-russischen Journalen gedruckt sind, scheinen zu fehlen.

Beilage zum 2. Heft der Nachrichten. St. Petersburg 1892. (S. 1 bis 53.)

Die Beilage enthält erstens eine archäologische Chronik über das letzte Drittel des Jahres 1891 (S. 1 bis 38.) und zweitens eine russische Bibliographie. (S. 39 bis 53.)

Die Archäologische Chronik berichtet:

I. Über die Tätigkeit der gelehrten Gesellschaften (1. Kaiserl. Russische Archäologische Gesellschaft; 2. Gesellschaft für klassische Philologie und Paläozoologie; 3. Archäologisches Institut; 4. Kaiserl. Gesellschaft der Freunde alter Schriftkunde; 5. Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft; 6. Kaiserl. Moskauer Archäologische Gesellschaft; 7. Gesellschaft für Archäologie, Geschichte und Ethnographie der Universität Kasan; 8. Kaiserl. Odessaer Gesellschaft für Geschichte der Altertümer; 9. Andere Provinzialgesellschaften; 10. Archäologische Kommission.)

II. Über die Museen und deren bemerkenswerte Zugänge.

III. Über Ausgrabungen und gelegentliche archäologische Funde — nach den einzelnen Gouvernementen des Russischen Reiches geordnet.

IV. Verschiedene Nachrichten.

Die Russische Bibliographie umfaßt erstens alle neuen im Jahre 1891 erschienenen Bücher geschichtlich-archäologischen Inhalts (S. 39 bis 45), die in russischen Zeitschriften während des Jahres 1891 erschienen sind.

Beide Verzeichnisse sind außerordentlich nützlich und wertvoll, sie kommen einem längst gefühlten Bedürfnis in außerordentlich dankenswerter Weise nach. Selbstverständlich ist eine auszugswise Wiedergabe aller zahlreichen und kurzen Mitteilungen der Chronik nicht möglich.

#### Nachrichten

##### der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 3. Mit 17. Tafeln und 82 Textzeichnungen. St. Petersburg 1892. 171 Seiten. Dazu eine Beilage. St. Petersburg 1892. 130 Seiten.

1. **Pharmakowski, B. W.:** Das Grabmal des Heuresibios und der Arcte in Olbia. Nebst 7 Tafeln (I bis VII). 6 Zeichnungen im Text. (S. 1 bis 20.)

Im Museum der Kaiserl. Odessaer Gesellschaft der Geschichte der Altertümer befand sich ein marmorernes Grabstein (Grabstein, Trapaera) mit einer griechischen Inschrift. Wie sich herausstellte, gehört dieser Stein zu einem großen Grabmal in einem Kurgan bei Olbia. Vom 14. August bis 4. September wurde dieser schon längst bekannte und in aller Zeit schon ausgegrabene Kurgan sorgfältig untersucht und in demselben ein grabartiges Grabmal entdeckt. Aus einer daselbst gefundenen Kupfermünze läßt sich schließen, daß das Grabmal erst am Ende des II. Jahrhunderts n. Chr. errichtet worden ist; auch die spätere noch übriggebliebenen goldenen Gegenstände bestätigen die Ansicht, daß das Grabmal aus dem Ende des II. oder aus dem Beginn des III. Jahrhunderts stammt. Die daselbst Bestattete war Arcte, die Tochter des Papios, die Gattin des Heuresibios.

2. **Latschew, W. W.:** Griechischendalteinische Inschriften, die während des Jahres 1891 in Südrussland aufgefunden worden sind. Mit 30 Textzeichnungen. (S. 21 bis 57.)

Es handelt sich um neue Inschriften aus dem Chersones, die bereits in Inscript. oras sept. Ponti. Eux. beschrieben sind.

3. **Jernstedt, V.:** De epigrammate Tryphonidis Panticapneae. Ad. Bus. B. f. Latschewium. (S. 57.)

4. **Pridik, E. M.:** Der in Anadol gefundene Schatz goldener Statuen. Mit 6 Tafeln (Taf. VIII bis XIII) und einer Textzeichnung. (S. 58 bis 92.)

Am 23. Januar 1895 fanden einige Bauern im Dorfe Anadol (Kreis Iznik, Gov. Bessarabien) einen Schatz, der aus goldenen Statuen aus der Zeit Philipps II., Alexanders des Großen, Philipps III., Lysimachus, Demeter Poliorketes und Selenuk I. Nikator bestand. Die Münzen befanden sich in einem kupfernen Gefäß, das einer der Arbeiter mit der Hacke zufällig traf und zerschlug. Dieser Schatz wird gewöhnlich als der Bessarabische Schatz aus der Stadt Reui bezeichnet, weil der Bürger der Stadt Reui, Michail Myrina, dem die Bauern ihren Fund zum Verkauf übergeben hatten, betrügerischerweise der Polizei mitteilte, daß er den Schatz in seinem Garten entdeckt habe. Wie viele Münzen jener Schatz enthält, bleibt für immer unbekannt. Der Kaiserl. Archäologischen Kommission wurden 879 Münzen überliefert und angekauft; die übrigen Münzen sind wohl an Ort und Stelle unter der Hand verkauft; was darüber mitgeteilt worden ist, erscheint alles unklar. Von dem Gefäß, in dem die Münzen enthalten waren, hat sich nur der Boden erhalten, alle Scherben sind verloren gegangen.

Die Münzen waren mit einem roten Anflug bedeckt, wodurch sie wie Kupfer aussehend; nachdem sie in eine heisse Lösung von doppeltkohlensaurem Natrium (Soda) gelöst worden waren, verschwand der Überzug und die Münzen waren ausgezeichnet rein. Fast alle Münzen, nur wenige ausgenommen, sind sehr gut erhalten; sie sind nur wenig im Umlauf gewesen. Da die neuesten Statuen auf die Begattung Selenuk I. sich beziehen, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Schatz im Beginn des III. Jahrhunderts vor Chr. eingegraben worden.

Auf den sechs Tafeln sind ganz vortreffliche Abbildungen der Münzen geliefert, wir lenken darauf die Aufmerksamkeit der Münzkennner; von einer Beschreibung müssen wir gänzlich absehen. Unter den Münzen sind:

1. Philipp II., 11 Stück, dazu 10 Abbildungen auf Tafel VIII.
2. Alexander der Große, 694 Stück, darunter 290 Varianten und 404 Doubletten, dazu auf Tafel VIII, IX, X, XI 107 Abbildungen.
3. Philipp III., 21 Stück, darunter 20 Varianten und Doubletten, dazu 18 Abbildungen auf Tafel XI.
4. Lysimachus, 250 Stück, darunter 138 Varianten und 117 Doubletten, dazu 51 Abbildungen auf Tafel XI und XII.
5. Selenuk I. Nikator, 1 Stater, abgebildet auf Tafel XII.
6. Demetrius Poliorketes, 2 Stück, abgebildet auf Tafel XII.

Die Tafel XIII gibt eine Übersicht der im Text angeführten 155 Monogramme.

5. **von Stern, E. R.:** Eine Vase mit Relief-Figuren. Mit 2 Tafeln (Taf. XIV bis XV). (S. 93 bis 113.)

Im Sommer des Jahres 1899 fanden die Bauern des Dorfes Parutino, das auf dem Territorium der algerischen Kolonie Olbia (die Russen schreiben stets Olvin) und nicht Olbia) liegt, unter verschiedenen alten Gegenständen, auch eine Vase, die der Kaiserl. Ermittlung in St. Petersburg übergeben wurde. Diese Vase ward hier unter Befügung vortrefflicher Abbildungen ausführlich beschrieben.

Die tonerne Vase ist außen bedeckt mit einem dunkelgrünen metallisch-glänzenden Lack, 22,5 cm hoch, der obere Durchmesser beträgt 21 cm, der untere 15 cm; sie ist ganz ausgezeichnet konserviert. Derartige Vasen

sind im allgemeinen selten. Am ehesten ist das Gefäß zu vergleichen dem berühmten Rheosus-Eimer (Baumeister-Denkmal, III. Abt., S. 2162; Gerhard, Trinkschalen und Gefäße aus Neapel, S. 2910). Zur Aufhängung der Vase hat als Vorbild offenbar ein metallisches Gefäß gedient. Die Oberfläche der Vase ist mit Reliefstellungen bedeckt; es sind menschliche Figuren, die zwei und dreien in einer Gruppe vereinigt sind. Es sind sechs verschiedene Gruppen erkennbar, zu denen der Künstler sechs verschiedene (hohle) Nesseln geformt hatte. Die Gruppen stehen in drei Reihen übereinander. Der Verfasser beschreibt ausführlich die einzelnen Gruppen und gibt dazu eine Erklärung; es sind Szenen aus der Göttergeschichte. Wir verweisen auf die Abbildung Tafel XIV und XV.

Die beschriebene Vase von Olbia verdient eine besondere Aufmerksamkeit wegen ihrer Form, Größe und wegen des Reichtums der Reliefverzierung. Eine selbständige künstlerische Bedeutung hat die Vase nicht. Die Vase steht nach ihrer Technik und dem Charakter der Ornamentierung in engem Zusammenhang mit einer anderen Art von Erzeugnissen der antiken Topferkunst, mit den sog. „negerischen“ Bechern. Doch läßt sich schließen, daß die künstlerische Arbeit dieser Vasen unter dem Einflusse der griechischen Kunst der hellenistischen Periode des III. Jahrhunderts v. Chr. entstanden ist.

6. **Pharmakowski, C. B.:** In Rußland gefundene Denkmäler der alten Kultur. (S. 114 bis 121.)

A. Ein geschuittener Stein römischer Arbeit, der im Gouvernement Tschernigow gefunden worden ist (S. 114 bis 118). Vergleiche dazu die Abbildung auf S. 114. Auf dem Stein ist ein stehender Krieger dargestellt, der einen Palmenzweig an der Statue der Hehate niederlegt.

B. Eine bronzene Votivhand, die im Gouvernement Jekaterinow gefunden worden ist. S. 118 bis 121 und Taf. XVI, auf welcher die betreffende Hand in zwei Dritteln der natürlichen Größe von verschiedenen Seiten her abgebildet ist.

Der Verfasser hält die Hand wegen ihrer arten Form und geringen Dimension für eine weibliche. Es handelt sich um eine rechte Hand. Maße sind nicht angegeben, doch da die guten Abbildungen die Hand in zwei Dritteln der natürlichen Größe reproduzieren, so läßt sich die Länge der Hand auf etwa 14,5 cm, die größte Breite auf 6,5 cm bestimmen.

An der Hand sind die drei ersten Finger (I, II, III) gestreckt, die beiden anderen gebeugt, eingeschlagen. Der Spitze des Daumens ist ein besonderes Körpchen angefügt, der Verfasser vergleicht dasselbe mit einem Tannenzapfen; nicht erinnert es eher an eine Fädel. Die Hand ist bedeckt mit Reliefdarstellungen. An der vorderen Fläche oberhalb der *Vola manus* (s. Fig. 1), dem Gelenk entsprechend, ist eine in einen Mantel (*mitras*) gehüllte weibliche Person dargestellt. Sie liegt und hält in ihrem rechten Arm an ihrer linken Brust einen Säugling. Der linke Arm ist nicht sichtbar. Über der Frau ist ein stehender Vogel erkennbar, umgeben von einem Halbkreis. An dem Halbkreis ist ein kleiner Tisch angefügt, auf dem drei nicht erkennbare Gegenstände liegen. Ferner sind am Handrücken erkennbar unter dem Daumen (Fig. 2 und 3) eine große Vase (Amphora), ein Baumzweig und ein Fisch; auf dem Baumzweig ist eine Eidechse dargestellt. Am Handrücken, an der Basis des zweiten und dritten Fingers, ist ein Wagen sichtbar, darunter zum Gelenk hin ein Heroldstab (*zupizna*) oder Merkurstab und eine Schlange, die sich mit dem Kopf zu den eingeschlagenen Fingern hinneigt. Außer der Schlange ist (Fig. 4) noch eine Schildkröte abgebildet und einige nicht recht deutlich erkennbare Gegenstände. Ich habe die Be-

schreibung hier wiederholt, weil man ohne dieselbe die Figuren auf der Hand meines Erachtens nicht erkennt.

Bemerkenswert ist, daß auch diese bronzene Hand eine rechte ist — ob es eine Frauenhand ist, darüber kann man streiten. Ich verweise in Bezug darauf auf meine Abhandlung (Altitalische Weibgesenke, in den anatomisch-archeologischen Studien, Wiesbaden 1901, S. 72 bis 75).

Die Hand ist gewiß eine sog. Votivhand, die als Geschenk der Gottheit dargebracht, aber gleichzeitig dazu dienen sollte, gewisse schlechte Einflüsse abzuwehren. Darauf deuten die drei gestreckten Finger; porrecti tribus digitis sollte das Bös abgewehrt werden. (Museum, Klein, Muscum XXV, 1-73.)

Die Hand stammt, wie der Verfasser in Berücksichtigung der Arbeit wie der figurlichen Darstellung meint, aus der spätromischen Zeit.

7. Skorpil, W. W.: Keramische Inschriften, die bei Gelegenheit der Ausgrabungen an nördlichen Abhang des Mithridaten-Berges in der Stadt Kertsch während des November und Dezember 1901 gefunden sind. (S. 122 bis 165.)

8. Iwanow, A.: Beschreibung goldener, zu einem chinesischen Uniformgürtel gehöriger Gegenstände. Mit einer Abbildung auf S. 170. (S. 166 bis 171.)

Es handelt sich um 15 goldene Platten verschiedener Größe, die im Jahre 1890 von einem Bauern des Dorfes Firnowskoje (Gouv. Tobol, Bezirk Ischim) gefunden und der Kaiserl. Kremlgüte für 735 Rubel (etwa 1500 bis 1600 Mk.) verkauft wurden.

Beilage zum 8. Heft, St. Petersburg 1902. (S. 130.) Die Beilage enthält:

1. Eine archäologische Chronik für die erste Hälfte des Jahres 1902 (S. 1 bis 73); sie umfaßt die Tätigkeit der gelehrten Gesellschaften in (S. 1 bis 34), der Museen (S. 36 bis 43), Nachrichten über Altertümern, Schatzfunde u. dgl. (S. 43 bis 71) und verschiedene Mitteilungen.

2. Bibliographische Bemerkungen über einige nicht-russische Zeitschriften. (S. 79 bis 112.)

3. Verzeichnis russischer Buchergeschichtlich-archeologischen Inhalts, die während der ersten Hälfte des Jahres 1902 erschienen sind. (S. 113 bis 121.)

4. Verzeichnis von Abhandlungen geschichtlich-archeologischen Inhalts in russischen Zeitschriften während der ersten Hälfte des Jahres 1902. (S. 121 bis 130.)

Selbstverständlich ist eine Wiedergabe der vielen kleineren und größeren interessanten Mitteilungen hier nicht möglich.

#### Nachrichten

#### der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 4. St. Petersburg 1902. S. 1 bis 142.

Mit 13 Tafeln und 132 Textabbildungen.

1. Wladimrow, J. A.: Ein alter christlicher Tempel in der Nähe des Aulek-Saents in Kubaengebiet. Mit 9 Tafeln (I bis 9) und 9 Textabbildungen. (S. 1 bis 14.)

Beschreibung der im Tempel befindlichen Fresken.

2. Pantusow, N. N.: Tschsch-Rabat. Mit 4 Tafeln (10 bis 13) und 4 Textabbildungen. (S. 15 bis 23.)

Die Ruinen der alten Baulichkeit „Tschsch-Rabat“ liegen auf dem Territorium der Gemeinde Tschsch-Tjukinsk im Kreise Proschnowk, nahe der russisch-chinesischen Grenze, in einer Göttergeschicht gleichen Namens, auf dem Karawanswege, der sich von der chi-

nesischen Stadt Kaselger über Turungast und Tschchyrkul in das russische Gebiet bis zum Fort Narynsk erstreckt.

Aus welcher Zeit das kolossale Bauwerk stammt, läßt sich nicht ermitteln; jedenfalls liegt die Errichtung viele Jahrhunderte zurück. Mit dem Namen Rabat wird in der türkischen Sprache eine steinerne Karawanserei von türkischer Bauart bezeichnet, die an der großen Hossstraße, die entfernt von einer Niederlassung, gelegen ist, Tschsch bezeichnet Stein oder Fels.

Gebildete Kara-Kirgisen meinen, daß jenes Bauwerk von Abdallah Chan, einem Emir von Buchara oder dem Emir Timur errichtet sei. Abdallah Chan hat während seiner Regierungszeit 1001 solcher Rabat aufbauen lassen, darunter auch die in Rede stehende. Die in der Nähe lebenden Kara-Kirgisen erzählen verschiedene Legenden, die auf jenes Bauwerk Rücksicht nehmen. Eine davon lautet: Vor vielen Jahren, als die Kara-Kirgisen noch Feuertempel waren, kam aus Rom zu ihnen ein kluger Araber mit seinen Leuten, der einen anderen Glauben als die Kara-Kirgisen hatte. Er war ein mächtiger Herrscher, der in kurzer Zeit das mächtige Bauwerk errichtete. Er ließ sich daselbst nieder, belehrte das Volk und gewährte den in Not befindlichen Leuten Unterstützung. Später ist dann das Oberhaupt verschwunden, die übrigen Begleiter wurden gefangen genommen und von einem Volke wüstenabgeführt, das von Westen nach Osten wanderte. Es scheint fast, daß diese Legende sich auf die Nestoriker bezieht, die hier ein Kloster gegründet hatten. Ein 1901 aus Urmia hierher gekommener geistlicher Mischak Abramow hat in Tschsch-Rabat einen Grabstein mit syrischer Inschrift gefunden, doch konnte der Böhrenerstatter diesen Stein nicht nach entdecken. Sollte hier wirklich ein nestorianischer Begräbnisort sich nachweisen lassen, so wäre die Annahme, daß jenes Bauwerk ein Kloster gewesen sei, begründet.

In betreff der anderen Legenden müssen wir auf das Original verweisen.

3. Graf Bobrinskij, A. A.: Bericht über die Ausgrabungen im Kreise Tschschkassai und Tschchirgin (Gouv. Kiew) während des Jahres 1901. Mit 23 Abbildungen im Text. (S. 24 bis 50.)

Der Bericht schließt sich an die Ergebnisse der Ausgrabungen, die der Graf Bobrinskij in seinem großen Werke über Smeln geliefert hat (s. meine Referate im Archiv für Anthropologie).

Es handelt sich hier, wie früher, um genaue Einzelbeschreibungen, die selbstverständlich nicht alle wiederholt werden können. Ich treffe insofern eine Auswahl, als ich mit Rücksicht auf die vielfach erörterte Frage nach der Rufsfärbung der Gräberkerne die Beschreibung derjenigen Kurgane hier wiedergebe, in denen rotgefärbte Knochen angetroffen worden sind.

1. Aufdeckungen von Kurganen im Kreise Tschschkassai und Aufdeckungen im Dorfe Grestschkowska. — Die Kurgane liegen auf den Anhöhen am rechten Ufer des Flusses Tschschin. Kurgan Nr. CCCLXXI: In der Erdbeuhöhlung lagen die Wirbel eines Schweines und einige Knochen kleiner Tiere, außerdem eine Lanzenspitze aus Feuerstein. Im südlichen Teile des Kurgans stieß man in einer Tiefe von 5 m auf zwei menschliche Skelette und im zentralen Teile ebenfalls auf zwei, und schließlich fanden sich in dem Erdhoben selbst vier Gräber (Grundgräber).

Die Skelette in den oberen Gräbern lagen gekrümmt auf der rechten oder linken Seite, der Kopf nach Westen gerichtet; die schlecht erhaltenen Knochen sind rötlich gefärbt; zu Fäßen ein tonernes Gefäß grober Arbeit; an Gegenständen nur einige Feuersteinwerkzeuge.

Unter den Grundgräbern gebe ich die Beschreibung von Grab Nr. 1. Länge des Grabes 1,62 m, Breite 0,96 m, Tiefe 0,22 m. Das Grab war mit einem höl-

zernen Deckel verschlossen, der hineingefallen und vollständig vermodert ist. Am Boden des Grabes lag ein menschliches Skelett, stark verwest, auf dem Rücken, der Kopf nach Westen, die Hände ausgestreckt, die Zähne des Schädels ausgezeichnet erhalten. Die Schädelknochen rot gefärbt; auch an den Fußknochen ist rote Farbe bemerkbar. Im Gebiet des Beckens sind Sparsamer wie ein weißer (Kalk) oder eines weißen Trübsichtbar.

Die anderen Gräber, zwei bis vier, zeigen dieselbe Eigentümlichkeit. In allen Gräbern fehlten Kulturgegenstände, nur einzelne sehr einfache Feuersteinwerkzeuge sind gefunden.

Die untersuchten Kurgane gehörten zum Typus der ältesten Kurgane der Dnjeprgegend. Das Volk, das diese Kurgane errichtete, war noch unbekannt als die erste Bekanntheit mit bronzernen Sachen gemacht. Es ist dieses die äneolithische Epoche (Stein-Bronzezeit). Die gefundenen Feuersteinwerkzeuge sind die allerersten Gegenstände, durch Zerschlagen von Feuerstein gewonnen.

Die Schmelz und die Fußknochen dieser Skelette sind rotbraun gefärbt. Diese Tatsache ist die Folge der Gewohnheit der Völker der äneolithischen Zeit, die Toten (vielleicht auch die Lebenden) zu färben. In den hier vorliegenden Fällen ist der Farbstoff nicht besonders dick, er findet sich vornehmlich an Kopf und an den Füßen. Unterdessen verschiedenen Annahmen in betreff der Entstehung der Färbung verdient Berücksichtigung die Annahme, daß die Leichen, nachdem sie ins Grab gesenkt waren, noch mit einer roten Farbe bestreut wurden. Die von den Gewandern oder dem Leichenkittel nicht bedeckten Teile erreichten deshalb rot gefärbt. Einzelne Knochen zeigen graublaue Flecke, als seien sie dem Feuer ausgesetzt gewesen. Wären vielleicht die Leichen in der Erde teilweise verbrannt, oder wurde über den Leichen ein Feuer angezündet? Wie ist dann aber die Rotfärbung zu erklären? Man darf vielleicht vermuthen, daß erst nach der Verbrennung der Körper im Grabe die rote Farbe darauf gestreut wurde. Im allgemeinen sind die Knochen der Skelette der äneolithischen Epoche sehr schlecht erhalten.

Die Kurgane CCLXXIII bis CCLXXIV ergaben dieselben Resultate.

2. Aufdeckung bei dem Dorfe Konstantinowo. Der Kurgan CCLXXV gehört der skythischen Epoche an; es wurde darin u. a. gefunden: eine bronzene Trone, eine schöne Urne (S. 31) usw. Die Aufdeckung der Kurgane CCLXXVI bis CCLXXXI ergab nichts Wesentliches. Sie waren offenbar schon in alter Zeit ausgeräumt, und zwar nicht wie sonst auf dem Wege eines unterirdischen Ganges, sondern direkt von oben her; deshalb sind auch noch einzelne Gegenstände übrig geblieben. Die Bestattungen fanden entweder unmittelbar auf dem Erdboden oder in einem oberflächlich gelegenen Grabe statt. Die Leichen waren vielfach verbrannt; es sind deshalb nur wenig Knochen erhalten. Die Gräber waren durch hölzerne Dächer verschlossen. Einige Gegenstände, die auf dem Dache lagen, sind erhalten, im Grabe aber keine. Sind vielleicht die Gräber bereits ausgeräumt worden, bevor noch die Erde in Form eines Kurgans aufgeschüttet worden war? Wenn man annimmt, daß zwischen der eigentlichen Bestattung und der Erdauflattung einige Zeit verfließen war, so wäre es möglich, daß in der Zwischenzeit die Gräber besetzt wurden; deshalb sind nur diejenigen Gegenstände übrig geblieben, die bei Gelegenheit der Leichenfeier und des Leichenmahls (Trisna) auf dem Dache des Grabgewölbes niedergelegt wurden. Im übrigen ist es schwierig, sich die Bestattungsgebräuche zu erklären. Die an 1 den Gräbern gefundenen

Gegenstände sind massiv bronzene; es sind eigentümliche Gefäße mit weißen Verzierungen (Inkrustationen), charakteristisch für die älteste der sog. Skythengräber. Graf Bohriniski bestritt, daß diese Kurgane, wie einige Archäologen wollen, in die römische Zeit hineingehören. Bohriniski meint, die Kurgane seien viel älter, sie stammten aus einer Zeit vor dem Eindringen der griechischen Kultur in Kleinasien. Die griechische Kultur in Kleinasien ist durch die Städte von Vasa, Amphoren, Schmucksaßen sieher gekennzeichnet. Da nun die griechische Kultur während des IV. Jahrhunderts vor Chr. nach Kleinasien gelangte, so sind die hier in Rede stehenden Kurgane wohl aus keiner älteren Zeit als dem V. Jahrhundert vor Chr. Der Typus der Schale (Becher) mit hohem (langem) Griff ist sehr beliebt unter den Skythen; er erhält sich sehr lange Zeit. In den betreffenden Gräbern aber sind Schalen älterer Art gefunden, sie sind etwa den Schalen ähnlich, die in italienischen Terrakotten entdeckt sind. Diese Gefäße kann man auch vergleichen mit vielen anderen eisernen Gefäßen, die weiß inkrustiert sind. Alle gehören jedenfalls in eine sehr alte Epoche. Sehr originell ist das halb sphärische Gefäß in Form eines Hums oder eines Rhytons (ger) eine Art Trinkhorn (Fig. 9 auf S. 35). Solch ein Trinkgefäß ist bisher noch nicht aufgefunden worden.

H. Kurganaufdeckungen im Kreise Tschigirin. — An dem Dorfe Tschigirin wurden zehn Kurgane angegraben. Der Kurgan CCLXXXII ist interessant, weil er Begräbnisse aus verschiedenen Epochen enthält. Die Grundgräber (Gräber im eigentlichen Erdhoden) gehören in die äneolithische Zeit. Wenigstens ein typischer Gegenstand der neolithischen Zeit, ein gewöhnlicher Hammer, gefunden worden ist, so sind doch auch viele kleine Sachen aus Bronze dabei entdeckt. Graf Bohriniski bezweifelt die Ansicht einzelner Archäologen (z. B. Belaschewski), daß die neolithische Epoche, ohne Bronze, sehr lange gedauert habe — das ist noch nicht faktisch erwiesen. Im Gegenteil, die große Mehrzahl der Sachen beweist einen sehr schnellen Übergang der paläolithischen Kultur zur äneolithischen.

Die Einrichtung der Gräber in den betreffenden Kurganen war folgende: In dem festen Grund der Erde wurde ein rechtwinkeliges Grab gemacht, in das man die Leiche hineingleite. Die älteste Sitte (der paläolithischen und neolithischen Zeit), die Leichen zu färben, beginnt zu verschwinden; allein die Lage der Leichen ist noch die gekrümmte auf der Seite, wiewohl die Leichen nicht mehr so stark gekrümmt erscheinen wie in der vorhergehenden Zeitperiode. Es scheint, daß man die Beine der Leichen an den Kumpf herangezogen und angeklebten hätte. Man erklärt die Sitte des Bindens durch die Furcht, daß der Tote wieder aufstehen könnte; man hat ihn dann stark zusammen, man walzte große Steine auf das Grab, man schüttete Erde darauf. Der Zustand der Knochen ist hier ein anderer als sonst. Wenigstens auch hier keine unversehrten ganzen Knochen zu sehen sind, so sind die vorhandenen Bruchstücke doch fester als die früher gefundenen Knochen, die sich durchwegs sehr schlecht konserviert haben. Das führt zu der Annahme, es seien alle Leichen im Dnjeprgebiet am Boden des Grabes verbrannt und danach seien die angebrannten Knochen mit einem roten Pulver bestreut worden. In jedem Grabe lag nur ein Skelett, Sachen lagen um Kopf; bei einem Tode ein Stück Farber, bei einem anderen ein Steinhammer, eiserner Gefäß, ein Elfenbein, die Knochen eines großen Vogels. Alle Gräber waren durch einen dicken hölzernen Deckel verschlossen.

Die oben aufgeführten Gegenstände — andere wurden nicht entdeckt — gehören durchaus in die neolithische Zeit.



Dies in der Erdaufschüttung gefundene Grab gehört in eine viel spätere Zeit. Es ist ein skythisches Grab, das wohl zwischen die alten neolithischen Gräber hineingerechnet wurde. Dies Grab ist ausgegrabt, die Wertobjekte sind gestohlen, nur einige wertlose Dinge sind übrig gelassen worden. Die eisernen Lanzenspitzen sind aus dem II. Jahrhundert vor Chr.

Der Kurgan Nr. CCXXXIII ist auch von Interesse. (Man vergleiche die Abbildungen Fig. 16 und 17 auf S. 42 und 43.) Der Kurgan enthielt zwei Gräber, das eine Grab stammte aus neolithischer Zeit, es lag darin ein gekrümmtes Skelett, dessen Knochen nicht gefast waren; zu Haupten des Skeletts stand ein großes Gefäß, nicht sehr alt, beside dem darauf, daß das Grab nicht der ältesten Zeit angehörte. Über diesem Grab war ein Kurgan errichtet, der viele Jahrhunderte später ein Begräbnis mit Leichenbrand in sich aufgenommen hatte. Das Grabgewölbe war aus Holz, hatte beträchtliche Dimensionen; es enthielt eine verbrannte Leiche mit vielen goldenen und bronzernen Sachen, einen schönen goldenen Ohrring, eine schöne Amphora usw.

Wie es scheint, diente die ganze Gegend hier, in der sich die Kurgane befinden, jahrhundertlang als Begräbnisstätte. Erst waren auf den Gräbern der ältesten Epoche nur kleine Kurgane errichtet, dann wurden hier die Skythen begraben. Die Leichen, der hier begrabenen Skythen wurden irgendwo auf einem Scheiterhaufen verbrannt; dann wurden die verbrannten Leichen in das Grabgewölbe gelegt und mit Erde, die vom Scheiterhaufen genommen, bedeckt bis zur Höhe des Kurgans. Aus den dabei noch gefundenen Gegenständen muß man schließen, daß die Gräber dem II. und III. Jahrhundert vor Chr. angehören.

Die Beschreibung der Kurgane CCXXXI bis CCCXI kann übergangen werden, weil sie nichts Bemerkenswertes darbieten. Die Gräber erwiesen sich meistens als ausgegrabt.

B. Die Reihengräber. Zwei Werst von Grischewka liegt eine Gruppe hoher Kurgane, die die Bezeichnung der Reihengräber trägt, es liegen nämlich alle Kurgane ziemlich dicht aneinander in einer langen Reihe (s. den Plan, Fig. 23 auf S. 47). Es wurden drei Kurgane aufgedeckt. (CULX, II bis IV.)

C. Aufdeckungen beim Dorfe Rebedailowka, Kurgan CULXCV.

III. Kurze Bemerkungen über einige Erdaufschüttungen und Kurgane in der Nähe der Dörfer Kamenskoi und Grischewka (Kreis Tschigirin).

4. **Koselouko-Waluszyniec, C.** Bericht über die Ausgrabungen in Cheronos während des Jahres 1901. Mit 12 Abbildungen im Text. (S. 51 bis 113.) Fortsetzung des früheren Berichtes.

5. **Lenz, E.** Beschreibung einiger Waffen, die im Jahre 1901 im Kubangebiet gefunden worden sind. Mit 22 Textabbildungen. (S. 129 bis 131.)

Die Gegenstände waren bei Gelegenheit der Aufdeckung eines Kurgans bei der Stauza Titliakaja im Gebiet Kuban gefunden worden. Sie wurden so, wie sie aus der Erde genommen waren, in Form eines großen Lehmklumpens abgeliefert. Nachdem die Lehmstücke vollständig abgewaschen war, ließen sich folgende Gegenstände erkennen: ein großer, vollständig plattgedrückter Helm, der in viele kleine Stücke zerfallen war; Stücke eines Panzers, eiserne Platten und Schuppen und drei zusammenhängende Ringe.

Der Helm erwies sich, soweit es möglich war die einzelnen Stücke zusammenzufügen, als ein eiserner von konischer Form, doch war das Metall fast alles

zerstört, fast vollkommen oxydiert. Der Helm ist über 23 cm hoch, von eigentlicher konischer Form, er besteht aus zwei Stücken (Fig. 1 und 2), ausser eigentlichen konisch geformten oberen Helmspitze und einem daran genieteten breiten Rand oder Streifen, an dessen Stirnteil eine schmale Fortsetzung aufsitzt (Nasenschirm). Seitlich davon sind unbedeutlich die Anhangswand ansehbar. Außerdem sind den Randstreifen seitlich zwei Ohrdeckel (Ohrschirme) angefügt, die auf eine nicht zu ermittelnde Weise mit dem Streifen vereinigt sind. Ob ein Nackenschirm vorhanden war oder nicht, läßt sich nicht ermitteln.

Die beschriebene Kopfbedeckung ist bemerkenswert wegen der schonen eigentartigen Form und der einfachen Konstruktion, die auf sehr geringe Entwicklung der Waffenschmiedekunst schließen läßt. Zwei ähnliche Eisenhelme wurden im Gouvernementmuseum der Stadt Tobolsk (Fig. 4a bis 4d) aufbewahrt. Die Abbildungen lassen die außerordentlich einfache konische Form und die Zusammenfassung aus zwei Teilen, eines unteren breiten und oberen konischen, deutlich erkennen.

Die Stücke des Ringel- oder Kettenspanzers sind noch sehr schlecht erhalten — offenbar ist nicht alles, was dazu gehört, abgeliefert — es läßt sich nicht entscheiden, ob es sich dabei um einen vollständigen Panzer oder vielleicht nur um einzelne Schutzstücke handelte. Die betreffenden Stücke bestehen aus unregelmäßig ineinander geschlungenen Ringen (Fig. 5 und 6).

Ferner fanden sich gegen 50 eiserne eckige Platten, die mit den Resten des Panzers fest verklebt waren. Der Verfasser bezeichnet die Platten als Schuppen, die meisten sind länglich viereckig, an dem einen Ende leicht abgerundet und mit einer Anzahl von Löchern versehen; andere sind dreieckig, aber auch mit Löchern, sie waren offenbar aneinander gefügt (Fig. 7, 8 und 9).

Schließlich waren noch einige Stücke eines Panzers oder eines Harnisches vorhanden (Fig. 14, 15 und 16), die aus kleinen länglichen fünfseitigen Stückchen, die an einem Ende zwei Löcherchen hatten, sich zusammensetzten. Es scheint, daß alle diese monokartig sich zusammenfügenden Plättchen an irgend einer Unterlage, wohl auf einem Klebstück, befestigt waren. Das Schwert hatte (Fig. 21) eine gerade Klinge, 81,5 cm lang; am Handgriff 3,5 cm, an der fehlenden Spitze auch 3,5 cm breit.

Der Dolch ist sehr schlecht erhalten, er ist 22 cm lang, am Griff 3 cm breit.

Die drei zusammenhängenden Ringe sind offenbar sog. Fesselringe, d. h. Ringe, die dazu dienen, drei Felle des Pferdes zusammenzufassen oder zu koppeln. (Die russische Sprache hat für diese Befestigung oder Koppelung der drei Felle eines Pferdes ein bestimmtes Wort: Frenschit; das Wort ist abgeleitet von dem Wort Tri — drei, und noge — das Bein oder der Fuß.)

6. **Spizyn, A. A.** Der bronzene Beschlag eines Dolchgriffes aus dem Terek-Gebiet. Mit 2 Abbildungen im Text. (S. 132 bis 135.)

Bei Gelegenheit einer im Jahre 1899 gemachten Kurganaufdeckung fand Herr G. A. Wertepow bei einem menschlichen Skelett den erwähnten Beschlag eines Dolchgriffes. Da in solchen, sicher der sarmatischen Kultur angehörigen Kurganen bisher keine Schwerter aufgefunden sind, so muß man den Griff wohl als einen Dolchgriff bezeichnen. Die Länge des Griffes ist beträchtlich, 42 cm, doch ist das nicht auffallend; der Dolch der Sammlung Trepelchows z. B. hat eine Länge von 33 cm. Der betreffende Beschlag besteht aus zwei bronzenen Platten, die dem Griff anliegen und fest mit der eisernen Grundrinne verbunden waren. Die Verzerrungen (Fig. 1 und 2) sind Tiergestalten, d. h. sog. Hirschen, die bei stärkechen

Schneckenähnlich häufig vorkommenden Tierfiguren. Der unter dem Tinnit hervorragende Knopf ist durchbrochen gearbeitet und läßt die Figur eines liegenden Hirsches (Fig. 2) erkennen.

7. **Tschuiko, M. D.:** Ausgrabungen im Kuban-gebiet. (S. 136 bis 138.)

Kurzgefaßter Auszug aus einem ausführlichen Bericht, den Herr Tschuiko, Schuldirektor der Simanin-Kanewskaja über seine Kurganuntersuchungen im Jahre 1900 der Kaiserl. Archäologischen Kommission eingereicht hat.

#### Verschiedenes.

8. **Gl. A. B. Graf Bobrinskij, A.:** Eine Bemerkung über Bestattungen in Schlitten. (S. 139 bis 140.)

Graf Bobrinskij erzählt:

Als ich im Sommer 1902 bei starker Dürre durch das Dorf Kosara (Kreis Tschigirin, Gov. Kiev) hindurchfuhr, war ich Zeuge eines alten Bestattungsbrauches, der sich hier in diesem abgelegenen Ort erhalten hat, aber Bestattung auf Schlitten. Man begrub einen Bauern. Der Sarg war auf einen einfachen Schlitten gestellt, zwei Paar Ochsen waren vorgespannt. Auf dem Sarge lag nach uraltem Gebräuch ein Tuch und darauf ein Brot. Voran ging der Geistliche und vor ihm wurde die Kirchensahne getragen. Die Straße ging bergan und die Profession bewegte sich nur langsam vorwärts. Die Bauern des Ortes Snela (Snela ist etwa 30 Werst [Kilometer] von Kosara entfernt), die mich begleiteten, um meine Ausgrabungen aufzuführen, sahen verwundert auf diese wunderliche Bestattung, die in Snela vollständig unbekannt ist. Die Bauern aus der Gegend von Kosara erzählten, daß eine derartige Bestattung auf Schlitten in Kosara und in den benachbarten Ortschaften ganz gewöhnlich sei. Auf solche Weise pflegte man Gräber, Personen, die sehr lange krank waren, Personen, die besonders geacht werden sollten, zu bestatten.

Der Verfasser verweist auf die bemerkenswerte Abhandlung von Anutschin (Moskau) „Über den Gebrauch von Schlitten, im besonderen bei Bestattungen“ (Arbeiten der Moskauer Archäologischen Gesellschaft, Bd. XIV, 1900, ref. in Arch. f. Anthropologie 1899).

Der Gebrauch der Schlitten hat sich erhalten in Kleinrußland, in der Ukraine, bei einzelnen südlichen Stämmen; auch in Ostchina ist heutzutage nach einundzwanzig Stunden dem Ochsen vor dem Pferde den Vortritt gibt. Auch Ch. Jaschetschurhinski (VII. archäolog. Kongreß in Jaroslaw 1887) macht in seiner Mitteilung über Reste des Heidentums in den Bestattungsgebräuchen Kleinrußlands“ auf die Verwendung von Schlitten mit Ochsen aufmerksam.

9. **Zwei alte Bauwerke im Kaukasus.** (S. 140 bis 141.)

Es handelt sich um die Ruinen zweier alter Türme, die Herr W. Adimirov auf einer Reise zu sehen Gelegenheit hatte.

10. **Latytschow, W.:** Einige Worte in betreff der antiken Gefäße mit dem Stempel *KIPBEI*. (S. 141.)

Professor von Stern hatte bei den Beschreibungen der Reliefase (S. 98 n. 113) auch auf einige Gefäße hingewiesen, mit einem Stempel *KIPBEI* gezeichnet, der einen weiblichen Kopf und eine *gorona marais* trägt. Stern hatte sich dabei der Ansicht *Uvarowa* angeschlossen und die Inschrift für einen Eigennamen erklärt, jedoch war ihm die Form eine auffallend gewesen. Latytschow hebt nur hervor, daß ihm noch andere Gefäße mit dem gleichen Stempel

bekannt seien. Er erklärt die Form folgendermaßen: *KIPBEI* (lies *Kybe*) ist der Genitiv des Namens *Kybe*, es gebe sehr viele ähnlich klingende Namen auf *kybe*, die auf griechischen Inschriften Südrusslands gefunden worden sind, z. B. *kybe*, *kybe*, *kybe*. Da Gefäße mit jenem Stempel (Namen) nur in den griechischen Kolonien Rußlands vorkamen, so darf man wohl annehmen, daß in einer Kolonie eine Fabrik für Topferwaren bestand, deren Inhaber die barbarischen Namen *kybe* trug.

11. **Popow, P.:** Über Inschriften auf einem chinesischen Gürtel. S. 142.

12. **Orechnikow, A. W.:** Ein Nachtrag zum Nekrolog des Baron Tieschenhausen. (S. 142.)

Eine kleine Ergänzung zum Verzeichnis der literarischen Arbeiten Tieschenhausen.

#### Nachrichten (Iswestija)

der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 5. St. Petersburg 1903. (127 Seiten). Includ:

Mitteilungen über Gorodischtschen und Kurgana aus dem Jahre 1873. Mit einem Vorwort von A. A. Spjuzin. (S. 11 bis 27.)

Das fünfte Heft der Nachrichten bringt eine Anzahl von Berichten über Kurgane und Gorodischtschen. Es kann natürlich nicht davon die Rede sein, hier einen Auszug zu geben; es sind nichts weiter als einzelne Aufzählungen der betr. Altertümer mit Angabe der Örtlichkeit. Doch ist es vielleicht angezeigt, hier einige Worte über die Gorodischtschen einzuschicken. Die Kurgane oder Hügelgräber sind bekannt.

Gorodischtschen sind Erlaubstättungen, Erhebungen, Erdwälle von sehr verschiedener Form und Größe; in Deutschland sind derartige Erhebungen meist bekannt unter dem Namen der Bünnerberge, Heidengräber, Fliedbergen usw. In Südrußland heißen sie Gorodischtschen oder Gorodki. Nach der heute als sicher anerkannten Meinung sind es die Reste besetzter Plätze und Ansiedelungen ältester Zeit. Die Ansicht, daß es Opferstätten, Stätten des heidnischen Kultus gewesen seien, ist heute aufgegeben.

Das Wort Gorodischtsche bedeutet den Ort, die Lokalität, wo früher ein Gorod war. Man gebraucht oft statt des Ansirische Gorodischtsche den Ausdruck Gorodok. Heute hat Gorod im Russischen die Bedeutung „Stadt“, allein in alter Zeit hat man mancherlei darunter verstanden, was sich mit unserem heutigen Begriff „Stadt“ nicht im entferntesten deckt. Das Wort „gorod“ bedeutete in alter Zeit Zann, Umzäunung, Befestigung, Mauer, Schutzwall oder eine besetzte Lokalität im allgemeinen oder einen bewohnten, besetzten Platz. Im besonders auch ein Territorium, entweder von politischem oder administrativem Charakter, auch ein Zentrum für Administration und Handel. Die übertragene und abgeleitete Bedeutung des Wortes „gorod“ hängt mit unserem heutigen Begriff des Wortes „Stadt“ zusammen. Ist somit „Gorod“ eine Banlieue, eine Ansiedlung, eine künstliche Befestigung, so ist Gorodischtsche ein Ort, wo früher ein Gorod, aber keineswegs eine Stadt im heutigen Sinne war.

Die Gorodischtschen, die früheren Ansiedlungsstätten haben in archäologischer Beziehung eine sehr große Bedeutung. Prof. Samok wasso hat durch eine Reihe von Untersuchungen diese alten Stätten genau durchforscht und vielfach über dieselben berichtet.

Die Gorodischtschen oder Gorodki haben sehr verschiedene Formen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Sie liegen — mit Ausnahmen — an ungelegenen Stellen der Flüsse und sind von zwei oder drei

Seiten durch natürliche Schuchten oder steil abfallende Abhänge geschützt, während an derjenigen Seite, wo die Ebenen angrenzen, künstliche Wälle und Gräben aufgeworfen sind. Nur wenige Goroditschsen sind in Niederungen, inmitten von Wiesen angelegt, aber in solchen Fällen immer allseitig von Wasser umgeben. Die un hohen Flußufer befindlichen Goroditschsen sind Teile des vorerwähnten Uferlandes, die durch einen aufgeworfenen Wall und Graben von der angrenzenden ebenen Fläche getrennt sind. Dabei ist der Zugang von der Ebene aus sehr erschwert. Die Ausdehnung, der Binnenraum des Platzes ist sehr verschieden, der Umfang ist auch verschieden, er schwankt zwischen 200 bis 1000 Schritt. (Man vergleiche Prof. Samokwasow's Untersuchungen über Goroditschsen und Kurgane, Russische Revue, Bd. XVI, St. Petersburg 1880, S. 134 bis 149 von L. Stodola.)

Es ist nicht ohne Interesse, aus der Einleitung, die Herr A. A. Spyzin zum Verfasser hat, einiges über die Entstehung der vorliegenden Berichte mitzuteilen. Auf Veranlassung des Herrn Dr. J. Samokwasow, damaligen Universitätsprofessors, jetzt Direktors des Archivs des Justizministeriums in Moskau, richtete im Jahre 1873 das Statistische Zentralkomitee an alle statistischen Gouvernementskomitees Anschriften und verlangte Mitteilungen über Goroditschsen und Kurgane, die sich in den betreffenden Gouvernements und Bezirken befinden, auf Grund folgenden Programms:

1. Gibt es daselbst Erdauflächtigungen, Schanzen oder Batterien, die im Volke Goroditschsen oder Gorodki genannt werden? Wenn es solche gibt, wo befinden sie sich und bei welchen Städten, Dörfern, Flüssen, Seen usw.?
2. Wie groß ist die Fläche — d. h. der Innenraum der Goroditschsen oder Gorodki — ohne Gräben und ohne Wälle?
3. Welche Form haben die Goroditschsen oder Gorodki?
4. Wie ist die Oberfläche beschaffen?
5. An was für einem Ort steht der Goroditschse?
6. In welcher Weise ist der Goroditschse umgeben von Schichten, Gräben, Wällen?
7. Wie ist die Länge und Breite der Gräben und Wälle der Goroditschsen?
8. An welcher Seite befinden sich die Zugänge zum Goroditschsen?
9. Wenn die Goroditschsen (Gorodki) nicht vollständig erhalten sind, sondern zerstört sind, ist es bekannt, wann die Zerstörung stattgefunden hat und was dazu Veranlassung gegeben hat?
10. Gibt es im Volke Legenden und Traditionen, warum die Goroditschsen errichtet sind? Weiß man etwas über Funde in Hüsen oder über Nachgrabungen? Wo sind die Funde aufbewahrt?
11. Gibt es daselbst Erdauflächtigungen, welche vom Volke Kurgane, alte Grabstätten oder Sepki genannt werden? Wenn es solche gibt, wo liegen sie, in welcher Anzahl?
12. Wenn diese Kurgane schon aufgegraben worden sind, ist es bekannt, wann, durch wen und zu welchem Zweck? Wurden bei dieser Gelegenheit nicht Knochen oder irgend welche alte Gegenstände gefunden?

Wie hieraus ersichtlich, handelt es sich bei diesem Programm im wesentlichen um die Goroditschsen, die Frage nach den Kurganen ist nur gelegentlich in Nr. 12 des Programms berührt worden.

Fast alle damals dem zentralen Statistischen Komitee eingehenden Berichte sind als Material zu einem Teil dem Prof. Samokwasow, zum andern Teil auf dessen Veranlassung anderen Personen zur Bearbeitung übergeben worden, so daß jetzt im Archiv des Zentralkomitees nur noch Mitteilungen über das

Gov. Archangol aufbewahrt worden. Die übrigen Berichte sind, wie bemerkt, verteilt; von vielen weiß man nicht, wo sie sich gegenwärtig befinden.

Prof. Samokwasow veröffentlichte durch den Druck einen Bericht über das Gov. Wulhynien (1898); eine Anzahl anderer Berichte (Woronesch, Podolien, Putlawo, Kursk, Smolensk, Orel, Tuza, Tschernigow, Orsberg), bereite er zum Druck vor. Einige lokale statistische Komitees gaben ihre Berichte selbst heraus (Wjatka, Kasan, Minsk, Nishnij Nowgorod, Olonok, Orel, Penza, Petersburg, Rjasan, Saratow und Tambow). Im Jahre 1896 entsand sich Herr Spyzin, das gesammelte Material zu bearbeiten; wengigell er sich der Endaufläglichkeit der Arbeit bewußt war, so unternahm er die Arbeit doch, weil hier keine systematische und vollständige Übersicht über jene alten Denkmäler in Rußland existiert.

Das Material über 14 Gouvernements befand sich in den Händen Samokwasows; er übermittelte alle Herrn Spyzin, der bereits die Nachrichten über die Gouvernements Woronesch, Podolien, Saratow, Smolensk und das Dneprgebiet veröffentlicht hat. Hier bietet uns der Verf. die Berichte über die Gouvernements Archangel, Witebsk, Mohilew, Orsberg, Taurien, Tambow, Cherson und Tschernigow; die Berichte sind unter der Aufsicht des Verf. von anderen Personen bearbeitet. Die Materialien über die polnischen Gouvernements sind durch Professor Samokwasow Herrn N. F. Helischewsky übergeben; die Materialien über das Gov. Putlawo sind von Herrn Spyzin und Herrn J. A. Ljutschonko angefertigt.

Weitere Mitteilungen als die aus dem Jahre 1873 stammenden stehen dem Verf. nicht zu Gebote; er weiß auch nicht, wo er dieselben suchen soll. Zum schluß der Einleitung gibt der Verf. eine Zusammenstellung der bereits gedruckten Berichte, Es gibt das Gouvernement, die Seiten der betreffenden Abhandlung, die Zeitschrift und den Namen des Verfassers an. — Ich benötige mich hier damit, die Namen der Gouvernements, über die Nachrichten vorliegen, zusammenzusetzen: Astrachan, Wulhynien, Woronesch, Wjatka, Siedowo, das donische Gebiet, Kasan, Kiew, Kursk, Minsk, Nishnij Nowgorod, Olonok, Petersburg, Podolien, Rjasan, Samara, Saratow, Simbirsk, Smolensk, Tambow.

Die Beilage zum 5. Hefte der Nachrichten des Kaiserl. Archivals, K. 1. 1. 1. St. Petersburg 1902, S. 1 bis 98, mit einer photographischen Tafel enthält wie die bisherigen beiden Berichte 1. eine archaische Chronik der zweiten Hälfte des Jahres 1901: Besuch des Museums und der Ausgrabungsstätten im Chersones durch den Kaiser und die Kaiserin von Rußland am 18. September 1902. Darauf bezieht sich die photographische Tafel. 2. Bericht über die Tätigkeit der Kaiserl. Archaischen Kommission, der verschiedenen gelehrten Gesellschaften, der Museen, Nachrichten über Altertümer, Schatzfunde usw. 3. Bibliographische Notizen aus mitrussischen Zeitschriften. (Auffallenderweise ist in diesem Hefte, wie in den beiden vorigen, das Archiv für Anthropologie nicht berücksichtigt.) 4. Ein Verzeichnis der in Rußland in der zweiten Hälfte des Jahres 1902 erschienenen Bücher genealogisch-archaischen Inhalts (S. 87 bis 91). 5. Ein Verzeichnis der in russischen Zeitschriften in der zweiten Hälfte des Jahres 1902 erschienenen Arbeiten genealogisch-archaischen Inhalts (S. 92 bis 96). 6. Übersicht der wichtigsten in russischen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Berichte über den XI. archaischen Kongress in Charkow (S. 97 bis 98).

## VII.

### Beiträge zur anthropologischen Untersuchung des harten Gaumens.

Von Dr. med. Moritz Bauer.

(Mit Tafel XV und 1 Abbildung im Text.)

Die Betrachtung des knöchernen Gaumens nimmt in der anthropologischen und anatomischen Literatur eine verhältnismäßig kleine Stelle ein. Erst durch das Aufblühen der anthropologischen Methoden in den letzten beiden Jahrzehnten wurde ihm wieder erneste Aufmerksamkeit zugewandt, die sich dann auch nach der morphologischen Seite hin ausdehnte.

Hatte Broca (1875) die Maße des harten Gaumens ausführlicher behandelt, so mußte die Entdeckung des Torus palatinus durch Knipfer (1879) den Anthropologen aufs neue den Anstoß zu Untersuchungen an Rassen-schädeln geben. Nachdem Ranke (1883) die Gaumenmessung an einer großen Anzahl althayrischer Schädel ausgeführt, und zu dem Ergebnis gekommen war, daß die männlichen Gaumen absohit länger seien als die weiblichen, daß die Breite hingegen sexuell nicht differiere, und daß in beiden Geschlechtern die Endbreite größer sei als die Mittelbreite, zeigt uns die Arbeit von Stieda (1891) eine Vereinigung morphologischer und anthropologischer Betrachtungsweise und wird eigentlich als Ausgangspunkt aller neueren und neuesten Arbeiten aufgeführt. Was nun sämtliche Autoren wohl am lebhaftesten interessiert hat, ist ohne Frage der Torus palatinus, jener durch eine Vorwölbung der medianen Gaumennaht gebildete Wulst, dessen sich sogar die Psychiater schon bemächtigt haben, froh, den bereits vorhandenen Degenerationszeichen noch ein neues hinzufügen zu können.

In Wirklichkeit allerdings können wir, wenn

wir aufrichtig sein wollen, den Torus palatinus bis jetzt überhaupt nicht erklären; denn da die syphilitische Natur desselben längst als unahntbar erkannt worden ist, bleibt uns nichts anderes als der Begriff der Ernährungsstörung im Knochengewebe übrig, dessen ziemlich unbestimmte Natur aus der Pathologie genugsam bekannt ist. Auch bezüglich der anthropologischen Verwertbarkeit des Torus palatinus können wir wohl über ein Plus oder Minus tabellarisch Auskunft geben, doch fehlen auch hier alle Beweise, daß er etwas für eine Rasse charakteristisch sei. „Der Gaumenwulst kommt an den Schädeln aller Völker vor“ (Stieda).

Nächst dem Torus palatinus hat man den Verlauf der Quernaht besonderen Studien unterzogen und vorwiegend drei Typen unterschieden (Stieda), von denen die eine, nach vorn vorspringende als besonders tierähnlich (theromorph) ausgesprochen wird, während die beiden anderen, die gerade und die verhältnismäßig seltene, nach hinten vorspringende Naht sich vorwiegend bei höheren Rassen finden.

Killermann (1894) hat sich der Mühe unterzogen, diesen Stiedaschen Grundunterscheidungen noch weitere Unterabteilungen hinzuzufügen. Und in der Tat kommen, wie sich auch bei den von uns untersuchten Gaumen zeigte, außerordentlich zahlreiche Nebenformen vor; indessen, da es ja bei derartigen Einteilungen doch nur auf das Schematische abgesehen ist, so glauben wir, daß die Killermannschen Unterabteilungen, so wertvoll sie auch für den

reinen Morphologen sind, das Studium sehr komplizieren. Wir ziehen es deshalb vor, die von Stieda aufgestellten Hauptformen festzuhalten und unseren Untersuchungen zugrunde zu legen.

Kupffer gebührt auch das Verdienst, die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Crista marginalis gelenkt zu haben, die noch dadurch erhöht wurde, daß Stieda zum ersten Male die Insertionsfläche des Musculus tensor veli palatini klarlegte. Erinnern wir uns ferner der Beobachtungen über das Zustandeckommen eines sog. Canalis palatinus inferior, dann der Albrecht-Stocquartschen Berichte über Varietäten des prämaxillaren Gaumenabschnittes, so drängt sich eine reiche Fülle von Material auf, wohl geeignet, neue Untersuchungen zu veranlassen.

Es sind dies die hauptsächlichsten morphologischen Gesichtspunkte; ihnen könnten wir noch einige mehr untergeordnete angliedern, die wir aber, als für uns von geringerer Bedeutung, übergehen wollen, um nunmehr zu dem uns zu wenden, was bisher die anthropologische Betrachtungsweise des Gaumens ergeben hat. Dazu wird es nötig sein, einen kurzen Überblick über die bei Gaumenmessungen angewandte Technik zu geben und im Anschluß daran diejenigen Abweichungen und Ergänzungen festzulegen, die sich uns als notwendig herausgestellt haben.

Broca maß die Länge des harten Gaumens mit dem Gleitzirkel von der Spina palatina bis zur „lèvre postérieure du hard alvéolaire“; er nahm ferner die Breite durch jedesmalige Feststellung des „maximum d'écartement“. Es mag gleich hier bemerkt werden, daß eine derartige Maximalbreite natürlich eine sehr verschiedene Lage haben kann, weshalb sie denn auch später durch bestimmte Angaben des betreffenden Molazabues ersetzt worden ist. Zu bemerken ist ferner, daß Broca den Gleitzirkel nicht direkt auf den Rand der Alveolen aufsetzte: „la glissière ne doit pas se placer sur le bord même des ouvertures des alvéoles, mais sur la face interne de l'arcade alvéolaire“. Virehow (1877 und 1892) maß die Gaumenlänge vom sog. inneren Alveolarpunkt zwischen den beiden inneren Schneidezähnen bis zur Spina palatina, die Gaumenbreite vom Innenrande des Alveolarfortsatzes, entsprechend den zweiten Molaren. Ranke gibt als Längenmaß die Entfernung

von der Basis der Spina des harten Gaumens bis zur inneren Lamelle des Alveolarrandes des Oberkiefers zwischen den mittleren Schneidezähnen, als Mittelbreite diejenige zwischen den inneren Alveolarrändern der zweiten Molaren und als Endbreite die Entfernung der beiden hinteren Endpunkte des Gaumens, bzw. der inneren Alveolarränder an. Nun kann es gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieses letztere Maß ein überaus unsicheres ist; und ganz abgesehen davon, daß sehr oft gerade die Endstücke dieser Alveolarfortsätze defekt sind, ist es nicht ersichtlich, an welcher Stelle man eigentlich den Zirkel aufsetzen soll; soll es am inneren Rande oder auf dem Gipfel dieses Fortsatzes geschehen? Wir haben uns daher genötigt gesehen, dieses Maß durch ein anderes zu ersetzen, das weiter unten ausführlich besprochen wird.

Turner (1884) fügt den Gaumenmaßen im engeren Sinne noch die sog. Palatomaxillarmaße hinzu, wobei er die „Länge“ vom oberen äußeren Alveolarpunkte bis zu einer durch die hinteren Ränder der Alveolarfortsätze des Oberkiefers gelegten Ebene maß, während er als „Breite“ die Entfernung der äußeren Ränder der Alveolarbogen unmittelbar über der Mitte der zweiten Molaren bestimmte. Eleholz (1892) maß die „Länge“ von der Spina palatina bis zum Gipfel der Erhebung zwischen den inneren Schneidezähnen, sowie die „Breite“ hinter den dritten Molaren. Jürgenson (1896) maß „die Entfernung der hinteren Spitze der Spina nasalis posterior von der Mitte des inneren Alveolarrandes zwischen den Schneidezähnen“ und „die Entfernung der inneren Alveolarränder an den zweiten Molaren“. Diese Maßweise entspricht nach der Ansicht des genannten Autors Nr. 28 der Frankfurter Verständigung; soweit wir aber ersehen, beruht diese Ansehnung Jürgensons auf einem Irrtum; denn die Frankfurter Verständigung gibt ausdrücklich die Basis der Spina an, nicht die Spitze. — Wir haben nun einer Arbeit von Bianchini (1900) zu gedenken, und zwar vor allem deswegen, weil er den bisher üblichen Indices von Virehow und Turner, die sieh unmittelbar aus dem oben Gesagten ableiten lassen, einen neuen Index hinzugefügt hat, den er als „Indice di divergenza“ bezeichnet und durch die Formel:

Breite zwischen den ersten Molaren  $\times 100$ , dividiert durch die Breite zwischen den dritten Molaren ausdrückt. Er gewinnt dadurch eine Formel für die verschiedenen Gaumenformen und leitet uns somit auf die alte Einteilung hin, die sich bereits bei Broca, dann bei Topinard und bei einer Reihe späterer Autoren findet:

U-förmig: . . . . . parallele  
 ellipsoid: . . . konvergierende  
 paraboloid: . . . . . divergierende } Alveolarränder.

Dazu sei noch bemerkt, daß Broca der paraboloiden Form im engeren Sinne noch eine hyperboloide anreihet (Topinard 1885, S. 955), doch dürfte diese keine praktische Bedeutung erlangen. Die U-Form, die sowohl Broca als Topinard, als auch neuerdings Bianchini ganz unbegreiflicherweise als „Y-förmig“ („ipsiloid“, „en upsilon“) bezeichnen, hat man auch bei Anthropoiden, die ellipsoide Form dagegen bei niederen Affen gefunden. Wir kommen unten darauf zurück — Nun hat Bianchini sich bewogen gefühlt, diese Einteilung noch dadurch zu komplizieren, daß er Unterabteilungen schuf, die er von der Länge und Breite der betreffenden Form abhängig machte, und hat es auf diese Weise auf sechs Formen gebracht. Es seien seine Einteilungen hier kurz angegeben (l. c. p. 97): „Veramente i tipi da me riscontrati furono due solamente, l'ipsiloido ed il paraboloido, ma credei conveniente aggiungerne un 3°: Pellisoido, che secondo il Broca è uno dei più frequenti. Sicchè i tipi della mia classificazione sono:

- I. ipsiloido (hypsiloides)
  - a) brachypsiloides
  - b) dolichypsiloides.
- II. paraboloido (paraboloides)
  - a) euryparaboloides
  - b) stenoparaboloides.
- III. ellisoido (ellipsoides)
  - a) brachyellipsoides
  - b) dolichellipsoides“.

Wir glauben, daß man auch hier bei der ursprünglichen Zahl bleiben darf; ebenso lassen wir die eben erwähnte hyperboloide Form (Topinard-Neuhaus, 1888) fallen. Aber so angenehm diese Einteilung in drei Haupttypen auch ist, so häufig läßt sie uns bei der Anwendung im Stiche. Wir haben in zahlreichen Fällen Gaumen gefunden, bei denen es ganz unmöglich war, anzugeben, ob sie der para-

boloiden oder der U-förmigen oder der ellipsoiden Form zuzurechnen seien. Es erklärt sich das folgendermaßen: Sehen wir uns einen Gaumen von der Mundseite an, so haben wir, streng genommen, zwei innere Alveolarränder, von denen der obere, d. h. nasalwärts gelegene, fast immer der ellipsoiden Form sich nähert — er biegt nämlich um das Foramen palatinum majus herum —, während der untere, d. h. oralwärts gelegene, an seinem hinteren Rande von dem oberen divergiert. Welche dieser beiden Randlinien nun dem Auge als die dominierende erscheint, hängt oft von der individuellen Auffassung ab, und es kann somit ein paraboloider Gaumen unter Umständen ellipsoid genannt werden, wenn man die obere, ein ellipsoider paraboloid, wenn man die untere Randlinie vorzugsweise ins Auge faßt. Zum Überflusse kommt noch die äußere Alveolarrandlinie hinzu und kompliziert das Bild oft derartig, daß wir eine strikte Definition gar nicht geben können. Es bedarf wohl nicht besonderer Erwähnung, daß neben diesen schwankenden Formen auch scharf ausgeprägte stehen, wo die Benennung keine Zweifel läßt; eine Einteilung aber sollte eben doch allen oder zum wenigsten der großen Mehrzahl der einzuteilenden Formen genügen, und das ist hier nicht der Fall. Wollen wir also aus anthropologischen Gründen diese Dreiteilung beibehalten, so dürfen wir das nur mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf tun, daß wir uns der schwankenden, bzw. Übergangsformen wohl bewußt sind. — Kehren wir nun wieder zu unserer Darstellung zurück und suchen eine Übersicht über die bisher gewonnenen Indices zu gewinnen.

1. Längen-Breiten-Index (Broca, Virchow, Topinard u. a.):
 
$$\frac{\text{Gaumenbreite} \times 100}{\text{Gaumenlänge}}$$
2. Palatamaxillar-Index (Turner u. a.):
 
$$\frac{\text{Äußere Gaumenlänge} \times 100}{\text{Äußere Gaumenbreite}}$$
3. Gaumemittel- und Gaumeneind-Index (Hauke):
  - a) Gaumemittel-Index = 1,
  - b) Gaumeneind-Index:
 
$$\frac{\text{Gaumeneindbreite} \times 100}{\text{Gaumenlänge}}$$

4. Indioe di divergenza (Bianchini):  

$$\frac{\text{Breite zwischen ersten Molaren} \times 100}{\text{Breite zwischen dritten Molaren.}}$$
5. Indioes vorliegende Arbeit:
- a)  $\frac{\text{Mittelbreite} \times 100}{\text{Spinabasislänge,}}$
- b)  $\frac{\text{Mittelbreite} \times 100}{\text{Spinaendlänge,}}$
- c)  $\frac{\text{Höhe hinter den ersten Molaren} \times 100}{\text{Mittelbreite,}}$
- d) Palatomaxillar-Index = 2.
- 5 a) und h) bezeichnen wir als „Gaumen-Index“, 5 c) als „Gaumenhöhen-Index“.

Wenden wir uns nach dieser Übersicht zur Darstellung unserer eigenen Maßtechnik. Die Messungen am Gaumen wurden mit dem Reißzirkel ausgeführt, mit Ausnahme natürlich der Turnerschen Maße, für die der Gleitzirkel in Anwendung kam. — Die Länge des Gaumens wurde gemessen 1. von der Basis, 2. von der Spitze der Spina palatina bis zu einem Kreisbogen, den der Reißzirkel zwischen den tiefsten Ausbuchtungen der Alveolarfläche der inneren Schneidezähne beschreibt. Unter Basis der Spina wurde eine Verbindungslinie verstanden, die die tiefsten Ausschnitte der Hinterränder der horizontalen Gaumenbeinplatten verbindet. Dieses letztere Maß hat vor dem ersteren den Vorzug, daß die großen Varietäten der Spina, die sich teilweise durch ihre verschiedene Länge, teilweise aus ihrer häufigen Deviation, vor allem aber aus den häufigen postmortalen Defekten ergeben, in Wegfall kommen. Diese Ansicht vertritt auch Schmidt (1888, S. 238 und 250). Die Breitenmaße wurden genommen erstens zwischen den beiden zweiten Molaren, und zwar muß hier ausdrücklich hervorgehoben werden, daß der Zirkel unmittelbar auf den Rand des Alveolarfaches aufgesetzt wurde; ferner zwischen den ersten Prämolaren und endlich zwischen den dritten Molaren (in derselben Weise). Mit dem Gleitzirkel bestimmten wir die Turnerschen Maße. Neu hinzugefügt haben wir die beiden Höhenmaße, die unseres Wissens an totem Material noch nicht genommen worden sind, wenn auch Neugebauer (1896), Siebenmann (1896), sowie Alkau (1901) Instrumente zur Messung der Gaumenwölbung am Lebenden konstruiert haben. Da die beiden ersten Methoden (die

Alkanseehe war mir leider nicht zugänglich) ausschließlich für Messungen am Lebenden eingerichtet sind, so sind sie für uns natürlich nur von indirektem Interesse. Immerhin sei folgendes erwähnt: Neugebauer, der sich ausschließlich mit der Messung des weichen Gaumens befaßte, stellte die Wölbung desselben fest, indem er stäbchenförmige Plättchen anfertigen ließ, deren Länge variiert, und deren jedes die seiner Länge entsprechende Zahl in Millimetern angibt. Die Stäbchen wurden mittels einer kräftigen, knieförmig gebogenen Pineoette gefaßt und die Messung abgelesen.

Wichtiger als dieser Apparat, der nur den weichen Gaumen berücksichtigt, ist der von Siebenmann (Basel) konstruierte Palatometer, den dessen Schüler Fränkel (1896) in seiner Dissertation beschreibt und abbildet. Das Instrument ist eine Kombination von Maßstab und Tasterzirkel und läßt gleichzeitig die Breite mittels einer Querstange und die Höhe mittels eines durchbrochenen Hebels messen. „Hat man den Palatometer mit seiner Querstange auf die Kronen der oberen, ersten Prämolaren aufgesetzt, die Gaumenbreite abgelesen, so hebewt man dieselbe auf der Kauffläche der oberen Zahnreihe in einer zur vorigen parallelen Richtung, bis man die Stelle hat, von wo aus man den höchsten Punkt des Gaumendaches zu treffen glaubt. An der betreffenden Stelle wird die Querstange fixiert, und zwar so, daß der Knopf des Hebels genau der Mitte des Gaumengewölbes gegenüberliegt. Ist man nun so weit, so drückt man auf den Hebel, bis dessen vorderes Ende das Gaumendach berührt, und kann nun in dieser Stellung an einem den hinteren Arm durchbrechenden kreisbogenförmigen Metallplättchen direkt die Zahl ablesen, welche der Gaumenhöhe entspricht.“

Der von uns angewandte Apparat, den der Zürcher Mechaniker P. Hermann nach den Angaben von Professor Dr. R. Martin angefertigt hat, besteht aus drei Teilen: erstens aus einem massiven, 6 mm dicken Stahlcylinder, der auf 20 mm graduiert ist und oben einen kleinen Handgriff besitzt; zweitens aus einer Messinghülse, die über diesen Cylinder geschoben werden kann, und deren unteres, verbräutes Ende jederseits eine viereckige Öffnung trägt, und

drittens aus einer Anzahl genau in dieselbe passender viereckiger Stabstäbchen, welche genau horizontal und rechtwinkelig zum Stabcyliner durch jene Öffnung hindurchgeschoben werden können. Das Verhältnis der viereckigen Bohrlöcher zu dem Kreisrusschnitt des unteren Mantelteiles ist ein derartiges, daß es die Bewegung sowohl der horizontal verschiebbaren Stäbchen als des vertikalen Maßstabes gestattet. Zu bemerken ist noch, daß der zylindrische Maßstab an seinem unteren Ende in der Weise zugespitzt ist, daß Aufsatz der Spitze auf den Knochen und Ableseung an der oberen Cylinderteilung in eine Frontalebene fallen. Die Zahl der horizontalen Stäbchen betrug 13, ihre Längen entsprachen der Skala von 28 bis 40 mm. Es ist wohl nötig, die Applikation des einfachen Instrumentes noch weiter zu erläutern. Nur wenige Worte mögen hier noch Platz finden. Die Messung wird in der Weise ausgeführt, daß nach hinreichendem Ausprobieren dasjenige Horizontalstäbchen eingeschoben wird, dessen seitlich zugespitzte Enden gerade auf den Alveolarfortsätzen aufliegen. Der Maßstab wird nun aufgesetzt und so lange verschoben, bis die Spitze genau in der Medianebene steht und das Horizontalstäbchen genau wagrecht eingestellt ist (Augenmaß). Man liest dann am Vertikalstäbchen die Höhe unmittelbar ab, und wir haben erstens die Höhe hinter den ersten Prämolaren, zweitens die Höhe hinter den ersten Molaren auf diese Weise überall da gemessen, wo die Alveolarränder nicht defekt waren. Es können natürlich Fälle vorkommen, wo eine wirklich horizontale Auflage der Plättchen nicht möglich ist. In solchen Fällen wird man entweder durch Schätzung auf der einen Seite die fehlende Höhe ergänzen, oder aber auf das Maß verzichten; wie wir uns überhaupt vorgenommen hatten, Maße, die im geringsten willkürlich zu sein schienen, lieber fortzulassen. Man darf sich ferner nicht damit zufrieden geben, daß das Stäbchen etwa von selbst liegen bleibt, sondern muß sorgfältig mit dem Augenmaß kontrollieren, ob die Stellung auch wirklich horizontal ist, was oft bei steil abfallenden Gaumen große Schwierigkeiten bietet. Daß man bei allen senk-atrophischen Alveolarrändern auf die Messung verzichtet, ist selbstverständ-

lich. Immerhin sind die Fehlerquellen auch durch die Präzision des Apparates und des Untersuchenden nicht gänzlich auszuschalten — man hat oft eine geringere Höhe, wenn der Tornus sehr stark entwickelt ist; doch gehören diese Fälle zu den selteneren. Das Aufsetzen der Spitze in der Medianlinie bleibt demungeachtet die einzig zulässige Messungsweise, da bei seitlichem Aufsetzen der Willkür ein zu weites Feld bliebe.

Unsere Untersuchungen wurden ausgeführt an dem Material des Zürcher Anthropologischen Institutes und umfaßten im ganzen 214 Schädel. Unter diesen waren folgende Rassen vertreten:

#### I. Europa:

1. 5 prähistorische<sup>1)</sup> Schädel (2 Auvernier, 3 Schädel aus einem alten Grabe),
2. 33 Schädel von der Ura (Ural); zu dieser Gruppe wurden 1 Finnländer- und 1 Wendenschädel gerechnet,
3. 1 Grönländer,
4. 62 rezente Schädel, worunter 60 sicher von schweizerischer Herkunft.

#### II. Asien:

1. 23 Birmanen,
2. 19 Battak,
3. 5 Timoreesen,
4. 4 Malaien + 3 Javanen + 2 Samanapaner + 1 Tidorese,
5. 5 Chinesen,
6. 1 Alfure,
7. 1 Drawida + 1 Singhalese.

#### III. Afrika:

1. 18 Ägypter (Altägypter),
2. 3 Neger + 1 Kaffer,
3. 1 Guancho.

#### IV. Amerika:

1. 1 Botokude + 4 Indianer (1 Duentes + 1 Arizona + 1 Indianer aus der Nähe von Toropilla + 1 Flathead-Indianer),
2. 5 Feuerländer.

<sup>1)</sup> Die fettgedruckten Namen sind maßgebend für die Bezeichnung in sämtlichen folgenden Tabellen. Es mußten eben, wo nur wenige Schädel vorlagen, verwandte Typen zusammengefaßt werden.



## V. Australien:

1. 1 Neu-Holländer + 1 Australier,
2. 6 Maori,
3. 3 Papua + 2 Schädel von einer kleinen Insel bei Neuginea.

Diese Aufzählung gibt zugleich die natürlichen Gruppen an, für welche die Mittel berechnet wurden. Zu bemerken ist, daß alle juvenilen oder infantilen Schädel bei dem Berechnen der absoluten Minima außer acht gelassen wurden. Die Gesamtzahl der auf diese Weise eliminierten Schädel beträgt 24 und ist, wie folgt, verteilt:

|               |    |
|---------------|----|
| Schweizer     | 14 |
| Europäer      | 1  |
| Birmanen      | 3  |
| Batak         | 2  |
| Timoresen     | 1  |
| Chinesen      | 1  |
| Neu-Holländer | 1  |
| Maori         | 1  |

24

Bei den Indices, bei welchen man es ja nur mit der Proportion zu tun hat, konnten natürlich diese juvenilen Schädel einbezogen werden. Außer den oben erwähnten Messungen wurden von jedem Schädel die größte Länge, die größte Breite, die Ganzgesichtshöhe, die Obergesichtshöhe und die Jochbogenbreite gemessen und die daraus sich ergebenden Indices (Längen-Breiten-, Ganzgesichts- und Obergesichts-Index) berechnet. Ferner wurde eine Beschreibung jedes Schädels gegeben (morphologischer Teil), in welcher sämtliche Sutura-Verhältnisse gezeichnet und außerdem folgende Punkte beschrieben wurden:

1. Allgemeine Form des Alveolarbogens,
2. Reliefverhältnisse:
  - a) der maxillaren,
  - b) der palatinalen Partie des harten Gaumens,
3. Ausbildung des Foramen incisivum,
4. Ausbildung des Torus palatinus,
5. Gestalt der Spina nasalis posterior,
6. Nahtverhältnisse,
7. Eventuelle Abnormitäten.

Wir möchten gleich hier bemerken, daß wir der Ausbildung des Foramen incisivum verhältnismäßig wenig neue Gesichtspunkte abgewinnen konnten; es handelt sich da meistens

um wenig interessante und unwichtige Form- und Größendifferenzen, weshalb wir unsere Befunde hier nicht mitteilen wollten; auch konnten wir dem interessanten Kapitel der Intermaxillar-Varietäten nicht näher treten, da dies den Rahm dieser Arbeit überschritten haben würde.

Wir gehen nun über zu einer Besprechung der durch unsere Messungen festgestellten Form- und Größenverhältnisse des harten Gaumens. Sämtliche Tabellen enthalten die arithmetischen Mittelzahlen für die einzelnen Rassengruppen, ferner Maximum und Minimum in denjenigen Fällen, in welchen wir über ein einigermaßen größeres Material verfügten, aus die hauptsächlichste Variationsbreite der meisten Fälle.

Vergleichen wir nun zunächst die absoluten Gaumenmaße der verschiedenen Rassen, so ergibt sich für die „Gaumenlänge bis zur Basis der Spina“ (Spinabasislänge) folgendes:

Tabelle I.  
Gaumenlänge bis zur Basis der Spina.  
(Spinabasislänge.)

| Rasse          | Mittel | Maxi-<br>mum | Mini-<br>mum | Oscil-<br>lation |
|----------------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Guauche        | 38,5   | —            | —            | —                |
| Schweizer      | 42,6   | 51,0         | 38,0         | 40—48            |
| Maori          | 43,0   | 45,0         | 42,0         | —                |
| Prähistorische | 43,2   | 44,0         | 41,5         | —                |
| Usa            | 43,8   | 49,0         | 41,0         | 45—47            |
| Birmane        | 44,4   | 48,5         | 40,0         | 42—48            |
| Batak          | 44,6   | 50,0         | 38,0         | 40—47            |
| Ägypter        | 45,4   | 51,0         | 41,0         | 44—47            |
| Australier     | 46,0   | —            | —            | —                |
| Papua          | 46,7   | 49,0         | 44,5         | —                |
| Dravida        | 47,0   | —            | —            | —                |
| Malsien        | 47,1   | 50,0         | 43,0         | —                |
| Feuerländer    | 47,6   | 50,0         | 45,5         | —                |
| Grönländer     | 48,0   | —            | —            | —                |
| Botokudo       | 48,0   | 53,0         | 43,5         | —                |
| Neger          | 48,2   | 51,0         | 45,0         | —                |
| Chinesen       | 48,6   | 53,0         | 48,0         | —                |
| Timoresen      | 50,2   | 54,0         | 49,5         | —                |
| Alfure         | —      | —            | —            | —                |

Wir ersehen aus dieser Tabelle, daß die Mittelzahl für diese Gaumenlänge zwischen 38,5 (Guauche) und 50,2 (Timoresen) schwankt, und daß die beiden europäischen Gruppen (Schweizer- und Usaschädel) in der Nähe der unteren Grenze bleiben, während Botokudo, Neger und Chinesen, sowie der Grönländerschädel dem maximalen Mittel am nächsten stehen. Sehr

auffallend ist die fast vollkommene Übereinstimmung der Battak mit den Schweizern in Maximum, Minimum und Oscillation, während das Mittel der beiden Gruppen zwischen 42 und 44, also um zwei Einheiten schwankt. Bemerkenswert ist außerdem die kleine Oscillationsbreite der Usaschädel, wenn man dagegen den großen Abstand von Maximum und Minimum hält.

Tabelle II.  
Gaumenlänge bis zur Spitze der Spina.  
(Spinaendlänge.)

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Guanche . . . . .        | 44,0   | —       | —       | —           |
| Usa . . . . .            | 45,0   | 53,5    | 44,0    | 46—50       |
| Schweizer . . . . .      | 46,0   | 56,0    | 40,4    | 40—50       |
| Maori . . . . .          | 46,7   | 50,0    | 46,0    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 48,1   | 53,0    | 43,0    | 45—51       |
| Prähistorische . . . . . | 48,4   | 51,5    | 44,5    | —           |
| Battak . . . . .         | 48,9   | 56,0    | 43,0    | 46—51       |
| Ägypter . . . . .        | 49,7   | 55,0    | 44,0    | 48—51       |
| Drawida . . . . .        | 50,5   | —       | —       | —           |
| Papua . . . . .          | 50,7   | 54,0    | 48,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 50,7   | 55,0    | 47,5    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 51,4   | 54,0    | 49,0    | —           |
| Australier . . . . .     | 51,5   | —       | —       | —           |
| Neger . . . . .          | 51,7   | 54,5    | 48,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 52,2   | 59,0    | 51,0    | —           |
| Grönländer . . . . .     | 52,5   | —       | —       | —           |
| Timoresen . . . . .      | 58,6   | 58,0    | 52,5    | —           |
| Botokude . . . . .       | 54,2   | 59,0    | 50,5    | —           |
| Alfure . . . . .         | —      | —       | —       | —           |

Vorstehende Tabelle zeigt uns die „Gaumenlänge bis zur Spitze der Spina“ (Spinaendlänge), und wir ersuchen aus ihr eine ziemlich genaue Übereinstimmung der Reihenfolge mit Tabelle I, mit geringen Ausnahmen, zu denen wir namentlich die Verschiebung der Australier rechnen. Die Oscillationsbreite der Ägypter ist hier die kleinste, während diejenige der Usa-Schädel zugenommen hat. Trotz dieser geringen Unterschiede wollen wir hier nochmals darauf hinweisen, daß die Basislänge der Endlänge vorzuziehen sei; in der Tat werden uns spätere Betrachtungen zeigen, daß folgende Punkte gegen die Verwendung der Endlänge sprechen:

1. Häufige Defekte der Spinaspitze.
2. Häufige Deviation derselben.
3. Vorkommende Spaltbildung.
4. Umbiegung derselben zur Nasenseite.

Hingegen ist das Basismaß fast immer genau, da selbst im Falle einer Verletzung der beiden Knochenbögen die oben genau beschriebene Linie immer mit Leichtigkeit zu rekonstruieren ist.

Wir wenden uns nun in der folgenden Tabelle zur „Gaumenmittellänge“, gemessen zwischen dem zweiten Molaren, und können auf das bereits über dieses Maß wie über alle anderen in der Einleitung Erwähnte hinweisen.

Tabelle III.  
Gaumenmittellänge zwischen dem  
zweiten Molaren.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Drawida . . . . .        | 36,5   | —       | —       | —           |
| Grönländer . . . . .     | 37,0   | —       | —       | —           |
| Schweizer . . . . .      | 37,5   | 44,5    | 33,0    | 33—41       |
| Usa . . . . .            | 39,6   | 45,0    | 35,0    | 35—42       |
| Australier . . . . .     | 40,0   | —       | —       | —           |
| Prähistorische . . . . . | 40,2   | 44,5    | 39,0    | —           |
| Ägypter . . . . .        | 40,3   | 48,5    | 36,5    | 37—44       |
| Chinesen . . . . .       | 40,6   | 45,0    | 39,0    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 40,7   | 47,0    | 36,0    | 39—41       |
| Malaien . . . . .        | 40,7   | 47,0    | 37,5    | —           |
| Battak . . . . .         | 40,8   | 44,0    | 37,5    | 38—43       |
| Neger . . . . .          | 41,2   | 45,5    | 36,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 41,2   | 45,0    | 35,5    | —           |
| Timoresen . . . . .      | 41,4   | 44,0    | 40,5    | —           |
| Maori . . . . .          | 41,7   | 43,0    | 39,0    | —           |
| Guanche . . . . .        | 42,5   | —       | —       | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 42,5   | 45,0    | 37,0    | —           |
| Botokude . . . . .       | 43,0   | 45,0    | 41,0    | —           |
| Alfure . . . . .         | 43,5   | —       | —       | —           |

Hier sehen wir eine Schwankung des Mittels von 36,5 bis 43,5 und sehen, ähnlich wie bei Tabelle I, die europäischen Gruppen sich der unteren Grenze nähern. An wesentlich anderer Stelle stehen allerdings die Australier und die Chinesen, was beweist, daß gegenüber der Längsentwicklung die Breite bei diesen beiden Gruppen nicht entsprechend entwickelt ist (relativ); Ägypter und Malaien zeigen hingegen keine große Variationsbreite gegen Tabelle I. Das Maximum des Mittels zeigen Alfure und Botokude, während die Chinesen, verglichen mit Tabelle I und II, eine bedeutende Verschiebung nach der oberen Hälfte der Tabelle aufweisen. Interessant ist ferner die enorme Breite (42,5), die der Guanche gegenüber einer Basislänge von nur 38,5 aufweist, woraus sich ergibt, daß er die einzige Gruppe darstellt, deren Breite

nicht nur nicht geringer, sondern volle 4 mm größer ist als die Spinabasislänge!

Wir können hier gleich vorgehend erwähnen, daß der Gauche dementsprechend den enormen Gaumenindex von 110,5 (Mittel) aufweist. Dem gegenüber ist es doppelt zu bedauern, daß uns von dieser Gruppe nur ein einziger Schädel zur Verfügung steht, der jeder Schlussfolgerung aus dieser Tatsache *a priori* einen Riegel vorschreibt. Weitere Untersuchungen sind hier also dringend nötig. — Maxima und Minima zeigen in Tabelle III keine großen Schwankungen im Abstände voneinander (35,0 bis 45,0; 33,0 bis 44,5; 37,5 bis 47,0; 35,5 bis 45,0 usw.). Auffallend klein ist die Oscillationsbreite der Birmanen, wenigstens, wenn man sie mit derjenigen der Battak, Ägypter, Usa und Schweizer vergleicht, und wenn man den Abstand von Maximum und Minimum dieser geringen Oscillationsbreite entgegenhält. Das absolut größte Maximum zeigen merkwürdigerweise die Ägypter (48,5), während deren Mittel nur 40,3 beträgt. Eine solche Divergenz besteht zwischen Minimum und Mittel nicht, hier haben wir vielmehr entsprechende Zahlen (36,5 bis 40,3).

Wir verlassen hiermit die Tabelle III und kommen nunmehr zu der schon oben eingehend

Tabelle IV.  
Gaumenendbreite zwischen den dritten Molaren.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Grönländer . . . . .     | 37,5   | —       | —       | —           |
| Drawida . . . . .        | 37,5   | —       | —       | —           |
| Schweizer . . . . .      | 40,4   | 47,0    | 33,0    | 39—44       |
| Usa . . . . .            | 40,9   | 46,0    | 36,5    | 37—45       |
| Ägypter . . . . .        | 41,1   | 50,5    | 35,0    | 38—41       |
| Prähistorische . . . . . | 42,0   | 47,5    | 37,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 42,2   | 45,5    | 29,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 42,2   | 45,0    | 40,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 42,3   | 46,5    | 38,0    | —           |
| Australier . . . . .     | 43,0   | —       | —       | —           |
| Guanche . . . . .        | 43,0   | —       | —       | —           |
| Timoresen . . . . .      | 43,0   | 45,5    | 41,5    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 43,2   | 52,0    | 39,5    | 39—42       |
| Mori . . . . .           | 43,3   | 46,0    | 40,0    | —           |
| Battak . . . . .         | 43,4   | 47,0    | 39,5    | 41—47       |
| Festländer . . . . .     | 44,0   | 49,0    | 39,0    | —           |
| Neger . . . . .          | 44,0   | 44,5    | 43,0    | —           |
| Alfure . . . . .         | 45,5   | —       | —       | —           |
| Botokade . . . . .       | 45,7   | 49,0    | 43,5    | —           |

erörterten „Gaumenendbreite“, gemessen also nicht nach Ranke, sondern zwischen den dritten Molaren.

Die „Gaumenendbreite zwischen den dritten Molaren“ bedarf noch einiger Bemerkungen. Bevor wir zu dem eigentlichen Vergleich von Tabelle III und IV übergehen, möchten wir feststellen, worauf die Bedeutung dieses Maßes beruht. Zweifellos in erster Linie auf dem mit seiner Hilfe von Bianchini aufgestellten „Indice di divergenza“. Für diesen Index ist jenes Maß in der Tat vortrefflich; sehen wir aber — wie das in vorliegender Arbeit geschehen ist — von ihm ab, so verliert auch das genannte Maß an Wichtigkeit.

Dazu kommt, daß an unserem Material — und wir nehmen an, bei jedem Material werde es ähnlich sein — in einer großen Zahl von Fällen die dritten Molaren entweder gar nicht oder nur teilweise durchgebrochen sind. Wir glauben also behaupten zu dürfen, daß man in der Anthropologie auch dieses Maß entbehren kann oder besser muß; wir beschränken seine Anwendung auf den genannten Index und ersetzen es im übrigen durch die Gaumenmittelbreite. Wir sind aber der Meinung, daß es immerhin dem Rankeschen Maße unbedingt vorzuziehen sei.

Fassen wir noch einmal kurz zusammen: Gegen beide Maße spricht die Unregelmäßigkeit des Vorhandenseins der dritten Molaren, sei es, daß sie gar nicht durchgebrochen oder ausgefallen sind, spricht ferner die Häufigkeit der dadurch bedingten Defekte der hinteren Alveolarränder (Atrophie), sprechen endlich die häufigen postmortalen Läsionen derselben. Gegen das Rankesche Maß im besonderen fällt ins Gewicht die Unmöglichkeit, sich über den Punkt des genauen Zirkelaufsatzes zu einigen (vgl. Einleitung).

Wenden wir uns nun zu dem Vergleiche von Tabelle III und IV. Eine Übereinstimmung namentlich in den Endgliedern der Tabellen ist unverkennbar; größere Verschiebungen zeigen in Tabelle IV: Australier, Birmanen, Battak und Neger nach dem höchsten, Guancho und Papua nach dem niedersten Mittel zu. Schlüsse auf die später zu behandelnde Gaumenform zu ziehen, lassen diese Zahlen nicht zu, wie ein Blick auf

Tabelle XVII lehrt. Im einzelnen ist zu Tabelle IV noch folgendes zu bemerken: Es entspricht weder dem absoluten Maximum (52,0) noch dem absoluten Minimum (29,0) die Größe des dazu gehörigen Mittelwertes; ferner fällt uns auf, daß die Oszillationsbreite der größten Gruppe (Schweizer, 39 bis 44) eine sehr kleine ist im Vergleich zum Abstände ihres Maximum (47,0) vom Minimum (33,0). Auch die Oszillationsbreite der Birmanen ist eine geringe; das gleiche gilt von den Ägyptern. Wie stark bei gleichen Maxima die Minima differieren können, dafür bietet einen Beleg der Vergleich zwischen Malaien, Chinesen und Timoresen (45,5, 45,0, 45,5; — 29,0, 40,0, 41,5). Bei den Minima tritt das weniger stark hervor. Natürlich ist hier, wie in allen ähnlichen Fällen, an das der Größe nach in den einzelnen Gruppen ungleiche Material zu erinnern.

Die folgende Tabelle gibt uns Aufschluß über die „Breite zwischen den ersten Prämolaren“.

Tabelle V.  
Gaumenbreite zwischen den ersten Prämolaren.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oszillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Dravida . . . . .        | 27,5   | —       | —       | —           |
| Ägypter . . . . .        | 29,1   | 35,0    | 25,0    | 27—29       |
| Schweizer . . . . .      | 29,2   | 36,0    | 25,0    | 25—31       |
| Ura . . . . .            | 29,5   | 36,0    | 25,5    | 27—31       |
| Malaien . . . . .        | 29,7   | 35,5    | 26,0    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 30,0   | 33,0    | 27,0    | —           |
| Prähistorische . . . . . | 30,0   | 31,5    | 28,5    | —           |
| Neger . . . . .          | 30,2   | 33,5    | 24,0    | —           |
| Bastak . . . . .         | 30,4   | 35,0    | 24,5    | 28—31       |
| Birmanen . . . . .       | 30,6   | 36,0    | 28,0    | 28—31       |
| Timoresen . . . . .      | 31,0   | 32,5    | 30,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 31,0   | 35,0    | 28,0    | —           |
| Australier . . . . .     | 31,0   | —       | —       | —           |
| Botokuden . . . . .      | 31,5   | 32,0    | 31,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 31,5   | 34,0    | 25,5    | —           |
| Guanche . . . . .        | 32,0   | —       | —       | —           |
| Maori . . . . .          | 32,4   | 36,0    | 30,0    | —           |

Vergleichen wir Tabelle V mit Tabelle III, so sehen wir eine bedeutende Verschiebung der Ägypter, Malaien, Feuerländer, Botokuden und Neger nach dem minimalen Mittel zu; wir werden also erwarten, daß die Tabelle XVII diese Gruppen als überwiegend „paraboloid“ darstellt, was auch, mit Ausnahme der Neger, durchaus

der Fall ist. Nach dem maximalen Mittel zu verschoben erscheinen Australier und Chinesen, was die Tabelle XVII allerdings weniger bestätigt; doch ist hieran sicher auch die geringe Anzahl namentlich der australischen Gruppe schuld. — Dem maximalen Mittel in Tabelle V zunächst stehen Maori, Guanche und Papua, demnächst Botokuden und Australier. Sehr bemerkenswert ist der geringe Abstand des größten vom kleinsten Mittel (32,4 bis 27,5), namentlich im Vergleich mit den entsprechenden Zahlen der Tabelle III (43,5 bis 36,5) und IV (45,7 bis 37,5), weil daraus zu schließen ist, daß die Breite im Bereich der ersten Prämolaren nicht nur absolut kleiner ist als im Bereich der zweiten und dritten Molaren, sondern auch, daß die wesentlichen Formdifferenzen auf dem hinteren Abschnitt des Gaumens beruhen, weil die Schwankungen im Bereich der ersten Prämolaren auch relativ klein sind. (Man darf nicht vergessen, daß 2 mm hier schon eine große Zahl bedeuten.) An dieser Stelle hätte sich nun die Berechnung des Bianchinischen Index einzufügen, wenn wir nicht, wie schon oben erwähnt, vorziehen würden, von demselben hier Abstand zu nehmen. Denn es kam uns hauptsächlich auf einen allgemeinen Überblick über die drei Hauptformen des Gaumens an, weniger darauf, sie rechnerisch nachzukonstruieren. Bezüglich der anderen Neuierung des genannten Autors in der Anstellung der schon erwähnten Unterabteilungen sei hier noch einmal kurz hervorgehoben, daß dieselben das Studium sehr erschweren. Wir ziehen es bei weitem vor, bei der alten Einteilung zu bleiben, und glauben, daß man Übergangsformen, die das Bild einer systematischen Einteilung trüben, nicht durch Einführung von Unterabteilungen beseitigt; dieses gilt auch von Killermanns so überaus mühevoller Arbeit über die Quernaht. Es erinnert diese Art, Morphologie zu treiben, allen sehr an das Linné'sche System der Pflanzen.

Wir wollen nun in den beiden folgenden Tabellen die von uns besonders berücksichtigten Höhenmaße studieren, und zwar in Tabelle VI die Gaumenhöhe hinter den ersten, bzw. zwischen den ersten und zweiten Prämolaren, in Tab. VII die Gaumenhöhe hinter den ersten, bzw. zwischen den ersten und zweiten Molaren.

Tabelle VI.  
Gaumenhöhe zwischen ersten und zweiten  
Prämolaren.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Maori . . . . .          | 8,2    | 9,0     | 8,0     | —           |
| Timoresea . . . . .      | 9,4    | 11,0    | 9,0     | —           |
| Usa . . . . .            | 10,4   | 14,0    | 6,0     | 9—11        |
| Schweizer . . . . .      | 10,4   | 17,5    | 7,0     | 8—13        |
| Batak . . . . .          | 10,4   | 14,0    | 7,0     | 10—12       |
| Drawida . . . . .        | 10,5   | —       | —       | —           |
| Chinesen . . . . .       | 10,6   | 13,0    | 9,0     | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 10,6   | 13,0    | 9,0     | —           |
| Malaien . . . . .        | 10,7   | 12,5    | 9,0     | —           |
| Papua . . . . .          | 10,7   | 13,0    | 6,5     | —           |
| Australier . . . . .     | 11,0   | —       | —       | —           |
| Ägypter . . . . .        | 11,2   | 15,5    | 8,5     | 10—12       |
| Prähistorische . . . . . | 11,4   | 14,0    | 9,0     | —           |
| Birmanen . . . . .       | 11,6   | 15,0    | 9,0     | 9—15        |
| Neger . . . . .          | 11,7   | 15,5    | 7,0     | —           |
| Botokude . . . . .       | 13,0   | 15,0    | 10,5    | —           |
| Guanche . . . . .        | 14,0   | —       | —       | —           |

Tabelle VII.  
Gaumenhöhe zwischen den ersten und  
zweiten Molaren.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Alfure . . . . .         | 9,5    | —       | —       | —           |
| Maori . . . . .          | 10,2   | 15,0    | 9,0     | —           |
| Grönländer . . . . .     | 11,5   | —       | —       | —           |
| Schweizer . . . . .      | 11,7   | 18,5    | 7,0     | 9—15        |
| Drawida . . . . .        | 12,0   | —       | —       | —           |
| Batak . . . . .          | 12,9   | 16,5    | 9,0     | 10—14       |
| Timoreesen . . . . .     | 13,0   | 18,0    | 10,0    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 13,0   | 16,0    | 11,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 13,2   | 16,5    | 10,0    | —           |
| Prähistorische . . . . . | 13,2   | 15,0    | 11,5    | —           |
| Usa . . . . .            | 13,5   | 19,0    | 9,0     | 11—14       |
| Ägypter . . . . .        | 13,7   | 17,5    | 10,0    | 12—17       |
| Birmanen . . . . .       | 13,8   | 20,0    | 11,0    | 12—15       |
| Australier . . . . .     | 14,0   | —       | —       | —           |
| Chinesen . . . . .       | 14,0   | 16,0    | 10,0    | —           |
| Neger . . . . .          | 14,2   | 18,0    | 11,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 14,9   | 21,0    | 13,0    | —           |
| Guanche . . . . .        | 15,0   | —       | —       | —           |
| Botokude . . . . .       | 15,5   | 19,0    | 13,0    | —           |

Uns fällt hier auf, daß die Gruppen der beiden Tabellen keineswegs ganz parallel sind, wenn auch einzelne von ihnen die gleiche Einordnung zeigen; das gilt namentlich von den Enden der Reihe (Botokude, Guanche, Maori, Schweizer, Batak, Neger), ferner von Ägyptern,

Feuerländern, Papua, Birmanen; auch Australien, Drawida zeigen ganz geringe Verschiebungen. Bedeutend nähern sich in Tabelle VII dem maximalen Mittel: Timoreesen, Malaien, Usa, Chinesen; eine größere Verschiebung im entgegengesetzten Sinne weisen nur die prähistorische Schädel auf. Berechnen wir nun aus den beiden Tabellen die Differenzen zwischen vorderer und hinterer Gaumenhöhe innerhalb der einzelnen Gruppen, so ergibt sich folgendes:

Tabelle VIII.

| Rasse                    | Differenz |
|--------------------------|-----------|
| Guanche . . . . .        | 1,0       |
| Schweizer . . . . .      | 1,3       |
| Drawida . . . . .        | 1,5       |
| Prähistorische . . . . . | 1,8       |
| Maori . . . . .          | 2,0       |
| Birmanen . . . . .       | 2,2       |
| Feuerländer . . . . .    | 2,4       |
| Batak . . . . .          | 2,5       |
| Papua . . . . .          | 2,5       |
| Ägypter . . . . .        | 2,5       |
| Neger . . . . .          | 2,5       |
| Botokude . . . . .       | 2,5       |
| Australier . . . . .     | 3,0       |
| Usa . . . . .            | 3,1       |
| Chinesen . . . . .       | 3,4       |
| Timoreesen . . . . .     | 3,6       |
| Malaien . . . . .        | 4,2       |
| Differenzsumme           | 42,0      |

Die Differenzen schwanken zwischen 1,0 (Guanche), bzw. 1,3 (Schweizer) und 4,2 (Malaien). Wir sehen, daß die durchschnittliche Differenz der vorderen und hinteren Gaumenhöhe  $42,0 : 17 = 2,5$  mm beträgt, und daß diese Differenz sowohl nach dem Minimum (1,0) als nach dem Maximum (4,2) zu eine fast vollständig übereinstimmende Ab- bzw. Zunahme erfährt:

Abnahme nach dem Minimum . . . = 1,5  
Zunahme nach dem Maximum . . . = 1,7.

Auch bemerken wir, daß 4 Gruppen unter 2,0, ebenso 4 Gruppen über 3,0 stehen, daß also eine Symmetrie in der Abstufung der Höhendifferenzen herrscht.

Es gibt uns also Tabelle VII darüber Aufschluß, welche Gruppen ein mehr der Horizontalen angenähertes, welche ein mehr schräges Gaumendach besitzen: da sehen wir denn, daß

die Schweizer den Typus für erstere Kategorie darbieten, Usa, Chinesen, Timoresen und Malaien hingegen den am schrägsten verlaufenden Gaumen haben. Der Mittelcharakter wird repräsentiert von Batak, Papua, Ägypter, Neger, Botokude; bemerkenswert erscheint die weite Distanz zwischen Maori (2,0) und Australier (3,0) und die Mittelstellung der Papua zwischen beiden (2,5). Doch ist auch hier wieder daran zu erinnern, daß uns gerade für die genannten Gruppen nur wenige Objekte zur Verfügung standen.

Es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, die Turnerschen Maße zu prüfen und zu untersuchen, ob und inwieweit hier von Beziehungen zu den inneren Maßen die Rede sein kann. So zeigt uns Tabelle VIII die „Palatomaxillare Länge“, Tabelle IX die „Palatomaxillare Breite“.

Tabelle VIII

## Palatomaxillare Länge.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Guaiche . . . . .        | 48,5   | —       | —       | —           |
| Schweizer . . . . .      | 49,2   | 59,0    | 44,0    | 48—55       |
| Maori . . . . .          | 50,5   | 53,0    | 49,0    | —           |
| Prähistorische . . . . . | 51,2   | 52,5    | 50,0    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 51,5   | 59,0    | 44,0    | 49—55       |
| Usa . . . . .            | 52,0   | 58,5    | 46,0    | 48—55       |
| Batak . . . . .          | 53,2   | 58,0    | 46,0    | 50—56       |
| Ägypter . . . . .        | 53,3   | 57,0    | 48,5    | 51—56       |
| Australier . . . . .     | 54,0   | —       | —       | —           |
| Grönländer . . . . .     | 54,0   | —       | —       | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 54,4   | 57,0    | 52,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 54,8   | 62,0    | 48,0    | —           |
| Drawida . . . . .        | 55,0   | —       | —       | —           |
| Botokude . . . . .       | 55,5   | 60,5    | 52,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 55,9   | 60,0    | 50,0    | —           |
| Timoresen . . . . .      | 57,2   | 60,5    | 57,0    | —           |
| Neger . . . . .          | 57,2   | 59,5    | 54,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 57,5   | 65,0    | 53,0    | —           |

Ein Vergleich zwischen Tabelle I und VIII zeigt uns nun in der dem minimalen Mittel zugewandten Hälfte, der übrigens die größten Gruppen angehören (Schweizer, Usa, Birmanen, Batak, Ägypter), vollständige Übereinstimmung; dem gegenüber treten die Schwankungen der dem maximalen Mittel zugewandten Hälften zurück (kleine Gruppen!), so daß wir sagen dürfen: Zwischen der Spinabasislänge und der Palatomaxillarlänge besteht im wesentlichen eine genaue Parallelität.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 11.

Tabelle IX.  
Palatomaxillare Breite.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Birmanen . . . . .       | 58,5   | 71,0    | 57,0    | 62—66       |
| Schweizer . . . . .      | 60,0   | 89,0    | 52,0    | 52—63       |
| Drawida . . . . .        | 60,5   | —       | —       | —           |
| Australier . . . . .     | 61,0   | —       | —       | —           |
| Grönländer . . . . .     | 61,0   | —       | —       | —           |
| Ägypter . . . . .        | 61,1   | 65,0    | 53,0    | 61—65       |
| Prähistorische . . . . . | 62,0   | 65,0    | 58,0    | —           |
| Usa . . . . .            | 62,2   | 70,0    | 56,0    | 58—67       |
| Maori . . . . .          | 62,7   | 68,0    | 60,0    | —           |
| Guaiche . . . . .        | 63,5   | —       | —       | —           |
| Neger . . . . .          | 63,7   | 69,0    | 59,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 64,2   | 69,0    | 60,0    | —           |
| Batak . . . . .          | 64,4   | 70,0    | 59,5    | 61—66       |
| Malaien . . . . .        | 64,7   | 71,0    | 60,5    | —           |
| Timoresen . . . . .      | 65,4   | 68,0    | 65,0    | —           |
| Papua . . . . .          | 66,2   | 72,0    | 57,5    | —           |
| Botokude . . . . .       | 66,5   | 70,0    | 65,0    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 66,5   | 70,0    | 62,0    | —           |
| Alfare . . . . .         | 69,0   | —       | —       | —           |

Tabelle III und IX ergeben eine nicht so vollständige Übereinstimmung, doch eine Parallele ist auch hier zu erkennen. Stärkere Abweichungen zeigen in Tabelle IX auch dem maximalen Mittel Birmanen, Maori, Guaiche; nach dem minimalen zu Chinesen und Malaien und Usa-Schädel. Die Parallelität zwischen Gaumenmittellbreite und Palatomaxillarlänge ist also nicht so scharf ausgeprägt wie bei den Längenmaßen.

Diese letztere Tatsache findet eine Ergänzung in der von Bianchini (l. c. p. 100) hervorgehobenen Beobachtung, „che il vocabolo adottato nella classificazione d'un palato, non risponde nella maggioranza de' casi alla forma del palato-mascellare, in quanto che, se il primo ha sempre un andamento rettilineo regolare e costante, il secondo è spessissimo irregolare ed inconstante“.

Mit diesen Tabellen verlassen wir die absolute Maße, um zu einer Berechnung und Vergleichung der daraus gewonnenen Indices überzugehen. Unsere Reihenfolge wird auch hier die sein, daß wir zuerst den „Gaumenindex“ (= Längenbreitenindex) betrachten, dann zu dem von uns zum ersten Male berechneten „Gaumenhöhenindex“ übergehen, den Obergesichtsindex zum Vergleich heranziehen, eben-

tuelle Beziehungen derselben zu den Gannnenverhältnissen feststellen und endlich mit einem Überblick über den Palatomaxillar-Index diesen Abschnitt beschließen.

Tabelle X zeigt uns den Gannnenindex, bezogen auf die Spinabasislänge, Tabelle XI denselben, bezogen auf die Spinaendlänge.

Tabelle X.  
Gaumenmittelbreite  $\times$  100  
Spinabasislänge

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Grönländer . . . . .     | 77,1   | —       | —       | —           |
| Drawida . . . . .        | 77,5   | —       | —       | —           |
| Timoresen . . . . .      | 82,3   | 89,8    | 76,9    | —           |
| Neger . . . . .          | 85,4   | 93,7    | 80,0    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 87,2   | 94,3    | 77,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 87,5   | 97,8    | 74,0    | —           |
| Australier . . . . .     | 88,0   | —       | —       | —           |
| Papua . . . . .          | 88,2   | 102,3   | 75,5    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 88,4   | 91,8    | 82,2    | —           |
| Ägypter . . . . .        | 88,5   | 102,1   | 76,5    | 80—93       |
| Usa . . . . .            | 89,6   | 105,1   | 77,8    | 84—97       |
| Schweizer . . . . .      | 91,0   | 107,5   | 76,7    | 89—97       |
| Battak . . . . .         | 91,0   | 100,0   | 79,7    | 84,0—85,1   |
| Birmanen . . . . .       | 92,4   | 117,5   | 77,6    | 80—97       |
| Botokuden . . . . .      | 92,7   | 97,8    | 84,9    | —           |
| Prähistorische . . . . . | 93,6   | 104,9   | 88,4    | —           |
| Maori . . . . .          | 94,0   | 102,4   | 86,7    | —           |
| Guanche . . . . .        | 110,5  | —       | —       | —           |

Tabelle XI.  
Gaumenmittelbreite  $\times$  100  
Spinaendlänge

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Grönländer . . . . .     | 71,1   | —       | —       | —           |
| Drawida . . . . .        | 72,1   | —       | —       | —           |
| Australier . . . . .     | 77,2   | —       | —       | —           |
| Timoresen . . . . .      | 77,6   | 84,6    | 72,4    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 78,0   | 84,9    | 69,0    | —           |
| Malaien . . . . .        | 79,2   | 92,2    | 67,3    | —           |
| Neger . . . . .          | 79,8   | 83,3    | 75,9    | —           |
| Papua . . . . .          | 80,6   | 93,7    | 64,8    | —           |
| Ägypter . . . . .        | 80,7   | 91,7    | 70,9    | —           |
| Usa . . . . .            | 81,9   | 95,4    | 72,0    | 77—86       |
| Feuerländer . . . . .    | 82,0   | 86,5    | 75,5    | —           |
| Botokuden . . . . .      | 82,1   | 88,0    | 76,3    | —           |
| Battak . . . . .         | 82,5   | 92,7    | 72,5    | 76—86       |
| Prähistorische . . . . . | 84,3   | 97,7    | 74,5    | —           |
| Schweizer . . . . .      | 84,3   | 107,3   | 68,4    | 80—91       |
| Birmanen . . . . .       | 85,1   | 109,3   | 70,6    | 70—97       |
| Maori . . . . .          | 85,6   | 89,6    | 78,0    | —           |
| Guanche . . . . .        | 95,4   | —       | —       | —           |

Zwischen beiden Tabellen besteht große Übereinstimmung — abgesehen davon, daß Neger und Australier ihren Platz gleichsam ausgetauscht haben, ist nur die Verschiebung der Schweizer in Tabelle XI zum minimalen Mittel hin bemerkenswert. Eine wesentliche Indikation, aus Gründen der Messungsergebnisse das Basismaß dem Endmaß vorzuziehen, besteht also unseres Erachtens nicht; wir gründen diese nachdrückliche Forderung lediglich auf morphologische Gesichtspunkte und heben das hier nochmals hervor.

Der für uns interessanteste, weil hier zum ersten Male behandelte Index „Gaumenhöhenindex“ wird uns etwas länger beschäftigen. Es wird nämlich auch erforderlich sein, den „Obergesichtsindex“ hier heranzuziehen, und wir wollen diese beiden Indices zunächst in Tabelle XII und XIII gesondert betrachten.

Tabelle XII.  
Höhe zwischen 1. und 2. Molaren  $\times$  100  
Gaumenmittelbreite

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Alfaro . . . . .         | 20,9   | —       | —       | —           |
| Maori . . . . .          | 26,1   | 38,5    | 20,9    | —           |
| Grönländer . . . . .     | 29,7   | —       | —       | —           |
| Battak . . . . .         | 30,9   | 39,5    | 22,5    | 29—36       |
| Feuerländer . . . . .    | 31,1   | 43,2    | 24,4    | —           |
| Schweizer . . . . .      | 31,3   | 51,5    | 13,2    | 22—40       |
| Timoresen . . . . .      | 31,5   | 42,9    | 23,7    | —           |
| Australier . . . . .     | 31,8   | —       | —       | —           |
| Prähistorische . . . . . | 32,3   | 36,8    | 28,9    | —           |
| Papua . . . . .          | 32,6   | 40,0    | 22,0    | —           |
| Drawida . . . . .        | 33,2   | —       | —       | —           |
| Usa . . . . .            | 33,7   | 47,4    | 25,6    | 29—33       |
| Neger . . . . .          | 33,8   | 42,9    | 26,2    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 33,9   | 46,5    | 23,1    | 27—39       |
| Chinesen . . . . .       | 35,0   | 41,7    | 23,3    | —           |
| Ägypter . . . . .        | 35,0   | 47,2    | 20,5    | 20—35       |
| Guanche . . . . .        | 35,7   | —       | —       | —           |
| Botokuden . . . . .      | 36,3   | 45,2    | 28,9    | —           |
| Malaien . . . . .        | 36,7   | 55,3    | 29,8    | —           |

Wir sehen eine Variationsbreite der Mittel von 20,9 zu 36,7 und finden in der Zone des größten Mittels außer Malaien, Botokuden, Guanche auch die Ägypter. Die Usa-Schädel zeigen dieselbe Einordnung wie in Tabelle XI, hingegen stehen die Schweizer hier dem minimalen Mittel viel näher, ebenso Battak und Feuerländer (im Vergleich zu Tabelle XI); das Umgekehrte gilt von den Chinesen.

Tabelle XIII zeigt uns nun den Obergesichtsindex (nach Kollmann).

Tabelle XIII.  
Obergesichtshöhe  $\times$  100  
Jochbogenbreite

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Alfure . . . . .         | 48,1   | —       | —       | —           |
| Guaneho . . . . .        | 48,5   | —       | —       | —           |
| Maori . . . . .          | 49,2   | 51,6    | 46,5    | —           |
| Botokude . . . . .       | 49,9   | 54,7    | 44,4    | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 50,6   | 53,7    | 48,1    | —           |
| Australier . . . . .     | 51,7   | 51,8    | 50,7    | —           |
| Usa . . . . .            | 51,7   | 57,4    | 46,0    | 48—52       |
| Timoresen . . . . .      | 52,0   | 56,9    | 47,5    | —           |
| Schweizer . . . . .      | 52,1   | 62,6    | 46,5    | 49—55       |
| Batak . . . . .          | 52,3   | 56,8    | 46,3    | 52—53       |
| Papua . . . . .          | 52,5   | 59,5    | 46,3    | —           |
| Birmanen . . . . .       | 52,6   | 58,7    | 48,1    | 49—53       |
| Malaien . . . . .        | 52,8   | 60,6    | 46,7    | —           |
| Drawida . . . . .        | 52,8   | —       | —       | —           |
| Prähistorische . . . . . | 53,1   | —       | —       | —           |
| Neger . . . . .          | 53,1   | 57,6    | 49,6    | —           |
| Chinesen . . . . .       | 53,7   | 57,5    | 47,4    | —           |
| Ägypter . . . . .        | 54,2   | 59,7    | 49,2    | 52—55       |
| Grönländer . . . . .     | 56,5   | —       | —       | —           |

Wir werden nun zunächst eine Zusammenstellung des Gaumenindex (nach Tabelle X) mit dem Obergesichtsindex studieren.

Tabelle XIIIa.

| Rasse                    | Obergesichtsindex (Mittel) | Gaumenindex (Mittel) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| Alfure . . . . .         | 48,1                       | —                    |
| Guaneho . . . . .        | 48,5                       | 110,5                |
| Maori . . . . .          | 49,2                       | 94,0                 |
| Botokude . . . . .       | 49,9                       | 92,7                 |
| Feuerländer . . . . .    | 50,6                       | 88,4                 |
| Australier . . . . .     | 51,7                       | 88,0                 |
| Usa . . . . .            | 51,7                       | 89,6                 |
| Timoresen . . . . .      | 52,0                       | 82,3                 |
| Schweizer . . . . .      | 52,1                       | 91,0                 |
| Batak . . . . .          | 52,3                       | 91,0                 |
| Papua . . . . .          | 52,5                       | 88,2                 |
| Birmanen . . . . .       | 52,6                       | 92,4                 |
| Malaien . . . . .        | 52,8                       | 87,5                 |
| Drawida . . . . .        | 52,8                       | 77,5                 |
| Prähistorische . . . . . | 53,1                       | 93,6                 |
| Neger . . . . .          | 53,1                       | 85,4                 |
| Chinesen . . . . .       | 53,7                       | 87,2                 |
| Ägypter . . . . .        | 54,2                       | 88,5                 |
| Grönländer . . . . .     | 56,5                       | 77,1                 |

Rufen wir uns die bezüglichlichen Einteilungen ins Gedächtnis —

a) für den Obergesichtsindex:

unter 49,9 . . . . . chamäprosp,  
50,0 und darüber . . . . . leptoprosp),

b) für den Gaumenindex (Virchow):

unter 79,9 . . . . . leptostaphylin,  
80,0—84,9 . . . . . mesostaphylin,

85,0 und darüber . . . . . brachystaphylin —

so sehen wir, daß sich Leptoprospie zweimal mit Leptostaphylinie (Drawida und Grönländer), einmal mit Mesostaphylinie (Timoresen), dagegen zwölfmal mit Brachystaphylinie verbindet, und ferner, daß auch in den Zahlen der Gaumenindices keine stetige Progression in der Abnahme nachzuweisen ist. Chamäprospie kommt überhaupt nur viermal vor und kombiniert sich dreimal mit Brachystaphylinie. Kombination von Chamäprospie und Meso- oder Leptostaphylinie kommt nicht vor. Aus Tabelle XIV ersieht man eine Bestätigung dieser Befunde und verweisen hier darauf.

Tabelle XIIIb gibt uns eine analoge Zusammenstellung der Mittel des Obergesichtsindex mit denen des Gaumenhöhenindex.

Tabelle XIIIb.

| Rasse                    | Obergesichtsindex (Mittel) | Gaumenhöhenindex (Mittel) |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Alfure . . . . .         | 48,1                       | 20,9                      |
| Guaneho . . . . .        | 48,5                       | 35,7                      |
| Maori . . . . .          | 49,2                       | 26,1                      |
| Botokude . . . . .       | 49,9                       | 36,3                      |
| Feuerländer . . . . .    | 50,6                       | 31,1                      |
| Australier . . . . .     | 51,7                       | 31,8                      |
| Usa . . . . .            | 51,7                       | 33,7                      |
| Timoresen . . . . .      | 52,0                       | 31,5                      |
| Schweizer . . . . .      | 52,1                       | 31,3                      |
| Batak . . . . .          | 52,3                       | 30,9                      |
| Papua . . . . .          | 52,5                       | 32,6                      |
| Birmanen . . . . .       | 52,6                       | 33,9                      |
| Malaien . . . . .        | 52,8                       | 36,7                      |
| Drawida . . . . .        | 52,8                       | 33,2                      |
| Prähistorische . . . . . | 53,1                       | 32,3                      |
| Neger . . . . .          | 53,1                       | 33,8                      |
| Chinesen . . . . .       | 53,7                       | 35,0                      |
| Ägypter . . . . .        | 54,2                       | 35,0                      |
| Grönländer . . . . .     | 56,5                       | 29,7                      |

\*) Leider ist bis jetzt eine mesoprospie Gruppe beim Obergesichtsindex nicht eingeführt, so daß wir uns genötigt sehen, hier die ursprüngliche Einteilung in zwei Gruppen anzuwenden.







Wir wollen hier gleich bemerken, daß wir, gestützt auf die unten zu besprechende Tabelle XV, eine Einteilung des von uns eingeführten „Gaumenhöhenindex“ aufgestellt haben, deren Abgrenzung einerseits durch numerische Gesichtspunkte, andererseits durch Vergleichung der hauptsächlichsten Gaumenformen der Sammlung bestimmt wurde. Es ergab sich daraus:

|                             |
|-----------------------------|
| 13,0—27,9 Chamästaphylinie, |
| 28,0—39,9 Orthostaphylinie, |
| 40,0—55,0 Hypsistaphylinie. |

Dies vorausgeschickt, kehren wir zu Tabelle XIIIb zurück, die aussagt: Leptoprosopie verbindet sich fünfzehnmal mit Orthostaphylinie. Hypsistaphylinie kommt in den Mittelwerten nicht vor. Chamäprosopie kommt viermal vor und verbindet sich zweimal mit Chamästaphylinie (Alfare und Maori), zweimal mit Orthostaphylinie. Eine zunehmende Progression in den Zahlen des Gaumenhöhenindex ist nicht nachzuweisen. Eine Kombination von Leptoprosopie und Chamästaphylinie kommt nicht vor.

Gaben uns Tabelle XIIIa und XIIIb einen Überblick über die Mittelzahlen, so ist es der Zweck von Tabelle XIV und XV, uns dieselben Vergleiche an den Indices des gesamten Gaumenmaterials vorzuführen. Nach dem vorher bereits über die Einteilung der Indices Gesagten bedarf es hier keiner Erklärung der Tabellen: die vertikale Kolonne gibt den Obergesichtsindex, die horizontale den Gaumenindex (XIV), bzw. Gaumenhöhenindex (XV) an; die Zahlen innerhalb der Quadrate geben an, wie oft sich jeder Index der vertikalen mit jedem Index der horizontalen Reihe verbindet. Die Gesamtsumme der Zahlen in Tabelle XIV beträgt 145, in Tabelle XV 150. (Es fehlen demnach vom Gesamtmaterial in Tabelle XIV 63, in Tabelle XV 64 Schädel.)

Es verbindet sich nun in Tabelle XIV:

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Leptoprosopie: | 14 mal mit Leptostaphylinie, |
|                | 20 „ „ Mesostaphylinie,      |
|                | 82 „ „ Brachystaphylinie,    |
| Chamäprosopie  | 1 mal mit Leptostaphylinie,  |
|                | 6 „ „ Mesostaphylinie,       |
|                | 22 „ „ Brachystaphylinie.    |

Es sind demnach:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| von 15 Leptostaphyl.: | 14 leptoprosop., 1 chamäprosop., |
| von 26 Mesostaphyl.:  | 20 leptoprosop., 6 chamäprosop., |
| von 104 Brachystaph.: | 82 leptoprosop., 22 chamäprosop. |

Es verbindet sich in Tabelle XV:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Leptoprosopie | 27 mal mit Chamästaphylinie, |
|               | 74 „ „ Orthostaphylinie,     |
|               | 19 „ „ Hypsistaphylinie,     |
| Chamäprosopie | 11 mal mit Chamästaphyl.,    |
|               | 17 „ „ Orthostaphylinie,     |
|               | 2 „ „ Hypsistaphylinie.      |

Es sind demnach:

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| von 38 Chamästaphyl. | 27 leptoprosop., 11 chamäprosop., |
| von 91 Orthostaphyl. | 74 leptoprosop., 17 chamäprosop., |
| von 21 Hypsistaphyl. | 19 leptoprosop., 2 chamäprosop.   |

In Tabelle XIV verbinden sich von 116 Leptoprosopen 14 mit Leptostaphylinie, von 104 Brachystaphylinen 22 mit Chamäprosopie.

In Tabelle XV verbinden sich von 120 Leptoprosopen 19 mit Hypsistaphylinie, von 38 Chamästaphylinen 11 mit Chamäprosopie. Dagegen verbinden sich von 91 Orthostaphylinen 74 mit Leptoprosopie, oder von 120 Leptoprosopen 74 mit Orthostaphylinie.

In Tabelle XIV liegt die größte Konvergenz zwischen 50 bis 53 des Obergesichtsindex und 88 bis 97 des Gaumenindex, also in einer Kombination von Leptoprosopie und Brachystaphylinie.

In Tabelle XV liegt die größte Konvergenz zwischen 50 bis 55 des Obergesichtsindex und 24 bis 35 des Gaumenhöhenindex, also in einer Kombination von Leptoprosopie mit Chamä- und Orthostaphylinie.

Es läßt sich also weder auf Grund der Tabelle XIV eine Beziehung zwischen Obergesichtsindex und Gaumenindex, noch auf Grund der Tabelle XV eine solche zwischen Obergesichtsindex und Gaumenhöhenindex nachweisen. Demgemäß ist die These Blochs (l. c. S. 39): „Schnallgesichter haben durchschnittlich einen höheren Gaumenindex als

„Breitgesichter“ nicht zu bestätigen. Es erhebt sich allerdings die Frage, ob nicht angesichts der großen Ungleichheit in der Verteilung die Gruppenbezeichnungen des Virchow'schen Gaumenindex einer Revision zu unterziehen sind, da wir sehen, daß der Leptostaphylinie mit 7, der Mesostaphylinie mit 5 die Brachystaphylinie mit 32 Einheiten gegenübersteht, und ferner müßte auch in Zukunft eine neue Gruppierung des Obergesichtesindex in drei Formen zugrunde gelegt werden.

Zum Abschlusse des tabellarischen Teils möge die Tabelle XVI mit dem Turner'schen Index hier Platz finden, weil dieselbe einen interessanten Vergleich mit Tabelle X bzw. XI zuläßt. In Tabelle X und XVI ist eine ausgesprochene Ähnlichkeit der Gruppierung — fast alle Gruppen zeigen geringe Verschiebungen gegeneinander, aber eine größere nur Botokuden, Maori, Australier.

Dasselbe gilt für Tabelle XI und XVI, die eine noch größere Übereinstimmung zeigen, namentlich in der maximalen Zone (Batak, Prähistorische, Schweizer, Birmanen, Guanche). Wir können also den Schluß ziehen, daß Gaumenindex und Palatamaxillarindex sich vollständig entsprechen, da die wenigen und klei-

nen Gruppen, die dem zu widersprechen scheinen, hier gar nicht in Betracht kommen.

Was lassen sich nun rechnerisch für Schlüsse ziehen für die Gaumenformen einzelner Gruppen? — Die Schweizer haben einen kurzen (42,6), verhältnismäßig schmalen (37,5) und flachen Gaumen (10,4 bis 11,7). Der Vergleich von Mittelbreite und Endbreite ist beträchtlich (37,5 bis 40,4). Diese Differenz aber ist ebenso wenig wie die zwischen II. Molarebreite und I. Prämolarenbreite zu einer rechnerischen Begründung der Tabelle XVII verwertbar. — Die Usa-Schädel stehen den Schweizern nahe, doch haben sie eine größere Mittelbreite (39,6). Ihre Gaumenhöhe nimmt aber hienun beträchtlich zu (10,4 bis 13,5). Differenz zwischen Mittel- und Endbreite ist weniger stark (39,6 bis 40,9). — Birmanen und Batak zeigen große Übereinstimmung. Sie haben etwas längere (44,4 und 44,6), breitere (40,7 und 40,8) und ebenso hohe Gaumen wie die beiden europäischen Hauptgruppen; Differenz zwischen Mittel- und Endbreite ist wie die bei den Usa-Schädeln (40,7 bis 43,2 und 40,8 bis 43,4). Die Ägypter schließen sich den Birmanen am engsten an, nur ist die Differenz zwischen Mittel- und Endbreite weniger ausgesprochen (40,3 bis 41,1). Wesentlich länger bei derselben Breite ist der Gaumen der „Malaien“-Gruppe, deren gemischter Charakter aber schon ihren Wert herabmindert (vgl. Einleitung). Die Länge beträgt hier 47,1; auch zeigt die hintere Höhe eine bedeutende Zunahme (bis 14,9!).

Von den kleineren Gruppen interessieren uns die Maori, deren Breite 41,7 im Verhältnis zur Länge (43,0) eine sehr bedeutende, und deren Gaumen sehr niedrig (8,2 bis 10,2) ist, verglichen z. B. mit den Malaien. Bei den Chinesen dagegen fällt uns gerade die Länge (48,6) des Gaumens auf und die bedeutende Höhenentwicklung (10,6 bis 14,0). Die Timorenen erreichen die enorme Gaumenlänge von 50,2 und eine fast ebenso bedeutende Höhenentwicklung wie bei den Chinesen (9,4 bis 13,0). Die „Botokuden“-Gruppe zeigt ebenfalls große Länge (48,0) gegenüber einer Breite von 43,0 und die Höhe von 13,0 bis 15,5. Bei allen diesen mittelgroßen Gruppen variieren Mittel- und Endbreite durchschnittlich um 2 mm; die

Tabelle XVI.

Palatamaxillare Breite  $\times 100$   
Palatamaxillare Länge.

| Rasse                    | Mittel | Maximum | Minimum | Oscillation |
|--------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Drawida . . . . .        | 109,9  | —       | —       | —           |
| Neger . . . . .          | 111,9  | 116,9   | 105,4   | —           |
| Grönländer . . . . .     | 113,0  | —       | —       | —           |
| Chinesen . . . . .       | 113,5  | 125,0   | 103,4   | —           |
| Timorenen . . . . .      | 114,4  | 117,5   | 112,1   | —           |
| Ägypter . . . . .        | 114,6  | 125,5   | 103,7   | 112—119     |
| Japan . . . . .          | 115,5  | 134,0   | 100,0   | —           |
| Malaien . . . . .        | 118,0  | 130,9   | 103,4   | —           |
| Usa . . . . .            | 120,1  | 130,1   | 103,6   | 113—128     |
| Botokuden . . . . .      | 120,5  | 125,0   | 116,7   | —           |
| Maori . . . . .          | 120,7  | 130,0   | 113,2   | —           |
| Feuerländer . . . . .    | 121,0  | 130,2   | 112,7   | —           |
| Batak . . . . .          | 121,1  | 133,3   | 105,2   | 117—127     |
| Prähistorische . . . . . | 121,2  | 127,4   | 111,5   | —           |
| Schweizer . . . . .      | 121,7  | 146,0   | 107,9   | 112—126     |
| Australier . . . . .     | 124,5  | —       | —       | —           |
| Birmanen . . . . .       | 125,2  | 154,5   | 109,6   | 116—139     |
| Guanche . . . . .        | 131,2  | —       | —       | —           |

größte Höhe unter ihnen zeigen Chinesen (14,0), Malaien (14,9) und Botokuden (15,5). Auffallend sind die kleinen Werte bei Schweizern und Usa; übertrifft doch die Mittelbreite der Botokuden die Spinabasislänge der Schweizer (43,0 bis 42,6). Nur diese beiden europäischen Hauptgruppen haben (von den großen und mittelgroßen Gruppen) eine mittlere Breite unter 40; hinsichtlich der Höhe läßt sich aber etwas Analoges nicht feststellen.

Es möge an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß dieser Arbeit sechs photographische Reproduktionen der hauptsächlichsten Gaumen-typen beigegeben sind, so zwar, daß wir je einen ausgesprochen ellipsoiden, U-förmigen und paraboloiden, sowie anderseits je einen chämä-, ortho- und hypostaphylinen Gaumen abgebildet sehen. Die Höhenunterschiede kommen allerdings in der Photographie nicht so gut zum Ausdruck, wie an den Objekten selbst.

Wir kommen nun dazu, den morphologischen Ergebnissen Rechnung zu tragen, und wollen hier wenige einleitende Bemerkungen vorausschieken. Wir sehen für die Morphologie des harten Gaumens die Stiedasche Arbeit (1891) als grundlegend an und bedienen uns im wesentlichen der von ihm festgestellten Nomenklatur. Neue Bezeichnungen wurden möglichst unterdrückt, um die Übersichtlichkeit nicht zu erschweren. Wir haben der Arbeit eine Tafel mit zwei Zeichnungen beigelegt und verweisen hier auf dieselbe, brauchen also nicht ausführlicher auf die Nomenklatur einzugehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchten wir auch z. B. kein allzu großes Gewicht auf die zahlreichen Variationen der Nebenfurchenbildung legen, trotzdem wir hier ein reiches Material gesammelt haben. Es ist ja überhaupt die Phase der Anatomie, wo jeder Knochenvorsprung, jedes Grübchen einen besonderen Namen erhielt, vorüber und hat schon lange der Anschauung Platz gemacht, daß das Typische, Charakteristische den Kern einer lebendigen morphologischen Forschung bilde. „Ontis formae e functione“ könnte man das vielleicht auch ausdrücken.

Wir haben nun bereits erwähnt, daß es uns nicht möglich erscheine, in jedem einzelnen

Falle die drei Hauptkategorien der Gaumenform streng aufeinanderzuhalten. Um diesen Satz zu beweisen, haben wir in nachstehendem eine Tabelle entworfen, welche die Verteilung der Formen für die einzelnen Varietäten zeigen soll und die von Broca, Topinard, Bianchini u. a. aufgestellten Grundformen durch Übergangsformen (nicht Unterabteilungen!) ergänzt. Eine Rubrik „Unbestimmt“, die wir noch hinzugefügt haben, enthält im wesentlichen solche Gaumenformen, die zwischen „paraboloid“ und „ellipsoid“ schwanken, oder etwa abweichende Formen aufweisen („spitz-ellipsoid“, „ovoid“ usw.).

Tabelle XVII.

## Gaumenformen der einzelnen Varietäten.

| Rasse                | Ellipsoid | Ellipsoid-U-förmig | U-förmig | U-förmig-paraboloid | Paraboloid | Unbestimmt |
|----------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|------------|------------|
| Prähistorische . . . |           |                    | 2        |                     | 3          |            |
| Usa . . . . .        | 4         | 7                  | 5        | 5                   | 12         | 2          |
| Grönländer . . . .   |           |                    |          | 1                   |            |            |
| Schweizer . . . . .  | 7         | 1                  | 9        | 6                   | 28         | 11         |
| Birmanen . . . . .   |           | 2                  | 7        | 4                   | 8          | 2          |
| Batak . . . . .      | 1         | 3                  | 1        | 2                   | 11         | 1          |
| Timoresen . . . . .  | 3         | 2                  |          |                     |            |            |
| Malaien . . . . .    | 1         |                    | 3        |                     | 6          |            |
| Chinesen . . . . .   |           |                    | 2        | 1                   | 2          |            |
| Alfare . . . . .     |           |                    |          |                     | 1          |            |
| Dravida . . . . .    | 1         |                    |          |                     | 1          |            |
| Ägypter . . . . .    | 4         |                    |          | 1                   | 10         | 3          |
| Neger . . . . .      | 2         |                    | 1        | 1                   |            |            |
| Guanche . . . . .    |           |                    |          | 1                   |            |            |
| Botokudo . . . . .   | 1         | 1                  |          |                     | 4          | 1          |
| Feuerkugel . . . .   |           |                    |          |                     | 2          | 1          |
| Australier . . . . . |           |                    | 1        |                     | 1          |            |
| Maori . . . . .      |           |                    | 2        | 1                   | 3          |            |
| Papan . . . . .      |           | 1                  | 1        |                     | 3          |            |
|                      | 24        | 17                 | 34       | 23                  | 95         | 21         |

Die Tabelle zeigt uns, daß in der Spezies Homo im allgemeinen die paraboloiden Form am stärksten vertreten ist. Von größeren Gruppen machen eine Ausnahme: Usa und Birmanen; von kleineren: Timoresen, Neger und Chinesen. Sehr reichlich sind die Übergangsformen vertreten, und bei den Schweizern ist die Rubrik „Unbestimmt“ mit 11 Schädeln vertreten. Es sind von 214 Schädeln:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ellipsoid . . . . .           | 11,2 Proz. |
| ellipsoid-U-förmig . . . . .  | 7,9 "      |
| U-förmig . . . . .            | 15,9 "     |
| U-förmig-paraboloïd . . . . . | 10,7 "     |
| Paraboloïd . . . . .          | 44,4 "     |
| unbestimmt . . . . .          | 9,8 "      |

Topinard (1885, p. 955) zitiert Broca, wo er von der ellipsoiden und paraboloïden Form des Gaumens spricht: „l'une ... particulièrement dans les races inférieures, l'elliptique; l'autre habituelle, particulièrement dans les races supérieures, la parabolique.“ Auch spricht er (L. c., p. 957) von der ellipsoiden Form als einer „c'est-à-dire à une forme palatine inférieure“. Aber er bemerkt, daß man nicht die ellipsoïde Form als charakteristisch für bestimmte Gruppen bezeichnen dürfe: „Nous tirons la conclusion, que la courbure des arcades alvéolaires chez l'homme, bien qu'offrant des dispositions similes çà et là chez quelques individus, n'est pas un caractère sériaire, contrairement aux prévisions, mais un caractère indifférent.“ In dieser Ansicht werden wir durch die Ergebnisse unserer Tabelle XVII bestärkt. Wenn wir übrigens Topinard richtig verstehen, unterscheidet er eine 1. „courbe alvéolaire externe“, 2. eine „courbe dentaire“ und 3. eine „courbe alvéolaire interne“; von dieser letzteren behauptet er, daß sie „toujours, à trois exceptions près, dans son ensemble parabolique“ sei. Die erste, die er (p. 956) auch als „courbe de l'arcade alvéolaire“ bezeichnet, ist weit entfernt davon, de refléter la courbe de l'arcade dentaire et d'être parabolique comme elle“, sondern hat stets „ses deux branches inférieures en dedans et est toujours, en un mot, elliptique“.

Wir wenden uns nun zur Feststellung der Zahl derjenigen Fälle, in welchen eine vollständige (d. h. an einer Stelle vollständige) Überdachung der medialen oder lateralen Gefäßfurche festgestellt wurde. Gerade hier haben Stieda, Mies (1893) u. a. interessante Resultate gefunden. Wir können allerdings nicht Anspruch darauf erheben, den wirklichen Befund, wie er sich bei den Schädeln zu Lebzeiten ausgenommen haben mag, sicher anzugeben, denn eine große Zahl von Fällen trägt

in meinen Schädel Tabellen den Zusatz: „starke Tendenz zur Überbrückung“ oder „Überbrückung an einer Stelle fast vollständig“. Betrachtet man solche Fälle mit dem Vergrößerungsglase, so hat man oft den Eindruck, daß es sich um postmortale Veränderungen handelt, derart, daß die überaus zarten Knochenbälkchen bei der Macoration gesprengt wurden.

Gleichwohl haben wir uns durch solche Eindrücke nicht für berechtigt gehalten, diese Fälle in der Tabelle mit aufzuzählen; vielmehr mußten wir uns strikt an diejenigen Fälle halten, wo eben wirklich noch die Knochenzapfen erhalten waren. — Wir gewinnen nun folgende Zusammenstellung: Bei Europäern fanden sich 4 Fälle (Schweizer), bei Asiaten 10 (3 Birmanen, 2 Batak, 1 Timorese, 2 Malaien, 2 Chinesen), bei Afrikanern 2 (Neger, Kaffer), bei Australiern 1. — Was die Verteilung der verschiedenen Furche anlangt, so ergibt sich folgendes:

| Mediale Furche |       | Laterale Furche |       | Mediale Nebenfurche |       | Laterale Nebenfurche |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Rechts         | Links | Rechts          | Links | Rechts              | Links | Rechts               | Links |
| 4              | 8     | 3               | 2     | 1                   | 0     | 0                    | 2     |

#### Überdachungen kamen also vor:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| bei Europäern in . . . . . | 6,4 Proz. |
| „ Asiaten in . . . . .     | 15,4 "    |
| „ Afrikanern in . . . . .  | 8,7 "     |
| „ Australiern in . . . . . | 7,7 "     |

In einem Falle sahen wir auch eine Überdachung einer Furche durch zwei Spangen (Neger, A. S., Nr. 92). Von den oben aufgezählten 20 Fällen gehörten 12 der linken, 8 der rechten Seite an, so daß die Angabe Adacelis (1900) eines häufigeren Vorkommens derartiger Bildungen auf der linken Seite für diese Varietät begründet erscheint.

Die Zackenbildung der Leisten variierte sehr; auch war keineswegs die laterale Leiste oft in ihrem ganzen Verlaufe erkennbar, sondern meist nur ein Stück weit, und zwar mehr nach hinten zu ausgebildet. Sehr häufig fanden wir an der Sutura transversa einen kleinen

Wulst, den wir vielleicht „Colliculus“ nennen können. Über diesen kleinen Hügel ging oft die Naht hinweg, so daß er dann von jener halbiert erschien. Der Colliculus stellte sich als verdicktes hinteres Ende der medialen Leiste dar, gleichsam mit der lateralen Leiste zusammen ein Gefäßtrichter bildend. Da sich diese Verdickung in der Literatur nicht erwähnt findet, so möchten wir an dieser Stelle besonders auf dieselbe hinweisen; vgl. dazu Fig. 1 und 2. Wir fanden sie sehr häufig; leider haben wir nicht von Anfang an die Fälle gezählt, können also keine prozentualische Feststellung geben. Bildung lateraler Nebenleisten sahen wir selten; stark ausgesprochen war eine solche an dem Feuerländer (Fig. 2). Die Zackenbildung stand meistens im Zusammenhang mit der Uneinheit des Reliefs überhaupt, also entsprechend etwa besonders starken Cristae marginales usf. Was diese Cristae angeht, so haben wir sie fast überall in stärkerer oder schwächerer Ausbildung angetroffen. Seit den Arbeiten von Kupffer und Stieda sind sie ein wichtiger Bestandteil der Gaumenmorphologie geworden und haben an Bedeutung noch durch Stiedas Nachweis gewonnen, daß die Insertion des *M. tensor veli palatini* auf die hintere Fläche dieser Crista übergreift. — Meist waren an unserem Material die Cristae scharfkantig und fielen nach der Mitte zu ab, während sie ihre größte Höhe am lateralen Rande erreichten. In weniger häufigen Fällen waren sie stumpf, und ganz selten waren sie nur schwach angedeutet oder fehlten. Oft zeigten sie eine scharfe Neigung nach vorn, in anderen Fällen standen sie annähernd senkrecht; Ungleichheiten in der Ausbildung und Höhe der Cristae links und rechts konnten wir beobachten (z. B. A. S. Nr. 429).

Wir wollen uns nun etwas eingehender mit der schon anläßlich der Gaumenlänge im ersten Teil öfters genannten Spina nasalis posterior (= Spina palatina verschiedener Autoren) beschäftigen. Diese variiert stark in Länge und Form; bald ist sie spitz, bald abgerundet, ja oft fast rechteckig abgeplattet. Nicht immer läuft sie in der Mittellinie aus, sondern die Spitze kann nach links oder rechts abweichen, sie kann ferner nasalwärts oder oralwärts un-

gebogen sein oder stumpf in das hintere Ende der Crista nasalis übergehen und auf ihrer Rückseite etwa das Bild eines ausgezogenen Vierecks bieten. — Wir sehen also, daß es sich um ein äußerst variables Gebilde handelt; gleichwohl wollen wir zur Besprechung nur denjenigen extremen Fall auswählen, auf den Waldeyer (1892) aufmerksam gemacht hat: die „Spina bipartita“. Anesh hier geben wir unsere Befunde mit dem Vorbehalt, daß wir alle diejenigen Fälle ausschalteten, wo die Zweiteilung nicht deutlich war; angedeutet war sie in noch mehreren Fällen, die hier nicht berücksichtigt sind.

#### Es zeigten Spina bipartita:

|  |   |
|--|---|
| Battak . . . . .                         | 6 |
| Usa . . . . .                            | 3 |
| Schweizer . . . . .                      | 3 |
| Birmanen . . . . .                       | 2 |
| Malsien (hiervon 1 tripartita) . . . . . | 2 |
| Ägypter . . . . .                        | 1 |
| Neger . . . . .                          | 1 |
| Botokude . . . . .                       | 2 |
| Maori . . . . .                          | 1 |

In einem Falle zeigte sich sogar eine doppelte Spaltung in sagittaler und horizontaler Richtung (Schweizer von Steinen Nr. 1). Die Spina tripartita zeigte der eine Samanpaner (A. S. Nr. 38).

Über die Nahtverhältnisse, zu denen wir jetzt übergehen, haben wir wiederum die Arbeit von Stieda (1891) als die grundlegende anzusehen; gehen wir darum von seiner Einteilung aus.

Wir unterscheiden erstens die gerade, zweitens die nach vorn gekrümmte, drittens die nach hinten gekrümmte Naht. Wie Stieda selbst feststellt, kommen zwischen den drei Formen zahlreiche Übergänge vor, von dem extremen Processus Calori his zur schwachen Vorwärtskrümmung einerseits, von der geradlinigen Form bis zur tiefen Einknickung nach hinten anderseits. Was wir anesh hier, analog den Feststellungen bei der Form des Gaumens, hervorgehoben wissen möchten, ist, daß es eine große Zahl von Übergangsformen gibt, die man gar nicht klassifizieren kann, und für welche

wir deshalb, Stiedas Vorgänge folgend, eine vierte Kategorie „Unbestimmt“ eingeführt haben.

Immerhin läßt sich die Einteilung Stiedas durchaus zugrunde legen und ist der Killermannsehen, welche jeden Haupttypus durch Unterformen kompliziert, unseres Erachtens vorzuziehen.

Wir haben nun die Gruppen zusammengestellt, und zwar, da sonst die Zahl eine zu geringe geworden wäre, mehrere Gruppen nach Weltteilen miteinander vereinigt, so daß sieh also, wenn wir die nach vorn vorspringende Naht mit I, die gerade mit II, die nach hinten vorspringende mit III und die „unbestimmte“ mit IV bezeichnen, folgendes ergibt:

Von 103 Europäerschädeln (5 Prähistorische + 35 Usa usw. + 1 Grönländer + 62 Schweizer) hatten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typus I . . . . . | 17,5 Proz. |
| „ II . . . . .    | 53,4 „     |
| „ III . . . . .   | 7,8 „      |
| „ IV . . . . .    | 24,6 „     |

Von 65 Asiatenschädeln (23 Birmanen + 19 Battak + 5 Timoresen + 10 Malaien usw. + 5 Chinesen + 1 Alfure + 2 Drawida usw.) hatten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typus I . . . . . | 20,0 Proz. |
| „ II . . . . .    | 47,7 „     |
| „ III . . . . .   | 7,7 „      |
| „ IV . . . . .    | 24,6 „     |

Von 23 Afrikanerschädeln (18 Ägypter + 4 Neger usw. + 1 Guanebe) hatten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typus I . . . . . | 17,4 Proz. |
| „ II . . . . .    | 39,1 „     |
| „ III . . . . .   | 4,3 „      |
| „ IV . . . . .    | 39,1 „     |

Von 10 Amerikanerschädeln (5 Botokuden usw. + 5 Feuerländer) hatten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typus I . . . . . | 20,0 Proz. |
| „ II . . . . .    | 50,0 „     |
| „ III . . . . .   | 10,0 „     |
| „ IV . . . . .    | 20,0 „     |

Von 13 Australierschädeln (+ Polynesier + Melanesier) (2 Australier, 6 Maori, 5 Papua) hatten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Typus I . . . . . | 30,8 Proz. |
| „ II . . . . .    | 30,8 „     |
| „ III . . . . .   | 7,7 „      |
| „ IV . . . . .    | 30,8 „     |

Wir entnehmen dieser Zusammenstellung, daß in allen Gruppen das Maximum auf den Typus II fällt, und daß nur bei Afrikanern und Australiern der Typus IV ebenso groß ist wie der Typus II. Es erbelit aus den Zahlen ferner, daß in allen Gruppen die nach hinten gerichtete Naht bei weitem die kleinste Anzahl bildet, ferner daß diese Anzahl eine gewisse Konstanz aufweist (7,8 Proz. — 7,7 Proz. — 4,3 Proz. — 10,0 Proz. — 7,7 Proz.). Auch die Zahlen des Typus IV lassen eine gewisse Stabilität erkennen (24,6 Proz. — 24,6 Proz. — 39,1 Proz. — 20,0 Proz. — 30,8 Proz.). Bei Stieda allerdings nimmt sich die Zusammenstellung etwas anders aus:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typus I . . . . . | 64,54 Proz. |
| „ II . . . . .    | 20,98 „     |
| „ III . . . . .   | 9,53 „      |
| „ IV . . . . .    | 4,92 „      |

Die Typen I und II haben wir also in der umgekehrten Frequenz erhalten, und Typus IV ist bei uns beträchtlich größer, was wohl daber kommen mag, daß wir gewisse Formen nach vorn vorspringender und sieh dann auf dem Gipfel wieder rückwärts krümmender Naht, sowie ferner alle Formen mit unregelmäßig verteilten Hälften des Nahtanatzes dem Typus IV zugezählt haben. Fälle von sog. Calorischer Naht haben wir viermal, darunter zweimal in guter Ausbildung, gefunden. (A. S. Nr. 33, 35, 108, 168; Ägypter, Ägypter, Schweizer, Usa). Auch Fälle von „Processus interpalatinus posterior“ (Killermann) konnten wir beobachten; Fig. 1 und 2 der beigefügten Tafel geben hiervon Beispiele. Zu bemerken ist, daß wir das Vorkommen des „Processus interpalatinus anterior seu Calori“ auch beobachtet, aber nicht besonders aufgezählt, sondern dem Typus I hinzugefügt haben. Bezüglich der Deutung der verschiedenen Formen der Gaumennaht nun scheint uns Stiedas Annahme, daß es sich „um einen an der Grenze zwischen Oberkiefer und Gaumenbein jederseits befindlichen Ossifikationspunkt handle“, die plausibelste zu sein; Stieda



glaubt, daß, wenn der Verknöcherungspunkt mit dem Gaumenbein verschmelze, die nach vorn gekrümmte, und daß, wenn er mit dem Oberkiefer verschmelze, die nach hinten einspringende Naht entstehe. „Weniger können wir Killermanns Annahme zustimmen, daß „die größeren Processus palatini anteriores und posteriores wahrscheinlich zum Teil bei gesteigerter Nahtdehnung oder wahren pathologischen Gaumenspalatungen und späteren Verwachsungen derselben entstehen“.

Gehen wir nun zu dem Torus palatinus über, so können wir von einer ausgiebigen Darstellung der von ihm hervorgerufenen Literatur nur die Hauptzüge skizzieren. Ist diese Literatur doch eine außerordentlich große, sowohl von Anatomen als Pathologen bereicherte — man findet sie gut und gründlich in der Arbeit von Jürgenson (1896), deren Benutzung wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Geheimrat Stieda verdanken, dargestellt. — Von der Entdeckung des Torus durch Kupffer (1879, 1880), der ihn anfangs für ein spezifisches Merkmal der preußisch-litauischen Völkerfamilie hielt, bis zu den neuesten Untersuchungen ist es nun, um das gleich vorwegzunehmen, nicht gelungen, den Charakter dieser Bildung zu präzisieren. Rüdinger (1880), Cocchi (1892) haben nachdrücklich auf den Zusammenhang des Torus mit dem Auftreten und der Verteilung der Drüsen am Gaumen hingewiesen. Näeko (1893) tritt energisch für die Deutung ein, daß es sich um ein Degenerationszeichen handle, und behauptet das häufige Auftreten des Torus bei Geisteskranken; andere Autoren, so Cocchi, widersprechen dem. Cocchi hat ferner hervorgehoben, daß es unmöglich sei, den Torus funktionell zu erklären. („Non può spiegarsi, questo rilievo, con un adattamento funzionale del osso, poichè là non vi prendono inserzione, nè muscoli, nè ligamenti; nè, quale sporgenza ossea gli spetta altra funzione fisiologica speciale.“) Auch phylogenetisch vermag man ihn nicht zu deuten („non può considerarsi quale reliquato di qualche disposizione osteologica normale in vertebrati inferiori“), auch nicht ontogenetisch („o nell' uomo stesso, durante lo sviluppo). Bezüglich der schon oben erwähnten Beziehung zu den Drüsen faßt

Cocchi seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen:

„1. Le ghiandole stanno ai lati del torus palatinus (s. Rüdinger, 1880).

2. Nei palati che non presentano torus palatinus, o, le ghiandole non si trovano limitate alle parti laterali della volta palatina, ma raggiungono la sutura medio-palatina; oppure, mancano sul palato duro.

3. La variabilità di disposizione dello strato ghiandolare sia in superficie che in spessore è consistente colla variabilità di sviluppo o di forma del torus palatinus.“

Ein sehr interessanter Befund, dessen Deutung aber wiederum nicht möglich erscheint.

Wir wollen hier wiederum von Stiedas Einteilung der Tori in „flache“ und „spindel-förmige“ (mit zahlreichen Übergängen) ausgehen und uns zunächst die Frage zu beantworten suchen: Wo läßt man überhaupt den Begriff „Torus“ beginnen?

Unserer Ansicht nach nicht erst dort, wo er eine größere Mächtigkeit erlangt hat, sondern schon da, wo es sich überhaupt um eine, wenn auch niedrige sagittale Knochen-erhebung handelt.


Es reduziert sich dann allerdings die Zahl der Fälle mit gänzlichem Fehlen des Torus auf sehr wenige. Wohl beobachteten wir Fälle, in denen der Torus in der maxillaren Partie gänzlich fehlte und nur durch schwache Erhebung auf der palatinalen Partie angedeutet war; diese Fälle sind häufig; auch einseitige Entwicklung eines niedrigen, schmalen Knochen-saumes war nicht selten anzutreffen. Aber wenn wir annehmen — und die Untersuchungen Jürgensons (l. c.) haben diese Annahme in überzeugender Weise fundiert — daß das Wesen des Torus in einem stärkeren Wachstum der kompakten Knochensubstanz der oralen Ränder der Längsnaht besteht, so hindert uns nichts, alles schon dem Torus zuzurechnen, was die geringste Erhebung in der Medianlinie aufweist.

Stiedas Einteilung in flache und spindel-förmige Tori ist von keiner anderen verdrängt worden und bildet in der Tat eine gute Gruppierungsmöglichkeit, selbstverständlich immer mit der von Stieda selbst gemachten Einschrän-

kung des Existierens zahlreicher Übergangsformen. — Kupffers Angabe, daß der Torus meist in einen „Kiel“ ausläuft, der zur Spina hin abfällt, konnten wir durchaus bestätigen; ergänzend ist hinzuzufügen, daß diese Bildung eines Kieles auch da vorkommt, wo der Torus auf der maxillaren Partie fehlt oder fast fehlt. Auffallend ist die starke Variation, die in der Art des Abfallens dieses Kieles stattfindet, und die sich einerseits in der Bildung zweier Schenkelchen zeigte, die manchmal eine Grube zwischen sich fassen („Fossula spinae palatinae“). Statt der zwei Schenkel kann man auch drei beobachten, sowie auch einseitiges Auslaufen einer Kielhälfte in zwei Schenkel. — Ist der Torus in der Pars maxillaris schwach entwickelt und kommt ihm dagegen in der Pars palatina eine große Mächtigkeit zu, so finden wir besonders oft eine scharfe Absetzung seiner Ränder, wodurch auf der palatinen Partie jederseits eine Grube (Fossa palatina) zustande kommt. Man mag diese scharfen Toruskanten als Cristae palatinae obliquae bezeichnen. (Wir möchten hier ausdrücklich betonen, daß die wenigen neuen Bezeichnungen dieser Arbeit nur den Interessen und der Bequemlichkeit des Spezialforschers dienen und keine Bereicherung der anatomischen Nomenklatur darstellen wollen.) — Einen Übergang der flachen Torusform in die Umgebung des Gaumenreliefs („Torusausläufer“) haben wir wiederholt beobachtet. — In Fällen, wo die Längsnaht in die Tiefe (nasalwärts) versenkt war, hatten wir gleichsam einen „negativen Torus“, der sich bei durchfallendem Lichte durch die größere Dichtigkeit der Knochensubstanz von seiner Umgebung abhob. — Wir möchten nun eine, bereits von Virchow erwähnte Form der Torusentwicklung etwas näher betrachten. Es handelt sich um die „diskontinuierliche Torusbildung“, wie wir sie nennen wollen. Es erheben sich nämlich dann in der maxillaren Partie zu beiden Seiten der Längsnaht kleine „Bröckchen“ oder „Wülstchen“, die oft in ihrem Zusammenhange untereinander durch scheinbare kleine Seitenausläufer der Längsnaht unterbrochen werden.

Diese Bildung fanden wir sowohl bei ganz schwach entwickelten als auch bei stärkeren Tori; auch Jürgenson hat sie beschrieben und

als lokale Verdickungen der Längsnaht bezeichnet. Allerdings wissen wir nicht, ob er gerade diese Wülstchen damit meint, zumal er vom vorwiegenden Auftreten dieser Verdickungen am Kreuzungspunkte der beiden Nähte spricht, während wir dieselben mehr im vor-



deren und mittleren Teil der Pars maxillaris sahen; doch ist anzunehmen, daß es sich um analoge Verdickungen handelt. Möglicherweise wird aus dieser Bröckchenform sich einmal ein Anhalt zur Erklärung der Entstehung des Torus gewinnen lassen. Es wäre dann etwa anzunehmen, daß es sich bei der Ossifikation gleichsam um überschüssige Knochensubstanz handle, die hier bei dem Zusammenschluß der beiden Oberkieferhälften abgeschieden werde.

Näheren Aufschluß darüber kann nur die Embryologie geben. Vor allem wäre festzustellen, ob Bessel-Hagens (1879) Mitteilungen über die Entstehung des Torus im vierten bis fünften Embryonalmonat, sowie das Zurückgehen desselben im Alter allgemeine Gültigkeit beanspruchen dürfen.

Endlich sei noch einer eigentümlichen Bildung gedacht, die wir zweimal (A. S. Nr. 418 Ägypter und Nr. 5 der Timurschädel) antrafen. Es handelt sich hier nämlich um zwei bohnenförmige Grübchen, die bei Nr. 418 auf dem Anfange der palatinen Toruswülste, bei dem anderen Schädel zwischen Toruswulst und Ende der medialen Leiste sich vorfanden. Bei Nr. 418 war mit dieser Grübchenbildung Trennung des Kieles mit Gabelung der rechten Hälfte desselben in zwei Schenkel und mit Spina bipartita verbunden. — Ungleiche Entwicklung der beiden Torushälften sahen wir 27 mal; 16 mal war

die rechte, 11 mal die linke Hälfte stärker entwickelt.

Fassen wir nun noch einmal kurz zusammen, was sich bezüglich des Torus palatinus ergab, so konnten wir ein Charakteristikum für bestimmte Rassen in ihm ebensowenig finden, wie Stieda; daß er ein Degenerationszeichen sei, ist nicht erwiesen. Es wird unseres Erachtens nicht nötig sein, den Torus als eine Abnormität aufzufassen, sondern die Schwankungen in seiner Entwicklung von der kleinen, zierlichen, sanftartigen Erhebung bis zum mächtigen Wulst sind nur als Stufen eines und desselben physiologischen Wachstumsvorganges zu betrachten. Das Vorkommen an so zahlreichen normalen Schädeln spricht dafür. Andererseits wissen wir, daß auch an anderen Stellen des Skeletts Exostosen- bzw. Osteophytenbildung außerordentlich häufig vorkommt, ohne daß denselben die geringste andere pathologische Grundlage gegeben ist als der dehnbare Begriff „Hyperplasie“. Welches die Ursache ist, welcher Reiz den Überschuß an Knochensubstanz bilden hilft, entzieht sich noch vollständig unserer Kenntnis. Daß der Torus selbst, bzw. die ihn deckende Schleimhaut keine Drüsen trägt (Rüdinger, Cocchi l. c.), ist immerhin eine interessante Tatsache. Das Wichtigste, was wir über die Entstehung des Torus wissen, scheint uns in Jürgensons Angabe zu liegen, daß sich die kompakte Knochensubstanz in stärkerer Ausbildung an seinem Zustandekommen beteiligt als die spongiose; wollen wir eine Definition des Torus geben, so können wir sagen: Es handelt sich um eine Exostosis dura seu osseus, um eine Hyperplasie, entstanden durch exzessives Wachstum; die Entstehung der Hyperplasie durch entzündliche Vorgänge (siehe E. Ziegler, „Allgemeine Pathologie“) wird durch das bereits embryonale Vorkommen des Torus unwahrscheinlich.

#### Zusammenfassung.

1. Die Spinaebasilänge ist der Spinaendlänge vorzuziehen und allen Messungen der Länge des knöchernen Gaumens zugrunde zu legen.

2. Die Gaumenendbreite ist nicht an den Ausläufern der Alveolarränder, sondern nur

zwischen den dritten Molaren einer genauen Messung fähig.

3. Die Gaumenendbreite ist überhaupt in vielen Fällen durch die Mittelbreite zu ersetzen.

4. Die Breite im Bereiche der ersten Prämolaren zeigt relativ geringe Schwankungen, so daß die Formdifferenzen mehr durch die Gaumenmittelbreite charakterisiert werden.

5. Der „Indice di divergenza“ von Bianchini rechtfertigt die Beibehaltung der Gaumenendbreite.

6. Die Höhenmessung des harten Gaumens wird am besten zwischen den ersten und zweiten Molaren und zwischen den ersten und zweiten Prämolaren ausgeführt. Die Höhe ist unter allen Umständen genau in der Medianlinie zu messen; der Maßstab muß genau vertikal stehen.

7. Zwischen Spinaebasilänge und Palatamaxillarlänge besteht ausgesprochene Parallelität.

8. Dasselbe ist, wenn auch etwas weniger präzis, zwischen Gaumenmittelbreite und Palatamaxillarbreite der Fall.

9. Die Messung der Gaumenhöhe hat zur Aufstellung eines „Gaumenhöhen-Index“ geführt, der dem „Gaumen-Index“ (= Längen-Breiten-Index) hinzuzufügen ist.

10. Wir teilen diesen neuen Index folgendermaßen ein:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Chamästaphylinie . . . . . | x bis 27,9    |
| Orthostaphylinie . . . . . | 28,0 bis 39,9 |
| Hypsistaphylinie . . . . . | 40,0 bis x.   |

11. Es läßt sich weder eine Beziehung zwischen Obergesichts-Index und Gaumen-Index, noch eine solche zwischen ersterem und Gaumenhöhen-Index nachweisen.

12. Die Verteilung der Gruppenbezeichnungen des Virehowschen Gaumen-Index ist wegen der numerischen Ungleichheit einer Revision zu unterziehen aus den schon oben ausführlich erörterten Gründen.

13. Gaumen-Index und Palatamaxillar-Index entsprechen sich fast vollständig.

14. Die drei Hauptformen des harten Gaumens weisen zahlreiche Übergänge auf und Abweichungen, die einer Kategorie „Unbestimmt“ zuzurechnen sind. Die paraboloide Form ist in der Spezies „Homo“ am stärksten vertreten,

die „ellipsoid-U-förmige“ Übergangsform am schwächsten.

15. Überbrückungen der Gefäßfurchen fanden sich in 20 Fällen, d. h. in 9,3 Proz.; links sind sie häufiger als rechts.

16. Ein relativ häufiges Vorkommen ist an dem hinteren Ende der medialen Leiste ein kleiner „Colliculus“, der bisher unseres Wissens nicht beschrieben ist.

17. Die Spina nasalis posterior variiert äußerst stark in Länge und Form; „Spina bipartita“ beobachteten wir in 20 Fällen, d. h. in 9,3 Proz.; „Spina tripartita“ in einem Falle (0,5 Proz.).

18. Auch bei der Einteilung der Sutura transversa ist eine Kategorie „Unbestimmt“, die schon Stöda aufstellt, durchaus erforderlich. Die Killermannschen Unterabteilungen sind für das Studium ersehrend und der älteren Einteilung zu opfern.

19. Die gerade Transversalnäht ist in allen Gruppenkomplexen am zahlreichsten vertreten, die nach hinten gerichtete Naht bei weitem am schwächsten. Die „Sutura Calori“ haben wir einmal, also in 1,9 Proz., beobachtet.

20. Als Torus palatinus ist jede noch so geringe Erhebung der Medianlinie anzusehen.

21. Die Variabilität des „Toruskieles“ ist eine überaus große.

22. Eine scharfe Abgrenzung der Ränder der palatinalen Toruspartie ist oft der Anlaß zur Entstehung von „Fossae palatinae“. Wir können in solchen Fällen die scharfen Kanten des Torus als „Cristae palatinae obliquae“ bezeichnen.

23. Es kommt auch ein „negativer Torus“ bzw. ein Sulcus vor, der durch eine Versenkung der Longitudinalnaht nach nasalwärts sich erklärt.

24. Der Torus zeigt sich oft in Gestalt diskontinuierlicher „Brückchen“ oder „Wülstchen“. Diese werfen möglicherweise Licht auf die Entstehung des Torus.

25. Der Torus palatinus ist weder für bestimmte Rassen charakteristisch, noch als ein spezifisch pathologisches Stigma zu betrachten; es handelt sich um eine durch überschüssige Knochenbildung entstandene Osteophyten, bzw. Exostosenbildung, deren Ursache wir nicht kennen.

Zum Schluss sei es uns gestattet, Herrn Professor Dr. R. Martin auch an dieser Stelle für die Anregung zu dieser Arbeit, für die Überlassung des Materiales und die reiche Unterstützung und Förderung, die er uns gewährte, unseren herzlichsten Dank auszusprechen.

Adacchi, Buntaro, Anatomische Untersuchungen an Japanern. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. 1900. Bd. II, S. 198—222.

Alkan, L. Gewisse Formen des harten Gaumens und ihre Entstehung. Referat im Zentralblatt für Anthropologie. 1901. Bd. VI, S. 72. (Originalarbeit im Archiv für Laryngologie, Bd. X, Nr. 3, war uns nicht zugänglich.)

Bessel-Hagen, Mitteilung, siehe unter Knipfer und Virchow 1878.

Bianchini, Arnaldo, Studio del palato del cranio umano. Atti della società romana antropologica. 1900. Vol. VII, p. 95—102.

Bloch, E., Der harte Gaumen. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. 1903. Bd. XLIV.

Broca, P., Instructions cranologiques et craniométriques. Mémoires de la société d'anthropologie de Paris. 1875. II. série, Bd. II.

Brosnan, Torus palatinus. Reencyklopädie der gesamten Heilkunde. 1900. Bd. IX.

Cocchi, A., Ricerche antropologiche sul Torus palatinus. Archivio per l'antropologia e l'etnologia. 1892. Vol. 22, p. 281—290.

Cocchi, A., Ricerche antropologiche sul Torus palatinus. Referat im Archiv für Anthropologie. 1895. Bd. XXIII, S. 498. Ist ein Referat über die vorige Arbeit.


Danziger, Fritz, Die Mißbildungen des Gaumens in Zusammenhang mit Nase, Auge und Ohr. Referat im Zentralblatt für Anthropologie. 1901. Bd. VI, S. 70. Originalarbeit, bei Bergmann, Wiesbaden 1900.

Eichholz, A., A racial variation in the length of the palate process of the maxilla. Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological. 1892. Vol. XXVI, new series, vol. VI, p. 538.

Fränkel, E., Der abnorme Hochstand des Gaumens. Inauguraldissertation. Basel 1894.

Gegenbaur, C. Die Gaumenfalten des Menschen. Morphologisches Jahrbuch. 1878. Bd. IV, Heft 4.

- Jürgenson, J., Die Gräberschädel der Domruine zu Jurjew mit neuen Untersuchungen über den *Torus palatinus*. Inauguraldissertation. Jurjew 1898 (enthält in der Dissertation eine genaue Übersicht der Torusliteratur).
- Killermann, Über die Sutura palatina transversa und eine Beteiligung des Vomer an der Bildung der Gaumentische beim Menschenschädel. Archiv für Anthropologie. 1894. Bd. XXII, S. 393.
- Kupffer, C. von, Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. 1879. S. 70.
- Kupffer, C. von, Gaumenwulst, *Torus palatinus*. Korrespondenzblatt, Archiv für Anthropologie. 1880. Bd. XIII, S. 44.
- Lissauer, *Crania prussica*. Zeitschrift für Ethnologie. 1878. Bd. X, S. 1 u. 82 ff.
- Lissauer, Dasselbe im Archiv für Anthropologie. 1885. Bd. XV, Supplement.
- Matiegka, Über Varietäten und Anomalien am kiefernen Gaumen des Menschen. Separatdruck aus den Sitzungsberichten der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1900. (Konnte nur in den Abbildungen studiert werden.)
- Mies, Über einige seltene Bildungen am menschlichen Schädel. Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1893. XXIV. Jahrgang, S. 105 bis 109.
- Näcke, P., Das Vorkommen des Gaumenwulstes im Irrenhaus und bei geistig Gesunden. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 1893. Bd. XXV, S. 470—485.
- Neugebauer, R., Über Messungen des weichen Gaumens mit Darstellung einer neuen Messungsmethode. Inauguraldissertation. Königsberg in Preußen 1898.
- Peter, C., Zur Bildung des primitiven Gaumens bei Menschen und Säugetieren. Anatomischer Anzeiger. 1902. Bd. XX, Nr. 22, S. 545—552.
- Ranke, J., Die Bildung des kiefernen Gaumens bei der altpaläolithischen Landbevölkerung. Beiträge zur physischen Anthropologie der Bayern. 1893. Kap. 6, V, S. 180.
- Ranke, J., Über normale Schwimmhautbildung und über besondere Bildungen am harten Gaumen beim Menschen. Archiv für Anthropologie. 1893. Bd. XXII. Korrespondenzblatt, S. 117.
- Schmidt, E., Anthropologische Methoden. Leipzig 1898. Veit u. Co.
- Stieda, L., Der Gaumenwulst (*Torus palatinus*). Ein Beitrag zur Anatomie des kiefernen Gaumens. Sonderdruck aus den internationalen Beiträgen zur wissenschaftlichen Medizin. 1891. (Festschrift für Virchow.)
- Stieda, L., Sur les différentes formes de la suture palatine transversale. Congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistorique II. Session à Moscou. 1892, p. 271—278.
- Stieda, L., Über die verschiedenen Formen der sogenannten queren Gaumennaht. Archiv für Anthropologie. 1894. Bd. XXII, t. u. 2. Vierteljahrsheft, Juli 1893, S. 1—12.
- Stieda, L., Die Gefäßfurchen im kiefernen Gaumen des Menschen. Anatomischer Anzeiger. 1894. IX, S. 729—735.
- Stoequart, La théorie d'Albrecht concernant la signification morphologique du bec-de-lièvre, compliqué de fissure palatine. Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles. 1893. XI, p. 185.
- Topinard, P., Éléments d'anthropologie générale, Paris 1895.
- Topinard, P., Anthropologie. Nach der dritten französischen Auflage übersetzt von Neuhauß. 2. Ausgabe. Leipzig 1888, Baldamus.
- Turner, Wm., Challenger Reports. 1894. Bd. XXIX.
- Turner, Wm., A rare form of palatal suture. Journal of anatomy and physiology. London 1899. Vol. 33, p. 674—675.
- Virchow, R., Beitrag zur physischen Anthropologie der Deutschen. 1877.
- Virchow, R., Abgüsse von Gaumen ostpreussischer Schädel. Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. 1879, S. 70.
- Virchow, R., *Crania ethnica americana*. 1892.
- Waldeyer, W., Über das Vorkommen des *Torus palatinus* an Lappenschädeln. Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie. 1892. Nr. 11 u. 12.
- Waldeyer, W., Über den harten Gaumen. Archiv für Anthropologie. 1892. Bd. XXI. Korrespondenzblatt, S. 118.
- Waldeyer, W., Anomalien des harten Gaumens. Zeitschrift für Ethnologie. 1892. Bd. XXIV. Verhandlungen, S. 427.



<sup>1)</sup> Siehe Archiv für Anthropologie, Neue Folge  
Bd. 1, 1903, 1, 43.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

... von den spanischen reich ver-  
standen werden. Doch scheint es, daß jenseits

---

## VIII.

### Ethnographisches aus Südwest-Frankreich<sup>1)</sup>.

#### II. Das Baskenland.

Von

Dr. L. Laloy.

Mit 10 Abbildungen im Text.

Die nördliche Grenze der Heimat der Basque fällt mit der Stadt Bayonne zusammen, wo man noch viele Häuser vom baskischen Typus beobachtet, und wo man beständig die rauhen Klänge der esknarischen Sprache zu hören bekommt, während in dem auf dem rechten Ufer des Adour gelegenen Vorort St. Esprit nur noch wenige Spuren einer baskischen Besiedelung anzutreffen sind. Es ist viel über die Ableitung des Wortes Bayonne gesprochen worden; man hat es nämlich mit einem vermeintlichen Augmentativ des spanischen „Bahia“, Bucht, etwa „Bayona“ große Bucht, in Beziehung gebracht, obwohl hier keine Spur einer Bucht anzutreffen ist. Mir scheint es viel wahrscheinlicher, den Namen vom baskischen „Bai iaona“, „ja Herr“ abzuleiten. Das sind nämlich die Worte, mit denen der des französischen unkundige Eskualdunak antwortet, wenn er in dieser Sprache angesprochen wird. Folglich wäre Bayonne die Stadt des Bai, die auf gleiche Weise wie die Provinz Languedoc auch ihren Namen vom Wort Ja (oc) erhalten hat. Beiläufig gesagt hat Bayonne mit der Erfindung des Bajonettes gar nichts zu tun.

Was die haskische oder esknarische Sprache

anlangt, so steht fest, daß sie mit keiner anderen verwandt ist. Sie gehört zur Gruppe der agglutinierenden Sprachen und bildet für sich eine Familie; durch die Schwierigkeit ihrer Grammatik hat sie gewisse Ähnlichkeit mit den Mundarten der nordamerikanischen Indianer. Andere agglutinierende Sprachen sind in Europa die finnische, die magyarische und die türkische, die in historischer Zeit in das Gebiet der flektierenden Sprachen eingebracht wurden, während das Eskuara seit undenklicher Zeit in seinem jetzigen Gebiet in Mitte der gallo-lateinischen Sprachen besteht. Das wahrscheinlichste ist, daß wir es hier mit einer sehr alten Mundart zu tun haben, die vielleicht während des früheren Steinalters über ganz Westeuropa verbreitet war. Nach Einwanderung der Arier hätte sich diese Sprache in die Pyrenäen und die angrenzenden Gebiete zurückgezogen. Daß sie aber trotz Berührung mit anderen mehr expansionsfähigen Sprachen dort bestehen blieb, ist immerhin fast unerklärlich.

Es ist noch hervorzuheben, daß auf beiden Seiten der Pyrenäen keine erheblichen Unterschiede zwischen den verschiedenen baskischen Mundarten bestehen, so daß die französischen Eskualdunak von den spanischen leicht verstanden werden. Doch scheint es, daß jenseits

<sup>1)</sup> Siehe Archiv für Anthropologie; Neue Folge Bd. I, 1903, I, 43.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.



der Pyrenäen die baskische Sprache mehr mit spanischen Wörtern gemengt ist, während sie sich auf französischem Gebiet reiner erhalten hat.

Die östliche Grenze der baskischen Sprache bildet der Berg von Anie. Von da aus führt eine unregelmäßige Linie nach dem Adour oberhalb Bayonne und dem Fluß entlang his zum Meer; sie umfaßt den größten Teil der Kreise Oloron, Manléon und Bayonne. Nach den geographischen Benennungen und den historischen Urkunden zu schließen, scheint sich diese Grenze seit geschichtlicher Zeit nicht verschoben zu haben. Broca<sup>1)</sup> erklärt diese Tatsache dadurch, daß nördlich der Pyrenäen die baskische Sprache nicht in Berührung ist mit der französischen, sondern mit der wenig expansionsfähigen bearnischen Mundart. Anders in Spanien; da wird die baskische Sprache in einem Teil der Provinzen Navarra, Alava, Guipuzcoa und Biscaya gesprochen; sie wird sogar offiziell anerkannt, da zum Beispiel in den Städten die Straßennamen spanisch und baskisch angeschrieben werden. Aber die spanische Sprache drängt immer mehr das Eskara zurück, so daß im Süden der drei Provinzen eine Zone anzutreffen ist, wo die geographischen Namen rein baskisch sind, aber wo heutzutage bloß spanisch gesprochen wird. Dann kommt ein Gebiet, wo beide Sprachen in Gebrauch sind; endlich ein anderes, wo nur baskisch gesprochen wird. Die westliche Grenze des baskischen Gebietes fällt auf die Stadt Bilhau. In dem von mir während eines Sommeraufenthaltes besuchten Territorium, nämlich dem Küstenlande zwischen Bayonne und San Sebastian, wird in den Dörfern allgemein nur baskisch gesprochen; sogar die jungen Leute scheinen das während des Militärdienstes erlernte Französische oder Spanische rasch zu vergessen. Bloß in den von Fremden besuchten Seebädern oder in den größeren Städten verstehen die Einheimischen französisch oder spanisch. In Bayonne wird eine eskuarische Zeitung veröffentlicht; die gedruckte baskische Literatur scheint ziemlich reichhaltig zu sein.

Sind die Basken durch ihre Sprache sehr bemerkenswert, so sind sie es weit weniger

durch ihre körperlichen Merkmale. Schon Broca hat darauf aufmerksam gemacht, daß letztere sehr variabel sind. Im Vergleich mit den gedrungenen Gestalten der Bewohner der Gascogne und des Béarn machen die Basken den Eindruck eines hochwüchsigen Volkes. In der Tat, obwohl die meisten von mittlerer Höhe sind, so sind doch hohe, schlanke Gestalten bei ihnen gar nicht selten; blonde Haare, blaue Augen und helle Haut haben sie öfters beobachtet, besonders bei den Franen. Auch in psychologischer Hinsicht sind die Basken recht verschieden von ihren Nachbarn. Sie haben nichts von dieser beständigen Lebhaftigkeit, die den Südländer oft so unangenehm macht; sie sprechen langsam und das Französische erhält von ihnen einen Accent, der an die Redeweise mancher Deutscher erinnert. Würde herrscht in jeder ihrer Handlungen, und öfters fiel mir auf, wie zum Beispiel auf dem Markt die baskischen Verkäuferinnen sich vornehmer und feiner benahmen als die Damen, die bei ihnen ihre Einkäufe machten. Wenn er aneh Ackerman treibt, hat der Baske nichts von der plumpen Gestalt eines Baners; sein Gang ist immer leicht und frei, sein Blick aufrecht und stolz. Dieser körperliche Habitus hängt gewiß his zum gewissen Grade von den Spielen und Tänzen ab, an die der Baske von Jugend auf gewöhnt ist.

Die baskischen Dörfer haben bloß einen zusammenhängenden Kern: er besteht aus der Kirche, dem Schil- und Rathaus; einigen Wirtshäusern, dem unentehlichen Ballspielplatz und vielleicht einem halben Dutzend Banernhäusern. Alle anderen Gehöfte liegen zerstreut auf dem Lande, sie sind durch große unbebaute Flächen voneinander getrennt. Es macht den Eindruck, als ob die Häuser noch auf denselben Plätzen stehen geblieben wären, wo bei der ersten Siedelung des Landes die Familienhäupter ihr Ziel angeschlagen haben. Die Wege von einem Gehöft zum anderen sind einfache Steige, zum Teil Hohlwege, die sich im Laufe der Zeit von selbst gebildet haben, und die gar nicht unterhalten werden. Jedes Gehöft trägt einen Namen, so daß in einem gewissen Sinne die Basken Recht haben, wenn sie behaupten, daß sie alle adelig sind, da sie

<sup>1)</sup> Revue d'Anthropologie, Vol. IV, p. 1, 1875.

den Namen ihres Eigentums tragen; doch hat jede Familie noch einen anderen Namen. Aber die Benennungen nach dem Eigentum dienen dazu, die verschiedenen Familien oder Familienglieder desselben Namens voneinander zu unterscheiden. In Spanien wurden auch früher die Basken als adelig betrachtet, weil sie nicht, wie der Rest der Bevölkerung, unter das Joch der Araber geraten waren.

Es ist mir oft aufgefallen, wie neben einem Gehöft Ruinen alter Gebäude stehen. Es scheint, als ob, wenn ein Haus oder eine Scheune hin-fällig wird oder abbrannt, man sich scheue, die Trümmer abzutragen und sie zum neuen Gebäude zu verwenden. Was uns auch noch sehr primitive Zustände vorführt, das ist die Größe des jedem Gehöfte angehörenden Bodens, die in keinem Verhältnis steht mit dem wirklich bebauten Felde. Mit voll-ständiger Unvorsichtigkeit ist alles abgeholzt worden, und die Vorhügel der Pyrenäen, welche normalerweise Wälder oder Reben tragen könnten (*Vitis vinifera* wächst wild in allen Hecken) sind bloß mit übermanns-großen Stechginatern (*Ulex europaeus* Sm.) und verschiedenen großen Heiden (*Erica vagans* L., *ciliaris* L. und *cinerea* L.) bedeckt, so daß sogar Viehzucht unmöglich geworden ist. Auf den Pyrenäen, wo dank der Feuchtigkeit letztere noch getrieben wird, sah ich, wie bei ihrem Aufbruch im Herbst die Hirten alle Gebüsch verbrannten, damit ja kein Holz wachsen könne und das Gras besser gedeihe. Auf den Vorhügeln sieht man hier und da kleine Waldungen von Eichen, die als Kopfbäume behandelt werden, indem jedes Jahr oder alle zwei bis drei Jahre die jungen Triebe als Brennholz verwendet werden. Diese niederen und ziemlich weit voneinander stehenden Bäume, deren alte Stämme gewöhnlich mit *Polypodium serratum* Willd. bedeckt sind, verleihen der Landschaft einen eigentümlichen Charakter.

Daß dem traurigen Zustande des Ackerbanes durch Neubewaldung oder sonstige Benutzung der öden Flächen abgeholfen werden könnte, ist wenig Hoffnung, besonders wenn man den selbständigen Charakter der Basken und ihren Mangel an Solidarität mit in Betracht

zieht. Es ist auch möglich, daß die Größe der unbebauten Flächen zum Teil von der ziemlich starken Auswanderung, besonders nach Argentinien, abhängt.

Die Wohnung ist immer von dem be-gegebenen Typus (Fig. 1): ein großes, mehr-stöckiges Haus mit unregelmäßigen Fenstern und wenigstens auf der Giebelseite sichtbarem Balkenwerk. Das Dach ist ziemlich flach und hat zwei ungleiche Hänge; auf der Frontseite steht es stark vor, während es auf der Rückseite kurz abgeschnitten ist. Im Küstenlande

Fig. 1.




Basisches Haus in Guéthary.

ist diese dem Meer zugewandt und die Mauer ist höher als das Dach, um letzteres gegen den Wind zu schützen. Die Seitenmauern haben wenige Öffnungen; auf der Frontseite treten sie in Form von starken Pfeilern weiter als die Frontmauer vor. Jedes Stockwerk greift über das andere und dementsprechend sind auch die Seitenpfeiler überhängend. So ist die gewöhnlich leichter gebaute und von der Windrichtung abgewandte Giebelseite von den Seiten wie

durch das überhängende Dach gut beschützt. Gewöhnlich ist die Tür auf dieser Seite, während auf einer der Längsseiten sich die Eingänge zu den Stallungen, Scheunen usw. befinden. In den größeren Gehöften bilden jedoch letztere isolierte Gebäude. Das abgebildete Haus trägt

Fig. 2.



Ornament oberhalb der Türe eines baskischen Hauses.

oberhalb der Tür ein Suastika-ähnliches Ornament (Fig. 2) im Relief mit Jahresangabe. Um das Gehöft liegen Gärten, namentlich der Obstgarten, wo die Apfelbäume wachsen für den im ganzen Gebiet allgemein gebräuchlichen Apfelwein. Dann folgen die Äcker, wo hauptsächlich Weiskorn, auch Getreide gebaut wird; sie gehen bald in die unbrauchbare Heide über.

Fig. 3.



Die Kirche von Guéthary.

Von den anderen Gebäuden sind noch die Kirchen (Fig. 3) zu erwähnen. Sie haben gewöhnlich keinen eigentlichen Glockenturm. Die Frontmauer ist höher als das Dach, und die Glocken sind hier in kleinen auf beiden Seiten

offenen Fenstern aufgehängt; sie können auch, wie in Guéthary, durch ein kleines Dach geschützt sein. Aber was an den baskischen Kirchen am meisten auffällt, das sind die im Inneren an den Längsseiten angebrachten hölzernen Galerien; es sind gewöhnlich auf jeder Seite drei übereinander, denen ebensoviel Reihen kleiner Fenster entsprechen. Eine steinerne Treppe, zuweilen mit doppeltem Ausgang, führt von außen her über dem Portal zur ersten Galerie, während einfache hölzerne Treppen im Innern der Kirche von dieser zu den anderen führen. Diese Galerien sind ausschließlich für die Männer bestimmt, während die Frauen unten im Schiff ihren Platz haben. Zu bemerken sind auch die vom Gewölbe herabhängenden kleinen Schiffchen mit Masten und Segeln, welche Weibgesellen darstellen; sie sind natürlich besonders am Küstenland häufig. Die Prädigt wird überall in baskischer Sprache gehalten.

Von der Kleidung ist wenig zu sagen. Wie überall ist die alte Tracht im Verschwinden; bloß Kopfbedeckung und Schuhe bieten etwas eigenartliches. Letztere sind die wohlbekannteren Soudalen aus fester weißer Leinwand mit Sohlen aus gewundenem Seil. Sie werden mit Schnüren am Fuß und am unteren Teil des Beines befestigt. Diese, wenigstens für den Sommer, sehr praktische Fußbekleidung hat sich nicht nur im mittäglichen Frankreich, sondern auch in vielen Großstädten und Seebädern eingebürgert, so daß sie unseren Lesern wahrscheinlich wohlbekannt ist. Das Gleiche kann man wohl von der runden platten Mütze der Männer aus dunkelblauem Tuch annehmen, die auch jetzt eine große Verbreitung hat. Diese sehr warme Kopfbedeckung, die auch im heißesten Sommer getragen wird, scheint mir eine Ursache der bei den alten Bauern ziemlich verbreiteten Kahlköpfigkeit zu sein. Eine kurze

Jacke und ziemlich enge Hosen, die mit einem breiten Gürtel befestigt sind, bilden die Kleidung der Männer. Bei den Weibern sind die Sandalen auch im allgemeinen Gebrauch; die Kleider bieten nichts bemerkenswertes. Die Kopfbedeckung wird bei den alten Weibern durch ein schwarzes Tuch gebildet, das um die Haare gewickelt wird, so daß letztere vollständig bedeckt sind, und das eine Ende des Tuches

Fig. 4.



Irdener Wasserkrug.

unter dem linken Ohr herauschaut. Diese ganz unschöne althergebrachte Mode ist von den jungen Weibern vollständig verlassen worden, die entweder barhaupt gehen oder auch, besonders am

Sonntag, die anmutsvolle spanische Mantille tragen; letzteres auch auf französischem Gebiete.

Von den Hausgeräten will ich nur die schönen großen Wasserkrüge (Fig. 4) erwähnen,

namentlich werden auf diese Weise die Gemüse auf den Markt gefördert, in zwei großen Körben, die auf jeder Seite des Tieres hängen; auch aus den Steinbrüchen werden die Steine auf Eseln geholt. Das charakteristische Fuhrwerk des Baskenlandes ist das in Fig. 5 abgebildete. Es ist ein zweirädriger flacher Wagen, der von zwei Oohsen gezogen wird. Die Kläder sind von einem dreiseitigen hölzernen Kasten, manchmal auch von einer runden Trommel bedeckt. Nach vorn zu steht ein einfaches Gitterwerk, und wenn es sich darum handelt, Heu oder Getreide zu befördern, kommt noch eine Längsstange auf die Last. Aus Fig. 5 ist noch ersichtlich, auf welche Weise die Stiere, an den Hinterteil des Wagens gebunden, nach dem Markt geführt werden. Die Ochsen, die mit dem Stachel angetrieben werden, haben gewöhnlich eine Decke aus Leinwand. Das sehr künstlich ausgeschnittene Joeh ist mit eingesechnittenen Rauten geziert. Es liegt hinter den Hörnern auf und ist an den mittleren

Fig. 5.



Der Viehmarkt in St. Jean de Luz: Ochsenwagen.

welche die Franen so geschickt auf dem Kopf tragen.

Die Anspanngeräte bieten mehr interessantes. Der Esel wird häufig als Lasttier gebraucht;

Teilen der letzteren mittels Riemen befestigt. Auf der Stirn hängt ein Stück Leder von länglich dreieckiger Form, das öfters aus mehreren Schichten besteht und reich mit vergoldeten

Nägeln und Krenzen geziert ist. Es dient dazu, die Stirn gegen den Druck des ziemlich dünnen Ziehriemens zu schützen. Dieses verzierte Stück Leder ist, wie das Joeh selbst, vollständig versteckt durch ein Schafsfell, das den Kopf so bedeckt, daß nur das Ende der Hörner sichtbar ist. Außerdem tragen noch die Ochseneinen ledernen Halsring, der mit messingenen Nägeln verziert ist und mit einer Schnalle geschlossen wird. Es hängt gewöhnlich eine Schelle dran. Das Ende des ziemlich breiten Bandes ist in viele dünne Riemen ausgeschnitten, die immer auf der freien Seite eines jeden Ochsens herabhängen.

Straße gemolken und verkauft wird. Ich habe gesehen, nämlich in Bordeaux, daß diese Ziegen zuweilen solche breite hölzerne Halsbänder tragen. Der Hirt ruft seine Kunden, indem er auf einer Pansflöte spielt, wie die im vorigen Aufsatz abgebildete.

Auf spanischem Gebiete sind die Fuhrwerke vom selben Typus, aber noch primitiver (Fig. 6). Die Räder sind nämlich einfache hölzerne Scheiben mit engem eisernem Reif. Die Enden der Achse sind viereckig, so daß sieh dieselbe mit den Rädern dreht. Statt der Trommel findet man über jedem Rad ein kurzes, hori-

Fig. 6.



Ein Ochsenwagen in Jrun.

Unter dem auf dem Markt von St. Jean de Luz aufgestellten Vieh sah ich eine Kuh mit einem hölzernen Ring von dem Typus, den ich in meiner letzten Abhandlung beschrieben habe; der Ring war mit eingebraunten Rauten geziert. Anah bei einem Pferdehändler in Gnèthary trug ein im Freien weidendes Pferd einen solchen Ring, aber ohne Ornament. Wie diese Ringe hierher gebracht wurden, konnte ich nicht feststellen. Im Frühling ziehen nach den Großstädten, sogar bis nach Bordeaux und Paris, baskische Hirten mit kleinen Herden von schwarzen Ziegen, deren Milch auf der

zontales Brett, das als Bank benutzt wird. Der kleine und enge Wagen scheint für die schlechten Bergstraßen sehr praktisch. Einmal sah ich einen solchen auf französischem Gebiet, nämlich in Aseain, am Ende der Rhone. Es scheint dies die Urform des Fuhrwerks zu sein, von welcher der schon viel vollkommene Wagen der französischen Basken hergeleitet wurde.

Außer der Bauernbevölkerung findet man auch im Baskenlande Leute, die ausschließlich von der Fischerei leben. Sie wohnen getrennt von den anderen, in kleinen armseligen Häusern, immer vom baskischen Typus, aber ohne Grund-

stück. Die Häuser stehen gewöhnlich dicht nebeneinander auf dem Gestade. In jedem Fischerdorf ist noch der alte Feuerturm vor-

Fig. 7.



Der Feuerturm in Guéthary.

handen, wo zwar kein Feuer mehr gemacht wird, aber an dem immer noch eine alte Frau angestellt ist, um bei schlechtem Wetter die Laterne anzuzünden und die Glocke anzuschlagen (Fig. 7). St. Jean de Luz bildet mit seinem Nachbarort Ciboure eine echt baskische Fischerstadt, die jedoch seit dem Verschwinden des Walfisches aus dem Golf von Biscaya sehr heruntergekommen ist.

Heutzutage wird besonders Kleinfischerei betrieben, mit Kähnen, die nur kurze Ausflüge längs den Küsten machen. Außer den Fischen bilden die Heuschrecken-Krebse (*Palinurus*) einen Hauptertrag. Sie werden in Fallen aus Flecht-

werk gefangen, die untergetaneht werden; ein Seil mit Korken ist daran befestigt, so daß der Platz kenntlich wird und man sie am nächsten Tage heraufholen kann. Die Mannschaft jedes Schiffes erkennt ihr Eigentum an der Zahl und der Anordnung der Korken. Die Schiffe und ihr Zubehör bieten nichts Interessantes. Bloß die Anker mögen erwähnt werden; sie sind nämlich ganz aus Holz (Fig. 8). Ihr Hauptbestandteil ist ein Kreuz aus vier Stäben mit viereckigem Querschnitt und zugespitzten Enden. In ein in jedem Arm des Kreuzes gebohrtes Loeh ist ein biegsamer Ast gezwängt worden. Am anderen Ende sind diese vier Äste mit Seilen oder Holzhängern aneinander befestigt; aber zuvor hat man einen schweren Stein zwischen sie gelegt, so daß der Anker untertaucht, wenn er ins Wasser geworfen wird. Diese höchst primitiven Instrumente werden von den Fischern selbst verfertigt. Ich sah sie sowohl in Guéthary als in St. Jean de Luz in Gebrauch.

Bei der Ebbe wird öfters eine eigentümliche Art von Fischerei getrieben. Zwischen den Felsen sind nämlich kleine Wasserpflützen zurückgeblieben, die sehr reich an Fischen sind. Nun sebart der Fischer mit einem eisernen Haken unter den Steinen, um die Fische heraus-

Fig. 8.



Drei hölzerne Anker.

znjagen. Kommt einer heraus, so spießt er ihn geschickt mit einer langen Gabel, die er in der anderen Hand hält. Ich sah auf diese Weise Seehähne (*Trigla*) fangen.

Es erübrigt noch von den Spielen und Tänzen der Basken zu sprechen. Diese von der Kindheit an getriebenen Übungen haben gewiß viel zu der auffälligen Schönheit der Männer und Weiber und zu der Gewandtheit ihrer Bewegungen beigetragen. In jedem Dorf findet man einen Ballspielplatz, gewöhnlich auch mehrere. Dieselben sind gewöhnlich 100 bis 200 Meter lang, und auf einer Seite von einer hohen Mauer (Fig. 9) begrenzt, gegen welche

zusammen und wickeln sie auf ein Steinkügelchen; den Überzug bilden zwei 8-förmige Stücke Leder, die gekreuzt zusammengeñäht werden, so daß die Konvexitäten des einen in die Konkavitäten des anderen greifen.

Junge und Alte haben eine wahre Leidenschaft für dieses Spiel, so daß die Ballspielplätze jeden Tag gebräncht werden. Auf den Längsseiten sind Bänke angebracht, auf denen sich die Zuschauer versammeln, besonders bei den größeren Partien, zu denen sich die berühmten Vorkämpfer der verschiedenen Dörfer herausfordern. So werden große Wettbewerbe gehalten, zu denen man sich von den ent-

Fig. 9.



Ballspielplatz in Guéthary.

der Ball von den Spielern geworfen wird. Dieser ist ungefähr faustgroß und besteht aus einem harten Kern, auf welchen mehrere Schichten des reinsten brasilianischen Kautschuks gewickelt werden; das Ganze ist mit Leder überzogen. Solche Spielhülle werden in den Dörfern selbst verfertigt; jeder kostet drei bis vier Franken. Die Schulkinder fabrizieren sich selbst billigere Bälle, wozu sie vorzüglich die elastischen Fäden, die sie aus ihren Gummisehnen ziehen, verwenden. Sie binden sie

ferntesten Dörfern aus versammelt. Die Sieger werden mit Preisen beehrt, und die Zuschauer riskieren oft sehr beträchtliche Summen auf die Spieler, von denen sie den Sieg erwarten. Die geschicktesten Spieler treiben es sogar jetzt berufsmäßig und geben in den Großstädten und selbst in Paris Vorstellungen, für welche man augenblicklich in Frankreich sehr begeistert ist. Der Basken liebt nur dieses nationale Spiel und für die blutigen Stiergefechte, die von den Spaniern importiert wurden und sich leider

nach in Frankreich eingebürgert haben, hatte er ursprünglich keinen Geschmack. Er fängt aber an, sich daran zu gewöhnen, wie an alles Schöne, das die Zivilisation mit sich bringt.

Es ist leicht einzusehen, welche Gewandtheit der Bewegungen und Sicherheit des Blickes nötig sind, um den mit Blitzesschnelle von manchmal mehr als 100 m Entfernung heranschnellenden Ball aufzufangen und ihn wieder gegen die Mauer zu schleudern. Dies nun so mehr, als man, besonders bei den ersten Wettspielen, ein gewisses Instrument, *Chiatera*

genannt, verwendet, das dem Arm eine noch viel größere Kraft verleiht. Es besteht (Fig. 10) aus einem ledernen Handschuh, an dem ein rinnenförmiger krummer Korb befestigt ist, in ihm wird der Ball aufgefangen. Auf diese Weise ist die Hebelwirkung des Armes vergrößert, indem der Hebel durch die Rinne verlängert wird. Der Ball wird entweder direkt, wie in Fig. 9 und 10 empfangen und zurückgeworfen, oder der Spieler kehrt plötzlich, im Augenblick, wo der Ball auf ihn kommt, der Mauer den Rücken und wirft den Ball mit umgewendetem Arm zurück. Das wird be-

sonders von den spanischen Spielern geübt und man begriff, daß in diesem Fall ganz andere Muskeln in Tätigkeit kommen. Die durch das übermäßige Ballspielen bei vielen jungen Leuten hervorgerufenen Mißbildungen sind in einer Inauguraldissertation beschrieben worden<sup>1)</sup>.

Die Nationaltänze der Basken sind durchaus keusch, insofern gewöhnlich jeder Tänzer für sich allein tanzt. Sogar wenn beide Geschlechter miteinander tanzen, wie im berühmten *Aurrescu*, findet keine direkte Berührung statt: Burschen und Mädchen halten sich während dieser Quadrille bloß durch die Enden eines Tasehentuchs

<sup>1)</sup> Eichepare: *Quelques remarques sur le joueur de pelote*. Bordeaux, thèse de médecine, 1900-1901, Nr. 64.

verbunden. Das Orchester besteht aus Pfeifen und Trommeln. Der Spielmann hat nämlich unter dem linken Arm eine längliche Trommel, auf die er mit einem in der rechten Hand gehaltenen Stab klopft, während er mit der linken Hand die Pfeife spielt. Ich habe leider keine persönliche Erfahrung über diese Tänze und ihre Musik. In den Dörfern, die ich während der Kirchweih besucht habe, waren die baskischen Tänze durch Walzer, Polka und den spanischen *Fandango* ersetzt, während die abgeschmackte Harmonika Flöten und Trommeln vertrieben hatte.

Fig. 10.



Spieler mit *Chiatera*. Im Hintergrund die Bänke für die Zuschauer.

So verliert jeden Tag dieses hochinteressante Völkchen etwas von seinen Eigentümlichkeiten und, wie überall in der Welt, wird bald auch hier die langweilige Einförmigkeit herrschen. Es ist aber zu beherzigen, daß trotz seiner Kleinheit selbst das baskische Volk nicht ohne Einfluß auf seine mächtigen Nachbarn war: von ihm rühren eine praktische Kopfhedeckung und leichte Sandalen her, die sich jetzt überall eingebürgert haben. Auch das baskische Ballspiel wird wohl in der Neubelebung der Leibesübungen, die sich in ganz Europa merklich macht, seine Rolle spielen. Sollten die Basken als Volk verschwinden, so haben sie doch ihren Mitmenschen etwas Nützlichliches überliefert.



## IX.

### Ethnographische Wandlungen in Turkestan.

Von

Dr. R. Karutz.

Ost-Turkestan, d. h. das chinesische Tarinbecken, steht seit einigen Jahren bekanntlich im Mittelpunkt einer eifrigen, auch von Deutschland aus betriebenen Forschung, die von neuen alle Ethnographen auf die kulturblühende Vergangenheit jener Länder aufmerksam gemacht hat, und die ihnen die Hoffnung berechtigt, noch viele wertvolle Aufschlüsse über die Geschichte des Buddhismus, Chinas und Indiens, sowie deren gegenseitige Beziehungen zu erhalten. Dieselbe glückliche Zukunft winkt der archäologischen Forschung im westlichen russischen Turkestan, wo sie sich einmal den Provinzen Semiretschjo und Semipalatinsk zuzuwenden hat, weiterhin diejenigen Stätten noch weit mehr berücksichtigen muß, die schon zur Zeit der Antike als alte blühende Kulturzentren bekannt waren, und die fast alle Rassen, Kulturen und Religionen des Erdhalbes haben durchpassieren sehen.

Neben diesen der Vergangenheit zugewendeten Aufgaben warten der Ethnographie noch solche auf dem Gebiete der Völkerkunde der heutigen Bewohner Turkestans. Mittelasien gewährt demjenigen, der den mohammedanischen Orient kennen lernen will, die echtesten Bilder, reiner und unverfälschter als irgend ein anderes Land. Nirgends ist der Islam orthodoxer und fanatischer als hier, wo der sunnitische Buchariot sich seinen Glaubensgenossen

aus der Türkei um ein Vielfaches überlegen dünkt; die russische Herrschaft bringt allerdings einen raschen Wandel herein hervor.

Andererseits leben unter der islamitischen Decke Reste eines eigenen, aus älterer und ältester Vorzeit stammenden Volkstums, die es verdienen, daß man ihren Quellen nachspürt. Die Kraft der Itasse auf der einen Seite, geographische und anthropogeographische Verhältnisse auf der anderen, die das Land besonders gegen Europa mit natürlichen Schranken umgaben, haben sie vor der Vernichtung bewahrt. Heute aber scheint die Wendestunde ihres Lebens gekommen. Zwar ist die russische Herrschaft noch jung, und die russische Art zu regieren, scheint in ihrer Nachsicht, die sich klugerweise so wenig wie möglich in die Lebensverhältnisse der unterworfenen Völker einmischte, besonders geeignet, fremdes Volkstum zu erhalten — so lange wenigstens, wie dieses politisch unverdächtig ist. Trotzdem sind auch hier jene zerstörenden Kräfte an der Arbeit, die überall aus der Berührung mit der europäischen Zivilisation geboren werden; die ethnographischen Wandlungen sind in vollem Gange, und es heißt eilig an die Arbeit gehen, wenn man für die Völkerkunde noch eine leidliche Ernte auf den Feldern Turkestans einheimen will.

Der nomadisierende Teil der Bevölkerung wird in erster Linie von der Veränderung seiner

Erwerbshedingungen betroffen. Die Kirgisen z. B. vermitteln vor dem Bau der transkaspischen Bahn fast den gesamten Handel des transoxanischen Turkestans mit Rußland und mit China. Jetzt ist aus dem Netze ihrer Karawanenwege ein gut Teil ausgeschaltet, und weitere Beschränkung wird eintreten, sobald die Bahnlinien Orenburg—Taschkent und Taschkent—Wernoje fertiggestellt sind. Die Folge davon ist das Einwandern der überflüssig gewordenen Arbeitskräfte in die Städte und dementsprechende ethnographische Verarmung. Die im Osten nomadisierenden Kirgisen finden ihre Weidelandereien durch die zunehmende Ausdehnung des Baumwollbaues eingeschränkt und ihre altgewohnte persönliche Ungebundenheit durch die Aufsicht der russischen Behörden beeinträchtigt, sie ziehen sich deshalb nach Möglichkeit in entlegene Gebirgstäler zurück, zum Nachteil auch ihres ethnographischen Besitzes, der von der schlaffen Bevölkerung vielfache Anregungen erfahren hatte.

Der zweite Hauptbestandteil der nomadisierenden Bevölkerung Turkestans sind die Turkmenen. Der von ihnen bewohnte Westen des Landes ist durch seine Salzsteppen und seine Sandwüsten viel unergiebig als der Osten, und ihre Lebensverhältnisse infolgedessen viel ärmlichere. Viehzucht, die sich auf spärliche und kleine Schafherden, auf ein paar Kamele und Esel beschränkt, Fischfang, wo er möglich ist, etwas Acker- und Gartenbau sind neben der Teppichweberei ihre Beschäftigung und ihre Nahrungsquelle. Vor der russischen Zeit kamen dazu die sogenannten Alamaane, die berühmten Raubzüge und Sklavenjagden, die sie weit bis nach Persien hinein ausführten, denen aber auch Russen, namentlich Fischer des Kaspischen Meeres, zum Opfer fielen. Die Geraubten wurden als Sklaven nach Chiwa, Buchara, Samarkand und Kokand verkauft, und man nimmt an, daß aus Persien im vergangenen Jahrhundert an eine Million Menschen von den Turkmenen in die Sklaverei geschleppt worden sind. Die Raubzüge waren also eine ebenso bequem erreichbare wie unerschöpflich fließende Erwerbsquelle; sie versiegt zu derselben Stunde, da die Eroberung des Landes durch die Russen vollendet war. Aus den selbständigen Herren

Räubern wurden Tagelöhner, die sich erst beim Bau der transkaspischen Bahn, später in den Städten und in den an den Stationen sich entwickelnden Ansiedlungen Arbeit suchten, zum kleineren Teile auch russische Milizsoldaten.

Zwar konnte der mit der neuen Ära aufblühende Handel auf den Karawanenstraßen mehr Leute als früher beschäftigen, aber einmal wurden wie im Osten für die Kirgisen, so auch im Westen für die Turkmenen durch die Bahn ganze Karawanenwege ausgeschaltet, andererseits bedeutete jener Berufswechsel ethnographisch genommen — und dieser Gesichtspunkt kommt hier für uns allein in Betracht — keinen Ersatz des früheren Herrenlebens.

Der Acker- und Gartenbau treibende Teil der Turkmenen machte eine andere Krise durch. Die Ländereien, die sie zur partiellen oder vollständigen Selbsthaftigkeit eingeladen hatten, waren in persischen Händen gewesen, von Persern kultiviert, bebaut und bewohnt. Die neuen Herren verstanden von der Landwirtschaft nichts, wollten auch nichts mit ihr zu tun haben, da die Männerarbeit des Krieges ihnen würdiger erschien. Sie ließen also die eroberten land- und gartenwirtschaftlichen Betriebe von ihren persischen Sklaven besorgen. Nachdem diese Arbeiterquelle erschlossen war, legten jene Unkenntnis und Unlust einen großen Teil der Kulturfächen brach, und erst allmählich wich diese Übergangszeit einer neuen Epoche, in der die Turkmenen sich den neuen wirtschaftlichen Bedingungen anpassen und die Erbschaft ihrer früheren verachteten Feinde erwarben, um sie zu besitzen. Die Klippe, an der die Naturvölker scheitern, war glücklich umschifft.

Nur eines konnte der Wechsel des Berufs nicht retten, nämlich die Stetigkeit des Erwerbs. Die Raubzüge durch die persischen Grenzprovinzen waren jederzeit möglich und brachten jederzeit den benötigten oder gewünschten Gewinn. Als Ackerbauer wurden die Turkmenen abhängig von den klimatischen und geographischen Eigentümlichkeiten des Landes, ein zu trockenes Jahr bringt ihnen Futtermangel und Mitternate, die natürliche Armut an Wasser zwingt die Ausdehnung ihrer Bodenbearbeitung mit eherner Notwendigkeit in enge Schranken. Die kompensatorische Rolle der Alamaane ist

ausgespielt, wirtschaftliche Verarmung droht in schlechten Jahren, und wenn auch sie in folgenden besseren wieder ausgeglichen wird, die ihr folgende ethnographische Verarmung wird es, wie man weiß, nicht.

Von den Persern haben die Turkmenen die Lehmhäuser übernommen. Besonders in alten Ruinenstädten am Nordhang des Kopet-Daghs sahen Radde und Walter die bekannten quadratischen oder rechteckigen Häuser mit flachen Dächern und kleinen Fensteröffnungen vereinzelt von turkmenischen Familien bewohnt. Aber doch nur vereinzelt. Bisher ist die alte türkische Nomaden-Kibitke, das bewegliche, praktische und warme Filzzelt noch immer die eigentliche Hausform des Turkmenen, und selbst da, wo er sich Lehmwände und große komplizierte Lehmfestungen zur Verteidigung gebaut hat, wohnt er innerhalb dieser Lehmäuern wieder nur in Zelten, nicht etwa in Kammern oder Häusern, die leicht an die Umfassungswände hätten angefügt werden können. Von einer eigentümlichen Übergangsform erzählt v. Schwarz in seinem wertvollen Buche über Turkestan (S. 132) von den Turkmenen des mittleren Amu-Darja: „Da sie in Ermangelung von Schafen und von Holz zu den Jurtenstellen nicht imstande waren, sich wirkliche Filzjurten anzuschaffen, so hatten sie sich aus Schilf Hütten geflochten, die genau die Form und Größe der gewöhnlichen Kirgisenjurten hatten und für den Winter zur Abhaltung der Unbilden der Witterung von außen mit Lehm beworfen wurden.“

Wie sehr das Filzzelt vorläufig noch die Gewohnheiten des Turkestaners beherrscht, zeigt eine andere Notiz, die v. Schwarz in demselben Buche (S. 102) gibt. Er spricht von den Bemühungen der russischen Regierung, die Kirgis-Kaisaken zu einer anständigen Lebensweise zu bestimmen und beriehtet, daß man zu dem Zwecke für die kirgisischen Khane und Saltane auf eigene Kosten Wohngebäude errichtet hatte. „Die schlugen aber für sich nach altem Brauch ihre Jurten auf den Höfen der für sie erbauten Paläste auf und benutzten die eleganten Wohnräume als Vorratskammern oder auch als Ställe für ihre jungen Pferde, Kamele, Schafe und Küder während der kalten Jahres-

zeit.“ Man wird hierbei an das erinnert, was Gentz vor kurzem im Globus (Bd. 85, S. 80) von den Hottentotten Deutsch-Südwestafrikas erzählte: „Die wohlhabenden Häuptlinge bauen sich wohl Lehmhäuser nach europäischem Muster. Hendrik Witboi besitzt in Gibeon sogar ein Haus mit mehreren Zimmern. Wohnen und schlafen tun sie jedoch trotzdem in ihrem Pontok, und nur zum Empfang europäischer Gäste begeben sie sich gewöhnlich in das Staatsgebäude.“

Die Kibitke widersteht somit der neuen Zeit noch erfolgreich. Daß sie es aber nicht für immer können wird, daß ihr originelles Bild aus einzelnen Strichen des Landes sogar ziemlich bald verschwinden wird, erscheint nicht zweifelhaft. Einzelheiten unterliegen heute schon Veränderungen, so die Holztüren, die ursprünglich in türkischen Mustern bemalt waren (zum Teil es auch noch sind), dann vielfach den aus Buchara eingeführten arabischkeuvertierten, geschnitzten Türen weichen und deren Degeneration, auf die ich uoch zu sprechen kommen werde, mitmachen.

Der Besitzstand der Turkmenen, der für die Ethnographie in Betracht kommt und dessen Verlust sie zu beklagen hat, setzt sich zusammen aus Eigenem und aus dem, was entlehnt ist, einerseits den Sarten oder der ansässigen Bevölkerung Turkestans, andererseits den Persern. Zu jenem typischen, also von Norden und Nordosten her mitgebrachten Besitz gehört außer der Filz-Kibitke hauptsächlich der Schmuck, dessen Formen von allem sonst Bekanntem abweichend und vielleicht bis in die vorgeschichtliche Vergangenheit zurückreichen. Er ist das erste, was bei der Verarmung der Familien veräußert wird. Ich sah auf dem Merwer Bazar, wie da alte, mit Familiennamen gezeichnete Stücke in die Verkaufsstellen der Händler wanderten und wie manches unter der Hand seinen Besitzer wechselte, hier ein Ring, dort eine Armspange oder ein Ohrgehänge. Als Ersatz drängte sich wohlfeile kaukasische Filigranarbeit ein, deren zierliches und glänzendes Äußeres manchem Steppensohn kostbarer dünkte als sein massives, gediegenes Erbstück. Dieselbe Metamorphose wie bei unserm Bauerschmuck. Daß der alte Schmuck nicht mehr gefertigt wird, sah ich

darau, daß die Leute außer den Schmeckgegenständen auch die Prägestempel verkaufen, mit denen die Verzierungen auf den Silberplatten eingraviert werden.

Die Grundzüge der Tracht sind bis auf die charakteristische hohe Mütze dieselben wie bei den Sarten. Die Mütze stammt vielleicht schon aus den Zeiten, da skythische und masagetische Stämme hier nomadisierten und hat allen Bemühungen des mohammedanischen Turban, sie zu verdrängen, erfolgreich widerstanden. Auch vor der russischen Mütze wird sie nicht so rasch kapitulieren. Die sonstigen Teile der Kleidung weichen in Einzelheiten, in den Farben, die man bevorzugt, und ähnlichem von derjenigen der Sarten ab; die Grundformen sind aber die gleichen und ihre Degeneration wird also den gleichen Weg geben wie dort. Ebenso stimmen die Lederarbeiten, Sattel und Zaumzeug, Messer, Käme, Taschen, Wasserkannen, Wasserpfeifen mit denen der Sarten bis auf unwesentliche Variationen überein. Überall bemerkt man jedoch an den Formen eine Neigung zur Vereinfachung, einen Übergang vom Mannigfaltigen zum Einförmigen und vom Reichen und Sorgfältigen zum Ärmlichen und Oberflächlichen. Das kleine Museum in der Bibliothek zu Aschabad, das der klugen und fleißigen Arbeit des Herrn Hofrat Ahlger daselbst zu verdanken ist, zeigt den Verfall recht gut. Was es diesem Herrn gelang, noch zu retten und hier, an der für ein turkmenisches Museum geeignetsten, weil mitten im Lande derselben Volkseinheit gelegenen Stelle, zusammenzubringen, ist zum großen Teile in den Jurten nicht mehr zu finden oder steht im Begriffe, aus ihnen zu verschwinden.

Der Verfall ist gerade deshalb so bedauerlich, weil augenscheinlich die Turkmeneu eine gewisse kulturelle Kraft innewohnt, die sich am ethnographischen Besitz in der Erfindung eigener, wie an der selbständigen Fortführung und Weiterbildung übernommener Formen deutlich zeigt. So sind die charakteristischen Muster und die Webetechnik der Tekiner Teppiche, die innerhalb der großen Masse der orientalischen Teppiche eine besondere, wohl unterscheidbare und qualitativ ausgezeichnete Klasse darstellen, bekannt. Ebenso bekannt ist aber auch der Ver-

fall der Teppichweberei. Die gesteigerte Nachfrage, die daraus folgende raschere und oberflächlichere Arbeit, die Konkurrenz gegen den europäischen Geschmack in Farbe und Muster, die Einfuhr der Anilinfarben, die direkten Aufträge der großen Firmen unserer Hauptstädte mögen die hauptsächlichen Ursachen sein. Für die Turkmeneu-Teppiche kam ein Moment hinzu, das überaus charakteristisch für den Einfluß unserer Zivilisation ist, und das ein Dorfchef so ausdrückte: „Unsere Frauen haben von den Russinnen gelernt, daß man nichts zu tun braucht.“

Anders als Kirgisen und Turkmeneu schält sich die Bevölkerung der Städte und Dörfer östlich des Amu-Darja, des alten Oxus, der russischen Ara gegenüber. Sie ist nicht in ihren Erwerbsbedingungen gestört, sondern wie sie seit Jahrtausenden, gleichgültig wer ihre Herren, ackert und handelt, so tut sie es auch unter den Russen weiter. Die natürlichen Schätze des Landes hat sie selbst seit laugem gehoben. Wenn ein Unterschied in den Erwerbsbedingungen gegen früher besteht, so besteht er nicht nach der Seite der Verarmung, sondern im Gegenteil nach derjenigen der Hebung des Wohlstandes. Denn seit der russischen Zeit ist der Umfang des Baumwollbaues in überraschendem Maße gestiegen, und man hofft ihn noch weiter zu steigern dadurch, daß man durch den Anschluß an die sibirische Bahn billiges Getreide importieren und die korntragenden Ländereien für den Baumwollbau frei machen will.

Ethnographische Wandlungen kommen hier also nicht durch Verarmung zustande, sondern umgekehrt dadurch, daß die Leute in die Möglichkeit versetzt sind, neu geweckte Bedürfnisse an dem breiteinfludenden Strome europäischer Zivilisation und Produktion zu befriedigen. Sie verachten und vergessen darüber eigenes Wissen und Können, der Verlust bedeutet dem Ethnographen einmal den Untergang der einheimischen Kunst, andererseits das Verschwinden aller primitiveren Technik und ihrer Werkzeuge.

In den Häusern treten an die Stelle geschätzter oder mit sehr dichten Arabesken farbig und goldig bemalter Deckenbalken glatte und einfach weiß gezeichnete. Die Hautüren, schmale, niedrige Doppelflügel, die mittels Zapfen

bewegt und mittels Kette und Schloß verriegelt werden, waren früher mit ausgezeichneter reicher und kräftiger Schnitzerei in Kerbschnittmanier verziert, die die ganze Fläche mit einem dichten Rankenwerk bedeckte. Die Kammern der Karawansereien, die Moscheen und Moscheenhöfe zeigen vielfach noch schöne alte Exemplare. Heute sind sie glatt oder mit wenigen rohen und oberflächlichen Ornamenten, flüchtig eingeschnittenen Strichen und Kreislinien abgefunden. Vereinzelt leht die Kunstfertigkeit noch, in Kokand bekommt man auf Bestellung z. B. geschmackvolle und gut gearbeitete Taburets, doch findet sie in der Bevölkerung keinen Rückhalt mehr und wird nach Aussterben der jetzigen Generation wohl rasch verfallen und verschwinden.

Die Fenster der Wohnungen bestanden da, wo sie überhaupt vorhanden und nicht in ihrer Funktion durch die Türen ersetzt sind, aus rechteckigen Öffnungen oberhalb der letzteren, die zuweilen mit Holz- oder Alabastergittern ausgefüllt waren und im Winter durch darübergeklebtes Papier gedichtet wurden. Sie begannen jetzt europäische Formen und Verglasung anzunehmen, wobei daran erinnert sein mag, daß im 13. Jahrhundert der chinesische Gesandte Lui-Yu in Samarkand Glasüren und -fenster gefunden hat, daß man auf dem Trümmerfelde von Maracanda, dem alten Samarkand, noch immer vereinzelt auf Glasscherben stößt. Diese Kunst der Glasfabrikation ist also später völlig verloren gegangen.

Die Unzulänglichkeit des Fenster- und Türverschlusses macht das Fehlen einer ordentlichen Heizvorrichtung in den sartschen Häusern doppelt fühlbar; der Europäer begreift nicht, wie die Leute es im Winter aushalten und wie sogar die Reichen so wenig Bedürfnis nach besseren Einrichtungen in dieser Beziehung haben empfinden können. Man begnügt sich noch immer mit dem Saual, dem Kohlebecken, das entweder in einer Bodenvertiefung oder unter einem niedrigen Tischchen steht. Darüber wird eine große Baumwolldecke gehreitet, und unter ihr kauert die ganze Haugesellschaft, steckt die Arme unter, streckt die Beine aus Feuer, friert an der Nase und schützt sich im übrigen gegen die Kälte nur wie die Chinesen

durch vielfache, übereinanderggezogene Kleider. Nur ganz langsam findet der russische Rosenofen, dessen Vorzüge die Eingeborenen doch täglich in den Koutoren und Aumastuben erleben, in Turkestan Eingang.

Schneller ist es mit dem Samowar, der russischen Teemaschine, gegangen. Sie sah Vambéry schon im Jahre 1862 in Buchara und Samarkand, also lange vor der neuen Ära, und heute ist er in den öffentlichen Teestuben der Bazare allgemein, in den wohlhabenden Privathäusern vielfach im Gebrauch. Sonst hat das Teewasser seinen Platz auf dem genannten Kohleofener.

Die Einrichtung der Wohnungen war bisher überaus einfach, ein paar Matten, Filzdecken oder Teppiche bedecken den aus Lehm festgestampften Boden; ein mit Eisenblech beschlagener, bunt bemalter Holzkoffer, der aus Rußland importiert wird, aus dessen Universalität des Gebrauchs man aber wohl schließen darf, daß es früher einheimische Truhen gab, die durch die fremde Ware aus dem Felde geschlagen sind, enthält die Wertstücke; in den Zimmerwänden sind bogenförmige, zum Teil alabasterausgelegte Nischen ausgespart, die als Schränke, Garderobenständer, Speisekammern, Etagären und Tische dienen, kurz den größten Teil unserer Möbel vertreten. In ihnen liegen die Decken und Teppiche, aus denen die Betten zurechtgemacht werden — Benutzung gibt es, aber nicht durchweg —, ferner Kleider, Geschirre, Edwaren usw. Die Russen bringen durch Einfuhr europäischer Möbelstücke oder deren Muster, nach denen an Ort und Stelle von den Sarten gearbeitet wird, einige, naturgemäß aber langsame Wandlungen hervor. Ich sah schon Glasschränke, in denen chinesisches und russisches Porzellengeschirre aufbewahrt wurde, wenn auch nur bei ganz reichen Kaufleuten. Mit der Zeit wird derartige aus weiteren Eingang finden, und die charakteristischen Wandnischen werden nach der Übergangszeit eines unverständigen ornamentalen Daseins verschwinden, da es einfacher und bequemer ist, die Wände gerade in die Höhe zu ziehen, als sie durch jene Nischenfächer zu unterbrechen.

Von sonstigem europäischem Hausrat sah ich Tischchen, Vitruen, Uhren und Stühle. Letztere

wurden von den Sarten in ihren eigenen Häusern nur für die Gäste gehalten, sie selbst leisteten uns in ihrer rückwärts geneigten Knieelage Gesellschaft. Der tägliche Verkehr mit den Europäern aber, die Einführung der Wagen und ihre allgemeine Benutzung auch von seiten der Eingeborenen, die Gewöhnung an die europäische Sitzweise in Eisenbahn und Pferdebahn und an so moderne Transportmittel wie das Fahrrad, auf dem sich Turban und Chalst freilich sonderbar ausnehmen, werden mit Sicherheit die allmähliche Wandlung der alten orientalischen Sitte und die stärkere Benutzung europäischer Möbel bedingen müssen. Wie hartnäckig allerdings die den Ostvölkern natürliche Hockstellung sich hält, sah ich in Baku, wo die tatarischen Kutseher auf den Halteplätzen, müde vom Warten und vom Sitzen, sich häufig zwischen Bank und Vorderwand des Boekes niederkauerten, um sich in dieser Stellung von der ungewohnten Anstrengung der europäischen Sitzweise auszuruhen. Mit der Zeit wird sich dieses Bedürfnis legen.

Von ähnlicher Einfachheit wie die Einrichtung des Hauses ist das Haargerät des Sarten. Waschsüssel, Waschkanne, Teekanne, ein paar Teller, Schalen und Tassen waren und sind ihr ganzer Besitz. Wir begegnen hier zweifachen Umwandlungen. Einmal behält das Gerät sein Material bei, degeneriert aber in der Qualität der Arbeit und im Geschmack der Form, ein andermal behält es seine Form, ändert aber sein Material.

Überwiegend ist das Geschirr aus Metall, aus Messing, Zinn, Kupfer, gearbeitet; seine Verzierungen sind ziseliert und im persisch-indischen Geschmack gehalten. Originelle Formen, langgeschälte Schalen, Kannen in Form von Vögeln, Vasen und Dosen jeder Gestaltung mit phantastischen Figuren-Ornamenten, Trommeln aus Metall, Wasserpfeifen aus Metall, Lampen und Speisedeckel aus Metall fallen uns in die Augen. Es wird jedoch immer schwerer, alte, gut gearbeitete Stücke zu erhalten, wenn nicht der Zufall einem auf dem Bazar von Buchara zu Hilfe kommt. Was heute gearbeitet wird, ist, wie die Holzschnitzereien, roh und monoton, die Formen beschränken sich auf ganz wenige, immer wiederkehrende Typen, wo sie

früher voller Reichtum und Phantasie waren, die Arbeit wurde flüchtig und oberflächlich, wo sie künstlerisch bedeutend und sorgfältig gewesen. Es sind das Vorgänge der Blüte und des Verfalls eines Kunsthandwerkes, die wir auch an anderen Stellen, auch bei uns leider, kennen gelernt haben.

Bei der Umwandlung des Materials ist der europäische Import die treibende Kraft. Zum Tee hatte man einheimische Ton-, besonders aber chinesische Porzellantassen; sie werden durch russisches Porzellan und durch die russischen Gläser verdrängt. Letztere freilich bürgern sich langsam ein, die Sarten trinken den Tee aus Gläsern gewöhnlich nur dann, wenn sie Russen bzw. Europäer bei sich eingeladen haben, aber der Anfang ist doch gemacht und der ist die Hauptsache. Mit den Teetassen werden auch die Wasserkannen zur Teebereitung und die Waschkannen von Moskauer und Warschauer Fabriken in Blech nachgemacht.

In Porzellan sieht man sogar jene hübschen und originellen, aus Kürbis gefertigten Wasserpfeifen imitiert, die zur unentbehrlichen Einrichtung jedes Hauses und jeder Teestube gehören. Die Sanduhrform des Kürbis ist genau wiedergegeben, und das leuchtende, mit schönen blauen, roten, gelben Blumen besprenkelte Weiß hetört manchen Europa-Schwärmer unter den Sarten, sich ein solches Meisterwerk der Moskauer Industrie, auf deren Triumph die Agenten gewiß stolz sind und von ihrem Standpunkte aus auch stolz sein können, zuzulogen. Für den Ethnographen ist der Anblick schrecklich und schmerzhaft.

Porzellanschalen, die die zierlichen, flachen, ziselierten Metallteller verdrängen, sind schon bis in die Aule der Turkmenen gedrungen. Als wir einen solchen einige Werst von Merw besuchten, setzte uns der Hausherr sein vorzügliches Schaschlyk, das tatarische Nationalgericht, am Spieß gebratene Hammelstückchen, auf einer langen Brateschüssel vor.

Als Trinkschalen dienen zuweilen russische, rot lackierte Holzschalen, wie sie früher — ver einzelt heute noch — in unseren Kolonialwarenläden zum Anstellen von Kaffee, Tee, Gewürz usw. gebräuchlich wurden. Russische Holzlöffel stehen sackweise in den Bazarränden zum Verkauf.

Verswinden die alten Formen unter der Wucht der europäischen Massenware, so werden andererseits Bedürfnisse geweckt, die früher nicht vorhanden waren. Man sieht im Speisewagen der transkaspischen Bahn die Turkmeneu schon so sicher und mauerlich ihre Messer und Gabeln, Löffel und Zuckerzangen handhaben, wie der Reisende der ersten Klasse. Und die Kenntnis des Neuen wandert als Luxus, später als Bedürfnis in das beimaliche Dorf mit.

Das sartische Kochgeschirr, das lediglich aus einem gußeisernen Kessel besteht, kommt durchweg aus Rußland.

Umwandlungen erleben wir weiterhin in den Hausindustrien der Weberei und Färberei. Die turkestanische Baumwolle kommt gereinigt nach Rußland, wird hier gesponnen und gewebt und als fertiger Stoff wieder nach Turkestan zurückgebracht. Die russischen Gewebe verdrängen die einheimischen, setzen die allgemeine Qualität durch ihre billige Konkurrenz herab und beseitigen die alten originellen Muster, die sie anfänglich wohl unehahnen, aber mit der Zeit, wenn erst eingeführt, vernachlässigen und in allmählichen Übergängen modifizieren und ausmerzen. Wie rasch die Entwertung eintritt, sah ich an der Leichtigkeit, hölzerne geschnittene Handstempel erwerben zu können, mit denen die einheimischen Fabrikanten die Stoffe bedruckt hatten. Ihr Verkauf bedeutete natürlich Verlust des Musters und der Technik und wäre nicht denkbar gewesen, wenn die Stücke in diesem Falle nicht eben schon vorher durch Nichtbenutzung ihren Wert für den Besitzer verloren gehabt hätten. Eine typische Musterung der seidenen Chalate besteht in weichen Linien, wie mit breitem Pinsel ausgestricheneu Tupfen, Flammen und Zungen, deren unregelmäßige und verwaschene Ränder mit der Grundfarbe des Stoffes in eigenartige, schillernde Kontraste treten. Es gibt so gefärbte Tücher von einer Weichheit der Seide, daß man sie zusammengefaltet in die Westentasche stecken, ausbreitet als Kopftuch gebrauchen kann, das fast über den Körper reicht und deren Glanz von überraschender Kraft und entzückender Dezent ist. Europa setzt an ihre Stelle in zunehmender Zahl einfarbige, auch da, wo die Fabrikate selbst einheimische sind und sich nur

dem europäischen Geschmack angeschlossen haben.

Die Formen der Kleidertracht, die bei der konservativen Art des Islams unvergänglich schieu, geht langsam Wandlungen ein, die bei der kurzen Dauer des europäischen Einflusses in Turkestan natürlich in den ersten Anfängen stehen. Neben die langwallende Tschapane oder Chalate, die die Figur der Sarteu so würdevoll und bedeutend machen, stellen sich die enganliegenden tatarischen Röcke, die „Besmahete“, die nur etwas unter die Knie reichen, vorn geknüpft werden, Taschen haben und den schwarzen Röcken nicht unähnlich sehen, die protestantische Geistliche und Missionare zu weilen tragen. Vielleicht kann man in ihnen einen Übergang zur uniformierenden europäischen Tracht erblicken, die freilich noch im weiten Felde liegt. Nicht so fern liegt vielleicht die Zeit, wo der Turban immer seltener um das kleine Käppchen geschlungen wird, das den kahl rasierten Schädel bedeckt und dazu bestimmt scheint, die Rolle des Fez zu übernehmen. Dann mag auch das diebte Netz aus schwarzen Roßhaaren fallen, mit dem sich die Frauen heute das Gesicht verhüllen, und das ihnen in der Hitze des zentralasiatischen Sommers eine wahre Strafe sein muß. Von einer mehr konservativen oder mehr freidenkenden Zukunft des mittelasiatischen Islams wird gleichfalls abhängen das Schicksal der eigenartigen Parndschu, des Frauen-Überarmletes, der über den Kopf gezogen wird, und dessen Ärmel hinten auf dem Rücken zusammengenäht herunterhängen. Die Fußbekleidung ist zu praktisch und den örtlichen Verhältnissen zu gut angepaßt, als daß sie sich ändern sollte, zumal auch die Russen hohe Stiefel und Gummischeuhe tragen und bei der ungläublichen Beschaffenheit der Straßen auch tragen müssen.

In den Baden der Bazarstraßen verfolgt man die Wandlungen auf Schritt und Tritt, die Formen der Sättel, der Hufeisen, des Zaumzeugs, der Steigbügel zeigen aus der Mode gekommene alte — bessere und feinere — und neue, einfachere Muster, die Waffen verschwinden, die Baumwollpressen, die Stampfmöhlen und Webstühle gehen ein oder verlassen ihre einfache Form. Das einheimische Papier, das

namentlich in Bnebara und Samarkand berühmt war, wird durch russisches verdrängt, das einheimische Leder, das in Kokand ein Zentrum der Fabrikation besaß, durch russisches und amerikanisches. Die ehemaligen Metallschreibkästen haben sich vor minderwertigen Pappschachteln zurückgezogen, das indische Rohr wird beim Schreiben durch Federhalter und Stahlfeder abgelöst, die chinesische Tusche dementsprechend durch Tinte.

Die Bazarstraßen selbst ändern ihr Aussehen. Zu den Hauptplagen des Landes, der Hitze, dem Staub, der Malaria, gesellt sich im Osten die Erdbebengefahr, die zuletzt noch Ende 1902 auf Anfang 1903 bei der Zerstörung Andisehans so aktuell wurde. Nun sind viele der Bazarstraßen mit Matten überdeckt, die auf hohen, die Straßen überbrückenden Balkengerüsten liegen, andere sind mit steinernen Kuppeln überwölbt, die ebenso wie jene den Zweck erfüllen, zu kühlen und das Licht zu dämpfen.

Beides hat die Nebenwirkung, daß es das auf- und niederwogende Getriebe des Bazarlebens mit seiner unendlichen Farbenfülle und Vielgestaltigkeit intimer und reizvoller formt. Diese Überdachungen verschwinden in den russischen Städten allmählich vor den Anforderungen der öffentlichen Wohlfahrtspflege, die nicht zulassen kann, daß ein über das Gewühl enger und engerer Gäßchen herstürmendes Erdbeben die Menschen unter den stürzenden Dächern begräbt.

Ein längerer Aufenthalt in Turkestan würde der auf den Punkt „Ethnographische Wandlungen“ gerichteten Aufmerksamkeit gewiß noch mehr Beispiele an die Hand geben, als ich es selbst mit Unterstützung meiner dortigen Gastfreunde vermöchte. Was ich aber hier mitteilen konnte, beweist wohl zur Genüge, daß man sich in Turkestan eine ertragreiche ethnographische Ernte nur noch für kurze Zeit versprechen darf, und daß daher der letzte Augenblick von uns genutzt werden sollte.



## Neue Bücher und Schriften.

1. **M. Schlosser:** Die mumifizierte Tierwelt des alten Ägyptens<sup>1)</sup>. Mit 4 Abbildungen im Text.

Ohne es zu wollen, ja selbst ohne es zu ahnen, haben die alten Ägypter der Zoologie nicht unwesentliche Dienste geleistet, denn schon aus ihren so naturgetreuen Bildwerken können wir sichere Schlüsse ziehen auf die Zusammensetzung der Fauna, welche diesen Kulturvolk bekannt war, und auf die verschiedenen Klassen der Haustiere, welche es sich dienstbar gemacht hatte. Aber nicht bloß plastische und farbige Darstellungen der damaligen Tierwelt hat uns diese alte Kultur überliefert, wir finden vielmehr in den Grabkammern außer menschlichen Leichnamen auch Überreste der verschiedenartigsten Tiere in der nämlichsten kunstvollen Weise präpariert und als Mumien bestattet wie jene der Menschen. Von den größten Tieren, wie Hind, ist freilich nur das Skelett, oder sogar nur der Schädel erhalten geblieben, denn solche Kadaver wurden zuerst begraben, um die Weichteile durch Verwesung zu beseitigen, und dann erst wurden die Knochen mit Banden einander befestigt und den Leichenfalten einverleibt.

Das Vorhandensein von Tiermumien mußte natürlich schon den frühesten archaischen Forschern aufgefallen sein, und ist selbstverständlich auch schon wiederholt Gegenstand von größeren oder kleineren Publikationen gewesen, aber eine des Gegenstandes würdige, zusammenfassende, in archaischer, osteologischer und zoogeographischer Hinsicht erschöpfende Darstellung haben uns erst im letzten Jahre zwei französische Forscher, Lottet und Gaillard, geboten, ein Werk, das jedoch leider kaum so verbreitet, wie allen Fachleuten zugänglich sein dürfte, wie es dies in Wirklichkeit verdient. Ich kann es mir daher nicht versagen, einen kurzen Auszug zu geben und so die Aufmerksamkeit auf diese prächtige Monographie zu lenken.

Begründet war die Mumifizierung und Bestattung der Tierleichen jedenfalls in religiösen Vorstellungen, denn alle auf diese Weise überlieferten Tierespezies haben gewisse Beziehungen zu Göttern, sei es, daß sie wie der Apissier selbst göttliche Verehrung gemessen, sei es, daß sie wegen dieser oder jener Eigenschaft einem Gott geweiht waren. Wir vermischen daher unter diesen Mumien einerseits recht gewöhnliche Arten, so von den Haustieren Schwein, Tauben, Hühner und anderes Geflügel, unter den wildlebenden den doch sicher auch damals nicht seltenen Sperling, sowie Hasen und Wästenfische, ja es fehlen sogar manche Arten, deren Abbildungen wir auf ägyptischen Bauwerken begegnen, wie Löwe, Giraffe

und Lehnemonratte, aber andererseits finden wir auch wieder Mumien von solchen Tieren, welche man wegen ihrer Kleinheit und ihres relativ seltenen Erscheinens nicht erwarten sollte, wie die Spitzmause.

Was die Form der verschiedenen Mumien betrifft, so sind an jenen der Raubtiere die Hinterbeine doppelt abgelegt und dem Körper dicht angepreßt, während die Vorderbeine gerade herabhängend und der Kopf mit dem Hals, welcher direkt in die Verlängerung des dumpfen Hals, einen rechten Winkel bildet. Die Mumien haben somit auf künstliche Weise eine der menschlichen Figur ähnliche, aufrechte Körperstellung. Die Graßvögel hingegen zeigen mehr oder weniger eine Korbhaltung, welche sie auch im Leben während des Ruhezustandes einnehmen, also die Beine unter dem horizontal liegenden Rumpf eingeschlagen, der Hals ist dagegen mehr oder weniger aufrecht und höchstens leicht gegen den Rücken hin abgelenkt, und der Kopf hat entweder eine horizontale Lage oder er ist mäßig nach abwärts geneigt. Daß von den Rindern und dem einzigen als Mumie bekannten Antilopen nur Schädel oder die in Bandel zusammengeknüpfen Knochen überliefert sind, habe ich schon vorhin erwähnt. Bei den Hirsnmumien ist der lange Hals und der Kopf mit dem langen Schenkel des Rumpfs möglichst


Fig. 1.



Hund von Roda. (1/4 nat. Gr.)

<sup>1)</sup> La Faune munitée de l'Égypte antique. Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Tome VIII. 4<sup>e</sup>. 200 S., 82 Textfiguren, 8 Tafeln.

Fig. 2.



Katze von Stahl Antar.  
( $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Die Sokalmumien gehören dem *Canis aureus*, die Hundemumien dem Pariahunde an und zwar verteilen

sich diese letzteren auf dreierlei Typen: auf den ägyptischen Pariahund, dieser am zahlreichsten vertreten, auf eine größere Form, ähnlich dem Pariahund von Konstantinopel, und auf den Windhund des alten Ägypten.

Sehr zahlreich sind die Mumien von Katzen, und zwar sind sie besonders häufig in Stahl Antar bei Beni Hassan. Der Zeit nach gehören sie in die ptolomäische Periode. Unter diesen Exemplaren sind alle Altersstadien vertreten. Während einige Autoren unter den Katzenmumien außer *Felis maniculata* auch *Felis caligata*, *serval* und *chaus* beobachtet haben, konnte Verf. nur die wilde *maniculata* und die von ihr abstammende Hauskatze wiedererkennen.

Besonderes Interesse verdienen die Mumien von Spitzmäusen. Sie befinden sich in vergoldeten Holzkästen, auf denen je eine Spitzmaus in Holz geschnitten ist und verteilen sich auf zwei Arten: *Sorex giganteus* und *Crocidura religiosa*.

Von Nagetieren sind nur *Aennys eahirinus* und *Mus rattus* var. *alexandrinus* überliefert, aber immer nur in Mumien von Raubvögeln.

Rindermumien kennt man von Sakkarä und Ahnair. Sie wurden zuerst begraben und erst nach Verwesung des Fleisches als Mumien präpariert; aber nur Niere wurden dieser Behandlung gewürdigt, auch wurden nicht selten nur die Kopfe aufbewahrt. Die vorhandenen Überreste zeigen alle typischen Merkmale von *Bos africanus*, namentlich: die langen, leierförmigen, fast senkrecht stehenden Hörner, während nach den Bildwerken auf Tempeln und Gräbern außerdem auch noch eine zweite Rinderrasse im alten Ägypten gelebt hat, welche aber nur kurze Hörner besaß. Sie ist mit *Bos brachycornis* identisch und hat später die langhornige Rasse gänzlich aus Ägypten verdrängt. Erst heutzutage wird neuerdings die langhornige Rasse wieder dieselbst kultiviert. *Bos africanus* ist ebenso in Afrika autochthon wie die ältesten Ägypter, von welchen körperliche Überreste erhalten geblieben sind: eine Einwanderung aus Asien hat Verf. für gänzlich ausgeschlossen.

Außer zahmen Rindern mumifizierten die Ägypter auch mehrere Antilopenarten, *Bubalis buse-laphus*, die große, jetzt auf Marokko und Tripolis eintritt und auf Arabien und Palästina andererseits beschränkte, in der libyschen Yachmur genannte Antilope, liegen bis jetzt keine Mumien dieser Rasse vor, welche noch heutzutage in Ägypten leben. Diese Gattungen wurden vollständig präpariert, dagegen wurden die *Bubalis* zuerst begraben, um die Weichteile durch Verwesung zu entfernen. Die *Bubalis*mumien stammen von Sakkarä, jene der Gazellen von Kom Merib, von Kom Ombo und von Tute.

Vom Schaf finden wir zwei verschiedene Rassen auf ägyptischen Denkmälern dargestellt. Das eine besaß spiralgedrehte, seitlich abstehende Hörner mit vorwärtsgerichteten Spitzen. Es gehört der Periode von Negasah an und reicht bis in die neolithische Zeit zurück, denn von ihm stammen Schädelfragmente aus den Kjökkennodding von Tulk in Oberägypten, dagegen liegen bis jetzt keine Mumien dieser Rasse vor, welche mit dem afrikanischen *Ovis longipes* identisch ist, aber als Rasse *palaeo aegyptius* von der lebenden Form unterschieden wird.

Die zweite Schaf rasse erscheint erst auf Bildwerken der 12. Dynastie, jedoch kommen Überreste dieser *Ovis platyura*, Rasse ägyptischer Fitzinger, in den Mumienkräutern von Ahnair vor. Sie zeichnet sich durch die rückwärts und dann abwärts und vorwärts gedrehten, dem Schädel ziemlich dicht anschließenden und rasch an Dicke zunehmenden Hörner aus. Mumien dieses Schafes befinden sich im Pariser und Berliner Museum, dagegen konnte Gaillard unter

sich diese letzteren auf dreierlei Typen: auf den ägyptischen Pariahund, dieser am zahlreichsten vertreten, auf eine größere Form, ähnlich dem Pariahund von Konstantinopel, und auf den Windhund des alten Ägypten.

Sehr zahlreich sind die Mumien von Katzen, und zwar sind sie besonders häufig in Stahl Antar bei Beni Hassan. Der Zeit nach gehören sie in die ptolomäische Periode. Unter diesen Exemplaren sind alle Altersstadien vertreten. Während einige Autoren unter den Katzenmumien außer *Felis maniculata* auch *Felis caligata*, *serval* und *chaus* beobachtet haben, konnte Verf. nur die wilde *maniculata* und die von ihr abstammende Hauskatze wiedererkennen.

Besonderes Interesse verdienen die Mumien von Spitzmäusen. Sie befinden sich in vergoldeten Holzkästen, auf denen je eine Spitzmaus in Holz geschnitten ist und verteilen sich auf zwei Arten: *Sorex giganteus* und *Crocidura religiosa*.

Von Nagetieren sind nur *Aennys eahirinus* und *Mus rattus* var. *alexandrinus* überliefert, aber immer nur in Mumien von Raubvögeln.

Rindermumien kennt man von Sakkarä und Ahnair. Sie wurden zuerst begraben und erst nach Verwesung des Fleisches als Mumien präpariert; aber nur Niere wurden dieser Behandlung gewürdigt, auch wurden nicht selten nur die Kopfe aufbewahrt. Die vorhandenen Überreste zeigen alle typischen Merkmale von *Bos africanus*, namentlich: die langen, leierförmigen, fast senkrecht stehenden Hörner, während nach den Bildwerken auf Tempeln und Gräbern außerdem auch noch eine zweite Rinderrasse im alten Ägypten gelebt hat, welche aber nur kurze Hörner besaß. Sie ist mit *Bos brachycornis* identisch und hat später die langhornige Rasse gänzlich aus Ägypten verdrängt. Erst heutzutage wird neuerdings die langhornige Rasse wieder dieselbst kultiviert. *Bos africanus* ist ebenso in Afrika autochthon wie die ältesten Ägypter, von welchen körperliche Überreste erhalten geblieben sind: eine Einwanderung aus Asien hat Verf. für gänzlich ausgeschlossen.

Außer zahmen Rindern mumifizierten die Ägypter auch mehrere Antilopenarten, *Bubalis buse-laphus*, die große, jetzt auf Marokko und Tripolis eintritt und auf Arabien und Palästina andererseits beschränkte, in der libyschen Yachmur genannte Antilope, liegen bis jetzt keine Mumien dieser Rasse vor, welche noch heutzutage in Ägypten leben. Diese Gattungen wurden vollständig präpariert, dagegen wurden die *Bubalis* zuerst begraben, um die Weichteile durch Verwesung zu entfernen. Die *Bubalis*mumien stammen von Sakkarä, jene der Gazellen von Kom Merib, von Kom Ombo und von Tute.

Vom Schaf finden wir zwei verschiedene Rassen auf ägyptischen Denkmälern dargestellt. Das eine besaß spiralgedrehte, seitlich abstehende Hörner mit vorwärtsgerichteten Spitzen. Es gehört der Periode von Negasah an und reicht bis in die neolithische Zeit zurück, denn von ihm stammen Schädelfragmente aus den Kjökkennodding von Tulk in Oberägypten, dagegen liegen bis jetzt keine Mumien dieser Rasse vor, welche mit dem afrikanischen *Ovis longipes* identisch ist, aber als Rasse *palaeo aegyptius* von der lebenden Form unterschieden wird.


Die zweite Schaf rasse erscheint erst auf Bildwerken der 12. Dynastie, jedoch kommen Überreste dieser *Ovis platyura*, Rasse ägyptischer Fitzinger, in den Mumienkräutern von Ahnair vor. Sie zeichnet sich durch die rückwärts und dann abwärts und vorwärts gedrehten, dem Schädel ziemlich dicht anschließenden und rasch an Dicke zunehmenden Hörner aus. Mumien dieses Schafes befinden sich im Pariser und Berliner Museum, dagegen konnte Gaillard unter

seinem Material aus Gizeh drei Mummies des Mufflon *Ammotragus tragelaphus* ermitteln, welcher noch heutzutage in ganz Nordafrika verbreitet ist. Von einer näheren Verwandtschaft zwischen ihm und dem Hausschaf kann keine Rede sein, er nähert sich viel mehr den Ziegen als den Schafen, insofern Tränengruben fehlen und die Nasenbeine gerade verlaufen. An die Bovinen erinnert die Anwesenheit großer Luftkammer in den knöchernen Hornzapfen und der Umstand, daß die Seitenbeine mit den Stirnbeinen nahezu einen rechten Winkel bilden. In den Proportionen der einzelnen Extremitätenknochen scheidet sich dieser Mufflon viel enger an die Ziegen als an die Schafe an.

Von Ziegen kennt man bis jetzt erst eine einzige Mumie aus Sakkara und einige wenige Knochen von der nämlichen Lokalität, sowie je einen Schädel aus Khozan und aus Tukh. Dieser letztere stammt aus

nach zumeist Raubvögeln an, nämlich den Gattungen *Milvus* — *egyptius* und *regalis* —, *Fernis* — *apivorus* —, *Elanus* — *caerules* —, *Buteo* — *desertorum*, *ferox*, *vilgatus* —, *Circus* — *gallinus* —, *Aquila* — *imperialis*, *maculata*, *pennata* —, *Haliaeetus* — *albicollis* —, *Falco* — *babylonius*, *barbarus*, *Feldgrü*, *sublimis* —, *Hierofalco* — *saker* —, *Cerchias* — *conchris*, *tinnunculus* —, *Accipiter* — *nisus* —, *Circus* — *aeruginosus*, *cynaes*, *maerurus*, *pygargus* —, *Malicorax* — *gabar* —, *Pandion* — *haliaetus* —, *Strix* — *flammea* —, *Bubo* — *ascalaphus* —, *Scops* — *Aldrovandi* — und *Asio* — *otus* und *brachyotus* — und unter ihnen sind die häufigsten *Buteo desertorum* und *ferox*, *Milvus aegyptius*, *Aquila maculata*, *Cerchias tinnunculus* und *Accipiter nisus*. Ihre Mummies stammen teils aus Gizeh, teils aus Ombo und Roda, und sind meist zu Bündeln von durchschnittlich  $1\frac{1}{2}$  m Länge und 40 cm

Fig. 3.



Spitzmaus-Sarkophag und Mumie.

den neolithischen Kjökkenmøddings und gehört wie jener aus Khozan dem *Hircus thebaicus* an. Auch dieser besitzt ein hohes Alter, denn er stammt aus der Periode von Negadah. Die thebäische Ziege ist noch jetzt in Oberägypten verbreitet und zeichnet sich durch Hangeohren, das Fehlen des Bartes, die gewölbte Stirn und die kleinen, rückwärts und abwärts gerichteten Hörner aus. Dagegen besitzt *Hircus mambriacus*, welcher durch eine Mumie und durch Hornzapfen aus Abasir vertreten ist, lange Beine, einen langen, wenig gewölbten Schädel, lange Ohren und nahezu aufrechtstehende, wenig nach rückwärts geneigte Hörner, die bei den Männchen bedeutend länger sind als bei den Weibchen. In der Gegenwart lebt diese Rasse in Syrien und Mesopotamien. Eigentümlicherweise war diese untersuchte Ziegenmumie durch Bündeln mit der Mumie eines Krokodilles vereinigt.

Von Vogelmummies konnte Giffard mehr als 1000 Exemplare studieren. Sie gehören der Artenzahl

Breite vereinigt, von denen jedes 30 bis 40 Individuen enthält. Wie schon erwähnt, haben diese Mummies die Beine in der Verlängerung des Körpers ausgestreckt und den Kopf dem oberen Teile des Körpers leicht angegedrückt. In der Mitte fast aller solcher Bündeln findet man die Mumie eines kleinen Vogels oder einer Spitzmaus. Auch die Mummies der Nachtraubvögel kommen stets nur einzeln in solchen Mumienbündeln vor, welche dem Alter nach von der Periode der 26. Dynastie bis in die römische Periode zurückdatieren.


Die Ibis mummies enthalten im Gegensatz zu jenen der Raubvögel stets nur ein einziges Individuum, dessen Hals S-förmig gebogen ist, so daß der Schädel mit dem langen Schnabel dem Körper möglichst dicht anliegt. Auch die Beine sind am Körper heraufgezogen, anstatt frei herabzuhängen wie bei den Raubvögeln. Die meisten Ibis mummies stammen von Sakkara, selten sind sie in Kom Ombo, Roda und Thebe, und bei Theben wurde sie jetzt überhaupt erst eine einzige gefunden.

In Kom Ombo sind sie immer nur einzeln in einer Tonurase eingeschlossen, während in Thebe eine Urne vier bis fünf solche Mumien enthält. Diese Bestattung der Ibisartigen begann in der Zeit der 20. Dynastie und dauerte bis in die griechische Periode. Als Ibis-mumien wurden zwei Vogelarten konserviert, *Ibis aethiopicus* und *Plegadis falcinellus*, doch ist diese zweite Art, welche sich von der erstern durch ihre dickeren Beine unterscheidet, wesentlich seltener. Von kleineren Vögeln wurden bis jetzt nur als

*Melanomus holtenianus* und *Vivipara* leben im Nil. Die Schalen haben bereits ihre Farbe verloren. Zu welchem Zweck sie gedient haben könnten, ist vorläufig nicht näher zu ermitteln, denn als Schneckenkanten wenigstens die erwahten Nilschnecken schwerlich verwendet werden.

Diese kurze Übersicht dürfte zur Genüge beweisen, wiewohl reichliche Fälle interessanter Beobachtung dieses Werk sowohl dem Zoologen als auch dem Archäologen bietet.

Fig. 4.



Laks niloticus von Esueh.

Mumien angetroffen Kueckel — *Cuculus caninus* —, Ibiher — *Cornacia garrula* —, Schwalbe — *Hirundo rustica* —, Frel — *Oedicnemus* — (*Charadrius*) *oedicnemus* — und ein Hühnervegel — *Pteroclorus* (*Tetrao*) *senegallus* —, und zwar immer nur in den erwahten Mumienbindeln.

Die Reptilien sind bis jetzt nur durch eine Giftschlange, *Naja haje*, eine kleine Eidechse — *Mabalia quinque taeniata* — und durch das Krokodil vertreten. Während von der erstern nur ein Exemplar und von der Eidechse zwei Exemplare vorliegen, sind Mumien des Krokodils, namentlich in Esueh, relativ häufig. Sie wechseln sehr beträchtlich in der Größe, von 30 cm bis 1½ m, und verteilen sich auf zwei Arten, *Crocodilus lacunosus* und *compilatus*. Der Zeit nach gehören die Exemplare von Esueh der griechisch-römischen Periode an.

Von Fischen hat man zwar nur eine einzige Art — *Lates niloticus* — als Mumie präpariert, aber von diesem sind uns zahlreiche vorzüglich erhaltene Exemplare auf diese Weise überliefert worden. Dieser Fisch, welcher auch jetzt in riesigen Mengen im Nil lebt und bis zu 2 m Länge erreicht, genößt besondere Verehrung, namentlich in Esueh, welche Stadt daher in der griechisch-römischen Zeit sogar den Namen *Latiopodia* führte. Im Gecontrast zu den Mumien anderer Tiere und vieler menschlicher Mumien wurde bei diesen Fische nicht Bitumen angewandt, sondern die Kadaver wurden zuerst in natron- und dann in kohlhaltigen Wasser aufbewahrt und darauf an der Sonne getrocknet.

Bei den Ausgrabungen in Karnak kamen auch eine Anzahl Knochenschalen zum Vorschein. Von diesen Arten lebt *Murex brandaris* im Mittelmeer, *Cassis glauca*, *Tridacna gigas* und *Ostrea plicata* bewohnen den indischen Ozean, *Murex anguliferus*, *Faciolaria truxizans*, *Sirambas tricornis*, *Pterocera lambis*, *Cypraea pantherina*, *melanostoma*, *histrio*, und *Caput serpentis*, sowie *Tridacna elongata*, *Peetunulus peetiniformis*, und *Melengrina margaritifera* das Rote Meer;

2. P. Matschie: Über einen Gorilla aus Deutsch-Ostafrika. Ges. naturf. Freunde (Berlin) 1903, S. 253—259.

P. Matschie: Bemerkungen über die Gattung Gorilla. Ebendaselbst 1901, S. 45—53.

P. Matschie: Einige Bemerkungen über die Schimpansen. Ebendaselbst 1904, S. 55—69.

Der vorzügliche Kenner der Säugetiere beschreibt hier einige neue, bisher unbekante Formen von Anthropoiden, und gibt zugleich ein System der gattungen Gorilla und Schimpanse; ein solches der Gattung Orang soll später folgen. Die Gibbons der Verf. ebenso wie Kobilbragge und Ringo aus der Reihe der Menschenaffen gestrichen wissen. Als betendes Prinzip für die Aufstellung neuer Arten wird einmal der Satz formuliert: „Überall, wo Unterschiede in den äußeren Merkmalen mit solchen des Schädels gleichzeitig auftreten, liegt die Wahrscheinlichkeit vor, daß man es mit einer verschiedenen Art zu tun hat“ — in interessanter Übereinstimmung mit den für die Kassenanatomie des Menschen geltenden Grundlagen.

Durch Aufzählung zweier neuer Arten, der von Matschie so genannten Gorilla heringei und Gorilla diehli, ist die Grenze des Verbreitungsgebietes des Gorilla, als welches bisher Kamerun bis Landana galt, nördlich bis an die englische Grenze, östlich bis zum Kivuisee herausgerückt worden. Es lassen sich nimmer folgende Gorillaarten unterscheiden:

1. *Gorilla gorilla* (Wynnaid) (syn. *G. gina*, *Trogl. savani*, *Pith. gessila*, *Sat. adrotes* (*Chimp. gorilla*)). Grundfärbung schwarzlichgrau, auf dem Schotel bei manchen Tieren bräunlichrote Haare mit schwarzlichgrauen gemischt. Im höheren Alter schälen die Männchen eine weißgraue Färbung auf den Oberschenkeln und dem Untertrucken zu bekommen. Größe schuldbreite bei 34 ♂ 142 bis 160 mm, bei 10 ♀ 129 bis 143 mm. Entfernung der H. intercondyl., von der Protub. occ. ext. bei 34 ♂ 108 bis 122 mm, bei 10 ♀ 81 bis 91 mm; Verhältnis beider Entfernungen, 0,73 bis 0,81 (♂) und 0,61 bis 0,67 (♀). Höhe des Platum

nuchale bei 34 ♂ 24 bis 45 mm., bei 10 ♀ 40 bis 52 mm. Der knöcherne Rahmen ist bei den ♂ kürzer als die Entfernung seines freien Randes von dem Hinterrande des Foramen magnum. Arenae supercil. vorn über der Mitte des Auges mindestens 11 mm dick. Der Unterrand der Augenhöhle hat mindestens neben dem Vorderrande des Foramen laterale eine Crista. Die Nasalia sind breit und verjüngen sich allmählich etwas nach dem freien Rande hin.

2. *Gorilla castaneiceps* (Stark) (syn. *Gorilla mayana* Alix und Bouvier). Langer behaart, Scheitel einfarbig oberbraun, Rücken bräunlich, Gliedmaßen schwärzlich. Große Schläfenrinne am Hinterhaupt bei 2 ♂ 135 und 142 mm., bei einem alten ♀ 117 mm.; Entfernung der Iueis. intercond. von der Protub. occ. ext. bei beiden ♂ 87 mm.; beim ♀ ebenso. Verhältnis beider Entfernungen: 0.59 und 0.64 (♂) und 0.71 (♀). Planum nuchale bei den ♂ 48 mm., beim ♀ 30 mm. breiter als lang. Es scheint, als ob der Schadel von *G. castaneiceps* namentlich im Gesichtsteil wesentlich kürzer als bei *G. gorilla* ist. Im übrigen stimmen beide Arten überein.

3. *Gorilla beringei* (Matchie). Am Vulkan Kirunga ya Sabuyo südlich von Albert-Edwardsee entdeckt. Fell noch nicht untersucht. Eine Photographie des Tieres eines Mannchens, zeigt einen dichten Vollbart. Der Schadel: größte Breite am Hinterhaupt 143 mm.; Entfernung der Iue. intercond. von der Protub. occ. ext. 111 mm.; Verhältnis beider Entfernungen 0.77. Planum nuchale um 32 mm. breiter als hoch. Diese Maße mit denen der übrigen Arten übereinstimmend. Ein Unterschied liegt dagegen in der großen Länge des knöchernen Gannums, der länger ist als die Entfernung seines freien Randes von dem Hinterrande des Foramen magnum. Arenae supercil. vorn nur 8 bis 9 mm. dick. Auf dem Unterrande der Augenhöhle keine Crista; Nasalia schmal; Sutura nasomax. bildet mit der Sutura nasointernax. fast einen rechten Winkel.

4. *Gorilla diehli* (Matchie). Im Becken des Croßflusses an der englischen Grenze von Kamerun aufgefunden. 4 Schadel von erwachsenen ♂, 5 von erwachsenen ♀. Die Maße sind: größte Breite am Hinterhaupt 166, 175, 174, 169 mm. (♂) und 131, 128, 143, 136 mm. (♀). Entfernung der Iue. intercond. von der Protub. occ. ext.: etwa 106, 107, 109 bis (♂) und 74, 75, 73, etwa 73 (♀). Verhältnis beider Entfernungen: 0.60 bis 0.64 (♂) und 0.51 bis 0.58 (♀). Planum nuchale bei den ♂ um 60 bis 68 mm., bei den ♀ um 53 bis 70 mm. breiter als hoch. Diese eigentümliche Gestalt der Hinterhauptfläche bildet einen auffälligen Unterschied von den zahlreichen Schadeln aus südlicheren Gegenden, mit denen sie in vielen anderen Maßen, in der Gesamtlänge, in der Länge der Molarenreihen, in der Gestalt des Gannums usw. übereinstimmen.

Ref. hält diese Resultate auch deshalb für besonders bedeutungsvoll, weil hier von zoologischer Seite der Wert von Schädelmaßen als Unterscheidungsmerkmal, bei Fehlen sonstiger unterscheidender Kennzeichen, nur nach vorhandener Berücksichtigung der Arbeit, aber doch tatsächlich durch Verwendung dieser Merkmale für die Systematik eine beachtenswerte Anerkennung erhält, die auch für die Anthropologie lehrreich ist.

Der Schädelbau der Schimpansen zeigt gleichfalls bei den verschiedenen Arten erhebliche Unterschiede. Als vornehmliche Berücksichtigung der Schimpansen, die dennoch in die Nomenklatur aufzunehmen ist, wird nachgewiesen Linné's *Simia satyrus*; *Simia* wird deshalb als Gattungsnamen gewählt, und folgende Arten werden unterschieden:

1. *Simia satyrus* L. (syn. *S. troglodytes* Gm., Trogl. niger Geoffr., Trogl. isehzo Duvernoy, Trogl. koulo-

Kamba Du Chailla, Trogl. aubryi Gratiolet, Pseudanthropus fuliginosus Schaubli). Haupthaar nicht geschweigt, Kopf länglich, Stirnhäare fallen aus, aber nicht bis zur Höhe der Ohren; Ohren mittelgroß, ungefähr 65 mm. hoch, 50 mm. breit. Der schmale dicke Bart, dessen Haare abwärts gerichtet sind, hält das mit spärlichen dunkelgrünen Haaren besetzte Kinnsfell. Färbung des Gesichtes und der Ohren beim jungen Affen ledergelb, beim alten schwarzbraun. Schädelmaße: Gesichtsteil sehr schlank, hinter den Eckzähnen eingezogen; größte Breite an den Caninen niemals erheblich, höchstens 1 mm.; größer als an den Molaren. Gehirnkapsel länglich eiförmig, Glauco-Linsenentfernung beim ♂ groß, nämlich 134 bis 142 mm. bei den ♂, 122 bis 130 mm. bei den ♀; Sagittallbogen ♂ 160 bis 165 mm., ♀ 140 bis 145 mm. (Ausnahme 1 ♀, vielleicht Bastard.) Größte Gesichtsbreite an den Caninen 59 bis 67 (♂), 52 bis 58 (♀).

2. *Simia calvus* (Du Chailla). Haupthaar nicht geschweigt, fällt auf der Stirn aus, so daß der runde Kopf bis zur Höhe der Ohren kahl erscheint. Ohren sehr groß, ungefähr 80 mm. hoch, 53 mm. breit. Wangenbart nicht dicht, langhaarig, abstehend, zieht nicht um das Kinn herum; dieses ist mit spärlichen weißlichen Haaren besetzt. Schadel: Gesichtsteil erheblich breit, weil er hinter den Eckzähnen verbreitert ist; größte Breite an den Caninen um 5 mm. geringer als an den Molaren. Gehirnkapsel rund, beim ♂ nicht länger als bei den ♀, 128 bis 139 mm. (♂), 127 bis 139 mm. (♀); im Bogen gemessen 148 bis 155 mm. (♂), 150 bis 160 mm. (♀); größte Gesichtsbreite an den Caninen 58 bis 60 mm. (♂), 54 bis 68 mm. (♀).

3. *Simia villosus* (Gray). Wesentliches Merkmal das sehr kleine Ohr (größte Länge 50 mm., größte Breite 45 mm.). Das Ohr wird von dem aus langen Haaren bestehenden und sehr breiten Wangenbart fast vollständig verdeckt und liegt den Kopfseiten nahe an. Der Bart umgibt das Gesicht vollständig und ist auch unter dem Kinn dicht. Schadel: Gesichtsteil schlank, vor den Nasenöffnungen flach. Gehirnkapsel bei 2 ♂ viel kürzer als bei 1 ♀ (Länge 131 und 132 mm., Bogen 150 und 152 mm. ♂, 137 bzw. 160 mm. ♀). Größte Gesichtsbreite an den Caninen 62 und 63 mm. (♂), 55 mm. (♀).

4. *Simia Schweinfarthii* (Giglioli). Geschwärteltes Haar, in der Jugend helles, später dunkles Gesicht. Ohren sehr groß. Wangenbart sehr breit, Kinn mit weißen Haaren dicht besetzt. Schadel: Gesichtsteil sehr schmal, hinter den Eckzähnen höchstens 55 mm. Gehirnkapsel bei ♂ und ♀ gleich lang (Länge ♂ 128 bis 132 mm., ♀ 130 bis 133 mm.; Bogen ♂ 150 bis 160 mm., ♀ ebenso).

5. *Simia insens* (A. R. Meyer). Rötlich-braunes Haarkleid, schliefstehende Augen, sehr helle Hanfbarbe. Hierher gehörig vielleicht gewisse Schadel (s. Original).

6. *Simia leucopymnus* (Lesson) (syn. *S. pygmaeus* Tyson). Haupthaar geschweigt, aber über der stark gewölbten Stirn sehr dünn. Das sehr große Ohr ist am oberen Rande abgerundet; Angengenehend ebenso wohl wie das übrige Gesicht; Unterrippe und Kinn mit braunen Haaren spärlich bekleidet; Wangenbart kurz und dicht, umgibt zwar das Kinn; Hirnschale flach gewölbt. Hierher gehörig vielleicht ein gewisser Schadel (s. Original).

7. *Simia elimpans* (Mayer). Geschwärteltes Haupthaar, dunkle Angengenehend, helle Lippen. Schadel etwas weniger Weibchen. Größte Gesichtsbreite 124 mm.; Bogen 146 mm.; Gesichtsteil zwischen den Molaren erheblich breiter als an den Caninen; sehr dünne Jochbogen (3 bis 4 mm. an der dünnsten Stelle).

Dieser von berufenster Stelle unternommene Versuch, in das gewiß noch von vielen Anthropologen peinlich empfundene Chaos in der Nomenklatur der

Anthropoiden Übersicht und Ordnung zu bringen, kann auch von anthropologischer Seite nur mit größter Befriedigung begrüßt werden; man mag das System annehmen oder nicht, immer wird es möglich sein, sich an der Hand der von Matschie gegebenen Übersicht der Merkmale und der Synonyme leicht zu orientiren; daß auch kranioetrische Merkmale zur Begründung des Systems in herbezugender Weise verwendet werden, macht diesen Versuch für uns noch besonders interessant.

Berlin.

P. Bartels.

### 3. Ribbe: Zwei Jahre unter den Kannibalen der Salomoineln.

Laugsan, über unverkennbar dümmert es auch im dunkeln Melanesien. In Neuguinea — mit Ausnahme freilich des indonesischen Teiles — und im Bismarck-Archipel liegt die Gruppe der Niamen, wenigstens an der Küste, ziemlich klar vor Augen, so daß hier und da die wissenschaftliche Arbeit schon mit einiger Aussicht auf Erfolg einsetzen kann. Am verschämtesten ist für uns besonders in ethnographischer Hinsicht noch das Bild der Neuen Hebriden, wo die angezeigten Stämme von Codrington nur um so schwerlicher reicheres Material vernachlässigen. Wenn die darzustellende Gruppe der Salomouen bereits sehr ferne Umrisse zeigt als ihr südlichen Nachbarn, so verliert sie das neben Parkinson, Guppy, Woodford und Somerville nicht zum wenigsten der Tätigkeit von Karl Ribbe, der sich Mitte der vier Jahre an den Shortlandsinseln südlich Bougainville anhielt und von dort Bougainville, Rabiana, Choiseul und Isabel besuchte. Außer in seinen beiden Sammlungen, die zu den Staatssammlungen des Berliner Museums gehören, sind die ethnologischen Ergebnisse seiner Reise hauptsächlich in dem oben genannten Buche niedergelegt, dessen Hauptfächer sein spätes Erscheinen ist, abstrahieren wir aber von dem Fortschritte, den unsere Ansprüche an Sammeln und Beobachten seit zehn Jahren gemacht haben, so werden wir finden, daß sich Ribbes Werk den besseren Erscheinungen der Reiseliteratur voll und ganz an die Seite stellen kann.

Über Wert oder Unwert der gegebenen Körpermessungen zu urteilen, bin ich nicht kompetent. Ribbe hat sehr richtig verfahren, mit ausreichendem Werkzeug Schädeldäse zu nehmen. Seine allgemeine Charakterisierung der Schädelformen, sowie die übrigen, geringeren Fehlern ausgesetzten Körpermaße, werden ja wohl für sich nicht verwendbar, vielleicht aber zur Ergänzung und Veranschaulichung wichtiger Materials nicht wertlos sein. Wichtig ist die Beobachtung einer heftigsten, dem malayo-polynesischen Typus ähnlichen Bevölkerung auf Isabel, die sich nach einer weiteren Notiz auch auf Malaita hinreichend machen muß. Bedauernd noch, jedenfalls aktiver ist der anscheinend einwandfreie Nachweis von Pygmaen im Innern von Bougainville, der ja nach Lauterbachs Beobachtungen in Neuguinea allerdings nicht überraschen kann. Ribbe selbst sah eine normal gebaute Frau von nur 1,15 m, sowie zwei ebenfalls gut gebaute Männer von 1,39 und 1,41 m Höhe, während die übrigen von ihm festgestellten Körpergrößen zwischen 1,50 m und 1,85 m liegen. Alle drei Individuen waren jung gesund worden und lebten als Sklaven unter der Kastenvölkerung.

Die Ethnographie der Shortlandsinseln und bis zu einem gewissen Grade auch von Rabiana, ist erschöpfend behandelt. Wichtig ist die Bestätigung der älteren Angabe, daß auf Mono Ausgeborene vorkommen, und ebenso, daß auch hier, wie sonst in Melanesien, der Betrieb der Topferi auf einem Ort, nämlich auf die kleine Insel Giu, beschränkt ist.

Besonders interessant ist der Bericht über die Herstellung der Muschelnringe. Seit der Entdeckung des Bababiskores von Beinhafen gab es Leute, die damit nun das Universalinstrument für die angegebenen Zweck gefunden zu haben meinten. Mit Unrecht; denn auf den Shortlands und Rabiana werden die Ringe, wie schon aus einzelnen Stücken von Ribbes Sammlung ersichtlich, gegost. Nachdem ein handliches, flaches Muschelschale zurechtgeschlagen ist, wird mit Hilfe eines kleinen Steinhammers ein Loch hergestellt, durch das die Rotangseile eines Bogens geführt wird, der den Eingeborenen als Sägeinstrument dient. Bemerkenswert ist noch, daß die Leute nach ihrer eigenen Aussage das Material zu den Ringen nicht aus der See holen, worin ihnen nach Ribbe auch alle Geräte fehlen, sondern sulfidische Schalen verwenden, die sie in den Bergen finden. Recht genau lernen wir bei Ribbe auch die verschiedenen Bootformen kennen, von denen wieder die von Isabel in Gestalt und Verzierung einen besonderen Platz einnehmen.

Von Sitten und Gebräuchen beobachtete Ribbe unter anderem die Begräbniszeremonien auf den Shortlandsinseln und Rabiana. An beiden Orten finden solche nur bei Hauptdingen und Vornehmen statt; aber während der Tote auf Rabiana in einem Strohhaufen beigelegt wird, ist auf der Nachbargruppe die Leichenverbrennung üblich. Gemeinsam sind wieder die dabei erforderlichen Menschopfer; sie sind die Hauptveranlassung zu den in diesem Teile der Salomouen stattfindenden Kopfdjagen, auf den Shortlandsinseln müssen außerdem die Reichen einige ihrer Sklavensöhne in den Tod folgen<sup>1)</sup>. Sehr dankenswert ist die Mitteilung einiger Sagen und Fabeln, von denen die eine, von den beiden Hauptdingen, in mancher Hinsicht an unsere Märchen erinnert: Der jüngere, hübsche, von Hause fortgeschickte, erhält aber sein Dank für seine Zuverlässigkeit gegen ein altes Weib und einen alten Hauptling von dem letzteren drei Kokonüsse, die sich denn in drei hübsche, junge Mädchen verwandeln. Als der ältere, häßliche Bruder das erfährt, läßt er sich von dem jüngeren den Weg beschreiben; da er aber unliebenschaftig ist, erhält er drei alte Nüsse, die sich dann auch in drei alte, häßliche Weiber verwandeln. Natürlich hat er nun zu dem Schaden auch noch den Spott.

Bedauern kann man, daß Ribbe diese Erzählungen nicht im Originaltext notiert hat. Es kann gar nicht oft genug betont werden, daß solche Texte mit Uebersetzungen für die Wissenschaft einen weit größeren Wert besitzen als die Aufzählung von Wörterverzeichnissen, wie sie auch Ribbe liefert. Besonders solche unvollständigen Listen, wie die von 63 Worten in 30 Sprachen, sind ja recht nett und gewiß nicht uninteressant, aber kein Sammler sollte vergessen, daß Kenntnis von Worten ohne solche von inneren Bau der Sprache keine fruchtbare Vergleichung gestattet. Drei Sätze sind bisweilen wertvoller als eine ganze Reihe von Vokabeln. Und in zwei Jahren läßt sich eine so vollkommene Anignung der Sprache ermöglichen, daß die Aufzeichnung sogar längerer Texte angeht.

Ich behre hiermit die Seite, auf der das Buch unseren heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt. Ihm mangelt die wissenschaftliche Auffassung der Sammelstätigkeit, die Kenntnis der Probleme in den gewählten Wissensgebieten. Bisweilen wird in eine auf Vollständigkeit gerichtete Sammelstätigkeit dem Bearbeiter ein abgerundetes Bild geben können; so ist es mit Hilfe von Ribbes Sammlungen möglich, die ganze Gruppe

<sup>1)</sup> Auf Rabiana soll sogar die Hauptfrau in  $\frac{1}{2}$  der Fälle dem Gatten eher kurz oder lang nachfolgen.

von Neu-Georgien mit Vella-Lavella und den anliegenden Inseln zu einem in sich wohl abgeschlossenen Kulturbezirk zusammenzufassen. Anders die Shortlandinseln; alle Nachrichten bunten, daß ihre Bevölkerung stark gemischt ist. Infolgedessen erhebt sich die Frage, zwischen welchen Stämmen sich die Mischung vollzogen hat, und welche Kulturelemente der einen, welche der anderen (heute entlossenen) sind. Über die Beantwortung der ersten Frage können wir ja in diesem Falle kaum zweifelhaft sein; denn auf der einen Seite deuten zahlreiche Anzeichen auf Beziehung zum südlichen Bougainville, auf der anderen einige, wenn auch geringere, auf Choiseul. Auch Ribbe erweist das durch die wichtige Bemerkung, daß die Shortlandklassen teils in Bougainville, teils auf Choiseul Angehörige hatten. Dagegen tauchen wir in bezug auf die zweite der oben gestellten Fragen noch recht im Dunkeln, da wir weder vom Süden noch Inneren von Bougainville, noch von Choiseul eine ausreichende Kenntnis besitzen. Und gerade hier hätte ein mit den Problemen des Gebietes vertrauter Sammler einsetzen müssen. Erzwungen wird die Scheidung noch dadurch, daß auf der einen Seite Choiseulkultur sich in Südost-Bougainville, so in Tolboroi, geltend macht, während andererseits sogar die sehr expansive Inskultur ihre Ausläufer bis zu den Shortlandsinseln hinabsendet. Einige Hilfe gewährt die Bemerkung, daß die beiden fraglichen Kulturen zu anderen, besser bekannten in Beziehung stehen. Ribbe berichtet, daß den Shortlandforschern in der Regel zwei Hauptlinge vorstanden. Ähnliches ist aus dem Norden von Neu-Britannien bekannt. Ethnographisch ist es das Süd-Bougainvilleelement, das einen unverkennbaren Zusammenhang mit der Neu-Britannienkultur aufweist; ich erinnere an die gedachten Ähnlichkeiten beider Gegenden, die sich häufig nur nach gewissen Einzelheiten der Technik auseinander halten lassen; so gehört auch eine den Salomonen sonst fremde Keuleform sicher dem Süden oder Inneren Bougainvilles an, die, obwohl äußerlich etwas abweichend, doch in all ihren Elementen unverkennbare Familienähnlichkeit mit den bekannten Tanzklingen der Ganellehallinseln zeigt. Auf der anderen Seite steht Choiseul innerhalb der Gesamtgruppe unzweifelhaft in einem näheren Zusammenhang mit Isabel, wie z. B. die gemeinsame Schild- und Keuleform erkennen läßt; ein einziger vergleichender Blick zeigt, daß etwa die übliche Ruderform der Shortlandsinseln einwandfrei in diesen Kulturkreis gehört, während freilich auch der Süd-Bougainvilletypus vereinzelt und nicht ganz rein vorkommt. Leider bleibt neben beiden Bestandteilen ein nicht unbetracht-

licher Rest, der sich mit unserer bisherigen Kenntnis nicht analysieren läßt.

Die Shortlandsinseln sind nicht das einzige Beispiel dafür, daß ethnographische Distrikte ineinander übergreifen; die kubuen Fahrten der Kopfjäger haben wohl den Hauptanteil an diesen Beziehungen. Am deutlichsten ist das Anfindere der Rubianskultur in Rubians auf Choiseul, doch sind Spuren davon auch auf Isabel unzweifelhaft; ausnehmend haben die Isabelteiler sogar einzelne Rubiansornamente hinübergenommen, die sie dann mit unvergleichlich größerem Kunstsinne mit einem Gefühl für Symmetrie verwendeten, wie es nicht vielen Melanesiern eigen, dafür aber ein Hauptcharakteristikon polyneischer Kunst ist. Daß solche Durchdringungen die Choiseul erschweren, ist klar, zumal da nugehört auch Isabel- und Choiseulelemente in Rubiana auftreten, eine Folge der von Ribbe erwähnten Verschiebung zahlreicher Isabel- und Choiseulsklaven nach Rubiana.

Wenig brauchbar ist leider ein Teil der Abbildungen. Ich hatte den Eindruck, als ob der Konnex des Autors mit dem Zeichen nicht eng genug gewesen sei; wenn man sieht, wie an Stellen, wo unzweifelhaft eine Ellipse hingehört, vermutlich aus einer flüchtigen Skizze des Autors ein Zweck stelen geblieben ist, so darf man wohl zweifelhaft sein, ob die gegebene Form in allen anderen Fällen ganz einwandfrei ist. Nicht selten läßt sich den Abbildungen in keiner Weise ansehen, ob sie nach einer Photographie oder nach einer Zeichnung hergestellt sind, und auch die unzweifelhaft nach Photographie angefertigten sind so stark überzeichnet, daß z. B. der körperliche Habitus der Kängehorenen oft gar nicht erkennbar ist. Immerhin hätte eine nähere Beziehung des Originals — ob Photographie, Zeichnung, Skizze — eine Beurteilung erleichtert.

Selbstverständlich konnte hier nur einiges aus dem reichen Inhalt des Buches herausgehoben werden, und wenn ich auf die Mängel aufmerksam machen mußte, so geschah es, wie ja schon anfangs bemerkt, gewiß nicht, um Ribbes Verdienste zu schmälern. Sie können aber für alle, die an dem Gelingen der Wissenschaft ein Interesse haben, eine Mahnung sein: Es ist höchste Zeit, daß die ethnologische Erforschung der Südsee aufhört, auf die Tätigkeit von Männern angewiesen zu sein, die, zum Teil in erster Linie ganz anderen Zwecken dienend, ohne genaue Kenntnis der einschlägigen Fragen, mit dem besten Willen und Eifer nicht instande sind, das zu leisten, was zur Lösung unserer tiefsten Probleme notwendig ist.

F. Graebner.

## Aus der russischen Literatur.

Von

Prof. Dr. L. Stieda Königsberg i. Pr.

Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der Universität zu Moskau.

III. Jahrgang 1902. Moskau.

Redigiert von A. A. Iwanowski. 4 Bände, IX—XII.

III. Jahrgang, Nr. 1 (IX. Bndh.) Moskau 1902. (S. I—153.)

1. E. J. Lusenko: Zur anthropologischen Charakteristik des altaischen Volksstammes der Telegeneten. Mit 11 Zeichnungen. S. 1—29.

Der Verfasser war vor fünf Jahren in Altai und hatte daselbst Gelegenheit, sowohl anthropologische Messungen an Lebenden anzustellen, als auch eine Anzahl Schädel zu sammeln. Die Schädel, 95 an der Zahl, sind dem anthropologischen Museum der Moskauer Universität übergeben. Der Verfasser ist bisher noch nicht im Stande gewesen, alles Material zu verarbeiten — er hielt aus hier nur einen kleinen Teil.

Als Einleitung liefert der Verfasser einige Bemerkungen über die Stellung der Telegeneten unter den Volksstämmen des Altai.

N. Aristow teilt alle Eingeborenen des Altai auf Grund der größeren oder geringeren Reinheit ihrer Sprache in 1. die reinen Tärken, 2. die turkisierten Samojeden und Jenseitsizen. Zur zweiten Kategorie rechnet er eine Reihe von Volksstämmen, nämlich die sog. „Tschernewje“, d. h. die in den nördlichen Vorbergen des Altai wohnenden. (Es sind diese Vorberge mit dichtem Wald — russisch „Tschern“, bedeckt, daher werden diese Volksstämme Tschernewje genannt.) Zu diesen Tschernewje gehören die Kumdindinen, die Tschernatataren und die Schoren. Das größte Interesse gewähren die Tschernatataren, die im Norden des Telekesees wohnen und die nächsten Nachbarn der Telegeneten sind. Die Tschernatataren sind von N. M. Jadrinzew anthropologisch untersucht, und das Hauptergebnis ist, daß sie keine mongolischen Eigenschaften haben, daß sie nach ihrem Kephalex zur Langköpfigkeit neigen, was sonst unter den Altai-stämmen südlich des Telekesees nicht beobachtet ist.

Die reinen Tärken des Altai, die an dem Oberlauf der Bija und des Katan leben, teilen sich

in 1. die eigentlichen Altaiaren, die gewöhnlich als Altaikalmaeken bezeichnet werden, 2. die Telegeneten, im Basin der Tschaja, Archyt und Iaschkans, 3. die Teless im Norden des Baschkans, insbesondere am Tschalyschman und am Telekesees. Die Ethnographen sind noch nicht einig, ob die Teless ein selbständiger Stamm des Altai oder nur eine örtliche Unterabteilung sind. Von Potanin werden die Teless für ein selbständiges Altaivolk gehalten. Aristow dagegen erklärt die Teless für den Zweig eines Volksstammes ganz anderer Herkunft als die Telegeneten. Die Telegeneten seien von einem Stamm Tele (oder von den Uiguren) abzuleiten, die Teless dagegen von einem Stamm Tunkja. Der Verfasser neigt zur Ansicht Aristows; die Teless und die Telegeneten auseinander zu halten ist sehr schwierig, sie sind zu sehr miteinander vermengt.

Sehr oft werden alle Altaiaren als „Kalmäcken“ bezeichnet, wohl deshalb, weil sie gewisse mongolische Züge aufweisen; sie gehören aber, wie die anderen Turkvölker, zur mongolischen oder besser zur asiatischen Rasse. Allein man ist zu dieser Bezeichnung „Kalmäcken“ nicht berechtigt, weil die Tschernatataren und die anderen Volksstämme nichts Mongolisches an sich haben, und ferner, weil aus dieser Bezeichnung leicht die ethnographische Identität der Altaiaren und Kalmäcken abgeleitet werden konnte. Man nennt daher fälschlich die Altaiaren turkisierte Mongolen, trotz der Reinheit und des Alters der von ihm gebrauchten Turk-Sprache.

Zwischen den Telegeneten und den eigentlichen Kalmäcken besteht keine Stammesverwandtschaft, — das soll durch die hier mitgeteilte kranziologische Skizze dargetan werden.

Die untersuchten Telegenetenschädel sind hauptsächlich an zwei Stellen, am Ulsagan und am



Tschulysehmän, gesammelt; doch 10 Stück stammen von der Tschuja und von Telezkersee; 7 sind durch Jadrinzew dem Museum geschenkt. Das Material ist daher nicht vollkommen gleichartig. Der Verfasser gibt die Maße in Tabellen, die durch Kurvenzeichnungen erläutert werden. Wir fassen hier die Ergebnisse zusammen.

Der Kopflindex der 83 Schädel ist im Mittel 86,61. Treunt man die beiden Hauptgruppen voneinander, so ist der Kopflindex für die Ulagenschädel 86,14 — für die Tschulysemaerschädel 84,88 und für eine Weiberschädel vom Telezkersee sogar nur 83,96.

|                   | Ulagan |    |      | Tschulysehma |    |      | Telezkersee |    |      | Jadrinzew |    |      | Summa |    |      | Proz. |
|-------------------|--------|----|------|--------------|----|------|-------------|----|------|-----------|----|------|-------|----|------|-------|
|                   | m.     | w. | zus. | m.           | w. | zus. | m.          | w. | zus. | m.        | w. | zus. | m.    | w. | zus. |       |
| Subdolichokephale | 1      | —  | 1    | 1            | —  | 1    | —           | —  | —    | —         | —  | —    | 2     | —  | 2    | 2,41  |
| Mesokephale       | —      | —  | 2    | 2            | —  | 2    | 1           | 2  | 3    | —         | —  | —    | 3     | 2  | 5    | 6,02  |
| Subbrachykephale  | 3      | 4  | 7    | 6            | 5  | 11   | —           | —  | —    | 1         | —  | —    | 10    | 9  | 19   | 22,89 |
| Brachykephale     | 13     | 13 | 26   | 7            | 12 | 19   | 4           | 2  | 6    | 3         | 3  | 6    | 27    | 30 | 57   | 68,67 |

Wirkliche Dolichokephale gibt es nicht unter den Telengeten; die Zahl der Subdolichokephale und Mesokephale ist sehr gering — dagegen ist die Zahl der Subbrachykephale und Brachykephale sehr groß, mehr als 90 Proz.

Es scheint, daß dem brachykephalen Hauptelement sich ein dolichokephales Element in sehr geringem Maße beigemischt hat, und zwar nimmt das brachykephale Element von Süden nach Norden zu. Im Süden sind kurzköpfige Mongolen und Kirgisen die Nachbarn der Telengeten, im Norden dagegen die Tschernataran, deren Stellung im System noch unklar ist. Trotz ihrer reinen Turko- oder Kirgisien sind sie sehr gemischt. Unter den 16 Tschernataran, die von Jadrinzew gemessen worden sind, finden sich Dolichokephale wie Brachykephale reichlich; erstere überwiegen (4 dolichokephale, 2 subdolichokephale, 3 mesokephale, subbrachykephale, 4 brachykephale).

Um weiter den Unterschied zwischen den beiden Schädelgruppen zu analysieren, prüft der Verfasser die einzelnen Gruppen mittels der Berechnung des Oszillationsindex nach Hering und der Idealkurve nach Steud. Das Ergebnis ist, daß es sich nicht um zwei scharf unterschiedene Typen handelt, sondern um verschiedene Gemische; unter den Schädeln von Tschulysehma ist die Beimischung eines nicht brachykephalen Elements bedeutend.

Der Verfasser hat ferner von 204 erwachsenen Männern den Kopflindex bestimmt.

Er gibt eine Tabelle, in der die Zahlen entsprechenden acht verschiedenen Geschlechtern (Stämmen) geordnet sind. Ich gebe nur die Hauptzahlen wieder.

| Kopflindex      | Anzahl |
|-----------------|--------|
| 75,37 bis 77,77 | 1      |
| 77,78 " 80,00   | 9      |
| 80,01 " 82,00   | 16     |
| 82,01 " 84,00   | 27     |
| 84,01 " 86,00   | 36     |
| 86,01 " 88,00   | 34     |
| 88,01 " 90,00   | 28     |
| 90,01 " 92,00   | 14     |
| 92,01 " 97,00   | 4      |

Das hieraus (204) gewonnene Mittel ist 86,06; es überwiegt das von den männlichen Schädeln gewonnene Mittel 84,88 um 0,88, d. h. etwa um 1. Der Kopflindex übertrifft noch die geläufige Anschauung, den Schädelindex um 1,2 bis 2,1, jedenfalls um eine Einheit.

Welche Stellung nehmen die Telengeten des Altai unter den übrigen Turkvölkern ein? Die Angehörigen der Turkstämme übertreffen in ihrer Kurzköpfigkeit noch die mongolischen Kalmlücken und Burjaten. Zu erinnern ist auch daran, daß die Turkvölker keineswegs einen einheitlichen anthropologischen Typus aufweisen, sondern im Gegenteil in der Richtung des Kopflindex große Unterschiede zeigen. Im allgemeinen kann man sagen, daß diejenigen Turkvölker, deren Kopflindex geringer als die durchschnittliche Norm ist, auch vom Standpunkt der Gesichtsbreite und Sprache nicht zu den reinen Turken gerechnet werden können.

Als Ausgangspunkt oder Zentrum mit einer hohen Brachykephalie von 85 bis 89 (Kopflindex ohne Reduktion) kann man die Sajan- und Altai-gebirgsbewohner (Sojoten, Altai-, Telemeten, Telesen, die Kirgisen, die Nogaien, im Kalmlücken und die Tarantischen ansehen. Je weiter nach Westen findet bereits in Osteuropa ein Sinken der Brachykephale von 85 bis 82 — offenbar infolge einer Beimischung anderer Elemente — statt.

Die Telengeten gehören jedenfalls zum neutralen Gebiet; sie stehen in einer Gruppe mit den Sojoten und Kirgisen, und zwar stehen sie dem reinen Typus der Turkvölker näher, als ihre nächsten Verwandten, die Mongolen.

Der Verfasser bespricht nun weiter ausführlicher einige andere Maße des Schädels, insbesondere des Gesichts an der Hand verschiedener Tabellen; ich fasse die Hauptergebnisse kurz zusammen:

Der größte Gesichtsbreitenmesser (Gesichtsbreite) ist im Mittel 130 mm, bei männlichen Schädeln etwa 6 mm bedeutender als bei weiblichen.

Kleinere Maße bis 129 mm finden sich bei 2 Proz., mittlere " 130 bis 136 mm " " 30 Proz., große " 137 mm und darüber finden sich bei . . . . . 68 Proz.

Das Maß von 139 mm ist sehr beträchtlich, es ist um 3 bis 4 mm größer als das Maß bei den typischen westlichen Mongolen und Torguten, bei denen es 135 bis 136 mm beträgt.

Ordnet man, wie Charasin es getan, alle Volkstämme nach ihrer Gesichtsbreite, so zeigt sich folgende: die größte Breite haben einerseits die Kuldshakmlücken und die Torguten, andererseits die Bukejewkirgisen, die Usbeken, ein Teil der Baschkiren, die Turkmennen, Karakirgisen. — Eine mittlere Breite besitzen einerseits die Kalmlücken-Tschacharen, die Arghemontinen, die Turfan und die Chinesen, andererseits die Tarantischen, die Kirgisen der drei Horden, die Altair Jadrinzew und ein Teil der Usbeken und der Baschkiren. — Kleine Maße der Gesichtsbreite kommen unter den Mongolen wie unter den Turkvölkern fast gar nicht vor, sie sind eine Eigentümlichkeit der sog. kaukasischen Völker. Charasin meint, daß bei den Turkvölkern die Gesichtsbreite absolut bedeutender sei als bei den Mongolen; dem Verfasser scheint dieser Schluß auf Grund des Schädelmaterials nicht ganz berechtigt. Man kann, wie Hecker in seiner Arbeit über die Jakuten sagt, eher behaupten, daß das Vorrücken des Jochbogens

bei den Türkvölkern ebenso beträchtlich ist als bei den Mongolen, bei einzelnen Völkern, z. B. bei den Jakuten, sogar beträchtlicher.

Die Gesichtslänge. Der Abstand der Nasenwurzel vom Alveolarpunkt erreicht bei den Telengeten dieselbe Größe, wie bei den Torguten, Sojoten und Kirgisen, er beträgt im Mittel 71 mm (bei männlichen Schädeln 72,3, bei weiblichen Schädeln 69,6 mm); das Maß ist nach Brocas Klassifikation als ein großes zu bezeichnen; kleine Maße fehlen ganz.

Das Verhältnis der Gesichtslänge zur größten Gesichtsbreite ist 51; es ist im Gegensatz zum absoluten Maße der Gesichtsbreite also bei den Telengeten geringer als bei den Torguten, bei denen es 57 beträgt.

|                            | Bei Männern | Bei Weibern | Summa | Proz. |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| Kleine Maße bis 63 . . .   | 27          | 28          | 55    | 80,88 |
| Mittlere Maße bis 57 . . . | 8           | 3           | 11    | 16,18 |
| Große Maße über 57 . . .   | -           | 2           | 2     | 2,94  |

Die Maße der Nase und der Nasenindex.

|                           | Männl.<br>mm | Weibl.<br>mm | Mittel<br>mm |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Die Länge der Nase . . .  | 54,7         | 51,9         | 53,2         |
| Die Breite der Nase . . . | 27,6         | 24,9         | 26,2         |
| Nasenindex . . . . .      | 49,30        | 49,20        | 49,25        |

Die Maße unterscheiden sich nur sehr wenig (etwa 1 mm) von den entsprechenden Maßen an den Schädeln der Mongolen, Sojoten und Kirgisen. Wie bei den typischen Kalmücken ist die Nase stark in der Breite und sehr gering in der Länge entwickelt.

In betreff des Spatium interorbitale zeigt sich kein Unterschied der Telengeten von den Mongolen. Die Entfernung beträgt bei Männern 24,7, bei Weibern 23,8, im Mittel 24,3 mm.

Die Schädelhöhe ist bei den Telengeten 129 bis 130 mm; sie überschreitet die Höhe des Schädels der Mongolen, insbesondere der Torguten von Tarbagatai; dementsprechend ist der Längshöhenmaß größer, im Mittel 74,1 (bei Männern 73,9, bei Weibern 74,5); die Telengeten neigen hiernach zur Hypsikephalie, während sie im allgemeinen orthocephalen Mongolen eher zur Platykephalie hängen.

Der Höhenbreitendurchmesser des Schädels, wie bei den Mongolen im allgemeinen, so auch bei den Telengeten überwiegen die breiten und niedrigen Schädelformen. Deshalb ist auch — abgesehen von den größten Höhenmaßen — bei den Telengeten das Verhältnis zwischen der Höhe und Breite dasselbe wie bei den Mongolen und Kalmücken.

Was die Maße der Schädelbögen betrifft, so stelle ich nur die Zahlen hin:

|                             | Männl.<br>mm | Weibl.<br>mm | Mittel<br>mm |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Querbogen (frontal) . . .   | 311,4        | 305,3        | 308,4        |
| Senkr. Bogen (sagittal) . . | 358,5        | 351,1        | 354,8        |

Die Maße des Querbogens sind größer als bei den Kalmücken; die Maße des senkrechten Bogens (sagittal) sind kürzer als bei den Mongolen, infolge des geringen Längslängenmessers.

Der Stirnindex ist geringer als bei den Mongolen, er beträgt bei männlichen Schädeln 79,1, bei weiblichen 79,4, im Mittel 79,4.

|                             | Männl. | Weibl. | Summa | Proz. |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| Mikrosom bis 83,00 . . .    | 31     | 36     | 67    | 80,7  |
| Mesosom 83,01 bis 87,00 . . | 7      | 4      | 11    | 13,2  |
| Macrosom 87,01 u. darüber   | 3      | 2      | 5     | 6,1   |

In betreff des Orbitalindex ist nichts an er unterscheidet sich nicht von dem der Mongolen; es sind auch bei den Telengeten die Magasmen aberwiegend, wie bei den Sojoten und Kirgisen.

Die Schädel der Telengeten haben mancherlei Eigentümlichkeiten mit denen der Kalmücken gemein, aber sie unterscheiden sich doch von ihnen. Man nennt heute trotzdem die Telengeten immer noch Kalmücken, ganz abgesehen davon, daß die Telengeten eine Turksprache reden, die deutliche Kennzeichen des Altertums trägt. Woher dieser Widerspruch? Er ist offenbar nur durch die Ähnlichkeit des äußeren Ansehens zu erklären. Der mongolische Typus — die dunkeln Haare und Augen, das breite Gesicht, die schief stehenden Augenliderpalpen — überwiegt entschieden unter den Telengeten; doch findet sich unter ihnen, insbesondere am Tschelischman, ein anderer, nicht mongolischer Typus.

Woher dieser Typus stammt, ist vor der Hand nicht nachweisbar.

2. **Aristow, N. A.:** Ethnologisches über den Pamir und die angrenzenden Gebiete, nach alten, insbesondere chinesischen, historischen Quellen. Fortsetzung: Ethnologisches über die südlich an den Pamir grenzenden Gebiete. (S. 30—48).

3. **A. Roschdestwanski:** Ein Beitrag zur Anthropologie der Weißrussen (Bjeloruss) im Kreis Sluzk des Minsker Govy. (S. 43—57).

Das Gebiet des Kreises Sluzk — wohl auch die Ukraine des Minsker Govy, genannt — hat eine etwas höhere Lage als das übrige sehrumpfige Gebiet des Minsker Govy, es finden sich hier zahlreiche Kurgane und Grabhügel aus alter Zeit, deren Ursprung unbekannt ist. Der slawische Stamm der Dregowitschen ist während des VI. bis VIII. Jahrh. n. Chr. hier eingewandert, aber erst im XII. Jahrh. vernimmt man etwas von Sluzker Fürstentum. Die alte Bevölkerung in steter Berührung, einerseits mit Slaven, Polen, Kleinrussen, Großrussen, andererseits mit westslawischen Stämmen, Finnen, Litauern, Juden — der ostslawische Weichsel der Regierung (Litauern und Polen) mühen natürlich auf den alten Stamm der Dregowitschen einzuwirken. Die Beziehungen der Weißrussen (Bjeloruss), worunter man amnähend die Bevölkerung der heutigen Gouvernements Mogilew, Witebsk, Minsk und zum Teil Smoleusk versteht, ist weit späteren Datums. In anthropologischer Beziehung hat die Bezeichnung „Weißrussen“ nur bedingungsweise Geltung.

Der Autor hat 150 Individuen anthropologisch untersucht, nämlich 74 Erwachsene (57 Männer und 17 Weiber), 76 Kinder (59 Knaben und 17 Mädchen). Die Zahlen, soweit sie sich auf die Knaben und Mädchen beziehen, lasse ich bei Seite.

In betreff der 57 Männer ist zu bemerken, daß es Leute im Alter von 22 Jahren und darüber gewesen sind.

Mit Rücksicht auf die immerhin doch nur geringe Zahl der Beobachtungen greife ich nur einige Maße aus der großen Anzahl heraus, die der Verfasser mitteilt und mit den entsprechenden Zahlen anderer Autoren (N. Jantschuk, K. Ikow und E. Kiehbels) vergleiche.

|  | Min.<br>mm | Max.<br>mm | Mittel<br>mm |
|--|------------|------------|--------------|
| Körpergröße . . . . .  | 1529       | 1730       | 1648         |
| Horizontaler Kopfumfang . . . . .                            | 522        | 588        | 554          |
| Längsdurchmesser [ des Kopfes<br>Querdurchmesser ] . . . . . | 171        | 193        | 185          |
| Nasindex . . . . .   | 135        | 163        | 151          |
| Brustumfang . . . . .  | 74,50      | 89,53      | 81,50        |
| Brustumfang . . . . .  | 761        | 989        | 890          |
| Länge der Arme (v. Aeromion<br>gemessen) . . . . .           | 675        | 802        | 738          |
| Länge der Beine (v. Trochanter<br>maj. gemessen) . . . . .   | 761        | 935        | 850          |

Die auf die 17 Weiber sich beziehenden Zahlen lasse ich fort, ebenso die mit den Zahlen der eben genannten Autoren angestellten Vergleiche.

4. Felix Kon (Cohn?): Zum 25jährigen Bestehen des Museums in Minussinsk (S. 58—61) mit zwei Bildern im Text.

In Minussinsk, einer Stadt am Jenissei (Gouv. Jenisseisk, Sibirien), an Nordabhang des sajanischen Gebirges gelegen, ist durch die außerordentlich energischen Bemühungen des dortigen Apothekers Nikola Michailowitsch Martjanow im Jahre 1877 ein Museum gegründet worden, dessen 25jährige Bestehen i. J. 1902 gefeiert werden konnte. Bei der Gründung bestand das Museum aus drei Abteilungen, einer naturhistorischen, einer technologischen und einer ethnologischen; aus der letzteren entwickelte sich allmählich eine anthropologische und eine archäologische (seit 1894), später, 1899, auch eine ethnographische. Zu den besonderen Förderern der Aufgaben des Minussinker Museums gehört D. A. Klementz. Das Museum befindet sich in einem bedeutenden stattlichen Gebäude. (Vgl. Abbildung S. 89.)

Am 11. September 1902 gab die Stadtverwaltung ihre Einwilligung zur Sammlung eines „anatomischen Kapitels“ auf den Namen Martjanow. Die Zinsen dieser Martjanowstiftung sollen zu Forschungsreisen, sowie zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten dienen.

Es sind bereits einige wertvolle Arbeiten, zu denen das Minussinker Museum das Material lieferte, veröffentlicht worden.

Dem Anfatze ist das Portrait des Gründers N. Martjanow beigelegt.

5. Vorträge, gehalten in der Sitzung der anthropologischen Abteilung am 3. Januar 1902 bei Gelegenheit der VIII. Versammlung der Gesellschaft russischer Ärzte zum Gedächtnis von N. J. Pirgow. (S. 62—134.)

- D. N. Anutschin: Über die Aufgaben und Methoden der Anthropologie. (S. 62—88.)
- P. Minakow: Die Bedeutung der Anthropologie für die Medizin. (S. 89—101.)
- W. W. Worobjew: Die anthropologische Untersuchung der slawischen Bevölkerung Rußlands. (S. 102—111.)
- A. Iwanowski: Die anthropologische Erforschung der nicht russischen Bevölkerung Rußlands. (S. 112—134.)

Alle vier Abhandlungen haben den Zweck, die russischen Ärzte sowohl mit den Aufgaben und Methoden der anthropologischen Forschung, als auch mit der

Wichtigkeit und Bedeutung der Ergebnisse bekannt zu machen. Von Seiten der Ärzte kann die anthropologische Forschung sehr erheblich gefordert werden; Ärzte sind leichter als andere Personen in der Lage, anthropologische Untersuchungen anzustellen. Den beiden letzten Vorträgen von Worobjew und Iwanowski sind sehr genaue und umfassende Literaturangaben beigelegt. Worobjew liefert ein Verzeichnis der russischen und nichtrussischen Literatur in betreff der Slaven (S. 106 bis 111); Iwanowski liefert ein sehr genaues Verzeichnis der Literatur über die nicht-russische Bevölkerung Rußlands (S. 119 bis 134).

6. Nekrologe: a) Alexei Jakowlewitsch Koschewnikow, Professor der Nervenkrankheiten an der Universität zu Moskau, geboren 1836 in Kjaan, gestorben den 10. Januar 1902. Auf die wissenschaftlichen Verdienste des Verstorbenen in betreff der Nervenpathologie kann hier nicht eingegangen werden, doch muß eine Tatsache aus dem Leben dieses Gelehrten hier rühmend hervorgehoben werden. Koschewnikow war Direktor zweier Kliniken, der Klinik für Nervenkrankheiten und der Klinik für Geisteskrankheiten. Er errichtete 1902 in der Klinik für Nervenkrankheiten ein neurologisches Museum, das erste dieser Art in Rußland, doch nicht allein das, er schenkte dem Museum die Summe von 3000 Rubel (etwa 600 Mk.) mit der Bestimmung, daß die Rente dieses Kapitals zum Unterhalt des Museums verwendet werde. Im Jahre 1897 ließ Koschewnikow einen umfangreichen illustrierten Katalog drucken. Das Museum enthält bereits damals 1029 Gegenstände. Die sechs Abteilungen des Museums umfassen: die normale Anatomie, die Bildungsgeschichte des Nervensystems des Menschen, die vergleichende Anatomie, Anthropologie und Klinik. Hier erwähnt werden sind 208 Tierhirne, 129 Rausenschädel, eine große Anzahl Gräber Schädel, deformierte Schädel aus Kertsch, 85 Verbrecher Schädel. Koschewnikow hat noch kurz vor seinem Tode eine größere Gedächtnis zur Vervollständigung des Museums dargebracht. Das Museum wird auf Anordnung der Universität Moskau nach dem Namen des Begründers genannt.

(W. W. Worobjew.)

b) Jean Charles Marie Letournaux, berühmter französischer Anthropolog, geboren 11. September 1831, gestorben 8. Februar 1902. (A. Mazimow.)

c) F. D. Nefedow. Philipp Diomidowitsch Nefedow, gestorben am 12. März 1902. Nefedow war ein außerordentlich tätiges Mitglied der Moskauer anthropologischen Gesellschaft, ein emporwärtiger Sammler und ein heiliger Schriftsteller auf dem Gebiet der Anthropologie und Ethnographie. Er hat die Ergebnisse seiner im Jahre 1878 begonnenen Ausgrabungen (Kurganaufdeckungen in den Gouvernements Rjasan, Wladimir, Kostroma, Suawra, Ufa, Orenburg und in der Krim), mehr als 300 Schädel, dem anthropologischen Museum zu Moskau geschenkt, während die archäologischen Funde dem historischen Museum einverleibt sind. Die meisten Berichte sind in den Nachrichten der Gesellschaft abgedruckt. Nefedow machte seine Studienreisen größtenteils auf eigene Kosten. Im Jahre 1895 verlieh ihm die Gesellschaft in Anerkennung seiner Verdienste die auf den Namen des Großfürsten Sergei Alexandrowitsch gestiftete Prämie.

Auch mit der Moskauer archäologischen Gesellschaft stand Nefedow seit dem Ende der 90er Jahre in naher Verbindung; manche seiner umfangreichen Berichte sind in den „Materialien zur Archäologie der 60 Jahre des Gouvernements“ erschienen. Die reiche archäologische Ansammlung ist von A. Anutschin verarbeitete. (A. A. Iwanowski.)

## 7. Kritik und Bibliographie. (S. 140—146.)

a) Nikolai Charusin. Ethnographie. Vorträge, gehalten an der Universität zu Moskau. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Wera und Alexei Charusin. I. Lief. I. Allgemeiner Teil. 2. Materielle Kultur. St. Petersburg 1901. X und 343 S. (bespr. von Maximow.)

b) W. A. Lewitzki: Zur Frage nach dem physischen Zustande der Bevölkerung des Podolischen Kreises. (Statistische Nachrichten des Govv. Moskau. Bd. IX. Materialien zur Bestimmung des physischen Verhaltens der Bevölkerung des Govv. Moskau 1901, bespr. von Iwanowski.)

c) S. M. Delizyn, Prof.: Zur Kasuistik der Anomalien der Arteria mediana antibrachii. (Annalen der russischen Chirurgie 1901. 3. Buch, bespr. von R. Weinberg.)

d) B. P. Batkini. Der Einfluß künstlicher Nähte des Schädels auf das Wachstum und die Entwicklung des Schädels bei jungen Tieren. (Neurologischer Bot. Bd. IX. Buch 3 u. 4. Kasan 1901, bespr. von W. W. Worobjew.)

e) Dr. J. J. Pantjuchow: Die hentigen Leaghinen. (Tiflis 1901, bespr. von Iwanowski.)

f) A. N. Džatschokow-Tarasow: Die Abadschen. Eine historisch-ethnographische Skizze. (Schriften der kasp. Abteilung der K. russ. Geogr.-Ges. Bd. 22, Lief. 4, bespr. von A. Iwanowski.)

## 8. Nachrichten und Bemerkungen. (S. 146—149.)

Die Anthropologie auf dem XI. Kongreß russischer Naturforscher und Ärzte zu St. Petersburg. Die ethnographische Abteilung des russ. Museums Kaiser Alexander III. Die Tätigkeit der russischen Anthropologischen Gesellschaft zu St. Petersburg i. J. 1901. Die anthropologische Abteilung während des im Januar 1902 tagenden Fergowkongresses. Die Sitzungen der anthropologischen Abteilung im Dezember 1901, sowie im Januar, Februar und März 1902.

## III. Jahrgang, Nr. 2, X. Buch. Moskau 1902.

(S. 1—114.)

## 9. N. L. Seeland: Über das Temperament.

Der Verfasser geht davon aus, daß die verschiedenen Formen des Temperaments von verschiedenen physischen Eigenschaften begleitet sind. Er hat darauf hin bereits 1892 eine Anzahl (200) nach dem Tempe-

rament gruppierte Personen anthropologisch untersucht. Die Ergebnisse sind in Kurze in den Verhandlungen des internationalen Kongresses in Moskau 1893: „Le temperament au point de vue psychologique et anthropologique“ mitgeteilt und später ausführlich in russischer und deutscher Sprache („Gesundheit und Glück“, Dresden-Neustadt, 265 S., 1896) veröffentlicht worden. Der Verfasser hat seine Untersuchungen fortgesetzt und bietet uns hier seine Resultate. Der Verfasser ist mittlerweile verstorben. Siehe den Nekrolog im dritten Heft.

Als Temperament bezeichnet er eine bestimmte organische Anlage, die sich kund gibt:

a) in einer bestimmten Geistesverfassung;  
b) in einer bestimmten Färbung der äußeren Eindrücke, die der Geistesverfassung entspricht;

c) in dem Einfluß der Geistesverfassung auf die Äußerungen des Charakters und Willens;

d) in der organischen instinktiven Anlage zu bestimmten Arten von Bewegungen;

e) in bestimmten Eigenschaften des Körperbaues, die in bekannter Weise auf die Erscheinungen des gesunden wie kranken Lebens einwirken.

(Ich meine, man kann ohne weiteres bei der altbekannten Erklärung des Temperaments stehen bleiben: Temperament ist die Gemütsart, soweit sie durch den Organismus des Körpers bedingt ist. Ref.)

Der Verfasser klassifiziert die Temperaments in folgender Weise:

1. Das fröhliche Temperament, das man sonst das sanguinische so nennen pflegt; man hat dabei zu unterscheiden folgende Formen:

a) das fröhliche, aber bedingungsweise starke Temperament;

b) das fröhliche und starke Temperament;

c) das helle Temperament, der höchste Grad des fröhlichen Temperaments.

2. Das ruhige Temperament läßt zwei Unterarten unterscheiden:

a) das phlegmatische oder das ruhige mittlere Temperament;

b) die eigentlich ruhige Form.

Der höchste Grad des fröhlichen Temperaments, das sogenannte helle Temperament ist als eine Vereinigung des fröhlichen mit dem ruhigen Temperament anzusehen.

3. Das mittlere Temperament.

| I. Serie<br>Temperament  | Anzahl | Temperatur der Achselhöhle | Pulsfrequenz | Atemfrequenz | Gesichtsfarbe | Gehörsehärte in cm | Gesichtshöhe in cm | Grad der Empfindung in mm <sup>2</sup> ) | Schmerzempfindlichkeit <sup>1)</sup> | Körpergewicht | Zugkraft in kg | Brustumfang | Lungenkapazität | Schulterbreite |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
|                          |        |                            |              |              |               |                    |                    |  |                                      |               |                |             |                 |                |
| 1. Fröhliches (heiteres) | 40     | 36,87                      | 67,4         | 20,5         | 2,82          | 57,6               | 849                | 5,9<br>5,7<br>5,5                        | 4,8<br>4,6<br>4,5                    | 40,52         | 91,74          | 56,19       | 2312            | 22,7           |
| 2. Ruhiges               | 40     | 36,87                      | 65,6         | 20,3         | 2,77          | 49,6               | 788                | 6,1<br>6,0                               | 4,5<br>4,4                           | 40,94         | 88,49          | 56,16       | 2313            | 22,6           |
| 3. Mittleres             | 40     | 36,93                      | 66,5         | 21,2         | 2,92          | 46,4               | 768                | 6,1<br>6,0                               | 4,4<br>4,4                           | 38,96         | 80,49          | 55,80       | 2343            | 22,7           |
| 4. Melancholisches       | 40     | 36,81                      | 63,6         | 19,8         | 2,67          | 41,3               | 702                | 6,0<br>5,9                               | 5,2<br>5,1                           | 39,05         | 68,45          | 55,79       | 2202            | 22,1           |
| 5. Nervöses              | —      | —                          | —            | —            | —             | —                  | —                  | —  | —                                    | —             | —              | —           | —               | —              |

<sup>1)</sup> Die Zahl oberhalb des Striches bezieht sich auf die rechte, die Zahl unterhalb auf die linke Handfläche.

4. Das neuropathische Temperament läßt sich in folgenden Formen bezeichnen:

- das melancholische Temperament,
- das nervöse Temperament,
- das choleriche oder zornige Temperament,
- ein Temperament, dessen Haupteigenschaft in einem bösartigen Pessimismus besteht (galliges Temperament).

5. Das lymphatische oder schlaffe Temperament.

Von der Idee ausgehend, daß die Ursachen der verschiedenen Arten der Temperaments in der körperlichen Beschaffenheit liegen müssen, untersuchte der Verfasser, der damals Militärarzt in Taschkent war, die Soldaten der Garnison auf ihre körperlichen Eigenschaften. Er stellte die Ergebnisse seiner Untersuchungen in vorstehender Tabelle zusammen.

In betref der Untersuchungen am Kopf (Büchsen und Messen) ergab sich: In den Gruppen der Leute mit frühlichem und ruhigem Temperament fanden sich mehr wohlproportionierte Köpfe, als in den beiden anderen Gruppen, in der mittleren Gruppe mehr als in der melancholischen. Unter den Leuten mit frühlichem Temperament fand sich kein asymmetrischer Kopf. Unter den Gruppen der Ruhigen fand

Eine dritte Serie bestand aus 100 Mann Soldaten von der Garnison der Stadt Veranoje; die Leute stammten fast alle aus Westasien.  
Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle vereinigt:

| Temperament | Anzahl | Körpergröße | Brustumfang | Verhältnis von Körpergröße zum Brustumfang | Druckkraft der rechten Hand | Fächel des Gesichtes und der Lippen | Grösse des Zahne bei Proc. der Leute | Gebirnschärfe | Gesichtschärfe |
|-------------|--------|-------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Heiteres    | 50     | 165,5       | 93,4        | 0,56                                       | 50,4                        | 2,8                                 | 82,0                                 | 144           | 792            |
| Mittleres   | 50     | 166,8       | 94,4        | 0,56                                       | 47,8                        | 2,2                                 | 82,0                                 | 116           | 699            |

Der Verfasser hat auch den Kopfmassen seine Aufmerksamkeit geschenkt. Er hebt hervor, daß zu allgemeinen Folgerungen die Zahl der untersuchten Individuen in den einzelnen Serien zu gering ist. Er stellt daher alle drei Serien unter einander und findet dabei doch einige Unterschiede. Er meint, es seien beim heiteren und ruhigen Temperament die größeren Kopfmasse mit der vergrößerten Muskulatur zusammen.

| Temperament | Zahl der Individuen | Körpergröße | des Schädels             |                         |                             |       | Höhe | Summe der Kopf-durchmesser | Verhältnis zur Körpergröße |
|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|------|----------------------------|----------------------------|
|             |                     |             | Größer Längs-durchmesser | Größer Quer-durchmesser | Kleinster Stirn-durchmesser | Höhe  |      |                            |                            |
|             |                     |             | em                       | em                      | em                          | em    |      |                            |                            |
| I. Serie    | heiteres            | 40          | 169,3                    | 18,50                   | 15,29                       | 10,86 | 8,14 | 52,78                      | 31,78                      |
|             | ruhiges             | 40          | 167,7                    | 18,80                   | 16,25                       | 10,90 | 8,15 | 53,00                      | 31,50                      |
|             | mittleres           | 40          | 166,8                    | 18,47                   | 15,11                       | 10,75 | 7,82 | 52,15                      | 31,25                      |
|             | melancholisches     | 40          | 166,7                    | 18,62                   | 15,12                       | 10,64 | 8,15 | 52,3                       | 31,51                      |
| II. Serie   | heiteres            | 10          | 150,0                    | 18,47                   | 15,9                        | 10,64 | 7,95 | 52,15                      | 32,70                      |
|             | ruhiges             | 10          | 156,1                    | 18,10                   | 14,29                       | 10,36 | 7,89 | 51,25                      | 32,82                      |
|             | mittleres           | 10          | 155,2                    | 18,11                   | 14,60                       | 10,24 | 7,75 | 50,89                      | 32,73                      |
| III. Serie  | nervöses            | 10          | 156,0                    | 18,10                   | 14,72                       | 10,26 | 7,55 | 50,65                      | 32,44                      |
|             | heiteres            | 50          | 165,5                    | 18,9                    | 15,44                       | 10,76 | 8,21 | 55,36                      | 32,36                      |
|             | mittleres           | 50          | 166,8                    | 18,82                   | 15,15                       | 10,57 | 8,43 | 52,47                      | 31,45                      |

sich ein Individuum mit einer geringen Plagiokcephalie und zwei mit vorwiegend Hinterhauptshöcker. Unter der Gruppe Leute mit mittlerem Temperament besaßen drei Köpfe einen deutlichen Hinterhauptshöcker, ein Individuum hatte unterhalb des Höckers einen Wulst, ein anderes Individuum hatte ein flaches Hinterhaupt.

Die zweite Serie bestand aus 40 weiblichen Individuen (Damen), die auch in vier Gruppen geteilt wurden.

| Temperament | Anzahl | Gesichtshöhe | Druckkraft der rechten Hand | Verhältnis des Thorax zum Verhältnis zur Körpergröße | Mittel aus dem Umfang des Halses und der Schultern |
|-------------|--------|--------------|-----------------------------|--|--|
| Fröhliche   | 10     | 2,3          | 17,35                       | 16,12  | 19,6   |
| Ruhige      | 10     | 2,1          | 18,25                       | 16,48  | 18,74  |
| Mittlere    | 10     | 2,0          | 16,81                       | 15,39  | 17,67  |
| Nervöse     | 10     | 1,8          | 15,95                       | 15,49  | 17,48  |

Der Verfasser wirft die Frage auf: Was darf man aus diesen Unterschieden, die in der Tabelle anzutreten, schließen? Es sei nicht zuzugestimmt, die anthropologischen Verschiedenheiten in den einzelnen Gruppen nur zur Zufälligkeit zu erklären, — um so weniger sei es zulässig, weil die Unterschiede sich in allen Serien wiederholten. Er versucht diese seine persönliche Meinung auch weiter ausführlich zu begründen, doch sehe ich davon ab, auf diese Auseinandersetzungen hier einzugehen.

(Ich fühle mich veranlaßt, einige Bemerkungen hier anzufügen. Die Idee, daß die Temperamente in gewissen organischen Anlagen des Körpers ihren Grund haben, ist sehr alt, und es dürfte wohl niemand an der Richtigkeit dieser Idee zweifeln. Ob aber die Frage, worin die organische Anlage bestehe, auf dem Wege, den der Verfasser einschlagen hat, zu beantworten ist, scheint mir zweifelhaft. Innerhalb ist der Versuch des Verfassers, auf diesem Wege eine Lösung der Frage zu erzielen, sehr lobenswerth; die sorgfältig angestellten Messungen sehr zu beachten. Doch sind meiner Ansicht nach die Unterschiede in den Ergebnissen der Messungen der einzelnen Vertreter der verschiedenen Temperamente so außerordentlich gering,

daß sie kaum zu verwerten sind. Die Hauptursache des Temperaments liegt offenbar in der verschiedenen Beschaffenheit des Nervensystems, des Gehirns und Rückenmarks, und diese tritt in den Messungen doch nicht hervor. Andererseits spielt aber die Ernährung des Nervensystems, die auf dem Wege der Blutzufuhr bewirkt wird, unzweifelhaft eine große Rolle. Verändertes Blutbild eines veränderten Blutes bedingt veränderte Funktion des Zentralnervensystems; und diese veränderte Blutfeschaffenheit, auf die die alten Autoren bei der Definition der Temperamente so großen Wert legten, kann durch anthropologische Messungen gewiß nicht festgestellt werden.

Immerhin haben die vom Verfasser ermittelten Tatsachen ein gewisses Interesse, wieweil diese Tatsachen an sich noch keine Bestätigung der Richtigkeit der Ideen des Verfassers liefern.

10. J. Talko-Hrynezow (in Troizkossawsk-Traubalkien): Ein Beitrag zur Anthropologie Traubalkiens und der Mongolei (Baraten, Tugusen und Chales). 1902, Nr. 2, S. 34—67. Mit 21 Porträts.

Der Autor, der seit 10 Jahren in Troizkossawsk als Arzt lebt, beschäftigt sich schon seit länger Zeit mit anthropologischen und anthropometrischen Arbeiten. Er hat in den Jahren seines Aufenthalts in Sibirien vielfach Gelegenheit gehabt, Vertreter des bunten asiatischen Völkergemisches kennen zu lernen. Er hat eine große umfassende Abhandlung „Materialien zur Anthropologie Traubalkiens und der Mongolei“ der Moskauer Gesellschaft für Anthropologie eingereicht. Die Abhandlung wird demnächst in den Arbeiten der anthropologischen Abteilung gedruckt werden. Da die vorliegende Mitteilung nur ein kurzer Auszug aus der im Druck befindlichen großen Abhandlung ist, so verzeihen wir das Referat bis auf spätere Zeit.

11. Aristow, N. A.: Ethnologisches über den Pamir und die angrenzenden Gebiete, nach alten, insbesondere chinesischen historischen Quellen. Fortsetzung 3. Ein Versuch, den Ursprung der am südlichen Abhang des Hindukusch, Mustang und Karakorum vorhandenen Volkstämme zu bestimmen; eine historische Skizze ihrer Schicksale in ethnischer Beziehung. 1902, III, Bd., Nr. 2, 1902, S. 68—81.

12. W. Rosanow: Polymastie und Polythelie. Zwei interessante Fälle werden beschrieben. Mit 2 Abbildungen, III, Nr. 2, 1902, S. 82—85.

I. Fall. Jhanna Pusskowa, 20 Jahre alt, aus dem Gouvernement Kasak, befaß sich zur Zeit der Untersuchung im städtischen Geburtshaus zu Moskau; sie hatte an diesem Tage zum erstenmal ein normales, gesundes Kind geboren. Bei der Betrachtung der Frau fiel die kolossalen Brüste auf, die groß, dick und lang sind. Die Stelle, wo die Brüste am Thorax ansetzen, ist die gewöhnliche, aber die Größe ist ungewöhnlich. Beim Sitzen der Frau reichen die Brüste bis zur Leistebeuge, beim Liegen reicht der untere Rand der Brüste bis zum Nabel. Nach der Erzählung der Frau waren die Brüste bereits vor der Schwangerschaft sehr groß. Die Brüste hatten im 15. Lebensjahr mit dem Auftreten der ersten Menstruation zu wachsen begonnen, aber erst im 18. Lebensjahre sei eine anfallende Vergrößerung bemerkbar geworden. Der Warzenhof beider Brüste ist stark pigmentiert. Der Durchmesser des rechten Warzenhofs beträgt 21,5 cm, des linken 20,5 cm. Außerdem hat die Frau zwei überzählige kleine Brüste. Vor jeder Achsel-

höhle, medianwärts von der Axillarlinie, liegt zwischen der 3. bis 5. Rippe eine überzählige Brust. Beide Brüste sind regelmäßig gebildet. Der Durchmesser des stark pigmentierten Warzenhofs ist rechts wie links etwa 7,9 cm. Auf Druck entleert sich aus beiden Brüsten etwas Milch. Der Verfasser hat die Frau, insbesondere den Kopf derselben, nach allen Richtungen gemessen — wir übergehen alle Zahlen.

2. Fall. Sinowija E. 35 Jahre alt, eine Bäuerin aus dem Gouvernement Moskau, zur Zeit an Rheumatismus im alten Katharinenkrankenhaus zu Moskau behandelt. Sie befindet sich im achten Monat der Schwangerschaft. Beide Brustdrüsen sind von normaler Größe und normaler Lage, doch ist bemerkenswert, daß die linke Brust zwei Warzen hat, die in vertikaler Richtung untereinander liegen; die untere an dem unteren freien Teil der Brust, die obere etwas höher. Der Durchmesser des stark pigmentierten unteren Warzenhofs beträgt 8,5 cm, der Durchmesser des überzähligen Warzenhofs nur 5,5 cm. Beide Warzen stehen mit der linken Brust in innigem Zusammenhang; es entspringt keineswegs die obere Warze einen besonderen Drüsenkörper. Die Frau kann in gleicher Weise beide Warzen zum Stillen des Kindes gebrauchen, doch hat sie auf Rat der Hebamme nur die untere Warze gebraucht.

Zur Schluß gibt der Verfasser einige literarische Hinweise (O. Schultze, Schickels, Henzig, Wiederheim, Ammon u. a.).

13. Nekrolog III, Nr. 2, 1902, S. 94—95.

A. P. Raszwetow (von A. Iwanowski). Mit 1 Porträt.

Alexander Pawlowitsch Raszwetow wurde im Jahr 1823 im Dorf Wednoje, Gouvernement Rjasan, geboren, wo sein Vater Landgutbesitzer war. Er besuchte zuerst das göstliche Seminar in Rjasan und studierte dann Medizin. Er war anfangs Assistent der chirurgischen Klinik, später, seit 1864, Professor der Chirurgie. Als solcher genöß er einen sehr guten Ruf und hatte eine ausgezeichnete, sehr einträgliche Praxis. Im Jahr 1876 gab er seine Lehrtätigkeit und bald darauf auch seine Praxis auf, doch war er weiterhin im Ministerium tätig, einerseits als Präsident der Prüfungskommission, andererseits als Mitglied des Komitees im Ministerium der Volksaufklärung. Er beteiligte sich nicht allein lebhaft bei den Arbeiten der anthropologischen Gesellschaft —, er war eine Zeitlang Vizepräsident und später Vorsitzender der anthropologischen Gesellschaft — sondern er unterstützte die Gesellschaft auch materiell, indem er im Jahr 1889 ein Kapital schenkte, aus dessen Zinsen eine Prämie und eine Medaille für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Anthropologie erteilt werden sollten. Außerdem schenkte er der Universität zu Moskau große Geldsummen zur Erhaltung von Stipendien. Dr. Raszwetow starb am 9. April 1903. In seinem Testamente bestimmte er 800 000 Rubel (etwa 1 1/2 Million Mark) zur Gründung eines Asylo für verarmte Ärzte, Feldscherer, Hebammen und überhaupt für Personen des medizinischen Standes und deren Familien. Zwei Drittel der Summe sollten zur Errichtung der Gebäude verbraucht werden und ein Drittel soll zur Unterhaltung der Häuser dienen.

14. Kritik und Bibliographie. III, 1902, Nr. 2, S. 96—107.

W. G. Pogoras: Skizze der Lebensweise der Rensselaer-Fischschalen unter Zugrundelegung der Sammlungen Gonadatta, die sich im ethnographischen Museum der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg befinden. (Sbornik des Museums, bespr. von Korotshanski).

K. Beegu. Zur Anatomie der Stirnhöhlen (Sinus front.). Doktor-Dissert. 1902, Königsberg i. Pr., bespr. von K. Weinberg.

G. A. Adolphi. Über die Zukunft des Brustkorbes der Menschen. Vortrag auf dem XI. Kongreß russischer Naturforscher und Ärzte in St. Petersburg, abgedruckt in Gelehrte Schriften der Universität Jurgow (Jorpet) 1902, bespr. von Weinberg.

A. A. Falk. Das Wachstum des Herzens bei Kindern verschiedenen Alters. St. Petersburg 1902, bespr. von Dr. Nikolski.

A. P. Szytschew. Die Maße des Körpervolumens und der Körperoberfläche bei Kindern verschiedenen Alters. St. Petersburg 1902, bespr. von Nikolski.

Szukiewicz, W. Szkice archeologiczne prehistorycznymi Litwy. Epoka kamienia w Gal. Wilensky. — Wilna 1901. Bemerkungen über die vorgeschichtliche Archäologie Littauens. I. Teil. Die Steinzeit im Govv. Wilna. Wilna 1901, S. 1—4. Mit einer Karte und fünf Tafeln, bespr. von Talku-Hrynawitsch.

M. A. Palem. Zur Frage nach dem Verderben der Zähne. Zahnärztliche Bote, 1901, Nr. 1, bespr. von Nikolski.

N. Aeschmarin. Skizze der literarischen Tätigkeit der mohamedanischen Tataren in Kasan. Moskau 1901, bespr. von A. Chauchanow.

15. Kurze Nachrichten und Bemerkungen III, Nr. 2, 1902, S. 108—110.

Anthropolog. Untersuchungen in Finnland, in der Schweiz. Anthropolog. Vorlesungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Frankfurter anthropolog. Gesellschaft. Die Franzen der Pariser anthropolog. Gesellschaft. Die anthropol. Gesellschaft in St. Petersburg und Moskau.

Russisches anthrop. Journal, III. Jahrgang, 1903, Nr. 3 (XI. Bneh), Moskau 1902. (S. 1—126.)

16. A. D. Elkind: Die Hebräer. S. 1—44. Mit 25 Abbildungen und 4 Diagrammen im Text. Da ich demnachst ein zusammenfassendes Referat über eine große Anzahl das jüdische Volk betreffende Arbeiten liefern werde, so verziehe ich das Referat über diese Abhandlung Elkind's auf später.

17. A. N. Krasnow: Materialien zur Anthropologie des russischen Volkes. S. 43—61. Mit 4 Tafeln Abbildungen.

Der Verfasser hat die sich ihm in Charkow bietende Gelegenheit zu anthropologischen Untersuchungen ausgenutzt. Charkow ist ein Sammelplatz für die hier durchziehenden, aus dem Süden kommenden und nach verschiedenen Gegenden Rußlands bestimmten Rekruten. Durch ein freundliches Entgegenkommen der Militärbehörde konnte der Verfasser einen Teil der in Charkow sich zeitweise aufhaltenden Rekruten untersuchen. Der Aufenthalt der Rekruten war nur kurz, daher konnte er nicht alle einer eingehenden Messung unterwerfen, dazu reichte die Zeit nicht aus. Er konnte auch nicht jeden einzelnen nach allen Richtungen untersuchen; er beschränkte sich auf die Untersuchung der Haarfarbe, Augenfarbe, Form des Kopfes. Er hat seiner Arbeit 4 Tafeln Photographien beigelegt: auf jeder Tafel sind 20 Köpfe dargestellt (auf 2 Tafeln die Köpfe en face, auf zweien im Profil). Die untersuchten Rekruten, Großrussen, stammen aus 10 verschiedenen Gouvernements (21 Kreise); auffallend ist die große Gleichförmigkeit. Durehweg fällt das Überwiegen des blonden, helläugigen Typus auf. Auch in den Gouvernements, wo die Bevölkerung eine gemischte ist, bilden die Blonden 20 bis 50 Proz., nur in einigen Kreisen, wo die Mischung mit

Tataren stark ist, sinkt der Prozentsatz auf 14 bis 16 Proz.

Man muß schließen, daß in den 10 Gouvernements (Saratow, Astrachan, Tambow, Kasan, Simbirsk, Penza, Woronesch, Kursk, Ufa, Wjatka) das Grundelement der heutigen großrussischen Bevölkerung eine blonde, helläugige Rasse ist, die trotz der Mischung mit einer schwarzhäutigen Rasse sich derart erhalten hat, daß sie sich in den zahlreichen Blüthen erhalten hat. Dieser Einfluß ist auch in den Mischformen insbesondere durch die Augenfarbe erkennbar: auch bei Leuten mit dunklen Haaren sind die Augen noch hell.

Wenn man annimmt, daß die Kupffern die widerstandsfähigste Eigenschaft der Rasse ist, so darf man solche Leute, deren Kopfkopf zwischen 71 bis 91 schwankt, nicht zu einer derselben Rasse rechnen, sondern muß die Mischung zweier Rassen, einer langkopfigen und einer kurzkopfigen, voraussetzen. Die langkopfige Rasse überwiegt in den nördlichen Gebieten, die kurzkopfige ist in den südlichen Gebieten sehr verbreitet, oft bis zu 50 Proz. Ob die russischen Dolichokephalen mit den dolichokephalen Rassen des westlichen Europas identisch sind, ist nicht zu untersuchen.

Man darf aber nicht meinen, daß die Langkopfigkeit mit hellen Haaren und die Kurzkopfigkeit mit dunklen Haaren zusammenfalle. Man findet auch unter den Brünetten sowohl Dolichokephalen wie Brachykephale. Das darf nicht ändern, daß es sich nicht auch bei Tataren, Tschuwassen — und Tschernisissen —

Bei den Kleinrussen (Malorussy) — es sind 66 Mann gemessen — fällt der bedeutende Kopfkopf auf, er schwankt zwischen 82 bis 84; hier in ihnen steckt offenbar ein brachykephaler Volkstamm von alters her.

Da ein ausführlicher Auszug unmöglich ist, so beschränke ich mich auf die Wiedergabe der letzten Worte des Verfassers.

Die kleinrussische Bevölkerung unterscheidet sich dadurch von der großrussischen, daß bei den Kleinrussen fast völlig die dolichokephalen Blondes fehlen, die bei den Großrussen reichlich da sind. Charakteristisch für die Kleinrussen ist, daß neben den rundkopfigen blonden und helläugigen Grundelementen auch brachykephale Brünette (der sogenannte Alpen-typus) vorkommen, die mit dem herrschenden slavischen Typus durch zahlreiche Vermischungen und Übergänge, sowie durch eine Beimischung zahlreicher dunkelhaariger Elemente (Tataren, Moldauer, Zigeuner, Juden usw.) vereinigt sind. Diese dunkelhaarigen Elemente haben sich mit der an und für sich schon an Brünetten reichen Grundmasse gemischt und mit den Blondes zahlreiche gemischte Typen und Formen erzeugt. Einige davon sind bibisch, andere aber nicht.

Man darf behaupten, daß für die Großrussen die Brünetten ein fremdes Element sind, das eingebrungen aber assimiliert ist; für die Kleinrussen dagegen ist das dolichokephal Element ein fremdes.

18. N. N. Aristow: Ethnologisches über den Pamir und die angrenzenden Gehökte nach alten, insbesondere chinesischen Geschichtsquellen. Fortsetzung. Kap. 6. Nachrichten aus dem VI.—VIII. Jahrhundert, über die unmittelbar im Westen und Norden an den Pamir angrenzende Gehökte. (III, Nr. 3, 1902, S. 62—64.)

19. R. Weinberg: Zur Anatomie des Gaumenulster (Torus palatinus). III, Nr. 5, 1902, S. 65—93. Mit 2 Abbildungen im Text. Nach einigen einleitenden Bemerkungen über den Torus palatinus im allgemeinen stellt der Verfasser

als wahrscheinlich die Behauptung auf, daß die Form des Torus palatinus in einer bestimmten Beziehung zum Bau und zur Form des harten Gaumens steht. An zwei Livenschädeln nämlich konnte der Verfasser zwei verschiedene Formen des Torus palat. beobachten, die er ausführlich beschreibt. 1. Schädel. Der harte Gaumen (mesostaphylis, Nr. 1, Fig. 1) zeigt eine einen länglichen, spindelförmigen Torus, der hinten an der Spina nasalis posterior beginnt und nach vorn bis 15 mm vom hintern Rand des Alveolarfortsatzes reicht; die Länge des Torus ist 35 mm, die größte Breite in der Gegend des Sutura transversa palatina ist 9 mm; der vordere Abschnitt des Torus hat die Gestalt eines langen Dreiecks, der hintere Abschnitt des Torus dagegen die Gestalt eines kurzen Drieecks, die mit ihrer Basis aneinander stoßen; die Höhe des Torus beträgt höchstens 3 mm. 2. Schädel. Der Gaumen ist leptostaphylis, stark vertieft; der Alveolarfortsatz höher als am Schädel Nr. 1; der Torus ist sehr hoch, 10 mm; die Länge beträgt 35 mm, die größte Breite 13 mm; Gestalt spindelförmig.

Der Verfasser benutzt beide Fälle zu folgenden Schlüssen:

Er unterscheidet zwei Typen des mit einem Torus palatinus versehenen harten Gaumens:

1. Flach (niedriger) Typus des Gaumens meistens leptostaphylis; der Torus palatinus abgewacht, hat seitlich die hügelartige Anlange, ähnlich einem Papierdrachen.

2. Tiefer (hoher) Typus. Der Gaumen meistens leptostaphylis, der Torus palatinus hoch, spindelförmig.

Die beiden beschriebenen Typen, die der Verfasser unter vier Livenschädeln beobachten konnte, scheinen ihm — trotz des scheinbar zufälligen Charakters der Funde — doch wichtig genug, um sie zum Ausgangspunkt einer eingehenden Betrachtung zu wählen.

Im Gegensatz zu den früheren Beobachtern (Stieda), die ein Vorkommen des Torus palatinus bei allen Völkern behaupten, glaubt der Verfasser zu einem andern Ergebnisse kommen zu müssen.

Er weist darauf hin, daß Waldeysr an den Lappenschädeln ein sehr häufiges Vorkommen des Torus palatinus festgestellt hat: unter 8 Schädeln zeigten 7 einen Torus; 8 Lappenschädel der Virchow'schen Sammlung hatten einen Torus; von 27 Lappenschädeln in Christiania besaßen 24 einen Torus. Eine Zusammenstellung aller Lappenschädel ergibt, daß unter 45 untersuchten Fällen nicht weniger als 40 einen Torus palatinus zeigten, das sind etwa 89 Proz., eine Ziffer, die bisher in keinem der früheren Völker erreicht worden ist.

Mit Rücksicht auf diesen Befund an Lappenschädeln mißt der Verfasser dem Vorkommen von Torus an 2 Livenschädeln (unter 4 Schädeln 2 mal) eine große Bedeutung bei. Lappen und Liven gehören zusammen, sie sind verwandt. Der Verfasser vermutet daher, daß auch unter den andern Vertretern der finnischen Volksgruppe der Torus palatinus annähernd so häufig vorkommen muß, wie unter Lappen und Liven.

Es sei das eine Aufgabe für spätere Untersuchungen. Daß die Finnen- und Esten-Schädel, wie es scheint, selten einen Torus palatinus aufweisen, glaubt der Verfasser durch die Stellung der genannten Völker erklären zu müssen, gegenüber dem isoliert rein gebliebenen Lappenvolke.

Der Verfasser kommt zu dem Schlusse, daß das Vorkommen zweier Fälle von Torus palatinus unter vier Livenschädeln kein zufälliges sei; es sei ein Hinweis auf die große Vererbung dieser kranziologische Eigentümlichkeit unter einigen Vertretern der finnischen Volksgruppe.

Am Schlusse seiner Abhandlung liefert der Verfasser (S. 90—93) eine sehr genaue kranziologische Be-

scheinung von vier im anatomischen Institut zu Dorpat aufbewahrten Livenschädeln. Er betont die Wichtigkeit dieser Schädel, weil dieselben noch nicht beschrieben sind. Die von Virchow als Liven bezeichneten Schädel sind offenbar keine Liven; sie wurden durch den Grafen Sievers-Wenden an einem Ort ausgegraben, wo niemals Liven gelebt haben.

Es kam hier selbstverständlich die ausführliche sorgfältige Beschreibung der vier Livenschädel nicht wiedergegeben werden. Zu einem Auszuge sind natürlich dergleichen Beschreibungen nicht geeignet. Es ist — meiner Ansicht nach — überhaupt nicht zulässig, aus einer so kleinen Anzahl sichere Schlüsse zu ziehen, um so weniger, weil die vier Schädel keine gleichartigen sind. Unter den vier nach Angabe des Verfassers männlichen Schädeln ließen nur drei eine genaue Messung zu, der vierte war defekt.

Der Schädel 1 ist stark dolichocephal (Index 67,3), 2 ist mesocephal (Index 77,9), 3 konnte nicht gemessen werden, 4 ist mesocephal (Index 77,5). Im übrigen verweise ich auf die genauen Zahntabellen S. 91—92.

Aus der fremden (nicht russischen Literatur).

20. B. Korolew: Über die Pygmeen. (S. 94—99.) Eine zusammenfassende Darstellung, die sich auf die jüngst publizierten Arbeiten von Thibelenius, Kollmann, David Mac Ritchie und Waale stützt.

21. Nekrolog. (S. 100—104.) Rudolf Virchow. Mit einem Bilde. Von Iwanowski.

22. Kritik und Bibliographie. (S. 105—116.) Fischer. Die Furchen und Windungen des kindlichen Gehirns während der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr. von N. Altshew.

Bondyrew. Materialien zur Untersuchung des Wachstums der Körpergröße und einzelner Körperteile bei Kindern. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr. von N. Altshew.

Sytschew. Untersuchungen über das Volumen und die Körperoberfläche bei Kindern in verschiedenen Lebensalter. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr. von N. Altshew.

Dr. Leon Rutkowski. Anthropologische Charakteristik der bauerlichen, nicht zur Schlichta gehörigen Bevölkerung des Kreises Plonsk und der benachbarten Kreise des Gouvernements Plotzk. Krakau 1901. In polnischer Sprache; bespr. von Talko-Hrynawitsch.

Russisches anthrop. Journal, III. Jahrgang, 1902, Nr. 4, (XII. Heft), Moskau 1903. (S. 1—124.)

23. R. L. Weinberg: Zur Lehre von der Form des menschlichen Gehirns. Mit 10 Abbildungen. S. 1—84.

Es kam hier auf eine Wiedergabe der Beschreibung verzichtet werden, da Weinberg das Wesentliche seiner Untersuchung im Biologischen Zentralblatt, XXIII. Bd., 1903, Nr. 4, S. 164—169, unter dem Titel „Über einige ungewöhnliche Befunde am Jüdenhirn“ veröffentlicht hat.

Ferner liefert Weinberg die Beschreibung eines Littauerhirns unter Begleitung dreier Abbildungen (Fig. 8—10).

Auf Grund der morphologischen Untersuchung dieses Littauerhirns gibt der Verfasser die wichtigsten Eigentümlichkeiten der Furchen und Windungen in folgender Weise an:

1. Zerfall des unteren Abschnitts des linksseitigen Gyrrus centralis anterior in zwei schmale sekundäre Gyri. Fig. 8.





| Weiber           |                 |
|------------------|-----------------|
| 1580 und darüber | 9 = 14,51 Proz. |
| 1575—1530        | 11 = 17,94 "    |
| 1525—1480        | 26 = 41,94 "    |
| unter 1480       | 16 = 25,81 "    |

Hieraus folgt, daß die Jakuten zu den Völkern geringer Körpergröße geboren, daß aber die Vermischung mit den Russen die Jakuten beeinflusst hat, so daß dadurch die Körpergröße steigt. Ein Einfluß der Tungusen auf die Jakuten ist nicht vorhanden, da die Körpergröße der Tungusen der der Jakuten sehr nahe kommt, d. h. etwas höher ist. (95 Tungusen hatten im Mittel eine Größe von 163,1 cm). Vielleicht, daß der Einfluß der nördlichen Tungusen, die viel kleiner sind (154,8 mm im Mittel) die Körpergröße in einzelnen jakutischen Gegenden erniedrigt.

Der Verfasser meint übrigens, daß die ganze jetzige Jakutenbevölkerung mit ihren 162,44 cm eigentlich doch gemischt sei; er meint, die alle rein jakutische Bevölkerung sei von kleinerem Wuchs gewesen, vielleicht von 161 bis 162 cm. Ein paar Tabellen, die die Maße der einzelnen Individuen nach ihren Wohnorten wiedergeben, müssen wir bei Seite lassen.

Die Gliedmaßen. Die Arme. Bei 13 Gruppen (unter 14) der Jakuten sind die Arme verhältnismäßig länger als bei den Russen. Eine den Russen gleiche Größe zeigen nur die Jakuten in Betjun, die, weil sie klein an Wuchs, ein umgekehrtes Verhältnis aufweisen müßten. Diese Eigenschaft nähert die Jakuten von Betjun den Tungusen; bei den Tungusen ist nämlich die obere Extremität kürzer als bei den Russen.

| Länge der Arme der |   |
|--------------------|---|
| ruß. Jakuten       | 73,78—75,66 cm, 44,49—44,81 Proz.   |
| Tungusen           | 71,47—74,36 = 44,42 Proz. (südliche Tungusen)<br>45,87 Proz. (nördliche Tungusen) |

Bei den Jakuten stellt sich das Verhältnis folgendermaßen:

| Armlänge      |       | Verhältnis zur Körpergröße |       |
|---------------|-------|----------------------------|-------|
| Männer 207    | 75,43 | 46,89                      | Proz. |
| Mischlinge 30 | 76,57 | 46,33                      | "     |
| Weiber 62     | 68,96 | 45,61                      | "     |

Die Beine. Sowohl die Tungusen wie die Russen haben längere Beine als die Jakuten. Bei der russischen Bevölkerung des Gebiets von Jakutsk beträgt die Länge der Beine 90,30 bis 92,85 cm (Verh. zur Körpergröße 54,84 bis 55,43 Proz.), bei den südlichen Tungusen Beinlänge 91,40 cm (56,18 Proz.), bei den nördlichen Tungusen Beinlänge 86,13 cm (55,00 Proz.); bei den Jakuten dagegen

| Beinlänge     |          | Verhältnis zur Körpergröße |       |
|---------------|----------|----------------------------|-------|
| 207 Männer    | 87,33 cm | 53,69                      | Proz. |
| 30 Mischlinge | 90,85 "  | 54,47                      | "     |
| 62 Weiber     | 81,86 "  | 54,05                      | "     |

Die Scheitelhöhe (Rumpflänge) in sitzender Lage gemessen, ist bei den Jakuten verhältnismäßig größer als bei den Russen, aber ebenso groß wie bei den Tungusen. Da aber bei den Tungusen der Kopf beträchtlich höher ist als bei den Jakuten, so ist eigentlich der Rumpf der Jakuten im Verhältnis zur Körpergröße länger als bei den Russen und Tungusen.

| Verhältnis der Rumpflänge zur Körpergröße |   |
|---|---|
| Russen des Govv. Jakutsk                  | 51,35 — 52,88 Proz.                               |
| südl. Tungusen                            | 53,06   |
| nördl. "                                  | 53,23 (bei Männern),<br>54,21 Proz. bei Weibern). |

| Rumpflänge in cm   |                     |
|--------------------|---------------------|
| Jakuten 207 Männer | 53,69 — 84,71—89,06 |
| 30 Mischlinge      | 51,95 — 85,28       |
| 62 Weiber          | 52,37 — 79,45       |

Die Naheöhe ist im Mittel bei den Jakuten

| Verhältnis zur Körpergröße |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Männer                     | 94,22 cm 58,14 Proz. |
| Mischlinge                 | 97,29 " 56,86 "      |
| Weiber                     | 88,69 " 58,54 "      |

Der Brustumfang ist bei den Jakuten im allgemeinen groß; doch ist der Vergleich mit den andern Nationalitäten nicht gut durchführbar, weil das Meßverfahren ein anderes war. — Mainow hat den Brustumfang bei aufgehobener Arme, Heeker bei herabhängenden gemessen. Es seien deshalb nur die Messungen der Jakuten angeführt: Brustumfang bei herabhängenden Armen.

| Verhältnis zur Körpergröße |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 207 Männer                 | 92,00 cm 56,52 Proz. |
| 30 Mischlinge              | 91,94 " 55,61 "      |
| 62 Weiber                  | 86,23 " 56,93 "      |

Die Maße der Schulterbreite und Beckenbreite lasse ich bei Seite.

Der Rumpf der Jakuten ist länger, aber in den Schultern und in der Brust enger, als bei den Russen und Tungusen, in der Beckengegend enger als bei den Tungusen.

Der Kopf. Es sind Messungen der Höhe des Kopfes, der Bogen, des Kopfumfanges usw. mitgeteilt. Ich gebe die Resultate aller dieser Messungen in einer verkürzten Tabelle.

| Jakuten    | Kopfhöhe | Horizontaler Kopfumfang | Längsdurchmesser | Breitedurchmesser | Kopflindex |
|------------|----------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
|            | cm       | cm                      | cm               | cm                |            |
| Männer     | 200,3    | 560,2                   | 190,9            | 157,8             | 82,66      |
| Mischlinge | 201,5    | 578,5                   | 192,7            | 161,66            | 83,55      |
| Weiber     | 200,4    | 549,7                   | 185,6            | 150,0             | 80,82      |

Die Kopfhöhe der Jakuten ist nicht groß, sie unterscheidet sich kaum von der Kopfhöhe der Jakutsker Russen, dagegen stellt sie zurück hinter der Kopfhöhe der Tungusen und anderw mit den Jakuten verwandter Völkstämme.

Die Form des Kopfes ist in allen Gruppen der Jakuten im Mittel brachykephal (82 bis 85), im Mittel 82,66 — ebenso wie bei den südlichen Tungusen 82,69; dagegen höher als der Kopflindex der russischen Jakuten 81,06 und der nördlichen Tungusen 84,69.

Der Kopflindex der Mischlinge ist größer als der der übrigen Jakuten. Der Kopflindex der jakutischen Weiber ist beträchtlich geringer 80,82, so daß die Jakutinnen an der Grenze der Mesokephalen stehen. Der Verfasser macht mit vollem Recht auf diese auffallende Tatsache aufmerksam.

Eine vom Verfasser (S. 52) gegebene Tabelle über den Vergleich der Kopflindizes der Jakuten mit den Indizes anderer Völkstämme, nebst den Prozentverhältnissen des Vorkommens, gebe ich in nachstehender Tabelle wieder.

Das Gesicht. In betreff der Länge des Gesichts nähern sich die Jakuten ihren langgesichtigen Verwandten und übertreffen die Russen und anderen

|                                  | Anzahl | Kopfform                |                              |                               |  |
|----------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                                  |        | Dolchekopfbal<br>bis 75 | Messkopfbal<br>75,1 bis 79,9 | Brechkopfbal<br>80,0 bis 84,9 | Hyperbrych-<br>kopfbal 85,0<br>und darüber |
|                                  |        | Proz.                   | Proz.                        | Proz.                         | Proz.                                      |
| Jakuten, 20 bis<br>60 Jahr . . . | 207    | 1,45                    | 20,29                        | 46,84                         | 31,40                                      |
| Mischlinge . . .                 | 30     | 0                       | 13,66                        | 33,93                         | 33,99                                      |
| Tungusen . . .                   | 98     | 0                       | 21,04                        | 60,21                         | 13,57                                      |
| Russ-jakutsker . .               | 127    | 2,55                    | 33,12                        | 50,96                         | 14,72                                      |
| Jakutinnen . . .                 | 62     | 4,84                    | 33,87                        | 40,39                         | 12,91                                      |
| Tungusinnen . . .                | 10     | 0                       | 30,00                        | 50,00                         | 20,00                                      |

Slaven. In betreff der Gesichtsbreite (Abstand der Gehirnbogen) steigen die Jakuten sehr sehr auschuliche Zahlen, sie kommen darin den Wolgakalmücken gleich und übertreffen dieselben.

|                | Gesicht     |              |       | Abstand der medianen Augenwinkel<br>(Spatium inter-orbitale) |
|----------------|-------------|--------------|-------|--|
|                | Länge<br>em | Breite<br>em | Index |  |
| Jakuten . .    | 18,75       | 14,86        | 79,25 | 3,48   |
| Mischlinge . . | 18,17       | 14,83        | 77,97 | 3,47   |
| Weiber . . .   | 17,86       | 14,09        | 78,99 | 3,39   |

Die von Hecker gemessenen Jakuten und Mischlinge sind in betreff der Gesichtsbreite einander gleich, während die von Mainow gemessenen russischen Jakuten beträchtlich hinter dem slavischen Typus zurückstehen, aber immerhin noch den Slaven näher stehen als die Jakuten.

Die Größe des Augenabstandes ist bei den Jakuten bedeutend, 3,48 em.

Zum Schluß macht Mainow noch einen Vergleich der von den Jakuten gewonnenen Zahlen mit dem Zahlen anderer Völkstämme, der Bukjewkirgisen (Charusia) als Vertreter des reinen Türkentypus, den Torqotan (Iwanowski) als reinen Mongoleu, und der südlichen Tungusen (Mainow), als der nächsten Nachbarn, sowie der russischen Jakuten.

Wir können die großen Zahlenreihen hier nicht wiedergeben, aber einige allgemeine Bemerkungen müssen doch als wichtig hervorgehoben werden.

Der Vergleich der von Hecker gemessenen Mischlinge (Mestizen, Bastarde), mit den russischen Jakuten (Mainow) hatten ein großes Interesse, wenn das Material ein gleiches wäre. Allein das ist nicht der Fall. Die Russischen Jakuten Mainow sind durchweg die Nachkommen von Russen in Ansiedelungen, in denen seit 150 Jahren russische Männer sich mit jakutischen Weibern verheiratet haben — es sind diese jakutischen Russen ein russisch-jakutisches Gemisch mit einer sehr hohen Beimischung jakutischen Blutes in weiblicher Linie. Die Mischlinge Heckers dagegen sind in umgekehrter Weise ein jakutisch-russisches Gemisch, d. h. sie bestehen aus Nachkommen von Jakuten mit einem geringen Beimengung russischen Blutes in weiblicher Linie. Die russische Beimischung ist hier geringer als die jakutische bei den Jakutkerrussen.

Die Jakuten gehören den Bukjewkirgisen in bezug auf die Körpergröße, Länge der Arme, Größe

des Kopfumfanges und Größe des kleinsten Stirndurchmessers.

Den Tungusen stehen die Jakuten nahe in betreff des Längs- und Querdurchmessers des Kopfes, der Größe des Kopffindex.

Bei den Jakuten ist das Gesicht länger als bei den anderen Völkstämmen, aber in betreff der Breite nähern sich die Jakuten den Tungusen, doch ist das Maß nur etwas geringer als bei den Tungusen.

Die russisch-jakutischen Mischlinge Mainow, so wie die Mischlinge Heckers, zeigen eine Kopfform, die derjenigen ihrer Vater entspricht, ohne irgend welche Kennzeichen des Einflusses mütterlicher (jakutischen) Blutes; während in den Gesichtszügen unzweifelhaft das mütterliche Element, freilich mit dem väterlichen vermischt, sich kund tut.

Diese Übereinstimmung in betreff des Auftretens der beiden Kennzeichen — Kopfform und Gesichtsbreite — bei den beiden verschiedenen zusammengesetzten Gruppen von Mischlingen bringt den Verfasser auf den Gedank, hierzu vielleicht eine Erklärung für die überraschende Tatsache zu suchen, daß die jakutischen Weiber einen niedrigen Kopffindex von nur 80,82 haben, der dem Kopffindex der Jakutkerrussen (81,06) gleich kommt. — Der Verfasser sieht darin den Einfluß der russischen Mütter und Großmütter auf die Kopfform der Nachkommen; denn die Familien, in denen Hecker die Weiber untersuchte, sind keineswegs ganz frei von Vermischung mit Russen. Diese Vermutung wäre sehr wahrscheinlich, wenn es sich nachweisen ließe, daß die Kopfform der Töchter von der Kopfform der Mütter abnimmt, sei, entsprechend der Tatsache bei den männlichen Mischlingen, daß die Kopfform dieser der Kopfform der männlichen Vorfahren gleicht.

## 25. J. O. Baronas: Zur Anthropologie des litauischen Volkstammes. III, Nr. 4, S. 63—87.

Der Volkstamm, der heute litauisch spricht, bewohnt die russischen Gov. Sawalki (Kreis Mariampol, Kalvaria, Sejny), das ganze Gov. Kowno, den großen Teil des Gov. Wilna und einen ganz kleinen Teil des Gov. Grodno; in Preußen wird ein Gebiet bewohnt, das außerdem durch eine Linie begrenzt wird, die von der Küste aus über die Städte Labiau und Isterburg bis zur russischen Grenze verläuft. Die Zahl der Littauer ist annähernd 2 Millionen, wovon über 1/2 Million auf das preussische Reich fallen. Man teilt die Littauer in die eigentlichen Littauer und die Shmaden (Shmadinen), doch liegt der Unterschied wohl nur in gewissen Formen der Sprache. Auf litauisch heißt die Heimat Lietuva; die Littauer nennen sich Lietavai, die Shmaden nennen sich Zemaičiai (spr. Schemaitsehi). Die Beziehung Schemaitsehi stammt von dem Wort zemas, 'niedrig'; es bezeichnet daher die Bewohner der Niederung, die Bewohner von Niederlittauen. Zemaja Lietuva ist Shmad, der übrige Teil heißt Angrijaja Lietuva, d. h. Hochlittauen, und die Bewohner heißen Angrijavai (spr. Angschaitsehi), vom Wort angrius, hoch. Über den Ursprung des Wortes Lietuva sind die Ansichten verschieden; vielleicht steht die Bezeichnung in Zusammenhang mit dem Worte let, d. h. man sagt auch heut letos vyras, letingas vyras, ein ausgezeichneter Mann.

So weit die historischen Nachrichten zurückreichen, lebten die Littauer in ihrem jetzigen Aufenthalt; allein ob sie hierher eingewandert sind und von wo sie gekommen, ist nicht bekannt — ebensowenig als man weiß, wer von den Littauern jene Gebiete bewohnte. Über die Abstammung resp. Herkunft sind

zahlreiche Ansichten ausgesprochen wurden — es ist keine Veranlassung, alle hier zu wiederholen.

Verwand mit den Littauern waren die Prussen, die zwischen Niemen und Weichsel wohnen, und zum Teil durch die Kriege mit den Ordensrittern vernichtet, zum Teil germanisiert wurden, so wie die alten Jatwagen, die die heutigen Govy. Grodno und Minsk bewohnen und allmählich durch die Kriege mit den Slawen angriffen wurden. Baranowitsch hat behauptet, daß die Jatwagen eigentlich Getwi (Gätwi) oder Getwigen hießen.

Ob die Anzahl der Littauer jetzt noch wächst oder abnimmt, darüber ist es sehr schwer zu entscheiden. Es scheint fast, daß trotz der Auswanderung nach Amerika und trotz des Verlustes der Nationalität infolge des Zusammenwohnens mit anderen Volkstämmen der Littauerstamm die Neigung zur Vermehrung zeigt.

Der Verfasser untersuchte i. J. 1898 im Kreis Mariampol (Govy. Suwalki) in den Ortschaften Birsha (Birsna), Sulstsch, Lausbeditschi, Popeljani (Govy. Kowno) 70 Männer und 30 Weiber, die als reine Littauer sich zu erkennen gaben.

(Es gibt bereits einige anthropologische Arbeiten über die Littauer: Brennsohn, zur Anthropologie der Littauer. Dorpat. Doktor-dissertation, verfaßt unter Stiedas Leitung; ferner Jantschuk, 1900; Talko-Grynzewitsch, 1894 u. a.) — Es ist nicht möglich, alle die großen Zahlenreihen des Verfassers wiederzugeben; wir müssen uns auf einige Zahlen beschränken, insofern dieselben mit den Zahlen der Vorgänger in Verbindung und in Vergleich gebracht werden. Die meisten der Schriftsteller beschreiben die Littauer als zu einem hellen Typus gehörig, d. h. helle Haare, Augen, und eine weiße Haut. Der Littauer gilt seit alten Zeiten her als hellhaarig und blankaugig.

Eine Übersicht über die Ergebnisse der Verfasser, so wie ein Vergleich mit den benachbarten Volkstämmen gibt folgende Tabelle:

|                    | Hellbraun und Blond<br>Proz. |        |        | Dunkelbraun<br>Proz. |        |        | Schwarz<br>Proz. |        |        |      |
|--------------------|------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|
|                    | Mittel                       | Männer | Frauen | Mittel               | Männer | Frauen | Mittel           | Männer | Frauen |      |
| Weißrussen . . .   | Jantschuk                    | 47,8   | —      | —                    | 48,5   | —      | —                | 3,7    | —      | —    |
| Littauer . . . . . | Barons                       | 53,1   | 47,7   | 64,5                 | 40,8   | 44,8   | 32,3             | 6,1    | 7,5    | 3,2  |
| Littauer . . . . . | Jantschuk                    | 62,8   | 51,4   | 55,6                 | 39,6   | 42,9   | 33,3             | 7,6    | 5,7    | 11,1 |
| Letten . . . . .   | Waeber                       | 65,0   | —      | —                    | 33,0   | —      | —                | —      | —      | —    |

Die Littauer besitzen hiernach vorwiegend helle Haare, wenn auch nicht in sehr starkem Maße, bei den Weibern mehr als bei den Männern. Sie nähern gleichsam zwischen den Weißrussen und den Letten die Mitte ein.

Augenfarbe. Das Ergebnis wird aus folgender Tabelle erkannt:

|                    | In Prozenten         |    |                |      |                 |    |
|--------------------|----------------------|----|----------------|------|-----------------|----|
|                    | blau und<br>grünblau |    | braun<br>brunn |      | andere<br>Farbe |    |
| Littauer Brennsohn | 36                   | 51 | 15             | 19   | 11              | 19 |
| „ Jantschuk        | 35,9                 | —  | 39,6           | 11,3 | 13,2            | —  |
| „ Barons           | —                    | 55 | —              | 17   | 14              | 14 |
| Letten Waeber      | —                    | 64 | —              | 19   | 10              | 7  |

Die blau (und grünblau) Augenfarbe ist vorherrschend bei den Littauern, doch steht der Littauer hinsichtlich dieser Farbe hinter den Letten (Waeber) zurück.

Die Körpergröße der Littauer ist eine sehr schwankende: Maximum 1842, Minimum 1456, Differenz 386 mm, im Mittel für Männer 1666 und für Weiber 1546,8 mm.

Männer.

Geringe Körpergröße (1450 bis 1600) 12,85 Proz. (9 Ind.)  
 Unter dem Mittel (1600 = 1640) 31,42 = (22 „)  
 Über dem Mittel (1650 = 1700) 33,57 = (27 „)  
 Große Körpergröße (1700 = 1850) 17,14 = (12 „)

Die Mittelzahlen stimmen fast vollständig mit denen Brennsohns.

|                     | Männer<br>mm | Weiber<br>mm |
|---------------------|--------------|--------------|
| Brennsohn . . . . . | 1658,8       | 1547,8       |
| Barons . . . . .    | 1656,2       | 1546,8       |

Die Körpergröße der Littauer ist demnach eine mittlere; sie steigt aber mehr zu einem größeren als zu einem geringen Wuchs.

Aus der großen Zahl der Einzelmaße des Kopfes nehme ich nur die Hauptmaße heraus.

|        | Kopflänge in mm |      |        | Kopfbreite in mm |      |        |
|--------|-----------------|------|--------|------------------|------|--------|
|        | Max.            | Min. | Mittel | Max.             | Min. | Mittel |
| Männer | 196             | 168  | 184    | 166              | 140  | 152,17 |
| Weiber | 188             | 165  | 177,6  | 157              | 140  | 146,36 |

|        | Kopfindex |       |        | Kopfumfang in mm |      |        |
|--------|-----------|-------|--------|------------------|------|--------|
|        | Max.      | Min.  | Mittel | Max.             | Min. | Mittel |
| Männer | 89,72     | 75,51 | 82,73  | 587              | 525  | 565,8  |
| Weiber | 89,71     | 76,92 | 82,49  | 568              | 510  | 539,0  |

Zur Erläuterung in betreff des Kopfindex diene folgende Tabelle:

|  | Männer   | Weiber   |
|--|----------|----------|
|  | Proz.    | Proz.    |
| Dolichocephale (bis 75,0) . . .        | —        | —        |
| Subdolichocephale (75,01—77,77) . . .  | 5=7,14   | 3=10     |
| Mesocephale (77,78—84,00) . . .        | 13=18,57 | 4=13,33  |
| Subbrachycephale (84,01—85,33) . . .   | 23=32,86 | 11=36,66 |
| Brachycephale (85,34 u. darüber) . . . | 29=41,42 | 12=40,0  |

Bei Männern wie bei Weibern hat die größte Anzahl einen Kopfindex von 83,33. Hiernach ist die am häufigsten vorkommende Kopfform die Littäuer die brachycephale, die andern Formen stehen weit zurück — dolichocephale Formen kommen gar nicht vor. Auch Brennsohn und Jantschuk betonen die Neigung des Littäuer zur Brachycephalie.

Die Kopfform der Weiber zeigt weniger Unterschiede als die der Männer. Bei den Männern finden sich alle Stufen von der äußersten Dolichocephalie bis zur äußersten Brachycephalie, bei den Weibern ist von keinem Beobachter ein Fall von Dolichocephalie beobachtet worden; das zeigt noch deutlicher folgende Tabelle, die den Prozentsatz des Vorkommens wiedergibt.

|                             | Männer    |           |         | Weiber    |           |         |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|                             | Jantschuk | Brennsohn | Baronas | Jantschuk | Brennsohn | Baronas |
| Dolichocephale . . . . .    | 2,86      | 1,66      | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Subdolichocephale . . . . . | 5,72      | 10,00     | 7,14    | 5,56      | 0         | 10,00   |
| Mesocephale . . . . .       | 25,71     | 15,00     | 18,57   | 22,22     | 2,50      | 13,33   |
| Subbrachycephale . . . . .  | 25,71     | 41,66     | 32,26   | 33,33     | 47,50     | 36,66   |
| Brachycephale . . . . .     | 40,0      | 31,66     | 41,42   | 38,89     | 50,00     | 40,00   |

Berechnet man alles zusammen, so ergibt sich, daß die größte Anzahl brachycephal sind, nämlich 39,92 Proz.; auf die anderen Formen kommen wenige, nämlich subbrachycephale 36,75 Proz., mesocephale 15,91 Proz., subdolichocephale 6,71 Proz., schließlich auf die dolichocephale Form nur 0,28 Proz. Der Kopflindex des Littauer ist im Mittel bei Männern 82,73, bei Weibern 82,49.

Der Kopflindex der Littauer Männer (82,73) ist aber geringer als der der Weiber, er steht dem Kopflindex der Weißrussen (81,28 — 82,12 — 82,34) sehr nahe; er antwortet sich vom Kopflindex der Letten (78,5) Talko-Hrynswitsch, 81,50 Wäcker).

Die Zahlen der anderen Autoren sind denen von Baronas gleich.

|                             | Männliche Littauer | Weibliche Littauer |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Baronas . . . . .           | 82,23              | 82,49              |
| Brennsohn . . . . .         | 81,76              | 83,09              |
| Jantschuk . . . . .         | 81,93              | 82,14              |
| Talko-Hrynswitsch . . . . . | 81,88              | —                  |
| „ „ (Letten) . . . . .      | 81,50              | —                  |

Der Vergleich der von Baronas gewonnenen Zahlen mit denen der anderen Autoren ergibt in betreff des Kopflindexes im Minimum:

|                     | Littauer Männer mm | Littauer Weiber mm |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Brennsohn . . . . . | 558,8   558,4      | 545,3   539,8      |
| Baronas . . . . .   | 556,2              | 539,0              |

## 26. A. A. Arutinow: Ein Beitrag zur Anthropologie der Aissoren. III, Nr. 4, S. 88—100.

Die Aissoren (Assuren) leben gegenwärtig in den Thälern Persiens westlich von Urmüsse; in der asiatischen Türkei im Bezirk von Chokkari (Chalkkari) zu Wan gehörig, in den Wilajets Erzerum, Bagdad, Diarlek, und in Transkaukasien in verschiedenen Dörfern des Gouvernements Erivan. Man trifft sie jetzt auch in den größeren Städten Transkaukasien, insbesondere in Tiflis.

Die Aissoren sind die Nachkommen der alten Chaldäer und Assyrer; der Tradition nach stammen sie von dem zweiten Sohne Sims, dem Enkel Nochs, Assur. Zur Zeit der babylonischen Herrschaft, wo ihre Macht sich auch auf den südlichen Teil Mesopotamiens,

Senear\* genannt, ausdehnte, siedelte Assur an Senear hinüber in das Gebiet des Flusses Tigris. Hier gründete er die Stadt Ninwi (Ninewa-Ninveh), den Ausgangspunkt des mächtigen assyrischen Reiches. Die Babylonier wurden unterworfen unter Beihilfe der Chaldäer, die, in Mesopotamien ansässig, sich mit den Assyriern als ihren Stammesverwandten vereinigt hatten. Die Chaldäer sollen der Tradition nach von Arfaksad, dem

dritten Sohne Sims, abstammen. Der Beginn des assyrischen Reiches liegt weit zurück, das Reich wuchs bis zum VII. Jahrhundert vor Christi. Im VI. Jahrhundert vor Christi verloren die Assyrer ihre politische Selbstständigkeit, sie gerieten unter das Joch der Meder und Perser. Die Beziehungen der christlich gewordenen Assyrer zu den Persern, die einst Anhänger der Lehre Zoroastres waren und die Lehre Muhammads annahmen, wurden immer schlechter. — Als schließlich durch Anehdnung des türkischen Reiches ein Teil der Assyrer unter türkische Herrschaft kam, wurde es gar schlimmer mit ihnen. Sie begannen auszuwandern, — nach Beendigung des russisch-persischen Krieges 1827 gingen etwa 100 Familien, unter Anführung von Alla-Wardi Tummare, auf russisches Gebiet über und siedelten sich in einigen Dörfern des Gov. Erivan an. Allmählich hat sich durch weitere Einwanderung der Aissoren ihre Zahl im Gov. Erivan beträchtlich vermehrt. Man zählt jetzt etwa 1250 Individuen (650 Männer, 600 Weiber), was etwa 0,23 Proz. der Gesamtbevölkerung des Gov. Erivan ausmacht.

Die Aissoren selbst nennen sich Syrier; die katholischen Aissoren dagegen nennen sich Chaldäer, in Persien heißen sie Nasran (von Nasaret); die Bezeichnung Aissoran ist ihnen von den Armeniern beigelegt worden.

Die in Transkaukasien ansässigen Aissoren sind rechtgläubig (orthodox), die in Persien und in der Türkei lebenden sind Nestorianer, viele aber sind infolge der Missionsbestrebungen Protestanten geworden oder haben sich der römischen Kirche angeschlossen; doch sind in der letzten Zeit auch viele orthodox geworden. Die Gesamtzahl der Aissoren ist mit Sicherheit schwer zu bestimmen. Man schätzt sie wohl auf 150000 Individuen, doch ist ihre Zahl wohl beträchtlich größer. Nach den Forschungen Malomas (Nachr. der kauk. Geogr. Gesellsch. 1873—74) sind die Aissoren schon sehr früh, 60 Jahre nach dem Tode Christi, durch zwei Schüler Christi, Marod und Marmar, zum Christentum bekehrt worden, später wurden sie Nestorianer.

Die christlichen Gebräuche der Taufe, Trauung, Bestattung werden von den Aissoren nicht sehr streng beobachtet; so nehmen z. B. manche Aissoren mehrere Frauen, offenbar unter dem Einfluß der Nubianer, zum Christentum bekehrt worden, später wurden sie Nestorianer.

Die Aissoren in der asiatischen Türkei haben — abgesehen von der türkischen Herrschaft — ihre eigene weltliche und geistliche Administration, die auf dem Wahlprinzip beruht.

Das Haupt aller Nestorianer Aissoren ist der Marschamun (Patriarch); gegenwärtig ist es ein weltliches Oberhaupt, früher war es ein geistliches Oberhaupt, daran erinnert heute noch die Ehelosigkeit des Patriarchen. In früheren Zeiten wurde der Marschamun frei aus allem Volke gewählt, jetzt wird ein Mitglied der Familie Schagrim erwählt. Die Wahl des Marschamun ist eigentlich eine lebenslängliche, aber im Falle man mit ihm unzufrieden ist, wird er durch einen andern ersetzt. Die türkische Administration gibt dem Marschamun die Stelle eines älteren Gerichtsmittels, die Bedeutung des Marschamun ist jetzt eine sehr geringe. Zur Verwaltung einer Anzahl von 8 bis 10 Dörfern wird vom Volke ein sogenannter „Melik“ gewählt, alle diese Meliks sind vollständig abhängig von den türkischen Beamten. Außerdem hat jedes Dorf seinen eigenen gewählten Ältesten. Das geistliche Oberhaupt ist der Metropolit, der von den verarmten Bischöfen gewählt. Er muß ehelos leben und streng fasten. Sein Aufenthaltsort ist das Kloster Der, bei ihm leben drei Bischöfe und 10 Geistliche. Die Bischöfe werden von den Geistlichen gewählt; auch die Bischöfe müssen unbeweiht sein und fasten. Bei einigen Kirchen wird statt eines Bischofs nur ein älterer Geistlicher, der Archidikon, angestellt. Die Geistlichen, deren jede Kirche 1 bis 2 besitzt, werden von den Bischöfen, dem Metropolit und dem Marschamun ernannt. Die Geistlichen dürfen sich verheiraten. Um die Geistlichen zu besolden, müssen bestimmte Dörfer eine Zahlung leisten, jeder männliche Bewohner muß einen Piaster, jedes Weib einen halben Piaster bezahlen.

Die türkischen, in einem guten Klima lebenden Aissoren beschäftigen sich mit Weinbau, Gartenzucht, Bienenzucht, Getreidebau; in einigen Dörfern wird Tabak und Baumwolle gebaut. Dabei wird auch viel Viehweid betrieben. — Der Handel, sowohl Ausfuhr wie Einfuhr, ist sehr gering entwickelt; die Stoffe zur Kleidung werden im Hause angefertigt.

Die in Rußland lebenden Aissoren beschäftigen sich auch mit Viehwirtschaft (Pferde, Büffel) und Gartenbau; sie trocknen allerlei Früchte zur Ausfuhr. Der Weinbau ist wenig entwickelt, doch wird vielfach Branntwein erzeugt. Da die Aissoren keinen eigenen Landbesitz haben, so müssen sie das Land pachten; sie zahlen den zehnten Teil des Ertrages als Pacht. Die in die größeren Städte Transkaukasien eingewanderten Aissoren leben von ihrer Handarbeit; sie sind Tagelöhner, Wasserführer, Maurer usw.; in Tiflis dienen sie als Last- und Packträger, sie werden „Musch“ genannt.

Die in Rußland lebenden Aissoren unterscheiden sich in ihrer Kleidertracht nicht von den Armeniern. Dagegen tragen die türkischen Aissoren ihre eigentümliche Tracht: eine kurze Jacke, weite Hosen, einen breiten Gürtel, hohe Filzschuhe, wollene Schuhe (Baselik). Die Tracht der Weiber besteht aus weiten roten Hosen, die sowohl oben als am Knie gebunden werden, darüber ein kurzer Rock (Haltrock Besmet); auf dem Kopf tragen die Weiber eine kleine Mütze. Die durch ein Tuch unter dem Kinn befestigt wird. Die Weiber verhalten ihr Gesicht niemals, sind sehr frei in ihrem Umgang und haben volles Recht, sich an allen Festlichkeiten und Vergnügungen zu beteiligen.

Die Aissoren schließen ihre Ehen größtenteils nur unter sich und zwar sehr früh: der Jüngling tritt mit 16 bis 18, die Jungfrau mit 13 bis 14 Jahren in die Ehe.

Die Sprache der Aissoren stammt offenbar aus der Alt-Assyrischen, ist aber unter dem Einfluß der Sprachen der benachbarten Völker sehr verändert. Die heiligen Bücher der Aissoren sind in alt-assyrischer Sprache verfaßt. Die jetzige Sprache der Aissoren wird von

ihren Nachbarn nicht verstanden, unter Schwierigkeiten vielleicht von den Hebräern; im Verkehr mit anderen Völkern bedienen sie sich der tatarischen und der armenischen Sprache.

In anthropologischer Beziehung sind die Aissoren noch wenig untersucht. Chantre hat 22 Männer und 5 Frauen, Erkert 6 Männer und Pantjehow 11 Männer gemessen (im Summa 43). Der Verfasser hat freilich nur 13 Personen (im Alter von 11 bis 60 Jahren) in Baku untersucht können, aber er hofft, daß trotz der geringen Zahl seine Mitteilungen wegen der Seltenheit des Materials ein gewisses Interesse haben werden.

Der Verfasser hat am Schlusse seiner Abhandlung alle seine Zahlen in eine große Tabelle (117 Zahlen für den Einzelnen) zusammengestellt. Er vergleicht seine Ergebnisse so viel als möglich mit denen anderer Autoren. Wir können hier nur einzelne Zahlen wiedergeben.

Die Haare der Aissoren sind dunkel, dicht und meist leicht lockig; die Haut ist an bedeckten wie an unbedeckten Stellen etwas dunkel. Die Augenfarbe ist dunkel- oder hellbraun. Die Augendipalte liegt horizontal. Puls und Atmung zeigen nichts Besonderes.

Die Körpergröße beträgt im Mittel 1737 mm nach Chantre . . . 1660 bei Männern, 1590 bei Frauen, nach Pantjehow 1683 mm bei Männern.

Die Kopfmäße sind:

|           | Länge     | Breite   | Kopfdiex                       |
|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| Arutinow  | 184,42 cm | 157,5 cm | 85,67 (Max. 93,90, Min. 77,95) |
| Erkert    | —         | —        | 85,0 (Max. 86,7, Min. 83,1)    |
| Pantjehow | —         | —        | 87,0 (Max. 92,3, Min. 80,5)    |
| Chantre   | —         | —        | 89,50 (Max. 95,97, Min. 83,72) |

Das Mittel aus den Messungen aller Forscher ist demnach 87,2 (Max. 95,97, Min. 77,95).

|                 |           |                     |             |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Mesokephal      | . . . . . | (77,78—80)          | 4 Proz. (2) |
| Subbrachykephal | . . . . . | (80,1—83,3)         | 8 „ (4)     |
| Brachykephal    | . . . . . | (87,34 und darüber) | 88 „ (44)   |

Folglich sind die Aissoren in hohem Grade brachykephal, sie nähern sich damit unter den Kaukasieren den Armeniern (86,89), den Lesghiern (85,9 bis 86,66), den kaukasischen Juden (85,3) und den Lasen (87,48).

Der Brustumfang beträgt im Mittel 800 mm (Min. 740, Max. 890), übertrifft demnach etwas die Hälfte der Körpergröße, Verhältnis zur Körpergröße ist 52,26 Proz. (Min. 49,36 Proz., Max. 55,31).

Der Verfasser gibt zum Schluß folgende kurze Übersicht.

Die Körpergröße der Aissoren überschreitet etwas das mittlere Maß, die Aissoren zeigen zu hohem Wuchse; ihr Brustumfang ist gut, er übersteigt die Hälfte der Körpergröße. Der Rumpf, die oberen wie die unteren Extremitäten sind mäßig entwickelt und proportioniert. Das Gesicht ist nicht breit, die Stirn ziemlich hoch, Nase von mittlerer Größe. Unter den drei Abschnitten des Gesichts ist der untere verhältnismäßig lang. Mund und Augen sind von mittlerer Größe. Der Kopf ist ziemlich groß, ist in senkrechter Richtung besonders entwickelt; er ist hoch, von vorn nach hinten dagegen erscheint er wie zusammengedrückt, er hat ein hohes Hinterhaupt. Die Aissoren sind stark brachykephal, die Mehrzahl, 68 Proz., hat einen Kopfdiex von 87,92. Die Mehrzahl der Aissoren ist brunnrot, hat eine dunkle Hautfarbe, braune Augen, schwarzes geflocktes Haar am Haupt wie im Bart.

Die Aissoren machen in ihrem ganzen Habitus den Eindruck von typischen Semiten; dasselbe sagen auch die Beschreibungen Chantres, Pantjehows und Er-

kerts, Chautre hält sie für reine Semiten, nach ihrer Sprache nach. Paantjgou erklärt sie für die am wenigsten gemischten Nachkommen der alten Chaldäer und findet sie am meisten ähnlich den kaukasischen Juden von Aelalyk.

27. Nekrolog: N. I. Seeland, von Ant. Iwanowski, S. 101—103. Mit dem Portrait Seelands.

Nikolai Lwowitsch Seeland wurde am 3. Nov. 1833 in der Stadt Aserburg auf der Insel Osel (Livland) geboren. Nachdem er das Gymnasium in Nowgorod absolviert, studierte er Medizin an der militärmedizinischen Akademie in St. Petersburg, und beendete den Kursus 1859; den Doktorgrad erwarb er sich 1869 in Warschau. Er war dann 37 Jahre lang ununterbrochen Militärarzt nachstehend in Orenburg, in Warschau, in Amurgobut, im Semiratschiner Gebiet, zuletzt Gehülfe des militär-medizinischen Inspektors zu Taschkent. 1896 nahm er seinen Abschied, lebte kurze Zeit in Kiew und ging zuletzt nach Werni), um sich ganz seinen anthropologischen Studien hinzugeben. Auf dem Wege ins Ausland starb er in Omak (Sibirien) am 19. August 1903. Seeland war ein sehr vielseitig gebildeter, fleißiger Forscher und Schriftsteller; er hat außer einer Reihe anthropologischer und ethnographischer Abhandlungen auch viele rein medizinische Arbeiten in russischen, deutschen und französischen Zeitschriften veröffentlicht. Unter seinen anthropologisch-ethnographischen Abhandlungen seien genannt:

Die Tihiliken (russ. Revue 1882, Arbeiten der anthrop. Ges. in Moskau 1884).

Die Kirgisen (Schriften der west-sibirischen Abt. der kais. russ. geogr. Ges. Revue d'Anthropologie 1895).

Ein vollständiges Verzeichnis aller Schriften Seelands (52 N. N.) findet sich S. 103.

28. Kritische Bibliographie. III. Jahrgang, Nr. 4, S. 104—115.

M. S. Morosow, Materialien zur Anthropologie, Aetiologie und Psychologie der Idiotismus. Das. St. Petersburg 1902, bespr. von W. W. Worschjow.

J. Talko-Ilynezowitsch. Zwei Worte über den Ursprung der Slaven vom anthropologischen Standpunkt aus. Wiss. Abh. 6. Warschau 1902 (in polnischer Sprache). Autoreferat.

Die ursprünglich in polnischer Sprache verfaßte Abhandlung ist eine an den bekannten Geschichtsforscher K. Podkasky, Professor an der Universität zu Krakau, gerichtete Antwort. Podkasky hat in der Lemberger historischen Vierteljahrschrift in polnischer Sprache eine Abhandlung über den Ursprung der Slaven drucken lassen.

Podkasky bespricht das Buch des tschechischen Gelehrten Professor Niederle über den Ursprung der Slaven und berührt einige anthropologische Fragen. Professor Niederle hat auf Grund der Arbeiten polnischer Anthropologen entdeckt, daß die Kurzköpfigkeit (Brachykephale) der polnischen Bevölkerung in Polen von Norden nach Süden zunimmt und das Maximum in Podgalja am Tatragebirge erreicht. Podkasky erklärt diese Tatsache durch besondere zufällige Einflüsse; er ist geneigt, die jetzt herrschende Hypothese über den Ursprung der Slaven aus den Karpathen zu legen. Nach der Meinung Podkasky's stellt die Bevölkerung in Podgalja keine reine ethnographische Einheit dar, sondern hat sich erst in verhältnismäßig jüngerer Zeit aus polnischen und slowakischen Auswanderern gebildet. Die Slaven siedelten sich nämlich untern in Gebirgen an; die Karpathen, die eine Völkergrenze darstellen, sind im Altertum keines-

wegs von Slaven bevölkert, sondern erst viel später, durch Deutsche, Malachen und Russen (Lithenen). Podkasky beruft sich dabei zur Begründung dieser Hypothese auf die historischen Arbeiten von Stadnicki, Niklositsch, Kalushnasky und auf ältere Chronisten, wie auf Dlugosch, auf die wälschische Benennung der Orte im Tatragebirge im XVI. Jahrhundert und auf die Worte wälschischen Ursprungs, die von den Viehzüchtern in bezug auf die Hauswirtschaft gebraucht werden. Darauf gestützt, daß im XV. und XVI. Jahrhundert am Fuße des Tatragebirges deutsche Kolonisten gelebt haben, und daß die polnische Bevölkerung erst in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts hier eingewandert ist, legnet Podkasky, daß die Bewohner von Podgalja den reinen anthropologischen slawischen Typus repräsentieren; er erklärt die Theorie von der Brachykephale der alten Slaven, insbesondere der Polen — für nicht bewiesen. Podkasky behauptet, der knorpelige Kargantypus sei der primitive Typus der Slaven; er weist ihn auf die beträchtliche Kurzköpfigkeit der im ersten Ostsee wohnenden Polestebken (Weißrussen), die zu beiden Seiten des Flusses Pripiet an seiner Einmündung in den Dnjepr die Niederung (Polesse) bewohnen, und die ebenso kurzköpfig sind wie die Tschechen und Slowaken. Da aus gewissen Urkunden des XVI. Jahrhunderts hervorgeht, daß damals schon eine der heutigen gleiche Bevölkerung dort saß, so gibt Podkasky zu, daß im Polesse ein älterer primitiver Herd der Kurzköpfigkeit besteht. Zum Beweis der Ansicht, daß die alten Gräber mit dolichokephalen Schädeln in Polen slawisch seien, bezieht sich Podkasky auf die Ausgrabungen des Dr. Rutkowski in den Kreisen von Plock und Serpce (Gouv. Plock). In diesen Gräbern, die aus dem XII. Jahrhundert stammen, sind gefunden: ringförmige Ohrgehänge, sowie eine Münze von Kasimir, hieraus ist auf eine slawische Abstammung der Gräber zu schließen. Die mittlere Körpergröße der gemessenen Skelette betrug 175 cm, der mittlere Schädelindex (24 Schädel) 71,93. Podkasky sagt nun, daß die alten Slaven sich auch durch andere anthropologische Eigenschaften von den jetzigen unterschieden hatten. Er weist darauf hin, daß nach Ibn Jacob (X. Jahrhundert) die Bewohner Tschechiens krumm gewesen seien, die sibirischen Slaven und die Szechon blond, so hätten sich die Tschechen von ihren sibirischen Stammesgenossen unterscheiden. Auch nach Dlugosch (XV. Jahrhundert) hätte die bayerische Bevölkerung in Polen aus zwei Typen, einem hellen und einem dunklen, bestanden. Podkasky nimmt nun, im Anschluß an Niederle an, daß unter dem Einfluß geographischer und anderer Bedingungen der ursprüngliche dolichokephale Typus der Slaven sich in den mesokephalen und brachykephalen umgebildet habe; es sei das geschehen durch eine Mischung der Slaven mit irgend einer kurzköpfigen Rasse, vielleicht im Westen mit den Kelten, im Norden mit den Finnen.

Dr. Talko-Ilynezowitsch kann vom Standpunkt der Anthropologie aus allen diesen Ansichten Podkasky's und Niederle's nicht zustimmen.

Seit den Zeiten Schafarik's sind alle polnischen Historiker der Ansicht, daß das Zentrum der ursprünglichen slawischen Bevölkerung die Karpathen sind. Dieser Meinung pflichten auch die hervorragenden Vertreter der russischen Geschichte bei: Solowjew, Bestuschew-Rjmin, Kostomarov u. a. Diese Meinung wurde auch bestätigt durch die Ergebnisse aller bisherigen semiten anthropologischen Untersuchungen. Wenn auch die angrenzenden Gebiete der Karpathen zeitweilig von anderen Volkstümern besiedelt worden sind, so konnte die geringe Zahl der Einwanderer auf die isolierte, bis auf den heutigen

Tag von freudiger Beimischung gesonderte alte Bevölkerung des Tatragebirges nicht einwirken; es kann die allgemein geltende Annahme, daß hier die älteste slawische Bevölkerung wohnt, nicht erschüttert werden.

Wenn wir davon absehen, daß Berge und Wälder früher besiedelt wurden als die Ebene, weil Berge und Wälder dem Menschen bessere Zufluchtsstätten gebieten, und weil der einfache Fang wilder Tiere des Waldes offenbar früher da war, als die Viehzucht auf den Ebenen, so ist wohl anzunehmen — meint Herr Talko-Hrynawitsch —, daß auch in der Urzeit Polens die bergigen Gegenden früher bewohnt wurden als die Ebenen. Das slavische Wort „ljudské“, das die Bewohner der Wälder (les) und Berge bezieht, soll, ist nach J. Karłowitsch älter als die Worte Polak, Polanin, die die Bewohner der Felder (pola) und Ebenen kennzeichnen. Man muß annehmen, daß „Podgajna“ in der ältesten Zeit schon bewohnt worden ist; es wird das auch bestätigt durch die erst kürzlich entdeckte Höhle, in der fossile Bärenknochen und knochenartige Gerätschaften gefunden worden sind. (St. Witkewitsch, Dr. El. Radekowsky). Wahrscheinlich werden sich auch menschliche Knochenreste finden. Die in den Karpathen gemachten anthropologischen Untersuchungen haben einen großen Unterschied dargestellt zwischen den Bewohnern der Berge und denen der Ebene. Die Bergbewohner sind größer (166,5 mm), haben einen in der Breite mehr entwickelten Kopf (156,4 mm) mit einem Kopffindex, der auf einen hohen Grad von Brachycephalie (85,35) hinweist, mit einer schmalen Stirn (106,5 mm), sie repräsentieren einen helleren Typus, als die Bewohner der Ebene.

Daß die Bergbewohner eine recht reine Rasse darstellen, wird durch die Gleichmäßigkeit des Kopffindex bewiesen. Die Vertreter des ersten Typus, der kurzköpfig (brachykephal), dagegen sind nur 6 Proz. mesokephal und kaum 1,8 Proz. dolichocephal. Bei einem Besuch der Tatra im vorigen Jahre fand Dr. Talko-Hrynawitsch unter den Bewohnern zwei verschiedene Typen vor, die Bewohner selbst bestätigten diese Wahrnehmung. Die Vertreter des ersten Typus, der mehr verbreitet ist, sind größer, bagner, dunkler an Haut und Haaren und haben ein langes Gesicht. Die Vertreter des andern Typus sind kleiner, viel kräftiger und untersetzter, von kräftigerem Bau, haben ein rundes Gesicht, helle Haut und Haare. Die Reinheit des Typus dieser Podgalinen wird geringer mit der Entfernung von der Tatra nach Norden und Osten, die Körpergröße wird geringer, die Kurzköpfigkeit geht allmählich in die Mittelköpfigkeit über. Die Mischung in den kranziologischen Gruppen zeigt sich, indem sowohl die Mesokephalie wie die Dolichocephalie zunimmt. Es tritt mehr die anthropologische Verwandtschaft der Podgalinen mit den Ukrainern an rechten Dnjeprufer und mit den Polsechtschaken hervor, als die Verwandtschaft mit den polnischen Bauern, welche die Ebene bewohnen. Die Körpergröße der Ukrainern ist 166,9, und der Kopffindex nach Talko-Hrynawitsch 83,2, nach Diebnid sogar 84,6 (86 Proz. sind brachykephal, 9,5 Proz. sind mesokephal, und 3,7 bis 4,5 Proz. sind dolichocephal). Bei den Polsechtschaken (den Bewohnern des Polzase) hat Talko-Hrynawitsch eine Körpergröße unter 164 cm ermittelt, der Kopffindex beträgt bei ihnen 85,1, nämlich kurzköpfig sind 82,1 Proz., mittelköpfig 14,4 Proz., langköpfig nur 3,5 Proz. Talko-Hrynawitsch hat in seiner Abhandlung über das Volk der Ukraine auf Grund seiner Messungen die Ansicht ausgesprochen, daß die Reinheit der Rassen sich unter den Bewohnern der Ukraine besser erhalten hat als unter den stammverwandten Kleinrussen (Molossin), die am linken Dnjeprufer wohnen. Er hat darauf hingewiesen, daß die

Bewohner der Ukraine (die Ukrainern) mit den Bewohnern der Tatra verwandt sind. In Betreff der Polsechtschaken ist zu betonen, daß nicht allein ihre Sprache, sondern auch ihre physischen Eigenschaften auf ihre Verwandtschaft mit den Ukrainern hinweisen. Talko-Hrynawitsch spricht hier Ansicht an, welche auf seine eigenen Untersuchungen und Erörterungen in geordneter Weise vor ihm viel mehr berechtigt, die einzelnen Zentren der Kurzköpfigkeit zu erklären, als die Anschauungen der andern Autoren.

Die Untersuchungen an den Vertretern der polnischen Schlächte (der Schlächtitzen) haben kundgetan, daß die Schlächtitzen von den Bauern durch ihren hohen Wuchs und größere Brachycephalie unterscheiden; sie nähern sich dadurch den Podgalinen und weiter den Ukrainern und Polsechtschaken. Bei den polnischen Bauern, wenigstens in den Gebieten, wo die Untersuchungen stattfanden, wurde festgestellt eine geringe Körpergröße und ein Kopffindex, der zur Mesokephalie hinneigt; nämlich bei den Warochauer Bauern 80,85, bei den Bauern von Plozk 81,74, von Lomaha 81,3 bis 81,8, Lublin 82,6, Plozak 81,74, Sandomir (nahe den Karpathen) 83,0. In einzelnen Gruppen schwankt der Prozentgehalt der Kurzköpfigen von 59 bis 77 Proz., der mittelköpfigen von 15 bis 26 Proz., der langköpfigen von 7,5 bis 17,5 Proz. Die größtenteils Bauern stehenden polnischen Bauern sehr nahe, sowohl in ihrem Kopffindex (82,1), wie auch in der Gruppierung der verschiedenen kranziologischen Typen; es überwiegen die Brachykephalen, 73,48 bis 72,50 Proz., während Mesokephale 16,18 bis 21,70 Proz., Dolichocephale 5,80 bis 19,62 Proz. ausmachen. In den nördlichen Gouvernements Nowgorod, Pskow, zum Teil nach Wolgda und Kostroma, tritt die brachykephale Element stärker hervor, als in den andern Gouvernements, die mehr südlich und östlich liegen. Die gegenwärtige Bevölkerung der Gouvernements Moskau, Tula, Jaroslaw, Wladimir, Twer, Olonek nähert sich nach ihrer kranziologischen Gruppierung dem Typus der Schädel aus den alten Grabstätten im Kreise Malinadyk (Govv. Kasan), die dolichocephalen Schädel der Massengrabstätten aus dem VIII. bis X. Jahrhundert unterscheiden sich nach Bogdanow in nichts von den alten Tscheremissen. Aus all dem Gesagten geht hervor, daß das Zentrum der Kurzköpfigkeit für Osteuropa in den Karpathen liegt. Als Zentren für die Dolichocephalie sind im Norden und im Osten anzunehmen, die finnischen Volkstämme bewohnt werden (Wotjaken, Karelen, Tscheremissen, Syrjänen, Esten und Aiven) mit einem (mesokephalen) Kopffindex von 78 und höher, aber mit einer gewissen Hinnegung zur Dolichocephalie. Einen noch niedrigeren Kopffindex besitzen die Letzen, ein Zweig des baltischen Volkstammes. Auf Grund der anthropologischen Eigentümlichkeiten derselben sprach Talko-Hrynawitsch (Charakterystyka fizyczna ludow Litwy i Rosi 1893) die Ansicht aus, daß sie mit den Finnen verwandt seien. Er war sehr erfreut, zu vernehmen, als der Finnologe Professor Baudouin de Courtenay ihm mitteilte, daß er in linguistischer Beziehung zu demselben Schluß gelangt sei. Ein anderes Zentrum der Dolichocephalie im Osten ist die Podlāsja. Durch den jahrhundertelangen Kampf von Polen und Westrußland ist dies Zentrum zerstört. Heute lebt daselbst eine Bevölkerung, die sich beträchtlich von der ursprünglich polnischen Bevölkerung unterscheidet. Die in der Podlāsja (östlicher Teil des Govv. Lomaha und die beiden Kreise Belak und Belostok des Govv. Grodno) lebenden Bewohner sind, wie man meint, die Nachkommen der in der Geschichte wenig bekannt gewordenen Jadawinger oder Jatwas, eines Volkstammes, der vielleicht den



Litauern oder den Finnen verwandt war. Die Bevölkerung vermischte sich mit den Russen und Polen; nach den Untersuchungen Talkos ist der Kopffindex 81,8 im Mittel (67 Proz. Brachykephale, 20 Proz. Dolichocephale und 13 Proz. Mesokephale). Schließlich finden wir noch als dritten Rest von Dolichocephalie die dolichocephale Gruppe der polnischen Hasaren, die Großrussen, Weißrussen (Bjelorussen) und Litauern. Allein am stärksten tritt der dolichocephale Typus in den alten Gräbern hervor; je älter die Gräber sind, um so schärfer ausgeprägt ist die Dolichocephalie, das ist sowohl in Polen wie in Rußland, wie in Tschechien zu bestatigen.

Vom VIII bis zum XV Jahrhundert nimmt der dolichocephale Typus allmählich ab, schließlich erhält der brachycephale Typus das Übergewicht und ist in den letzten Jahrhunderten der vorherrschende. Aus all' diesem geht hervor, daß einst die Zentren der Dolichocephalie in Osteuropa zahlreich waren. Mit Berücksichtigung des heutigen slavischen Typus und in der Überzeugung von der Unveränderlichkeit des Typus meint Talko, daß der Typus der Slaven in alter Zeit brachycephal war. Eine Veränderung des Typus konnte eintreten unter Einfluß der Vermischung der Slaven mit anderen Völkern. Allein wir wissen aus nubeschriebenen Tatsachen, wie schwer sich bei Vermischung der Schädel ändert. Es ändert sich die Farbe der Hautbedeckung, die Körpergröße, allein am längsten bewahrt der Typus des Schädels seine ursprüngliche Beschaffenheit. Wir beobachten das an der Bevölkerung des östlichen Rußlands und Sibiriens; das slavische Element hat trotz seiner numerischen Schwäche die Masse der eingeborenen Bevölkerung überwunden und auf dieselbe die slavische Kultur übertragen. Aber trotz des durch viele Generationen andauernden frischen Zuflusses slavischen Blutes ist noch heute auf der Masse der finnischen, tatarischen und mongolischen Bevölkerung nicht der anthropologische Typus der Slaven übertrags worden. Noch mehr bemerkbar macht sich unter den Völkern Zentralasiens; große Massen der eingeborenen Bevölkerung vermischen sich, nehmen eine fremde Kultur, fremden Glauben, fremde Sprache an, behalten aber ihre anthropologischen Eigenschaften bei. Auf diese Weise allein können wir es erklären, warum die alten slavischen Gräber, die ihrer Kultur nach als slavische aufzufassen sind, doch in anthropologischer Hinsicht nicht für slavisch gelten können. Es ist sehr möglich, daß der langköpfige slavische Kurgantypus nichts ist als der Rest einer alt-europäischen Rasse, die allmählich von den jungen und lebensfähigen kurzköpfigen slavischen Rasse überwunden worden ist. Ein derartiges Aussterben der Völker beobachtet man noch heute dort, wo ein barbarisches Volk mit einem zivilisierten Volke zusammenstößt. Im Kampfe ums Dasein fällt die ihrer Organisation nach niedriger stehende Rasse.

Wir nehmen an, daß der ursprüngliche slavische Typus durch eine kurzköpfige, mit dunkeln Haaren versehene Rasse, wie sie heute noch im Tatrgebiete wohldefiniert vorkommt, diese Rasse breitete sich nach Westen aus, wanderte durch Mitteleuropa, durch Schlesien, Mähren (Tschechien), Bayern bis zu den Alpen; es war die sogenannte kelto-slavische Rasse der französischen Autoren. Wir nehmen weiter an, daß die kurzköpfige dunkelhaarige Rasse sich von den Karpathen aus, als dem Zentrum der kurzköpfigkeit, nicht allein nach Westen, sondern auch nach Norden verbreitete und ferner über die Weichsel in das östlich gelegene Gebiet eindrang; so haben wir ein Bild von der Ausbreitung der Slaven.

Wir stützen uns auf anthropologische Daten, auf die anthropologische Verwandtschaft zwischen den

Podgörlänen und den Schlichtizern, wenn wir die Hypothese aufstellen, daß von den Karpathen ein kurzköpfiges, kriegerisches und ritzenhaftes Volk (die Schlichtäer oder die Schlichtizern) ausging, das langköpfige, nomadischere Volk der Ebene besiegte und assimilierte. Die langköpfigen Individuen unter den polnischen Hasaren, sowie die langköpfigen Leute unter der fast rein großrussischen Bevölkerung sind als die Repräsentanten eines einst zahlreichen, jetzt ausgestorbenen Typus der Antochthonen zu betrachten.

## 23. Nachrichten und Bemerkungen. S. 116—120.

Die Untersuchungen F. J. Koss (Cohns) im Lande der Urjanchen. (S. 117—120.) F. J. Cohn, der seit dem Ende des vorigen Jahres 1902 die Sojoten anthropologisch und ethnographisch untersuchte, teilt über den Gang seiner Arbeit folgendes mit: die ganze Zeit, die ich im Gebiet der Urjanchen oder, wie sie sich nennen, Tuwa überbrachte, war der Erforschung der Sojoten (Kemttschiker) gewidmet, die am Flusse Kemttschik, einem Nebenflusse des Jenissei, wohnen und zu den Choschonen T oder Mongtschak und Belira gehören. Beide Choschonen nennen sich unter der Verwaltung eines „Ukareda“ (oder Gurd), der sich erst im Laufe dieses Jahres von der Abhängigkeit des Ambin-Noion befreit hatte und nun direkt mit dem „Jehanschin in Ulasutas verkehrt. Die Teilung der Sojoten in Choschonen ist willkürlich; sie hat nur eine administrative Bedeutung. Die Sojoten selbst teilen sich jetzt wie in alter Zeit in „Samsak“ (Knochen) oder unter Gebrauch eines von den Mongolen genommenen Ausdrucks in „Samsu“. Jedes „Samsu“ wird wieder in kleinere Teile zerlegt.

Das von der Kemttschiksojoten bewohnte Gebiet ist in archäologischer Hinsicht sehr interessant, es ist mit Altartemern wie best: mit burghanen (korum) und Steinfiguren (kache-tschak) und mit Inschriften auf Steinen. Ich habe — schreibt der Verfasser — mir Photographien von all' diesen Altartemern gemacht. Ein mit Schriftzügen versehen Stein, der bei Dschardelaryk gefunden wurde, konnte nach Minussinsk ins dortige Museum geschafft werden, — ein Abdruck davon ist an die Akademie der Wissenschaft nach St. Petersburg befördert worden. Auf dem Wege nach Salsan entdeckte ich unter der Figur eines Tigers Bruchstücke einer steinernen, mit Schriftzügen bedeckten Platte. Nach Entfernung der Tiggerfigur wurde die Platte gehoben und dabei festgestellt, daß auch die untere Fläche eine gut erhaltene Inschrift aufwies. Der Ort, wo dieser Stein sich befindet, heißt Chemsurgantyn-Kyik, am linken Ufer des Jenissei, 7 bis 8 Werst (Kilometer) von der Einmündung des Flusses Baryk. Alle die Altartemern dieser Gegend werden Tschingti-Chan zugeschrieben. Nach den Worten der Sojoten soll Tschingti-Chan noch leben — als Gast des Kaisers (Bogdeyhan) von China.

Es wurden 50 Sojoten, darunter 15 Weiber, gemessen, und 15 Schädel gesammelt, so daß ich hoffe, es würde sich die Möglichkeit ergeben, etwas über die Abstammung der Sojoten zu ermitteln. Zunächst kann nur gesagt werden, daß am Flusse Kemttschik das Volk kräftiger und gesunder, während es zum Dschakul hin schwächer wird. In pathologischer Hinsicht ist bemerkenswert: Am Ursprung des Kemttschikflusses gibt es sehr viel Erkrankungen der Respirationsorgane aus viel Rheumatismus, was häufiger ist als bei den Sojoten mit Syphilis behaftet. Die Ursache dieser Erkrankungen liegt, wie es scheint, in der Nähe der Umsinkor Goldwäshen.

Das Verhältnis der Russen zu den Sojoten ist sehr schlecht; die Sojoten werden anferngewöhnlich schlecht behandelt.

In betref der religiösen Anschauungen unterscheiden sich die Kentschik-Sojoten sehr auffallend von den andern. Der Lamaismus (Buddhismus) beginnt erst jetzt hier Wurzel zu fassen und den Schamanismus zu vordrängen, doch haben zunächst beide nebeneinander Platz, die Lamas und die Schamanen, sowie die Götzenbilder. Der Lamaismus ist mit den Mongolen hier eingedrungen, die Lamas sind Mongolen; die lamaistischen Lehren und Sagen tragen deutlich den mongolischen Charakter. Aber auch im Schamanismus ist der mongolische Einfluß bemerkbar. Es gibt Schamanen, welche vorher in die Gegend von Urga gelangt waren, um beim Tain Tersch sich segnen zu lassen. Mitunter ist der Tain Tersch auf einer Schamanentransmigrirung abgeholt. Als Amulette spielen eine große Rolle „ter-edij“, Gegenstände, die vom Himmel fallen — bronzene Pfeilspitzen aus den Kurganen, ferner Spiegel, Hämmer, die Götzenbilder (Kren mongol. ongon) sind sehr mannigfaltig, je nach ihrer Bestimmung, nach Schutz auf Reisen, gegen Krankheiten usw. Es werden allerlei Beschwörungsformeln usw. aufgesprochen, wobei die Lamas, wie die Schamanen spielen die Rolle der Ärzte: sie beschäftigen sich mit Heilung von Krankheiten friedlich nebeneinander, sich gegenseitig helfend. Die Lamas sind Vertreter der tibetisch-mongolischen Medizin, die Schamanen vertreten die Volkmedizin. Beider Hilfe wird oft gleichzeitig angewandt, die Lamas heilen Scharlach, die Schamanen die Schamanen zaubern und stellen totenbildend zum Schutz der Kranken auf. In einem Fall verlangte der Schaman, der einen erkrankten reicheu Bonamen der Sojoten behandelte, daß, im Anschluß an die vorausgegangene Zauberei, die Knochen der Eltern des Kranken, sowie des Schamanen, der ihn früher behandelt hatte, verbrannt werden sollten, und es geschah auch.

Der mongolische Einfluß ist auch bemerkbar im Aufbau der Wohnhäuser und Jurten. Die Jurten sind aus Filz, kuppelförmig, von mongolischem Typus, die einzelnen Teile der Jurten tragen mongolische Beziehungen.

In betref der Nahrung, der Kleidung, der Familienverhältnisse sind reichliche Materialien gesammelt worden. Einiges mag hier angeführt werden: das Geschlecht des Kindes kann im Voraus bestimmt werden durch Beobachtung der Kindesbewegungen im Leibe der Schwangeren. Der weibliche Fötus bewegt sich namentlich vorwärts, der männliche Fötus bewegt sich selten aber rückwärts. Beim Erkären riefen die Frauen nach: „Ich halte dich dabei mit den Händen an einem ausgepanschten Felle. Die bei der Geburt helfende Hebamme heißt „Tudngchi“. Geizige Frauen öffnen bei ihren Gehärten ihre Kisten, in denen ihre Halseligkeiten liegen. Bildet die Nachgeburt zurück, so wird mit einem Gewehr, das der Frau auf die Schulter gelagert wird, hind geschossen. Blutungen werden nicht gestillt, man meint, je reichlicher Blut abfließt, um so besser sei es für die Gebärende. Die Nabelschnur wird mit einer Schere oder einem Messer abgetrennt und mit einer Sehne gebunden. Die Nachgeburt wird vergraben, in solchen Familien, wo Kinder sterben, wird die Nachgeburt zugleich mit einem Stück Schafwolle in den Händen zum Feueren vorgeworfen. Das Neugeborene wird mit einem Aufguß von chinesischem Tee (Ziegeltee) mit Salz begossen. Beim Einlegen in die Schaukelwiege werden die Glieder gerichtet. Die Mutter stillt die Kinder bis zur nächsten Geburt; es kommt vor, daß das einjährige Kind den Rest der Milch, den das Neugeborene nicht mehr genossen, aus der Brust aussaugt. Die Beziehungen der Eltern zu den Kindern sind sehr verschieden: der Kuabe ist der zukünftige Herr des Hauses, — das Mädchen geht in eine fremde Familie,

sie ist in der eigenen Familie überflüssig; sie trägt auch die Benennung „kro-dahok“, d. h. nicht nötig. Der Eintritt der Geschlechtsreife ist bei Knaben wie Mädchen sehr früh, im 12. bis 15. Jahre. Die Knaben vollführen den ersten Coitus, sobald sie manbar geworden, die Mädchen sehr oft vor dem Auftreten der ersten Menstruation. Der Verkehr der Mädchen mit den Jünglingen vor der Ehe gilt nicht als schimpflich; besonders Jurten zur Erleichterung dieses Verkehrs, wie E. K. Jakowlew berichtet, gibt es aber bei den Kentschik-Sojoten nicht. Die Mädchen heiraten einen Mann, obschon sie bereits Kinder von andern Männern haben. Diese Kinder bleiben größtenteils in der Familie der Mädchen. — Freien und Hochzeiten sind mit einer Reihe von Gebräuchen verbunden. Taktur — die Verlobung, eigentlich die Verlobung. In einer besonders dann erblicheten Jurte (oinar-ug) hechten die Freunde des Brautigams sowohl ihm als auch der Braut die Zöpfe. Am Abend desselben Tages nimmt der Brautigam ein Stück vom Oberkiefer seines Schafes in den Mund und hält das Stück mit den Zähnen, und die Braut muß davon ein Stück abbeißen. Dieser Gebrauch soll symbolisch andeuten, daß die Braut sich von ihrer Familie löst; er heißt Tscherik-ysyrtir. Eigentümlich ist ferner folgender Gebrauch: Wenn die Braut mit ihren Freundinnen in den Ullus (Lager, Wohnort) des Brautigams kommt und die von der Braut mitgeführte Jurte aufgestellt ist, so werden die Begleiter der Braut dreimal um die Jurte; sie werden dabei von den Gefährten des Brautigams verfolgt, die sich bemühen, die Begleiter der Braut mit Wasser zu begießen. Die Verfolger armieren einander durch den Ruf: Begießt sie! Die Verfolgten rufen: Macht euch fort! Sobald das Wasser bei den Verfolgten zu Ende geht, so fangt die Verfolgten an zu weinen, ihr habt nicht Wasser genug, um uns zu bespritzen, lieber solltet ihr doch Kuhharn nehmen! Man bemüht sich dann, denjenigen, der das Gefäß hat, zu fangen, und wirft ihm wohl gelegentlich ins Wasser, in einen Bach oder einen Teich. Die Sojoten erklären diese Sitte in folgender Weise: durch das Begießen mit Wasser wird die Braut und ihre Begleiter, die bis dahin als unrein galten, gereinigt.

Fälle von Bigamie sind sehr selten; der Sojote nimmt nur dann eine zweite Frau, wenn die erste unfruchtbar ist. Die guten oder schlechten Beziehungen der beiden Weiber untereinander hängen davon ab, ob im Einverständnis oder gegen den Willen der ersten Frau die zweite gewählt worden ist, so wenn die erste Ehefrau stirbt, heiratet die Witwe entweder der Bruder des Verstorbenen oder sie kehrt zu ihrem Vater zurück. Die Kinder bleiben jedoch in dem „Smo“ des Verstorbenen.

Auch die Bestattung wird unter viel besonderen Gebräuchen vollzogen. Sobald ein Sojote gestorben ist, schlachtet man einen Schafbock und schickt mit dem Schamanen „De Schaman“, „Chin“ meist auf den Opferaltar (san-aslyr) Feuer an, legt Stücke Schafschafschaf auf und sagt: Du bist gestorben! Weine nicht, so nicht betrüb! Hier hast du alles, was dir zur Nahrung deut: Fleisch, Hirs, Branntwein, Tee, — alles dies wird auf den Altar gestellt. Der Verstorbene antwortet dann durch die Mund des Schamanen: Was willst Du? Ich bin ja unter euch, ich lebe! Du lebst? Der Lebende hat einen Schatten, sich doch um, du hast keinen Schatten! — Der Tote gibt sich zufrieden, — alle Anwesenden werfen etwas Tabak aus ihren vollgestopften, aber nicht brennenden Pfeifen auf den Altar; dann legt man den in irgend ein Tuch eingewickelten Toten auf den Altar. Die dem man ihn unter das Haupt einen Saft gießt und das Gesicht mit einem Stück Seidenzeug bedeckt hat. Der Tote ruht auf seiner rechten Seite, die

rechte Hand unter der Wange, die linke auf der Brust. Ehe die Leiche aus der Jurte getragen werden soll, erscheinen die Lamas und weisen den Ort an, wohin die Leiche gebracht werden soll. An der Stelle der Jurte, wo der Tote bisher gelegen hat, wird der Filz und das betreffende Stück des Gitterwerks der Jurte entfernt, und durch die so entstandene Öffnung wird der Tote nicht von seinen Verwandten, sondern von einem der anderen angesehenen Sojoten herausgetragen. Die Jurte, in der der Tote lag, und derjenige, der die Leiche hinausgetragen, gelten als unrein und unterliegen einer Reinigung. Die Leiche wird nicht begraben, sondern am Südbhange eines Berges hingeworfen. Eine Ausnahme wird nur mit den Leichen der Schamanen und der vom Blitz Getroffenen gemacht: sie werden auf Bretter gelagert, die auf Pfählen ruhen.

Der Forscher hat ferner ein reiches Material gesammelt in betreff der Lebensweise und Beschäftigung der Sojoten, hat die Regeln ihrer Spiele (Schachspiel und andere), Sagen, Sprichwörter, Gesänge aufgezeichnet.

Eine neue Prämie für anthropologische, Sibirien betreffende Arbeiten. Der Universität zu Tomsk hat der erbliche Ehrenbürger L. P. Kusnezow ein Kapital von 21 441 Rubel 25 Kop. (etwa 50 000 M.) geschenkt mit der Bestimmung, daß die Zinsen dieses Kapitals zur Prämierung eines russischen Werkes über die Geschichte, Anthropologie oder Soziologie Sibiriens verwandt werden sollen. Zur Bewerbung werden alle die Arbeiten zugelassen, die nicht früher als fünf Jahre vor Erteilung des Preises erschienen sind. Der ganze Preis beträgt 1500 Rubel (etwa 3000 M.), der halbe Preis 700 Rubel (etwa 1400 M.). Wird kein Preis erteilt, so werden die Zinsen zum Kapital geschlagen. Der Preis wird alle zwei Jahre der Reihe nach für ein geschichtliches, anthropologisches oder sozialpolitisches Werk verteilt. Die erste Preisverteilung findet am 22. Oktober 1903 für das beste

historische Werk über Sibirien statt. Mindestens 10 Exemplare des konkurrierenden Werkes müssen ein Jahr vor der Preisverteilung dem Konzil (Sowet) der Tomsker Universität eingereicht werden. Die Preisverteilung wird durch eine besondere vom Konzil gewählte Kommission vorgenommen.

Anthropologische Untersuchungen von Großrussen. (S. 130.) Dr. J. D. Galsi hat im Sommer 1902 im Gov. Twer 920 Großrussen anthropometrisch untersucht (200 Männer, 100 Weiber, 100 Knaben und 100 Mädchen). Das Material wird jetzt verarbeitet.

#### Neues Material zur Anthropologie der Jakuten. (S. 120.)

N. A. Witasehewski hat an der Expedition teilgenommen, die von seiten der ostibirischen Abteilung der k. russ. geograph. Gesellschaft auf Kosten des verstorbenen Sibirjakow im Jakutiker Gebiet unternommen worden war. Er hat bei dieser Gelegenheit 101 Individuen (Männer, Weiber, Kinder) gemessen und sein Material der Moskauer anthropologischen Gesellschaft zur Bearbeitung übergeben.

Eine Expedition zu den Ainos (S. 130.) Herr W. L. Seroschewski, der Verfasser eines umfangreichen Buches über die Jakuten, ist von der k. russ. geogr. Gesellschaft und der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg zur anthropologischen und ethnographischen Untersuchung der Ainos abkommandiert.

Anthropologische Untersuchung der Udinen oder Uden. Dr. A. Aratinow beendigt gegenwärtig die Bearbeitung des gesammelten anthropologischen Materials über die Uden (Udinen), einen kleinen kaukasischen Volksstamm. Es sind 150 Individuen gemessen worden.

Kurzer Bericht über die Sitzungen der anthropologischen Abteilung der k. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde in Moskau.

## X.

## Der Schloßberg bei Burg, im Spreewald, Kreis Kottbus.

Am 6. August 1896 machte mir Herr Landtagsabgeordneter, Rittergutsbesitzer von Werdeck auf Schorbus, Kreis Kottbus, persönlich die Mitteilung, daß die Vertretungen der Kreise Lübben und Kottbus, sowie die Stadt Kottbus beschlossen hätten, gemeinsam eine Eisenbahn durch den Spreewald, ausgehend von der Stadt Lübben und endigend in Kottbus, zu erbauen. Die Bahn solle über den Burger Schloßberg geführt werden und es sei Gefahr vorhanden, daß dieses hochbedeutende altherwürdige Denkmal ans grauer Vorzeit vernichtet werde. Auf meine an die Generalverwaltung der Königlichen Museen erstattete Anzeige, berichtete letztere sogleich weiter an das hohe Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, welches unverzüglich tatkräftig eingriff und diesem umfangreichen Bauwerk unserer Altvordereu, dem Wahrzeichen des ganzen Spreewaldgebietes, seinen wirksamen Schutz andeuten ließ.

Zugleich hatte auch die deutsche anthropologische Gesellschaft, welche unter Virchows Vorsitz in Speyer tagte, Gelegenheit genommen, auf die hohe Bedeutung dieses mächtigen Erdwerkes für die Altertumskunde unserer nördlichen Ebene hinzuweisen, und sich höheren Orts gleichfalls für dessen Erhaltung zu verwenden.

Es wurde nun eine kommissarische Beratung an Ort und Stelle auf dem Schloßberge selbst für den 12. April 1897 anberaumt. Zu derselben waren folgende Herren eingeladen und erschienen:

1. Seitens des Königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalan-

gelegenheiten Geheimer Oberregierungsrat Persius, Geheimer Regierungsrat v. Moltke, der Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung des Königlichen Museums für Völkerkunde zu Berlin Dr. Voß, der Provinzialkonservator für Brandenburg, Landesbau rat, Geheimer Bau rat Bluth.

2. Seitens des Königlichen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, Geheimer Oberregierungs rat Francke, Geheimer Bau rat v. Doeminiug.

3. Seitens der Königlichen Regierung von Frankfurt a. O. Geheimer Regierungsrat Baudouin, Geheimer Bau rat Krönke, als Vertreter des Kreises Kottbus Landrat Freiherr v. Waackbarth; als Vertreter des Kreises Lübben Landrat Graf v. d. Schulenburg.

4. Seitens der Königlichen Eisenbahndirektion Halle a. S. Regierungs- und Bau rat Bischof und Regierungsassessor Kasak, endlich der Bauunternehmer Becker, welcher den Bau der Bahn auszuführen übernommen hatte.

Es wurde über die Verhandlung folgendes Protokoll aufgenommen:

„Zwecks Erörterung über die Zulässigkeit der von dem Unternehmer einer Kleinbahn Lübben-Bylegahre-Burg-Werben-Kottbus in Aussicht genommenen Durchschneidung des Schloßberges bei Burg, hatten sich die Genannten heute nach dem Schloßberg begeben. Seine vom Unternehmer beabsichtigte Durchschneidung war abgesteckt. Die Kommissare der genannten Zentralstellen waren übereinstimmend der Ansicht, daß durch eine gemäß dieser Abstreckung ausgeführte Linie, welche den Berg auf seiner westlichen Seite ungefähr 100 m von dem westlichen Fuße, durchschneiden würde, die äußere Gestaltung dieses altherwürdigen

Denkmals der Vorzeit wesentlich beeinträchtigt werden würde und daß es sich deshalb wohl rechtfertigen lassen dürfte, die landespolizeiliche Genehmigung für die abgesteckte Linie auf Grund der Ziffer 2 des § 4 des Kleinbahngesetzes vom 28. Juli 1892 zu versagen.

Weiter wurde allseitig anerkannt, daß eine in östlicher Richtung um den Schloßberg an dessen östlichem Fuße anzulegende Linie, wegen der sich aus der Örtlichkeit und der Kostspieligkeit der Ausführung ergebenden Schwierigkeiten, nicht wohl in Betracht kommen könne. Es wurde deshalb in eine Erörterung über eine Linie eingetreten, welche unter Vermeidung jedes Einschnittes des Schloßberges in westlicher Richtung heranzuführen sei. Der Unternehmer und der Landrat Graf v. d. Schulenburg erklärten indessen übereinstimmend, daß durch diese Linienführung die Kosten des Bahnbauwes, da dann die sehr bedeutenden, zur Aufschüttung des Bahnkörpers über die niedrig gelegenen Wiesen erforderlichen Erdmassen aus weiter Entfernung herangeschaft werden müßten, um 20 000 bis 30 000 Mark erhöht werden würden und daß dann der ohnehin wenig leistungsfähige Kreis Lübbau, auf dessen Kosten die Kleinbahn hergestellt werden sollte, übermäßig belastet werden würde.

Diese Begründung erschien nicht ungerechtfertigt. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß der gesamte Schloßberg sich im Privateigentum befindet, daß der Unternehmer nach einer glaubwürdigen Angabe sich ein Verkaufsrecht daran gesichert hat und daß eine gesetzliche Bestimmung, auf Grund deren die Entnahme von Erde aus dem Schloßberge gebindert werden könne, nicht besteht. Eine Gewähr dafür, daß der Schloßberg, wenn die Kleinbahn mit ihm herumgeführt wird, dauernd in seinem gegenwärtigen Zustande erhalten bleibt, ist mit ihm nicht gegeben.

Aus diesem Grunde wurde erwogen, ob es nicht angängig sei, die Kleinbahn an einer Stelle durch den Schloßberg zu leiten, welche zwar dem Unternehmer die Entnahme von Erdmassen aus ihm gestattet, gleichwohl aber seine Gesamterscheinung unthätig wenig zu beeinträchtigen geeignet ist und den Bestand des Berges dauernd sichert. Eine Lösung nach diesen

Richtungen gewährt der Umstand, daß die Umwallungen des Berges in der Richtung von Nord nach Süd anscheinend zwecks Ausfüllung des Innern des Burgwalles so stark und in solcher Breite abgetragen sind, daß die Konturen des Berges daselbst im Norden und Süden völlig verwascht und an Stelle der Umwallungen leicht ansteigende Böschungen getreten sind, über welche ein Fahrweg führt.

Auf die Erhaltung dieses Teiles des Schloßberges in seinem gegenwärtigen Zustande ist daher kein Wert zu legen. Dementsprechend erscheint es unbedenklich, die Kleinbahn an dieser Stelle — also in einer Entfernung von ungefähr 55 bis 60 m in östlicher Richtung von der vorgedachten abgesteckten Linie — durch den Schloßberg hindurchzuleiten und dem Unternehmer die Entnahme von Erde auf der zu durchschneidenden Strecke unter der Bedingung zu gestatten, daß er Sicherheit bezüglich der dauernden Erhaltung der übrigen Teile des Schloßberges in seinem gegenwärtigen Zustande bestelt. Der Unternehmer hat sich bereit erklärt, auf diese Bedingung einzugehen.

Berlin, den 1. Mai 1897.

Ministerium der öffentlichen Arbeiten III.  
5765, IV. A. 2895, Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten U. IV. 1801.

Bei Anschluß einer Abschrift der Niederschrift über das Ergebnis der kommissariischen Beratung vom 12. v. M., betreffend die Zulässigkeit der vom Unternehmer der projektierten Kleinbahn Lübbau-Byleghure-Burg-Werben-Kottbus beabsichtigten Durchschneidung des Schloßberges bei Burg, erklären wir uns mit dem Vorschlage, nach welchem die Linie der Kleinbahn in einer Entfernung von ungefähr 55 bis 60 m von der nach den Projektzeichnungen in Aussicht genommenen, in dem Lokaltermin durch Absteckung ersichtlich gemachten Linie durch den Schloßberg hindurchzuleiten ist, unter der Voraussetzung einverstanden, daß der Unternehmer zwar an der Entnahme von Erde auf der hiernach auszuführenden Strecke nicht zu hindern ist, indessen Sicherheit bezüglich der dauernden Erhaltung der Gestaltung der übrigen Teile des Schloß-

berges im gegenwärtigen Zustande zu leisten hat. Ob die Sicherheit durch Bestellung einer Kaution oder durch grundbuchliche Eintragung auf den sämtlichen, zum Schloßberge gehörigen Grundstücken zu Gunsten des Fiskus zu bewirken ist, überlassen wir Ihrer Entscheidung.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

I. A.

gez. v. Zedlitz.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

I. A.

gez. Schön.

An den Königlichen Regierungs-Präsidenten Herrn v. Puttkamer, Hochwohlgeboren, zu Frankfurt a. O. "

Die Erdarbeiten zum Zwecke der Durchschneidung des Schloßberges begannen am 4. Oktober 1897. Sie wurden abwechselnd von dem Unterzeichneten und von dem Direktorial-Assistenten Herrn Dr. Götzke von der prähistorischen Abteilung des Königlichen Museums für Völkerkunde beaufsichtigt. Eine wesentliche Hilfe hatten wir durch die große Gefälligkeit des Herrn Apotheker Petermann, damals in Burg, vor einigen Jahren nach Frankfurt a. O. verzogen und dort leider bereits verstorben. Herr Petermann sorgte für die sichere Aufbewahrung des gefundenen Materials und unterstützte uns kräftig bei der Verpackung und Absendung desselben an das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, dem die Bearbeitung der Funde von der ministeriell bestätigten Lokalkommission übertragen worden war. In einer vorbereitenden Ausschußsitzung der Bahninteressenten, zu welcher auch Herr Geheimrat Virchow, als Vorsitzender der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, hinzugezogen worden war und welche die Mitglieder der Baukommission der Kreise Lübben und Kottbus und der Stadt Kottbus einberufen hatte, wurde, wie Herr Geheimrat Virchow in einer Vorstandssitzung der Anthropologischen Gesellschaft mitteilte, beschlossen, dem Königlichen Museum für Völkerkunde die aus dem Schloßberge zu erwartenden Funde zu überweisen. Dies ist später von dem Vertreter der Baukommission, als ich mich später darauf berief, mit den Worten, daß darüber nichts

bekannt sei, abgelehnet worden. Über den engültigen Verbleib der Funde ist bisher noch keine Entscheidung getroffen worden.

Die Wichtigkeit der Untersuchung eines so berühmten Denkmals unserer Vorzeit veranlaßte selbstverständlich auch eine Zahl unserer anthropologischen und antiquarischen Freunde, uns mit ihrem Besuche zu beehren, so vor allem Herr Geheimrat Virchow, welcher in Begleitung seiner Fräulein Tochter Johanna der erste war, die neugeschaffene Situation zu besichtigen. Ferner besahen uns von der Berliner Anthropologischen Gesellschaft die Herren Professor Dr. Lissauer, Dr. Olshausen und E. Wagner; von der Niederlausitzer Anthropologischen Gesellschaft Herr Professor Dr. Jentsch aus Guben, Stadtrat Ruff aus Kottbus, Medizinalrat Dr. Behla, damals in Luckau, jetzt in Potsdam, Direktor Dr. Weineck aus Lübben und viele Herren von Burg und Umgegend.

Was nun das Gesamtergebnis der Untersuchung anbelangt, so ist die höchst bemerkenswerte Tatsache hervorzuheben, daß die frühere ziemlich allgemeine Annahme, die Anlage sei im wesentlichen eine alt-lavische, gründlich widerlegt worden ist. Wenn der Durchstich durch den Burgwall auch nur einen verhältnismäßig schmalen Streifen der ausgedehnten Oberfläche darstellt, so ist doch die Masse des zutage geförderten Materials so gewaltig und so vorwiegend vor-lavisch, daß den Slaven nur ein kleiner Anteil an diesem großen Deutikal zuzusprechen ist. Die Funde, welche bis in die Steinzeit hinaufreichen, gehören vorwiegend dem Lausitzer Typus und zwar der Billendorfer Unterart, also der späteren Bronzezeit und der Hallstattzeit an. Von der La Tène und der römischen Kaiserzeit wurde fast nichts gefunden. Es ist möglich, daß solche Funde an einem nicht berührten Teile des Walles verborgen liegen, möglich aber auch, daß in diesen Jahrhunderten, in denen die große Völkerbewegung begann (Gallier, Cimbern und Teutonen), der Burgwall nicht besiedelt war. Es finden sich in Norddeutschland, wieweilich Grabfelder aus dieser Zeit nicht selten sind, überhaupt wenige Befestigungen, welche dieser Zeit angehören — eine immerhin auffallende Erscheinung.

Dabei ist auch immer zu bedenken, daß der Burgwall leider nicht mehr ganz intakt ist. Am Nordrande ist ein großer Teil abgetragen, wahrscheinlich um das umliegende Terrain zu erhöhen und Wegedämme zu schützen, wodurch die sehr steilen Ufer dieses Teiles entstanden, die sogenannten Bastionen des Herrn W. v. Schulenburg. Im großen und ganzen kann man aber doch noch die Grundform des Burgwalles erkennen und zwar zeigt sich klar, daß die ganze Anlage in zwei große Abschnitte zu scheiden ist, in einen höher gelegenen Teil, die Hochburg, und einen niedriger gelegenen, die Niederburg. Man hatte eben bei der ersten Anlage eine von dem festen Lande des den Spreewald an dieser Stelle begrenzenden Terrains isoliert liegende höhere Erhebung anzuersuchen, um sich hier eine geschützte Zufluchtsstätte zu sichern. Die Erhebung stellt einen kurzen Bergücken dar, welcher auf dem Nordrande höher war, als auf dem Südrande, und bestand zum größten Teil aus angewehtem oder auch durch Überschwemmungen angespültem feinem Sande, welcher auf einer lehmigen Unterschicht ruhte.

Der höhere Teil (die Hochburg) bot natürlich mehr Sicherheit und scheint nicht durch einen Wall besonders geschützt gewesen zu sein, während der westliche Teil, die Niederburg, welcher von dem östlichen durch eine künstliche Böschung deutlich abgegrenzt war, durch eine umschließende Wallanlage befestigt war und durch letztere eine bedeutende Raumvergrößerung darstellte. Diese Niederburg war die Hauptansiedelung, wie aus den massenhaften Beberbenfunden, dem stark kohlenhaltigen Boden und den isolierten Ansiedelungs-(Herd-)stellen zu sehen war. In ihr stieß ich auch auf eine Altaranlage, welche aus sonst hier nicht gefundenen Kopfsteinen, etwa 12 Fuß im Geviert

groß,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Fuß hoch, erbaut war, und genau in ihrer Mitte den Schädel eines alten Bären enthielt. Der Schädel stammte, nach den stark abgekauten Zähnen zu urteilen, von einem sehr alten Individuum, das vielleicht als Fetisch verehrt und gefüttert worden war, bis es eines Tages verschled und verpest wurde. Wenigstens deutet die scharf abgehaene Schnauze darauf hin, daß man ihn zu einer Mahlzeit bestimmt hatte. Nach Professor Nehring ist es ein *Ursus arctos* L., ein durch seine Größe ausgezeichnetes Exemplar, welches die Dimensionen der stärksten russischen Bären zeigt.

Ich übergebe nun das Material, welches in seinem archäologischen Teil von Herrn Dr. Götzke bearbeitet wurde, und das ebenfalls sehr wichtige und in einem so großen Umfange bisher noch nie bearbeitete Material an Tierknochen, dessen mühsamer wissenschaftlicher Bearbeitung sich Herr Dr. Duerst, Privatdozent an der technischen Hochschule zu Zürich, in sehr dankenswerter und umfassender Weise unterzogen hat, der wissenschaftlichen Welt und hoffe, daß recht zahlreiche ähnliche Arbeiten sich anschließen werden, um auch diesen Teil unserer prähistorischen Forschungen, der gegenüber dem archäologischen Teil derselben in letzter Zeit weniger kultiviert war, wieder die Aufmerksamkeit in höherem Maße zuzulenken.

Zugleich wollte ich nicht verfehlen, dem Herrn Direktor Professor H. Filhol und dem Unterdirektor Dr. P. Gervais des Jardin des plantes in Paris für das freundliche Entgegenkommen, welches sie Herrn Dr. Duerst und dem Königlichen Museum für Völkerkunde durch die Gestattung des direkten Vergleichs des ihnen übersandten hiesigen Materials mit dem in der dortigen Sammlung vorhandenen bewiesen haben, den verbindlichsten Dank an dieser Stelle auszusprechen. A. Voß.

## XI.

### Die Tierwelt der Ansiedelungen am Schloßberge zu Burg an der Spree.

Versuch einer Schilderung altgermanischer Viehzucht.

Von Dr. J. Ulrich Duerst, Privatdozent in Zürich.

Mit Tafel XVI bis XX und 1 Abbildung im Text.

Das reiche Material zu den vorliegenden Untersuchungen wurde mir durch die Güte des Herrn Geheimen Regierungsrats Dr. med. A. Voß zuteil und stammt von den Ausgrabungen am Schloßberge zu Burg, über deren Ausführung ich auf die Abhandlung des genannten Herrn verweisen muß<sup>1)</sup>.

Es erübrigt mir zunächst, einige allgemeine Bemerkungen über die Zusammensetzung und Beschaffenheit der zur Untersuchung übergebenen Knochen zu machen.

In der Art der Ausführung der Grabungen liegt es wahrscheinlich, daß eine genaue Aufzeichnung der Schichtenlage der Funde nicht gemacht worden ist, was natürlich bei dem Vorhandensein von zwei Kulturperioden die Bestimmung der Zugehörigkeit wesentlich erleichtert hätte. Dennoch ist es als feststehend anzusehen, daß die Hauptmenge der hier zur Besprechung gelangenden Knochen aus der früheren, vorchristlichen Periode, etwa aus der Zeit der jüngeren Lausitzer Gräberfelder (Bronze-Eisenzeit) um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christo, stammt, was auch von den Resultaten der archäologischen Forschung bestätigt wird.

Sodann glaube ich es zum Teil der Art der Ausgrabungen zuschreiben zu müssen, wenn ich mich einem zwar sehr großen, aber doch verhältnismäßig wenig differenziertem Materiale

gegenüber befinde, so zwar, daß die kleinen und kleinsten Knöchelchen, z. B. von Fuchs, Marder, Wildkatze, Eichhorn, Igel, Vogelarten usw., gänzlich fehlen, obgleich es dem übrigen Anscheine nach mehr als wahrscheinlich ist, daß solche Tiere dort vorkamen. Jedoch können dieselben auch von den Schloßbergern selbst oder ihren Hunden völlig verpeist worden sein.

Ferner ist die Erschöpfung der Knochenreste des Schloßberges ja nicht eine vollständige, wie dies etwa bei manchen Pfahlbauausbeutungen der Fall war, sondern diese Ausgrabungen am Schloßberge vermögen uns bloß einen Teil, gleichsam eine Stichprobe, der Tierwelt aus den Zeiten jener Ansiedelungen vor Augen zu führen. —

Wenn ich daher nunmehr versuchen will eine ziffermäßige Zusammenstellung der Vertretung der einzelnen Tierarten zu geben, so kann dieselbe natürlich nur einen relativen Wert besitzen und vermögen vielleicht spätere Funde diese Liste wesentlich zu verändern, sei es durch Hinzufügung noch nicht vorhandener Tierpezies, sei es durch die Veränderung der prozentischen Anzahl ihrer Vertretung. Ich kann jedoch nur schildern, was ich vor Augen habe.

Diese Aufzählung stellt aber zugleich eine Art retrospektiven Menüs dar, einen Speisezettel aus den Zeiten der sogenannten Germanen und Slaven! Denn darüber kann nach der Beschaffenheit der Knochen kein Zweifel herrschen,

<sup>1)</sup> Der Schloßberg bei Burg, im Spreewald, Kreis Cottbus.



daß alles, was uns hier vorliegt, reine Küchenabfälle, Speiseüberreste dahingeschwandener Menschen sind. —

lierenden Sagen<sup>1)</sup> einiger Wert beigemessen werden, und wir hier eine Art von Herren- oder Fürstenhof vor uns haben.

| Tierart  | Skeletteil |                        | Approximative Individuenzahl | Prozentische Vertretung der Arten nach der Individuenzahl Proz. |
|--|------------|------------------------|------------------------------|---|
|  | Kopf       | Rumpf und Extremitäten |                              |   |
| <b>A. Haustierte.</b>  |            |                        |                              |   |
| 1. Das Schwein ( <i>Sus scrofa domestica</i> ) . . . . .<br>( <i>Sus scrofa palustris</i> )              | 84         | 41                     | 56                           | 44  |
| 2. Das Rind, <i>Bos taurus brachyceros</i> . . . . .   | 72         | 108                    | 31                           | 24  |
| 3. Das Schaf ( <i>Ovis aries palustris</i> ) . . . . .<br>( <i>Ovis aries Studeri</i> )                  | 37         | 13                     | 18                           | 14  |
| 4. Der Hund, <i>Canis fam. Inostranzewi</i> . . . . .  | 14         | 19                     | 12                           | 9   |
| 5. Die Ziege, <i>Capra hircus</i> . . . . .  | 9          | 8                      | 6                            | 5   |
| 6. Das Pferd ( <i>Equus caballus Nehringi</i> ) . . . . .<br>( <i>Equus cab. fossilis robustus (?)</i> ) | 10         | 62                     | 5                            | 4   |
| <b>B. Wilde Tiere.</b>   |            |                        |                              |   |
| 1. Der Hirsch, <i>Cervus elaphus</i> . . . . .   | 26         | 49                     | 10                           | 40  |
| 2. Das Wildschwein, <i>Sus scrofa</i> . . . . .  | 14         | 23                     | 5                            | 20  |
| 3. Das Reh, <i>Cervus capreolus</i> . . . . .  | 12         | 17                     | 5                            | 20  |
| 4. Der Elch, <i>Cervus alces</i> . . . . .   | 3          | 6                      | 2                            | 8   |
| 5. Der Ur-, <i>Bos primigenius</i> . . . . .   | 1          | 6                      | 1                            | 4   |
| 6. Der Reiher, <i>Ardea sp.</i> . . . . .  | —          | 1                      | 1                            | —   |
| 7. Die Ente, <i>Anas sp.</i> . . . . .   | —          | 1                      | 1                            | —   |

Außer diesen hier behandelten Knochen empfing ich im Juli 1903 noch eine weitere kleine Sendung von einigen fünfzig Knochen, von welchen aber nur Hornzapfen von Rind und ein Schädelfest von Ziege von Interesse waren, die anderen Reste bestanden aus Bruchstücken von Schädel- und Extremitätenknochen der hier aufgeführten Tierespazies. Es ist zu beachten, daß auch hier sich kein anderer Hund als *C. f. Inostranzewi* vorfand.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, war das Kontingent, welches durch die Haus- und Wildschweine an die Ernährung der Schloßbergbewohner gestellt wurde, am größten. Aber auch die Anzahl der Rinder ist nur um ein geringes niedriger und liegt hierin ein tieferer Unterschied gegenüber den schweizerischen Pfahlbauten, woselbst Schweine und Wildbret die Hauptmenge der Nahrung lieferten.

Die Rindviehzucht war also, so können wir hieraus schließen, schon bedeutend vorgeschrittener als diejenige der Pfahlbauer, wenn auch jetzt das Rind noch nicht im Überflusse vorkam. Jedoch scheint man die Tiere nicht mehr so lange wie möglich ausgenutzt zu haben, sondern man schlachtete sie, um junges Fleisch zu haben, schon früh. Weil nun dies eine dem gewöhnlichen Manne wohl kaum zustehende Praxis ist, dürfte den über den Schloßberg zirku-

Nach dem Rinde folgen der Individuenzahl nach Schaf, Hund, Ziege und Pferd.

Das häufigste Wildbret war der Hirsch, dann das Reh und das Wildschwein; seltener waren Elch und Ur. Auch von Angehörigen der Vogelwelt liegen zwei sehr stark beschädigte Knochen vor, nämlich ein Humerus eines Reiher und der Metacarpus einer Ente. Ich werde darauf nicht mehr zurückkommen.

In bezug auf die Erhaltung der Knochen und ihre Beschaffenheit ist im allgemeinen den Ausführungen Rüttimeyers in seiner Einleitung zur Fauna der Pfahlbauten beizupflichten. Je nach der Lagerung im Boden, wie auch der Tierart ist Farbe und Textur der Knochen durchaus verschieden. Im allgemeinen herrscht

<sup>1)</sup> W. v. Schulenburg, Der Schloßberg zu Burg an der Spree. Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, S. 237—244.

ein helles Gelbbraun bis Graubraun vor, die Bruchstellen sind gelblichweiß.

Die Schädel wurden, um die inneren Cavernen ausbeuten zu können, in kleine Stücke geschlagen, von denen uns nur noch wenige geblieben. Mit den Hornzapfen vermochte man nichts anzufangen, weshalb dieselben unter den Küchenabfällen recht häufig sind.

Dieses Zerschlagen der Schädel wurde allgemein bei allen Tierarten durchgeführt und zwar nach genau eingehaltenen Regeln: Man spaltete die Schädel in der Medianlinie, nachdem man vorher den Gesichtsteil abgeschlagen hatte.

Der Unterkiefer wurde folgendermaßen behandelt, wobei ich speziell vom Unterkiefer der Rinder rede:

Man zerbrach erstens jeden Ast des Unterkiefers in der Mitte. Gewöhnlich brach er hinter dem zweiten Prämolaren. Dann versuchte man das Mark auszusaugen. Gelang dies nicht, so sah man meist mit einem scharfen Instrumente der Länge nach den Ast auf, wobei ein Oberteil mit den Zähnen vom dritten Molaren bis ersten Prämolaren reichend, und ein Unterteil übrig blieb. Sodann brach man den Vertikalast ab, der meist in der Mitte entzwei ging.

Damit sind die vier hauptsächlichsten Formen, in denen die Unterkieferreste fast aller Tierarten vorkommen, bedingt. Wir finden nämlich erstens das zuerst abgebrochene Vorderstück, bestehend aus Unterkieferkörper und dem ersten und zweiten Prämolaren, sowie zweitens, aber sehr selten, den übrig bleibenden Teil, an dem gewöhnlich auch die Oberhälfte des Vertikalastes abgebrochen ist, was womöglich schon beim Entfernen des Unterkieferkörpers vom Schädel geschehen konnte (Tafel II, Fig. 2a, 2b). Sodann drittens den beschriebenen Oberteil des Mittelstückes des horizontalen Astes und viertens das Unterstück desselben. Der Gelenkteil ist nur ganz selten.

Es ist feststehend, daß die vorliegenden Knochen richtige Küchenabfälle sind, woraus hervorgeht, daß die damaligen Schloßbergbewohner, neben Wildhret, Rindern, Sehsafen, Schweinen und Ziegen, auch Pferde und Hunde aßen, also den Wert und Genuß der Hippophagie und Kynophagie längst erkannt hatten, welchen man ihren modernen Nachkommen zum

Teil noch vergeblich klar zu machen sucht. Während der Genuß des Pferdefleisches, wie wir später noch sehen werden, recht beliebt war und wohl nur der kleinen Anzahl dieses edlen Tieres wegen aufgegeben wurde, werden die Schloßberger denn doch wohl ihre Hunde nur dann gegessen haben, wenn sie nichts anderes hatten, oder wenn diese zu alt zum Dienste geworden waren. Wenigstens finden wir unter den zahlreichen ausgesaugten und zersehlagene Handknochen keine von jungen Tieren, deren Fleisch ein Leckerbissen dargestellt haben könnte.

Was nunmehr die Art der Ausführung der nachfolgenden Untersuchung angeht, so bin ich darüber einige Rechenschaft schuldig.

Das Material habe ich im Sommer 1902 noch im Laboratorium der vergleichenden Anatomie des Muséum d'Histoire Naturelle in Paris untersucht, gemessen und verglichen. Zur Abnahme der Messungen diente mir der anthropologische Maßstock nach Rudolf Martin, den ich seit vielen Jahren unausgesetzt verwende und dessen Genauigkeit eine sehr große ist.

Das Vergleichsmaterial bildeten die Knochen rezenter und subfossiler Tiere des Pariser Museums, sowie diejenigen des Naturhistorischen Museums von Bern. Außerdem kam ich mehrfach in die Lage, auf Material aus englischen und französischen Kulturschichten zurückgreifen zu müssen, das ich im Laufe der Jahre zu studieren Gelegenheit hatte, sowie auch Specimen verschiedener anderer Museen, wie meiner eigenen Handsammlung.

Ich habe mich bei der Ausarbeitung im ganzen an das durch Rüttimeyer und Nehring aufgebrachte System gehalten, obgleich ich etwas mehr der geographischen Verbreitung der Tiere und der Stellung der germanischen Haustierwelt innerhalb derselben mein Augenmerk geschenkt habe. Hauptsächlich anläßlich der Besprechung der von mir seit Jahren kultivierten Spezialgebiete (Rind und Schaf) habe ich mir gestattet, etwas weitgehendere Gesichtspunkte einzuflechten, die sich im Laufe der Beobachtungen ergeben haben.

Dabei möchte ich es aber nicht verfehlen, nicht bloß dem Manne, der mir das Vergnügen einer so interessanten Arbeit verschaffte, Herrn

Geheimen Regierungsrat Dr. A. Voß, zu danken, sondern auch den Herren, die mich mit Rat und Tat bei denselben unterstützten, so den Herren Prof. Dr. Th. Studer, Dr. A. Götzte und Dr. H. Paul Gervais.

## A. Haustiere.

### 1. *Sus scrofa*, Das Schwein.

Der Individuenzahl nach nimmt das Schwein die erste Stelle in der Herde der Haustiere vom Schloßberge ein, wenn auch die von ihm erhalten gebliebenen Knochen weder an Zahl noch Masse denen des Rindes gleichkommen.

Es liegen aber vom Schweine besonders viele Unterkiefer, Schädelreste und Zähne vor, unter welchen wir von den erstgenannten allein schon 98 Stück zählen, wozu noch 65 Rumpf- und Extremitätenknochen kommen, so daß sich uns eine approximative Individuenzahl für Wild- und Hausschwein von 61 Stück ergibt.

Dem Wildschweine (*Sus scrofa ferus*) können mit Sieberheit nur relativ wenige der Knochen zugerechnet werden, die sich durch ihre Größeneentwicklung vor den anderen auszeichnen. Die Großzahl der Reste ist aber der gezähmten Form des Wildschweines, dem *Sus scrofa domesticus*, von Rütimeyer auch Hausschwein genannt, sowie dem *Sus scrofa palustris*, dem Torfschweine, zuzuschreiben, wiewohl letzteres unter den Schweinen dieselbe Stellung einnimmt, wie das Torfschaf und das Torfrind unter den anderen Haustieren.

Das Schwein war im alten Germanien ein überaus verbreitetes Tier und die Lieblingspeise aller deutschen Stämme. Auch erfordert wohl seine Haltung in diesem Lande eine bedeutend geringere Mühe als die der anderen Haustiere oder es ließ sich doch wenigstens mit geringem Aufwande viel schmackhaftes Fleisch gewinnen.

Um eine leichtere Mastung zu erzielen, wurden die Schweine im Monat Mai verschnitten (Maiales = Maisechweine) und dann zur Zeit der Eichel- und Bucheckernreife in die Wälder zur Waldmast getrieben. Nicht, daß sie nur zu dieser Zeit im Freien gehalten wurden, sondern, wie Strabo erzählt, weideten sie immer auf den

Feldern<sup>1)</sup>, aber die Eichelmast war das wichtigste Hilfsmittel der damaligen Tierhaltung. Mußte doch noch zur späteren Karolingerzeit jeweils dem Könige bis zum 1. September jedes Jahres angezeigt werden, ob die Eichelmast abgebalten werden könne<sup>2)</sup>. Dieselbe, in frühester Zeit *esca-Atzung*, später lateinisch *sapinatio*<sup>3)</sup>, *justio*<sup>4)</sup>, *masta* oder *Waldmasta*<sup>5)</sup> genannt, verursachte viele Bestimmungen in den Gesetzen der salischen und ripuarischen Franken, den Bayern, Alamannen, Longobarden u. a.<sup>6)</sup>, aus denen ersichtlich ist, wie allgemein dieselbe geübt und welchen Wert sie für die damaligen Völker besaß<sup>7)</sup>.

Das Schweinehüten war durchaus keine so einfache Sache, da nicht allein die Schweine der Belgier grimmige Tiere waren, von denen Strabo sagt, daß die Gefahr, wenn man sich ihnen unversehens nähere, so groß sei wie bei einem Wolfe<sup>8)</sup>, sondern auch von den Schweinen der Umgegend von Paris lehrt uns Jehan de Brie, daß es alles „rohe Tiere von schlechter Erziehung seien“<sup>9)</sup>, die durch ihre Unfolgsamkeit dem guten Hirten viel Kummer bereiten. Daher waren die Schweinehirten bei den germanischen und gallischen Völkerschaften sehr hoch angesehen. Das Wehrgeld für den Totschlag eines Schweinehirten war auf 50 Schillinge festgesetzt, während ein Ochsenhirt nur 20 Schillinge gewertet war<sup>10)</sup>. Selbst der Vorsteher eines Gestütes, Marschalk, galt nur 40 Schillinge. Auch hatte der Hirt zu seiner Unterstützung einen

<sup>1)</sup> Strabo, Bd. IV, C. 4, 3.

<sup>2)</sup> *Capitulare de villis vel curtis imperatoris*. Art. 25.

<sup>3)</sup> *Codex Laouris*, Bd. I, C. 68.

<sup>4)</sup> *Capit. de villis etc.* Art. 25.

<sup>5)</sup> Schöpflin, *Almetia Diplomatica*. Mannheim 1772. Bd. I, S. 73.

<sup>6)</sup> *Lex Saxon.*, Bd. XXII, Art. 1; *Leges Alamann.*, tit. 97, lex 1; *Lex Rothari*, Art. 355; *Lex Luitprandi*, Bd. VI, S. 98; *Lex Wisigothorum*, L. VIII, T. 3, § 2, usw.

<sup>7)</sup> Rudolf Virchow, *Der Spreewald und die Lausitz*. Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. 12, 1880, S. 232. — „Der Spreewald bestand ausschließlich aus Laubholz, namentlich Eichen und Erlen.“ Darin liegt die Erklärung für die große Schweinezucht der Schloßbergbewohner.

<sup>8)</sup> Strabo, Bd. IV, C. 4.

<sup>9)</sup> Jehan de brye, *le bon bergier*. Paris 1379. (Nst. Bibl. Paris.)

<sup>10)</sup> *Lex Rothari*, Lex 133, 135; *Leges Alamann.*, tit. 79, lex 1.

Hund und ein Horn (*buccina porcellis*) bei sich<sup>1)</sup>. Den Schweinen ward ebenso wie den anderen Haustieren eine Glocke umgehängt, damit das in den großen Waldungen so häufige Verirren vermieden würde<sup>2)</sup>.

Die zur Waldmast in einem einzigen Forste versammelten Herden waren oft sehr groß, so z. B. finden wir solche von 770<sup>3)</sup> und 1000<sup>4)</sup> Stöcke erwähnt.

Das Verhältnis der unverschnittenen Eber zu den weiblichen Tieren wird wohl zu der frühen Zeit der Schloßbergansiedlungen dasselbe gewesen sein, was die Gesetze der Angeln sowie der salischen und ripuarischen Franken als übereinstimmende Norm aufführen, nämlich auf je sechs Sauen ein Eber<sup>5)</sup>.

Auch die in die Mark eingewanderten Slaven haben das Schwein als hauptsächlichstes Nutzvieh beibehalten, wenigstens herrschen in slavischen Burgwällen die Schweineknochen ebenfalls vor<sup>6)</sup>.

Was das Fleisch der germanischen Schweine angeht, so sind nicht allein die Schinken des gebirgigen Marserlandes (Westfalen)<sup>7)</sup> und die des Landes der Menapier im späteren Rom hochberühmt gewesen, sondern auch die Belgier lieferten von ihren hochbeinigen, starken und schnellen Sauerden Salzfleisch nicht bloß nach Rom, sondern versorgten damit ganz Italien<sup>8)</sup>. Selbst die gallischen Schweine aus der Gegend von Altinum<sup>9)</sup> wurden wegen ihres köstlichen Fleisches und ihrer Größe gerühmt und ihre Schinken als Delikatesse angesehen.

Das Essen des rohen Schinkens und Speckes war in Germanien so gebräuchlich, daß der Bekehrer der Deutschen, Bonifacius, sich beim Papste Zacharias Verhaltungsbefehle darüber holte, wann seine Neubekehrten solch rohes Fleisch genießen dürften. Es wurde ihm die

Antwort zuteil: nicht eher, als bis es durchräuchert oder am Feuer gekocht worden sei; wenn man Speck und Schinken aber lieber ungekocht essen wolle, so dürfe es erst nach dem Osterfeste geschehen<sup>10)</sup>.

Daß auch die Schloßbergbewohner sich gerne von Rancheiseln genährt haben, geht aus der Menge der vorhandenen Schinkenknochen (*Femur* und *Tibia*) und denen der Schulterstücke (*Scapula* und *Humerus*) hervor. Wobei aber beachtenswert ist, daß es nicht das Fleisch alter Tiere war, welches man genoß, sondern meistens das von Frischlingen (*fringsinga*), die nach der herbstlichen Eichelmast zu Weibnachten schlachtreif wurden. Aus diesem Grunde fehlen an den Tieren meist die Epiphysen.

Selbst im Kultus der Germanen nahm das Schwein eine ganz hervorragende Stelle ein. Es war der Sonne geheiligt und an Feste derselben, dem Julfeste, ward es geopfert und verspeist. Aus Gallien ist mir eine Bronzestatue eines dreihörnigen Wildschweines bekannt, der man ebenfalls eine Kultusbedeutung zusprechen muß<sup>11)</sup>.

Gehen wir nun zur Besprechung der Schweinereste vom Schloßberge über. — Da die Schweineknochen durchweg sehr leicht erkennbar sind und ihre Bestimmung deshalb so wie so auf keine großen Schwierigkeiten stößt, werde ich meine Betrachtungen hierüber kurz fassen können, zumal da es mir durchaus fern liegt, mich mit den Fragen der Abstammung und Herkunft der zahmen Formen hier zu beschäftigen, über die schon eine große Literatur vorliegt.

#### a) Das Wildschwein.

Ähnlich wie bei dem Knochenmaterial aus den schweizerischen Pfahlbauten besteht auch hier die Hauptmenge in großen oder kleinen Partien von Unterkiefern, an denen man niemals vergessen hatte, die Alveolarhöhlen auf-

<sup>1)</sup> Lex Bajuvarum, Art. VIII, cap. 10.

<sup>2)</sup> Lex Salica, Art. XXVII, §. 1.

<sup>3)</sup> Schöpflin, Als. Dipl., Bd. I, S. 73.

<sup>4)</sup> Z. B. anno 863. Cod. Laur., Bd. I, S. 68; anno 890, Martene et Durand, Coll. ampl. II, S. 34.

<sup>5)</sup> Lex Baju., T. 3, cap. 10; Lex Roth., Art. 356.

<sup>6)</sup> Vgl. meine Bestimmungen bei A. Götzke. Die Schwedenbohne auf der Kinke bei Riewend. Nachr. deutsch. Altertumsfunde, Heft 2, 1901, S. 22.

<sup>7)</sup> Horaz, Oden, Bd. I, S. 1, 26.

<sup>8)</sup> Strabo, Bd. IV, S. 4.

<sup>9)</sup> Columella, Bd. VII, S. 2; Varro, Bd. II, S. 4, 10.

<sup>10)</sup> Eccardus, Comment. Rer. Franciae Oriental., Bd. I, S. 306.

<sup>11)</sup> Befindet sich in dem Cabinet des Médailles der Bibl. Nationale und stammt aus der Bourgogne. Vgl. auch S. Reinach, Répertoire de la statuaire etc. tome II, p. 748 und S. Reinach, Les survivances du Totémisme chez les anciens Celtes. Revue celtique, tome XXI, juillet 1900, p. 29.

zubrechen. Die wenigen, in ganz kleine Bruchstücke zerschlagenen Schädelknochen deuten dennoch auf eine gewaltige Größe dieser Tiere hin.

Diese Wildschweinreste stimmen mit denen rezenter Wildschweine so sehr überein, daß ein ausführliches Eingehen in osteologische Details überflüssig wird.

Einen ungefähren Begriff von der Größe des Tieres geben einige Vergleichsmaße.

päischen Hausschweines (*Sus scrofa domestica*) und in die kleine, feinknochie Form des Torfschweines (*Sus scrofa palustris*), der ein anderer Ursprung vindiziert wird, die wir aber in ihrer typischen kleinen Gestalt konstant mit Torfschaf und Torfrind gleichzeitig auftreten sehen.

Die Bewohner des Schloßberges besaßen diese beiden Schweine Typen. Die Knochenreste sind beredt genug. Die größere Rasse ist diejenige, die schon Strabo bei den Belgiern als

| Dimensionen der Unterkieferreste in Millimetern                        | Schloßberg | Schweizerische Pfahlbauten nach Röttemeyer | ad ♂ Algerisches Wildschwein recent Samml. Duerst |
|--|------------|--|---|
| Länge der Symphyse . . . . .   | 115—123    | 123—145                                    | 65  |
| Größter Durchmesser der Caninalveole . . . . .                         | 29—32      | 31—38                                      | 22  |
| Breite des Unterkieferkörpers am Außenrande der Caninalveole . . . . . | 71—81      | —  | 60  |
| Höhe des Unterkieferastes vor P. 2 . . . . .                           | 60—69      | 66—69                                      | 44  |

| Dimensionen der Eckzähne des Unterkiefers           | Schloßberg | Röttemeyer Pfahlbauten | Jeitelles Olmütz | Algier recent |
|---|------------|------------------------|------------------|---------------|
| Länge im Bogen vom Wurzelrande zur Spitze . . . . . | 160—175    | 250                    | 190              | 157           |
| Umfang des Zahnes über der Wurzel . . . . .         | 70—85      | —                      | —                | 55            |
| Durchmesser in der Breite . . . . .                 | 20—29      | 31—38                  | 28               | 20            |
| Durchmesser in der Dicke . . . . .                  | 10—15      | —                      | 15               | 10            |

Von den Extremitätenknochen sind ein Humerus, Radius und einige Femurenden zu erwähnen. Ein Radius ist vollständig. (Länge 186 mm, proximale Breite 42, distale 51 mm.)

Mit diesen Maßen sind die Wildschweine des Schloßberges genügend charakterisiert und erscheinen deshalb von den rezenten nicht oder nur insofern verschieden, als sie gemeinhin etwas größer waren.

Die Anzahl der großen adulten Wildschweine, die auf den Tisch der Schloßberger kamen, würde also nach den vorliegenden Resten nur vier oder fünf Individuen betragen haben, was einen verschwindenden Prozentsatz gegenüber den zahmen Tieren ausmacht.

#### b) Das Hausschwein.

Bekanntlich unterscheidet man nach Röttemeyer die Hausschweine in zwei Formen, nämlich einerseits in die direkt vom Wildschweine herstammende große Form des euro-

hochbeinig, schnell und stark, aber so überaus grimmig schildert, die andere dagegen war klein, doch genügsam.

Während in den ältesten Pfahlbauten die Reste des Torfschweines diejenigen des autochthonen Hausschweines noch weit überwiegen, hat sich hier am Schloßberge gleich wie allgemein in den jüngsten Perioden vor der Römerzeit das Mengenverhältnis des Auftretens schon so weit verschoben, daß die zahme Descendenz des Wildschweines dem Torfschweine an Zahl fast gleichkommt, ja dieselbe schon hier und da übertrifft.

Es ist überaus schwer, bei den Resten vom Schloßberge hierüber zu einem einigermaßen genauen Urteile zu kommen, da die Knochen, besonders des autochthonen Hausschweines, zu sehr zerschlagen sind. Eine approximative Schätzung der Individuenzahl führt uns zur Annahme von etwa 36 kleinen Hausschweinen, zu denen die Torfschweine und jungen Indi-

viduen von *Sus scrofa domesticus* gerechnet sind, und 18 bis 20 großen Schweinen.

Da das überaus zahlreiche Material die Abnahme von Maßen gestattet, so werde ich in nachfolgenden Tabellen die besterhaltenen Knochen der Schweine der Schloßbergbewohner zusammenstellen, damit sie späteren Mitarbeitern zum Vergleiche dienen können.

### Kopf.

Unter den gesamten Knochenmaterialie des Schloßberges ist der Schädelrest eines adulten Torfschweines (Nr. 600) das am besten erhaltene Stück. Aus irgend einem Grunde hat man es unterlassen, das Gehirn des Tieres zu verpeisen; man hat den Schädel also nicht in zwei Hälften gespalten, sondern sich damit begnügt, ihm den Gesichtsteil abzuschlagen. Es gestattet deshalb dieses Stück, die Identifizierung mit dem Torfschweine der schweizerischen Pfahlbauten genau durchzuführen.

In osteologischer Hinsicht ist die Übereinstimmung eine vollständige; näher auf die einzelnen Punkte derselben einzutreten erscheint jedoch überflüssig, da sowohl schon früher, wie erst vor kurzem wieder eine gute Darstellung

dieser Verhältnisse gegeben wurde<sup>1)</sup> und ich nicht in der Lage wäre hier Berichtigungen anzubringen.

In der nachfolgenden Tabelle stelle ich die Maße des Torfschweines vom Schloßberge denjenigen eines Torfschweines von La Tène gegenüber und füge außerdem diejenigen des Schädels eines Maorischweines von Neuseeland bei, der sich in meiner Sammlung befindet.

Wie ersichtlich steht das vorliegende Torfschwein vom Schloßberg der Größe nach zwischen dem kleinen Maorischwein und dem etwas größeren Torfschwein von La Tène. Dennoch waren nicht alle Torfschweine des Schloßberges so klein. Dasjenige z. B. von dem der Gaumen- und Oberkieferrest Nr. 605 herstammt, muß größer gewesen sein, da die Länge der Molarreihe 66 mm, die Gaumenbreite innerhalb der drei Molaren 33, diejenige außerhalb 64 mm beträgt und somit die in der vorhergehenden Tabelle ersichtlichen Maße übertrifft.

Die Maße der besterhaltenen Unterkieferreste des Torfschweines habe ich in der folgen-

<sup>1)</sup> Friedrich Otto, Osteolog. Studien zur Geschichte des Torfschweines. Revue suisse de Zoologie 1901. Schütz, Zur Kenntnis des Torfschweines. Inaug.-Diss., Berlin 1868.

| Dimensionen des Schädels  | Sus s. palustris<br>Schloßberg<br>Nr. 600 | Sus s. palustris<br>La Tène<br>Mus. Bern | Maorischwein<br>Neuseeland<br>Samml. D'nerst |
|---|---|--|--|
|   | mm  | mm                                       | mm   |
| Länge vom Scheitelkamm zur Nasenwurzel . . . . .                    | 138                                       | 139                                      | 129  |
| Länge der Stirnbeine . . . . .                                      | 94  | 98                                       | 82   |
| Länge der Parietalia . . . . .                                      | 26  | 28                                       | 25   |
| Breite der Stirne zwischen Orbitalprocessus . . . . .               | 84  | 86                                       | 81   |
| Stirnenge hinter denselben . . . . .                                | 72  | 69                                       | 68   |
| Parietallänge (engste Stelle zwischen den Schläfengruben) . . . . . | 24  | 24                                       | 23   |
| Stirnbreite zwischen den inneren Augenwinkeln . . . . .             | 59  | 61                                       | 54   |
| Größte Breite der Parietalia hinter den Orbitalprocessus . . . . .  | 72  | 69                                       | 68   |
| Größte Wölbung der Schädelskapsel . . . . .                         | 69  | 50                                       | 60   |
| Jochbogenabstand . . . . .  | 104                                       | 114                                      | 112  |
| Basiscraniallänge (Foramen-Sphenoidnaht) . . . . .                  | 45  | —  | —  |
| Kleine Hinterhauptshöhe . . . . .                                   | 60  | 65                                       | 55   |
| Große Hinterhauptshöhe . . . . .                                    | 90  | 90                                       | 88   |
| Gaumenbreite außerhalb des dritten Molars . . . . .                 | 58  | 59                                       | 56   |
| Gaumenbreite innerhalb des dritten Molars . . . . .                 | 32  | —  | 30   |
| Länge der Molarreihe . . . . .                                      | 53  | 46                                       | 43   |
| Breite zwischen den Wangenhöckern . . . . .                         | 79  | 84                                       | 58   |
| Höhe der Augenhöhle . . . . .                                       | 35  | 33                                       | 36   |
| Breite derselben . . . . .  | 32  | 36                                       | 30   |

den Tabelle zusammengestellt, aus der aber leicht ersichtlich ist, wie klein von Gestalt die Großzahl der verspeisten Individuen war; noch kleiner als diejenigen der Pfahlbauten. Die in Tabelle II zusammengestellten Unterkieferreste sind alle fast von derselben Gestalt, Form A, d. h. Unterkieferkörper, deren beide Äste auf der Höhe des zweiten Prämolaren entzwei geschlagen worden waren. Alle diese Unterkieferreste gehörten erwachsenen Individuen an.

leicht erkenntlich. Als Maße derselben finde ich

|   |    |    |
|---|----|----|
|   | mm | mm |
| Länge im Bogen von Wurzel bis Krone . . . . . | 54 | 53 |
| Umfang an der Wurzel . . . . .                | 36 | 32 |
| Querdurchmesser Breite . . . . .              | 19 | 10 |
| Diöke . . . . .                               | 5  | 6  |

Von den vorhandenen Extremitätenknochen ist eine Ulna der vollständigste. Ihr Größenunterschied gegenüber dem Wildschwein ist ein augenfälliger und geht aus den folgenden Maßen klar hervor.

| Dimensionen der Unterkiefer.<br>Form A<br>in Millimetern                            | Schloßberg |                   |     |     |     |     |     |     |     |     | Rütimeyer,<br>Fanna der<br>Pfahlbauten<br>S. 44<br>Mittelsablen |       |
|---|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|
|   | Nr.        |                   | Nr. |     | Nr. |     | Nr. |     | Nr. |     | ♂   | ♀     |
|   | 578        | 625 <sup>1)</sup> | 576 | 611 | 590 | 609 | 584 | 575 | 583 | 580 |   |       |
| Länge der Kinnsymphyse . . . . .  | 75         | 72                | 68  | 67  | 65  | 65  | 62  | 62  | 58  | 57  | 74—79   | 62—75 |
| Breite des Unterkieferkörpers zwischen den<br>Außenwänden der Caninalvene . . . . . | 46         | 65                | 49  | 45  | 49  | 46  | 45  | 43  | 30  | 42  | 45—53   | 44—53 |
| Breite zwischen den inneren Rändern der-<br>selben . . . . .                        | 25         | 30                | 30  | 34  | 29  | 31  | 31  | 26  | 27  | 31  |   |       |
| Quere Breite var P. 3 . . . . .   | 37         | 43                | 37  | 37  | 38  | 35  | 34  | 34  | 33  | 38  |   |       |
| Vertikalhöhe des horizontalen Astes vor<br>P. 3 . . . . .                           | 40         | 52                | 40  | 39  | 45  | 37  | 37  | 39  | 31  | 37  | 42—46   | 37—43 |

Die andere Form (B), unter welcher die Unterkieferreste im Schloßberge vorkommen, ist das hintere Stück des horizontalen Astes mit der Molarreihe, sowie dem unteren Teile des aufsteigenden Astes. Bei einem adulten Tiere ist sogar die ganze Unterkieferlänge meßbar. Es ist dies zwar auch noch bei einem Unterkiefer eines Frischlings der Fall, doch haben Maße junger Tiere keinen Wert, wenn man das Alter nicht genau kennt.

Die Eckzähne des Unterkiefers von Sus pan-  
jestrus sind an ihrer schlanken Form und Gestalt

|   | Wild-<br>schwein<br>mm | Tarf-<br>schwein<br>mm |
|---|------------------------|------------------------|
| Größe Länge . . . . .   | 293                    | 198                    |
| Länge des Olecranon vom äußer-<br>sten Ende seiner Artikulation<br>mit dem Radius . . . . . | 107                    | 64                     |
| Größe Breite des Olecranon in der<br>Gegend des Proc. coronoides . . . . .                  | 57                     | 37                     |
| Dieselbe am Ende des Olecranon . . . . .  | 42                     | 29                     |
| Breite der Ulna in der Hälfte ihrer<br>Länge . . . . .                                      | 23                     | 15                     |

| Dimensionen der Unterkiefer.<br>Form B<br>in Millimetern | Schloßberg |     |     | Schaffis<br>nach Studer <sup>1)</sup> |     |
|--|------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|
|  | Nr.        | Nr. | Nr. | ♂                                     | ♀   |
|  | 668        | 659 | 634 |                                       |     |
| Breite des aufsteigenden Astes . . . . .                 | —          | 70  | 84  | —                                     | —   |
| Höhe des Horizontalastes M. 3 . . . . .                  | 47         | 47  | 48  | 41                                    | 35  |
| Länge in der Höhe des Alveolarrandes . . . . .           | 229        | —   | —   | 246                                   | 241 |
| Länge der Backzahnreihe ohne P. 4 . . . . .              | 102        | 105 | 110 | 115                                   | 110 |

<sup>1)</sup> Dürfte infolge seiner bedeutend stärkeren Entwicklung dem antiochthonen Hausschwein zuzurechnen sein.

<sup>2)</sup> Th. Studer, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bielersees. Mitteil. Nat. Gesellschaft Bern 1883, S. 69—70.

Ein prinzipieller Grund, das Vorkommen des südlichen Torfschweines in deutschen Kulturschichten bestreiten zu wollen, liegt, wenn man die Abstammungshypothesen ganz außer acht läßt, durchaus nicht vor und es erscheint deshalb unpraktisch eine Lokalform anzunehmen, die in Größe und osteologischen Charakteren sich — individuelle Differenzen ausgenommen — vollkommen mit dem Torfschwein südlicherer Gegenden deckt. Da mir gerade in dieser Arbeit viel daran liegt, in objektiver Weise die Verbreitung der Haustiere der verschiedenen Kulturperioden Europas darzustellen, um ihren Einfluß auf die Haustiere der früheren Schloßbergbewohner darzutun, so ist es auch aus allgemeinen logischen Gründen sehr plausibel, daß das kleine Schwein der norddeutschen Kulturschichten dasjenige weit verbreitete Schwein ist, das Rüttimeyer nach der Periode seines ersten Auftretens in Mitteleuropa als Torfschwein bezeichnete. Wir finden es nicht bloß im Süden in den Terramarren und früheren Kulturschichten Italiens<sup>1)</sup>, in den Pfahlbauten der Schweiz<sup>2)</sup>, in Olmitz<sup>3)</sup> und anderen zentral-europäischen Fundorten, sondern ebenso in französischen Kulturschichten<sup>4)</sup> und sogar den englischen speziell den irischen Torfmooren sehr häufig. Unter den vielen mir bekannten Schädelresten englischer Torfschweine ist ein fast ganz unverstärkter Oberschädel, der sich in der Paläontologischen Galerie des Pariser Museums befindet und einen absolut sicheren Schluß auf die Kongruenz mit dem Torfschwein der kontinentalen Fundorte zuläßt.

Es scheint mir deshalb eine unnötige Vorsicht, an der Identität dieser Rasse zu zweifeln und eine neue Form anzunehmen, weil die sie

<sup>1)</sup> Strobel, Sul teschio del porco delle Mariere etc. Milano. Soc. Ital. Atti 25, 1882, p. 21—83, 183—237. Ibid., Etude comparative sur le crâne du porc des Terramarres. Arch. Ital. de Biolog., T. I, III, fasc. II, 1883.

<sup>2)</sup> Rüttimeyer, Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz. Neue Denkschriften Allg. Schw. Gesellsch. 1882, S. 33. F. Otto, Op. cit.

<sup>3)</sup> Jeitelso, Die vorgeschichtlichen Altertümer der Stadt Olmitz usw. 1872, Bd. II, S. 22.

<sup>4)</sup> Rüttimeyer, Neue Beiträge zur Kenntnis des Torfschweines. Verb. Nat. Gesellsch., Basel IV, 1864, S. 171. Gurrigou et Filhol, L'âge de la pierre etc. Compt. Rendus Ac. Sc. Tom. 57, p. 839, sowie andere Stücke neolithischer Zeit im Museum.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

begleitenden anderen Haustiere wie Torfschaf, Torfrind, Torflund sich ebenfalls in norddeutschen Kulturschichten nachweisen lassen. —

## 2. Bos taurus, Das Hausrind.

Eaeque solae et gratissimae opes sunt.

Tacitus, Germ. V.

Das Hausrind ist jederzeit, mehr als irgend eine der anderen im Hausstande lebenden Tierespezies, am engsten mit dem Lose seiner Herren verknüpft gewesen. In ihm und seiner Beschaffenheit spiegelt sich die Stufe der Zivilisation und Gesittung seiner Besitzer oft recht deutlich wieder.

Gemeinhin ist man der Ansicht, daß sämtliche Rinder der Meeresküsten und Niederungen wie auch die des ganzen übrigen nördlichen Europas direkte reinblütige Abkömmlinge von *Bos primigenius* Boj., dem wilden Ur-, und im nördlichen Europa selbst zu vorhistorischer Zeit domestiziert worden seien.

So überaus schön und einfach diese Anschauung wohl wäre, so spricht, wenn man sie gründlich sachlich prüft, recht viel dagegen und nur wenig für ihre allgemeine Gültigkeit in obiger Form.

Ich will hier gleich im voraus konstatieren, daß ich mich, wenn auch nach langem Suchen und Tasten, nun vollständig in Übereinstimmung mit der Auffassung A. Nehring's befinde und ebenfalls alle unsere taurinen Hansrinder vom Ur herleite, vom Ur und seinen Varietäten<sup>1)</sup>. Nur muß ich, weil ich mich nicht auf das Rind Europas beschränke, über den Ort der Domestikation eine abweichende Ansicht vertreten.

Die kleine, kurzhörnige, so früh auftretende Form des Hausrindes ist morphologisch sehr weit vom Ur verschieden. Nehring hat in seiner stets gewissenhaften und wohl begründeten Weise dies damit zu erklären versucht, daß durch Hunger, naßkaltes Klima, Inzucht, Vernachlässigung und ähnliche Momente die kleine Kümmerform des Rindes erzeugt worden sei, deren Reste wir so allgemein auffinden. Ich bin gewißlich der letzte, der nicht die Variabilität der Form beim Rinde im höchsten Maße

<sup>1)</sup> A. Nehring, *Bos primigenius*, insbesondere über seine Koexistenz mit dem Menschen. Verb. Berl. Gesellsch. f. Anthropologie usw. 1888, S. (230).



anerkennt, ich habe schon in früheren Arbeiten stets darauf hingewiesen und hoffe es noch weit mehr tun zu können, doch hier kommen wir damit nicht aus! Wäre das kurzhörnige, kleine Rind das einzige Hausrind, dem wir in diesen Zeiten begegnen, dann könnte man wenig mehr aussetzen. So jedoch finden wir in späteren Perioden — in der Schweiz zum erstenmale in der jüngeren, neolithischen Zeit mit Kupferspuren (Lattrogen) — eine zweite viel stärkere und größere Rinderrasse, die dem *Bos primigenius* Bojanus überaus ähnlich sieht<sup>1)</sup>. Wir finden sie nicht bloß in der Schweiz und in Italien<sup>2)</sup> sondern häufig auch in nord- und südfranzösischen Pfahlbauten und Kulturschichten<sup>3)</sup> sowie ebenfalls in Norddeutschland<sup>4)</sup>. Besonders wichtig ist aber, daß sowohl in der Vendée,

diese subfossilen Stücke aufweisen. Am deutlichsten sieht man dies bei den Rindern der Vendée, wo die unwürdige Gegend und geringe Kultur der Landbevölkerung auf eine ziemlich rein erhaltene Stammmasse hoffen läßt<sup>1)</sup>.

Ich habe deshalb einen Schädelrest aus dem Torfmoore der Somme bei der bekannten prähistorischen Station Abbéville, demjenigen eines Stieres der Race Vendéenne gegenübergestellt, wobei die fast vollkommene Kongruenz selbst dem Laien klar ins Auge springt. Der deutsche Schädelrest von Schlanstedt stimmt mit demjenigen von Abbéville ganz überein.

Auch die Maßzahlen der beiden abgebildeten Kränien stimmen in ihren Proportionen ganz auffallend zueinander, wie aus nachfolgender Tabelle leicht ersichtlich ist.

| Dimensions des Schädels                        | <i>B. t. primigenius</i><br>Rätimayer<br>Torfmoore der<br>Somme |       | <i>B. t. primigenius</i><br>Rätimayer<br>♂<br>Rasse der Vendée |       |
|--|---|-------|--|-------|
|  | mm  | Proz. | mm   | Proz. |
|  | Vordere Schädelänge (approximativ) . . . . .                    | 490   | 100  | 600   |
| Stirnlänge . . . . .                           | 220   | 45    | 260  | 43    |
| Stirnbreite . . . . .                          | 210   | 43    | 260  | 43    |
| Stirnänge . . . . .                            | 175   | 35    | 210  | 35    |
| Große Hinterhauptshöhe . . . . .               | 155   | 31    | 180  | 30    |
| Große Hinterhauptbreite . . . . .              | 220   | 45    | 270  | 45    |
| Länge der Molarreihe des Oberkiefers . . . . . | 75  | 15    | 90   | 15    |
| Umfang der Hornzapfen an der Basis . . . . .   | 210   | 43    | 258  | 43    |
| Länge der Hornzapfen . . . . .                 | etwa 250  | 51    | 300  | 50    |

wie auch am selben Orte, wo einige der mir vorliegenden Schädel gefunden wurden, bei Rouen und im Dep. Somme, heutigentages noch Hausrinder leben, deren Schädelform vollständig mit derjenigen übereinstimmt, welche

Solche Fundstücke aber für eine ver kümmerte Form des wilden Urzo halten, würde selbst von den von Nehring<sup>2)</sup> gezeigten Größenvariationen und den im nachfolgenden Kapitel über den *Bos primigenius* Bojanus zusammengestellten Schwankungen in den Hornzapfen nicht angehen.

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Rätimayer, Fauna der Pfahlbauten usw. S. 201. Stöder, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bieterees. Mittell. Nat. Ges. Bern 1882, S. 17. David, Abstammung des Hausrindes. Landw. Jahrbuch der Schweiz 1897, S. 117. G. Patroni, La civilisation primitive dans la Sicile orientale. L'Anthropologie 1897, p. 129—148.

<sup>2)</sup> E. Regalia, Sulla Fauna delle Grotte di Froia e Zaehit. Archivio per l'Autropologia e l'Etnologia p. 225—236.

<sup>3)</sup> Abbéville, Menesrey, Cavernes de Bédellhauc, de Nisux (Ariège), Lourdes etc.

<sup>4)</sup> Aus Schlanstedt bei Magdeburg. Durch Prof. Dr. H. Kramer (Bern) ausgegraben und der Landw. Sammlung Zürich geschenkt.

<sup>1)</sup> Vgl. A. Sanson, Traité de Zootechnie, Tome IV, 1896, 3. édit., p. 147—148, über die kranologischen Merkmale der Race vendéenne. „Cette description crânologique sommaire conviendrait parfaitement pour le type auquel la plupart des paléontologistes donnent le nom de *Bos primigenius* d'après Bojanus. On voit ainsi qu'elle ne s'appliquerait exactement, à en en regard, aux types que Rätimayer et d'autres auteurs font dériver du *Bos primigenius*." — p. 75 „On ne s'explique pas de telles confusions."

<sup>2)</sup> A. Nehring, Über Riesen und Zwerge des *Bos primigenius*. Berlin. Sitzungsber. Gesell. Naturf. Freunde 1889, Nr. 1, S. 5.

Auch spricht die Art des Vorkommens dieser Schädelstücke zu deutlich dagegen.

Sondern diese großen, starkköpfigen und langhörigen Hirschrinder der späteren neolithischen Zeit stellen die direkten Naehkommen des Ur dar, so daß man dabei nicht nötig hat, unter allerlei wenn und aber an eine allmähliche Verkümmernng des wilden Urs auf norddeutschem Boden zu glauben, eine Annahme, für die zum mindesten die Ursache fehlt<sup>1)</sup>. Diese Form der langhörigen Rinder der Vendée, die sich wohl auch im englischen Parkland und möglicherweise dem schottischen West Highland Breed recht rasserein erhalten hat, stellt allein den typischen Abkömmling des Ur dar, den eigentlichen *Bos taurus primigenius*.

Die kurzhörigen großen Niederungsrassen hingegen sind nur Kreuzungsprodukte dieser Form mit dem neolithischen, kleinen, kurzhörigen Rinde der norddeutschen Tiefebene, sowie auch mit verschiedenen anderen recht heterogenen Rinderschlägen. Ich werde dies sogleich zu beweisen versuchen. Das altgermanische Kurzhornrind der deutschen Tiefebene findet sich noch heuteutage im hohen Norden in seiner ganz überaus typischen, reinen, ungekreuzten Form, so z. B. auf Island, einigen skandinavischen Inseln und abgelegenen Teilen Irlands. (Tafel XX, Fig. 1. Islandrind.)

Es war der Anblick dieses stattlichen, großköpfigen, ganz primigeniusartigen Rindes der Vendée, der mich zum ersten Male auf meinen Reisen in Frankreich, vereint mit den nüchternen Ideen meines verstorbenen väterlichen Freundes A. Sanson an der Rüttimeyerschen Klassifikation der Hirschrinder stutzig werden ließ, was aber diese Skrupel förderte, das waren die folgenden Gesichtspunkte.

Das kleine Rind, das wir in den frühesten Pfahlbauten als auch in den ältesten norddeutschen Kulturschichten antreffen, muß, wenn es aus der stattlichen Form, die wir soeben

<sup>1)</sup> Man wolle mich hier aber nur nicht falsch verstehen, ich wende mich in keiner Weise gegen die Theorie der Verkümmernng der Rinder, sondern bin selbst ein eifriger Anhänger derselben. Aber die Verkümmernng der wilden oder domestizierten Form bis herab zur Zwergform auf europäischem oder sogar norddeutschem Boden anzunehmen, scheint durchaus nicht einwandfrei.

kennen gelernt haben, hervorgegangen sein will, einer überaus alten Zucht entstammen. Finden wir nun auf europäischem Boden das Übergangsstadium vom wilden Ur zu dieser kleinen Form in den ältesten Bodenschichten und Pfahlbauten? Nein! Die große primigenius-ähnliche Rinderform kommt erst später. In den ältesten frühneolithischen Pfahlbauten, wie Schaffis, ist es nur dies kleine Rind, welches wir antreffen und im Schweizerbild begegnen wir demselben schon in der paläolithischen unteren Nagerschicht, sowie in der grauen, neolithischen Kulturschicht<sup>2)</sup>, wir finden es in der Caverne von Laugres und anderen<sup>3)</sup>, im Neolithikum Englands<sup>4)</sup>, in neolithischen Schichten Skandinaviens<sup>5)</sup> und im Pleistozän Algeriens<sup>6)</sup> neben dem wilden Ur, ohne jegliche Übergangsform immer in demselben kleinen, konstanten Typus.

Es ist ja noch die letzte Möglichkeit, daß die großen primigenius Rinderformen durch Kreuzung dieses kleinen Rindes mit dem Ur entstanden sind, wie z. B. Hunderassen durch Kreuzungen mit dem Wolf. Aber dies vermögen wir nicht zu beweisen noch zu kontrollieren und ist der Hypothese Tor und Tür geöffnet. Deuuch müßte dann das kleine Rind früher vorhanden gewesen sein als das große.

Soll nun aber das Ausgangszentrum dieses Tieres in willkürlichem Gegeusatz zu den Kenntnissen, die wir aus Archäologie und Geschichte gewonnen haben, im Norden Europas

<sup>1)</sup> Studer, Die Tierreste aus den pleistocänen Ablagerungen des Schweizerlandes bei Schaffhausen. Denkschriften der schweiz. naturforsch. Gesellsch. Vol. XXXV.

<sup>2)</sup> Duerst, Notes sur quelques bovidés préhistoriques. L'Anthropologie 1900, tome XI, p. 459. — E. Rivière, Les grottes de la Manche (Dordogne). Bull. Soc. d'Anthrop. Paris 1897, p. 302 ff. — A. Sanson, Traité de zootechnie. Tome IV, p. 33.

<sup>3)</sup> Kob. Hall, On the remains of oxen found in the bogs of Ireland etc. Irish Acad. Proceed. Dublin I. 1881, p. 253—259. — Derselbe, On the collection of the fossil Mammalia of Ireland etc. Trans. Royal. Dublin Soc., Vol. III, 1885, p. 343. — Wilde, On the ancient and modern races of oxen in Ireland. Proceed. Royal. Irish Academ., Vol. VI, 1862, p. 64—75. — Benule, On the occurrence of *Bos longifrons* etc. Trans. Geolog. Soc. Glasgow., Vol. II, 1867, p. 152.

<sup>4)</sup> Steenstrup, Om *Bos longifrons* Owen, funden i Danmark. Skand. Naturf. Forhandl. 1847, S. 946. — Madsen, Müller etc., Afsalddynger fra Stenalderen i Danmark, Kopenhagen 1900.

<sup>5)</sup> Pomel, Les Boeufs-Taureauz. Carte géologique de l'Algérie. Paléontologie Alger. 1893, p. 67.

gesucht werden? Ich glaube, daß unter Annahme der Richtigkeit meiner Voraussetzungen wohl niemand mehr ernstlich daran denken wird! Daß der Ur oder eine seiner südlichen Varietäten als Stammform des kurzhörigen Rindes angesehen werden muß, ist mir im Laufe meiner Forschungen klar geworden<sup>1)</sup>. Besonders hat mich darin die Auffindung subfossiler Rinder in Madagaskar (Ambolisatra) bestärkt<sup>2)</sup>.

Wir wollen jedoch vorerst die Frage erörtern, ob sich ein Gegensatz zwischen dem von Rüttimeyer als „Torfriid“ bezeichneten kleinen Rinde schweizerischer Pfahlbauten und dem ebenso kleinen Rinde nordeuropäischer, speziell norddeutscher Kulturschichten wahrnehmen läßt. Angenehmlich ist das an Menge zwar reiche, aus dem Schloßberge stammende Knochenmaterial, der schlechten Erhaltung wegen, nicht genügend. Ich beziehe mich deshalb noch auf rund 120 Schädel und Schädelreste aus englischen Höhlen, Torfmooren, Pfahlbauten und Kulturschichten, die mir in öffentlichen und privaten Sammlungen Großbritanniens gütigst zur Verfügung gestellt wurden. Ich begreife außerdem in meine Betrachtung ein, mehrere in Norddeutschland speziell der Mark Brandenburg gefundene Schädel des kleinen Hausrindes, von denen derjenige von Vetschau (Tafel XX, Fig. 2) der wohlhaltenste ist.

Wie aus Bildern und Maßzahlen ersichtlich, ist die Kongruenz der kleinhörnigen, schmalstrügnen Rinder der britischen Kulturschichten, des *Bos longifrons* Owen, mit denjenigen der schweizerischen Pfahlbauten eine vollkommene. Sie wurde bekanntlich schon durch Rüttimeyer erkannt. Ein Unterschied zwischen dem englischen und norddeutschen Kurzhornrind dieser Zeiten ist aber ebenfalls nicht wahrzunehmen.

Diese Formähnlichkeit existiert aber nach meinen diesbezüglichen Untersuchungen zwischen jedem Rinde, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die dabei allein Beachtung verdienen, welchen man aber unbegreiflicher Weise in der

vergleichenden Kraniologie der Wiederkäufer dieselbe noch nie gebührend geschenkt hat; nämlich, daß die zu vergleichenden Schädel von Tieren gleichen Geschlechtes, gleichen Alters, gleichen Lebensbedingungen (Boden, Klima, menschlicher Einfluß), relativ gleicher Hornlänge und Hornform herkommen. Unter solchen Umständen sind mit Ausnahme bloß individueller Variationen die Schädel aller unserer taurinen Hausrinder einander gleich.

Es ist vor allem die Hornform und Hornlänge, die durch mechanische Einwirkung die bestimmten Schädelformen hervorrufen. Ich habe die dabei geltenden Gesetze zu formulieren versucht, und deren Richtigkeit durch das Experiment am lebenden Tiere direkt bewiesen<sup>3)</sup>.

Die die Schädelform bedingende Form der Hörner hängt ihrerseits ab von derjenigen, die die Hornscheide annimmt, welche beeinflußt wird von der Form und Krümmung der Haare, der Dicke der Haut und dem Verhältnis von Oberhaut zu Unterhaut, dem Geschlecht des Tieres und der Spezies.

Es läßt sich auf diese Weise mancher Bildung der Stirnbeine und übrigen Schädelknochen erklären, wie denn auch so das Rätsel gelöst wird, das H. v. Nathusius der Rüttimeyerschen Abstammungstheorie entgegenstellte<sup>4)</sup>.

Eine Schwäche der Rüttimeyerschen Arbeiten liegt darin, daß dieser Autor genötigt war, seine sonst so bewunderungswürdigen Forschungen auf ein zu geringes Material zu basieren. So dienten Rüttimeyer als Typus, nach dem er seinen rezenten *Bos taurus primigenius* charakterisierte, einige Schädel von Rindern Hollands und Frieslands<sup>5)</sup>. Eine osteologische Beschreibung eines vollständigen

<sup>1)</sup> „Les lois mécaniques dans le développement du crâne des Caviornes.“ *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, Paris 1903, II. Sem., Nr. 3, p. 342—344. — Experimentelle Studien über die Morphogenie des Schädels der Caviornes. I. Teil. Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch., Zürich 1905, III. Heft, S. 360 bis 374.

<sup>2)</sup> H. v. Nathusius, Über Schädelformen des Rindes. *Landw. Jahrbücher*, IV. Bd., 1875, S. 442 bis 459.

<sup>3)</sup> Rüttimeyer, Fauna der Pfahlbauten. S. 201. Anf., S. 140 bis 143, werden die Merkmale der subfossilen Stücke besprochen.

<sup>4)</sup> Duerst, Wilde und zahme Rinder der Vorzeit. *Natur und Schule*, II. Bd., 1903, I. Heft, S. 31.

<sup>5)</sup> Vgl. A. Filhol, Observations concernant les mammifères contemporains des Aepyornis de Madagascar. *Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris* 1895, p. 12.

Schädels von *Bos primigenius* Bojanus als Vergleich dazu, hat uns Rüttimeyer jedoch nie geliefert. Die Rüttimeyersche Charakteristik von *Bos taurus primigenius* ward in der Folge ganz getreulich beibehalten, obwohl sie weder auf die Schädel des Ur-, noch diejenigen der langhörigen Steppenrinder, noch die der Vendée und anderer Gegenden anwendbar war, Rinderrassen, die Rüttimeyer dessen ungeachtet zu dieser Form rechnete.

Eine Charakteristik, die besonders dann nicht anwendbar ist, wenn man diese Rassen mit den als Typus geltenden Holländer Rindern vergleicht.

Stellt man aber einerseits die Rinder der englischen Torfmoore, der norddeutschen Kulturschichten und der schweizerischen Pfahlbauten mit den rezenten Rindern der Bretagne, den kleinen holländischen Rassen (Drente und anderen) in Parallele, dann würde selbst der Laie auf diesem Forschungsgebiete doch eine große Übereinstimmung erkennen, die um so größer wird, je mehr der von mir erst erwähnten Voraussetzungen zutreffen<sup>1)</sup>.

Aber noch etwas anderes läßt sich erwähnen, um die Rassenreinheit der Niederungsrinder als direkte Abkömmlinge des Urs anzufechten, selbst wenn man die osteologische Vergleichung mit primigen gebildeten Rindern ganz außer Spiel läßt; das ist nämlich ein historisches Zeugnis.

Bei meinen Quellenstudien über diese interessanten Fragen bin ich in der Nationalbibliothek in Paris auf mehrere wichtige Stellen gestoßen, von denen ich die unzweifelhaftesten hier erwähnen möchte.

Querbrat Calloet, Generaladvokat, Staatsrat, Edelmann und Landwirt, verfaßte in den Jahren 1666 bis 1680 mehrere Abhandlungen über Vorschläge zur Hebung der französischen Viehzucht. Es ist hier vor allem ein Rapport an Monseigneur Colbert, Finanzintendanten Ludwig XIV., zu nennen, der auf Befehl Mazarins und Colberts verfaßt wurde, und den

Titel führt „Moyens pour augmenter les revenus du Royaume de plusieurs millions“. Sodann aus dem Jahre 1680 das Böhlein „Pour augmenter les revenus des terres, Vaches de la race indienne“. In beiden Arbeiten bespricht der Autor den Import von ost- und westindischen Rindern nach Holland und England zum Zwecke der Vergrößerung der einheimischen Rassen, der in diesen Ländern von Staatswegen betrieben wurde, und empfiehlt, in Frankreich das gleiche zu tun<sup>2)</sup>.

Spätere französische Autoren wissen außerdem von häufigen Importen dänischer Rinder nach Holland zu Kreuzungszwecken zu berichten<sup>3)</sup>.

Wie weit die Kreuzung und Verbesserung holländischer Viehschläge ging, ist nicht sicher zu sagen, wohl aber genügen diese Angaben, um darzutun, daß die sogenannten Niederungsrassen des Hausrindes keine reinblütigen, charakteristischen Nachkommen des *Bos primigenius* Bojanus sind, wie die Rüttimeyersche Schule es annimmt.

Ist aber diese Annahme unbegründet, dann ist es auch verkehrt, die Schädelcharaktere solcher Kreuzungsprodukte als Grundlage einer Klassifikation der Rinderrassen zu machen, wie L. Rüttimeyer es infolge der Unkenntnis dieser Tatsachen getan hat.

Wenn ich nach diesen Betrachtungen nochmals zu dem Kurzhornrinde der alten Germanen zurückkehre, das man direkt vom Ur abzuleiten versucht, und es ohne sicher nachweisbare Übergangstadien direkt als wilde Kümmerungsform in den Hausstand treten lassen will, so glaube ich darauf aufmerksam machen zu müssen, daß die Bedingungen des Lebens und der Züchtung für die damaligen Haustiere wohl etwas andere waren, als man voraussetzt.

Damals war das Hausrind unter annähernd gleiche Lebensbedingungen gestellt wie das wilde, und infolge des noch so unentwickelten Verständnisses war Zucht und Paarung oben-

<sup>1)</sup> Daß ich nicht der einzige bin, dem solches aufgefallen, geht aus den angeführten Äußerungen Sanoas und der Arbeit von W. Klecki, *Studia nad morfologia etc. Bydla rogatego Bretanii*, Krakau 1898, hervor.

<sup>2)</sup> Vgl. „Betrachtungen über die Entstehung der sogenannten Niederungsschläge des Hausrindes.“ *Illustr. Landw. Ztg.*, 23. Jahrg., Nr. 63 bis 64, 8. und 12. August 1903, S. 677 bis 678; S. 687 bis 688.

<sup>3)</sup> „Le parfait Bouvier“, Epinal 1825, p. 11.

falls sie selbst überlassen. Inzucht konnte bei kleinem Viehstande vorkommen, doch weil gewöhnlich alle Herden eines Pagus oder Vicus gemeinsam gebütet wurden, ist dies wohl kaum so häufig und die Wirkung weniger schädigend gewesen.

Eine andere Möglichkeit der Verkleinerung der Rasse im Hausstande wäre vielleicht in der Paarung von zu jungen Tieren zu erblicken, die nach Adametz auch noch heute eine der Ursachen des kleinen Wuchses bei den bosnischen Rindern ist. Aber bei der völlig freien Haltung war auch dies kaum häufig, da die älteren stärkeren Bullen die jungen Tiere aus dem Felde schlagen<sup>1)</sup>.

Das damalige Hausrind lebte im Walde oder auf Brüchen entweder ganz frei oder von Hirten gebütet, und erst nach der allmählichen Rodung des Waldes auf Weiden. Also unter denselben Bedingungen wie sein Stammvater, der wilde Ur. Warum nun die große, kräftige Gestalt bei diesem und die kleine, zierliche, aber so überaus konstante Form bei jenem? Bei der Entstehung einer Kümmerungsform haben wir stets Übergänge. Auf europäischem Boden aber finden wir dieselben in frühester Zeit nicht, sondern sie treten erst nachträglich in der späteren Steinzeit auf.

Das deutet darauf hin, daß die Domestikation der europäischen Varietät des Urs erst später erfolgte, daß aber das älteste kleinhörige Rind damals schon importiert worden war.

Die Entstehung von Kümmerformen beim Hausrind braucht eine viel längere Zeit als den Neolithikern zur Verfügung stand. Bilden sich doch bei Rindern, die seit Jahrhunderten direkt auf Inzucht und die Leichensart ihrer Vorfahren angewiesen sind, jetzt noch keine solche Kümmerformen. Ich meine hier die englischen Parkrinder.

Bei meinen Studien über die Geschichte der Haustierrasse bin ich unter anderem in der Library des British Museum auf eine Stelle in Gervase Markhams „Husbandry“ aus dem Jahre 1631<sup>2)</sup> gestoßen, die mir manche Auf-

klärung zu geben scheint. Es heißt hier unter der Stichmarke der „Kinderfütterung“, daß diejenigen Tiere, die man „weanings“ oder „rearings“ nenne, und die zum Nachschub für die Nutztiere dienen, auf dem schlechtesten Boden mit dem geringsten Ertrage gehalten werden müssen, „seien es Wälder, Parks oder umzäunte Weiden oder Heiden, Moore, Brüche oder andere wilde oder unbegrenzte Flächen“. Hier müssen sie bleiben, Sommer wie Winter, bis sie zum Ziehen des Pfluges gebüldigt oder in den Stall „oder zu Markte beföhrt werden. Aber wenn solch ein Boden sie den Winter über nicht zu ernähren vermöge, so müsse man ihnen auf jenen Orten Krippen mit Stroh aufstellen.“ S. 243.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß die englischen Parkrinder als die letzten Überreste der auf diese Weise gehaltenen, mittelalterlichen Hausrinder aufzufassen sind, und nicht als die direkten Abkömmlinge des einst in jenen Wäldern wild lebenden Urs. Objektiv urteilende britische Forscher, wie z. B. Boyd Dawkins<sup>3)</sup>, Ball und andere haben sich ebenfalls dafür ausgesprochen. Für mich selbst war die persönliche Inaugenscheinnahme der Parkrinderherden noch besonders hierfür überzeugend.

Was die Rassenzugehörigkeit des Rindes aus der Ansiedelung am Schloßberg angeht, so stimmt dasselbe vollständig überein mit den Kurzhornrindern der englischen, irischen<sup>4)</sup> und schottischen Ablagerungen, sowie denjenigen der schweizerischen Pfahlbauten frühester Zeit. Ich gebe in nachfolgendem eine Tabelle mit den Vergleichsmaßen von Schädeln, die mir in gütigster Weise von den verschiedensten Museen und Privaten im Laufe des Jahres zur Untersuchung überlassen worden sind. Leider können nur die Hornzapfenmaße Berücksichtigung finden, da uns andere Schädelreste vom Schloßberg nur in unbrauchbarer Form zur Verfügung stehen.

<sup>1)</sup> Boyd Dawkins, The Chertley White Cattle. North Staffordshire Field Club, Januar 17, 1899.

<sup>2)</sup> Die Importation des Kurzhornrindes nach Irland ist Hall, On the Collection of the Fossil Mammalia of Ireland. Trans. Roy. Dubl. Soc. Vol. III, 1883, p. 343 genau zu beweisen, da überhaupt keine dem Ur angehörigen Reste je in Irland gefunden worden sind.

<sup>3)</sup> Vergl. über Theorien der Domestikation, die überaus einleuchtende von J. R. Mücke, Urgeschichte des Ackerbaues und der Viehzucht. Greifswald 1898.

<sup>4)</sup> Captaine Gervase Markham, The whole Art of Husbandry contained in four Bookes. London 1631, III. Buch, S. 243.

Die Übereinstimmung des englischen Kurzhornrindes (Celtic-Shorthorn oder Bos longifrons Owen genannt) mit demjenigen der schweizerischen Pfahlbauten ist eine vollkommene und ebenso kann den Hornzapfen und Uterkiefern, sowie den sonstigen Größenverhältnissen gemäß eine Ähnlichkeit, wenn nicht eine Kongruenz mit den deutschen Kurzhornrindern der Vorzeit, nicht geleugnet werden.

Obwohl eigentlich der Owensche Name Bos longifrons die Priorität besitzt — es läßt sich darüber nicht streiten, und ich erwähne dies, um meinen englischen Freunde Genugtuung zu geben — so hat man sich doch allgemein gewöhnt, diesen Typus mit dem praktischeren Namen Bos taurus brachyceros Rüttimeyer zu bezeichnen<sup>1)</sup>.

Diesen Bos taurus brachyceros begegnen wir also hier am Schloßberge und zwar in einer sehr reinen und kleinen Form.

Aus den vorgenommenen Größenberechnungen geht hervor, daß die Widerristhöhe dieser Tiere im Mittel 108 cm betrug. Es ist dies also die Größe des modernen Viehes aus der Bretagne, von Dreute, dem Dachauer Moor, Westsibiriens, Syriens usw.

Gleichartige Rinder wurden auch anderorts in Norddeutschland gefunden, so ein fast vollständiges Skelett eines „Zwergrindes“ in Börsum<sup>2)</sup> durch A. Wollmann. Sie bestätigen das für

die Schloßbergerinder durch Berechnung und nach Knochen verschiedener Individuen gefundene Mittelmaß; inwiefern aber die neue Benennung als Bos taurus primigenius minor Wollmann berechtigt ist, geht aus dem Vor erwähnten hervor.

Die Größenangabe stimmt aber auch überein mit der Schilderung von dem kleinen, unansehnlichen Schlag der Rinder der Germanen, wie sie uns die römischen Schriftsteller, vor allem Tacitus, Germania C. V., überliefert haben. Wenn Tacitus sagt „ne armentis quidem annis honor aut gloria frontis“, so trifft dies genau auf das wenig stattliche, kleine und kornhörige Rind des Schloßberges zu. Er fügt jedoch noch hinzu, daß die Germanen sich an der Zahl des Viehes erfreuten, nicht an ihrer Gestalt, und es ihnen die liebsten Schätze seien. Gewiß ist auch das vollkommen richtig, denn noch Karl der Große hält in seinen Capitulare de villis nichts auf Güte und Wert, sondern nur auf die Anzahl<sup>3)</sup>.

Dessungesecht konnte der Viehstand damaliger Zeiten sicher noch nicht ein großer genannt werden, und wenn Tacitus von großen Herden spricht — er bezieht es wohlweislich auf Groß- und Kleinvieh zugleich — so mag er wohl nicht das Besitztum eines einzelnen Mannes allein im Auge gehabt haben.

Dennoch ist die Rindviehzucht der Bewohner des Schloßberges derjenigen der älteren schweizerischen Pfahlbauten überlegen, insofern als jene infolge der kleinen Anzahl ihrer Rinder immer bloß die alten Stücke aßen, die nicht mehr zur Arbeit zu verwenden waren, während sich die Schloßbergansiedler, den Knochen nach zu urteilen, öfters den Genuß eines Kalbsbratens oder des Fleisches junger Rinder leisten konnten.

Neben der Fleischnutzung war es jedenfalls bloß uoch der Arbeitsnutzen, weshalb man die Rinder hielt. Daß zur damaligen Zeit Kühe wie Ochsen zur Arbeit verwendet wurden, was wir noch aus Karolingerzeit bestätigt erhalten<sup>4)</sup>, geht aus der nachfolgenden Betrachtung über die Deformation der Hornzapfen deutlich hervor. Pferde wurden nie oder nur selten zum Zuge verwendet.

<sup>1)</sup> Übrigens hat Owen im Kataloge des Museums des College of Surgeons im Jahre 1830 den Namen Bos brachyceros für dieses kleine Rind eingeführt. Er ließ ihn aber 1833 im Report on British fossil Mammalia wieder fallen zugunsten von Bos longifrons.

Nach meinen vorausgehenden Betrachtungen würde es sich fragen, ob man nicht den Namen Bos taurus primigenius für diese Rinder ebenfalls beibehalten sollte, da sie doch ebenfalls im Bos primigenius Bojanus oder dessen Varietäten ihren Ursprung nehmen. Aus praktischen Gründen schlage ich jedoch vor, die Einteilung statt nach der Körpergröße (major und minor) oder nach den Rindcharakteren (longifrons) nach der Hornlänge vorzunehmen, die sich doch als Hauptursache der Schädelform erweist. Ich habe dieses Prinzip meiner Klassifikation der Rinderarten der vergleichenden anatomischen Sammlung des Pariser Museums zugrunde gelegt, deren Katalog sich in Vorbereitung befindet. Seine weit leichtere, praktischere und anatomisch begründete Verwendbarkeit liegt an der Hand.

<sup>2)</sup> A. Wollmann, Ein domestiziertes Zwergrind der Primigenierrasse. Korrespondenzblatt d. deutschen Gesellsch. f. Anthrop., XXII. Jahrg., 1891, S. 50 bis 51; ibid. 10. Jahresth. Ver. Nat. Braunschweig. 1897, S. 208.

<sup>3)</sup> Capitulare de villis vel curtis imperatoris. Art. 23, p. 19.

<sup>4)</sup> Ibid. Artikel 23.

Die Milch war Nebensache, da man noch kaum etwas anderes daraus zu bereiten verstand als „lac conerctam“, dicke Milch, und die Kühe bei der geringen züchterischen Einwirkung nicht das ganze Jahr hindurch Milch gaben.

Ans allen diesen Gründen haben wir uns das Rind der alten Germanen und Ansiedler am Schloßberge ähulich vorzustellen, wie verschiedene Künstler des 17. Jahrhunderts, so z. B. Potter, uns manche Rinder vorführen, klein, kurzhörnig, struppig, knochig und mager, mit kleinem Euter und ziemlich grobem Kopfe.

Die Knochen des Hausrindes sind unter den

Als *Bos taurus hircyoceros* wird dieses Rind auch durch den äußerst geradlinigen Verlauf der Schläfenkante des Frontales, das geringe Vorragen der Orbitalränder, die ungemien flache Schläfengrube und den starken Stirnwulst gekennzeichnet. Die Parietalia greifen zipfelförmig auf die Stirnfläche hinüber. Das Hinterhaupt ist ziemlich flach, ohne starke Erhöhung des Hinterhauptswulstes über die Squama. Die Hörner sind direkt nach vorn gerichtet, die Spitzen einwärts gekrümmt, jedoch mit dem Unterschied, daß bei männlichen Tieren die Krümmung schwächer ist als bei weiblichen.

| Dimensionen der Schädelreste            | Schloßberg |         | Moorfields                | Jarrow-Docks               | Felixstow                 |
|---|------------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   | Nr. 487    | Nr. 492 | Brit. Museum<br>Nr. 40197 | Brit. Mus.-am<br>Nr. 32738 | Brit. Museum<br>Nr. 28011 |
| Kleine Hinterhauptbreite . . . . . mm   | 114        | —       | 112                       | 94                         | 118                       |
| Höhe des Hinterhauptwulstes . . . . . " | 24         | —       | 32                        | 31                         | 40                        |
| Breite des Parietalreiecks . . . . . "  | 64         | —       | 56                        | 46                         | 78                        |
| Seitliche Stirnlänge . . . . . "        | —          | 103     | 110                       | 134                        | —                         |
| Schläfengrubebreite . . . . . "         | —          | 22      | 26                        | 31                         | —                         |

Resten vom Schloßberge an Zahl und Masse vorherrschend (173 Stück). Die Extremitätenknochen besonders sind in reichem Maße erhalten. Jedoch die berechnete Individuenzahl läßt das Rind mit 31 Vertretern oder 24 Proz. der gesamten Haustierzahl erst nach dem Schwein, an zweiter Stelle, erscheinen.

#### Schädel

Die wichtigsten erhaltenen Schädelknochen sind die Hornzapfen. Es sind 17<sup>1)</sup>. Sie variieren etwas in der Länge, je nach Alter und Geschlecht der Tiere, von denen sie stammen. Die längsten, diejenigen einiger alter Kühe, sind 17 cm lang. Man kann sie deshalb alle als „kurz“ bezeichnen. Der Querschnitt ist bei den meisten rundoval, der größere Durchmesser in horizontaler Richtung. Die Zapfen sind, da sie alten Tieren zugehörten, fast durchweg sehr stark gefurcht und die meisten mit Spuren der Bearbeitung mittels scharfer Instrumente.

Die an einzelnen derselben (Nr. 492, 487) anhaftenden Frontalteile geben folgendes Bild.

Die Maßzahlen im Vergleiche mit einigen englischen Torfrindern weisen auf ihre Zusammengehörigkeit hin.

Neben den genannten, normal gebildeten Hornzapfen finden sich nun mehrere, die sich durch eine ganz eigentümliche Form auszeichnen. Sie sind im unteren Teile sehr stark verbreitert, abgeflacht, weshalb sie von der Seite gesehen (s. Fig. 3a, Taf. XVIII) sehr schmal, von vorne dagegen breit wie ein Büffelhornzapfen erscheinen. Im Querschnitt sind sie infolgedessen mehr rechteckig bis dreieckig, da die Unter- und Vorderfläche miteinander eine scharfe Kante bilden. Die Unterseite ist leicht gewölbt, während die Vorderseite ganz flach, aber mit tiefen Linien und Furchen versehen ist. Bei Nr. 486 ist an der Basis, besonders auf deren Hinterkante, ein nicht um den ganzen Zapfen herumlaufender, rundmüldiger Eindruck wahrnehmbar. Diese Abflachung ist bei fünf der Hornzapfen in bald stärkerem, bald schwächerem Maße ausgebildet, und geht am deutlichsten aus dem Verhältnis zwischen Vertikal- und Horizontal-durchmesser hervor (s. Tabelle 8).

Der sechste der abgeflachten Hornzapfen (Nr. 489) zeigt nun ein ganz umgekehrtes Ver-

<sup>1)</sup> DAZU noch zwei aus der nachträglichen Sendung Nr. 30 und 35.

halten. Bei ihm ist nicht die vordere Seite, sondern die hintere Seite des Zapfens eine vollständig ebene Fläche, während Ober- und Vorderseite normal gerundet mit der Hinterfläche unten eine scharfe Kante bilden (Trochocerosform).

Worauf beruht diese ganz eigenartige Bildung der Hornzapfen dieser Rinder vom Schloßberg? Das Interesse daran wird dadurch noch verstärkt, daß auch unter den Hornzapfen, die mir aus den bis zur Römerzeit reichenden englischen Pfahlbauten von London-Wall vorlagen<sup>1)</sup>, ebenfalls Stücke vorhanden waren, bei denen sich gleichfalls die Abflachung, wenn auch in etwas weniger auffallender Weise konstatieren ließ.

Auf Grund meiner Untersuchungen über die Hornentwicklung der Cavicornia<sup>2)</sup> ist die Erklärung für diese Erscheinung leicht zu geben. Von dem Grundsatz ausgehend, daß der Zapfen eine Bildung der Haut ist und seine Form von derjenigen der Hornscheide abhängt, erkennen wir, daß, um diese Hornzapfenbildung zu erzeugen, die Hornscheide entweder von vorn oder von hinten flachgepreßt werden mußte. Wie kam nun aber das zustande?

Es beruht einzig und allein auf der Anwendung des an den Hörnern befestigten Stirnjoches zur Anspannung der Rinder. Die Abflachung der Vorderseite der Hörner war durch die Befestigung des Joches vor den Hörnern, der Eindruck an der Basis des Zapfens Nr. 486 durch das Umachnüren mittels eines Strickes und die Abflachung der Hinterseite des Hornzapfens Nr. 489 durch Benützung des hinter den Hörnern befestigten Joches bedingt.

Durch den steten Druck und das Reiben wurde die Hornscheide wohl erwärmt und so flach gepreßt.

Wenn wir nun danach die Art des Joches der alten Germanen rekonstituieren wollen, so müssen wir vorerst einige Bemerkungen vorausschicken, um auch aus der Literatur unsere Folgerungen zu bestätigen.

Die Verwendung des Stirnjoches bei den ältesten Völkern ist durchaus nicht häufig. Die

<sup>1)</sup> A. Lane Fox, A description of certain piles found near London-Wall etc. Journ. Anthropol. Soc. Nr. 17, 1867, p. 71.

<sup>2)</sup> Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Hörner der Cavicornia. Festschrift zur Feier des 70. Geburtstages von Prof. Dr. A. Krämer. Frauenfeld 1902.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Babylonier spannten ihre Rinder mittels des auf dem Nacken liegenden Joches an und ließen den Kopf vollständig frei. Es geht dies deutlich aus dem von mir veröffentlichten Zylinder aus ältester babylonischer Zeit hervor, der aus das Pflügen vorführt<sup>3)</sup>, sowie aber auch aus den häufigen derartigen Darstellungen auf assyrischen Denkmälern. Die Ägypter hingegen benutzten das vor den Hörnern befestigte Joch. Wir erkennen dasselbe in Gräbern des alten Reiches, so z. B. vom Grabe des Ptah-Hotep, vom Grabe des Ty usw.<sup>4)</sup>

Es bestand in einem Balken, der mittels Stricken vor den Hörnern der beiden Tiere und an denselben festgebunden wurde.

Im neuen Reiche wird aber diese Methode der Anspannung verlassen und das Nackenjoch, sowohl als Einzel- wie als Doppeljoch verwendet. Ein derartiges Einzeljoch hat Wilkinson<sup>5)</sup> uns überliefert. Das Nackenjoch zeitet auch bei den alten Griechen in allgemeiner Verwendung gewesen zu sein, wir sehen es wenigstens bei Terrakotten aus Tauagra<sup>6)</sup>; ebenso ist es bei den etruskischen Bronzewagen<sup>7)</sup> in Verwendung.

Die römischen Schriftsteller erzählen uns, daß man in den Provinzen, namentlich aber den Alpen, das Joch gewöhnlich auf die Hörner der Tiere band, während es bei ihnen in Italien auf den Nacken gelegt wurde. Fast alle Landwirtschaftslehrer der Römer haben das Hörnerjoch verworfen, da mit Hals und Brust das Rind viel mehr leisten könne, indem es sich mit dem ganzen Gewicht in die Arbeit werfe. Liege ihm aber das Joch auf den Hörnern, so werde der Kopf beim brüskigen Anhalten zurückgerissen und das Tier gequält<sup>8)</sup>.

Die mittelalterlichen und neueren Autoren waren aber darüber anderer Ansicht, was uns beweist, daß das Horn- oder Stirnjoch noch bis jetzt in Mitteleuropa häufig verwendet wird.

<sup>3)</sup> Notes sur quelques bovidés, p. 155 (Figure 14). L'Anthropologie 1906.

<sup>4)</sup> Vgl. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben. Bd. II, 549 S. — Duerst, Die Rinder von Babylonien. S. 28.

<sup>5)</sup> Wilkinson, Customs and manners II, p. 392.

<sup>6)</sup> Hamy, Laboueurs et pasteurs berbères. Confer. Asson. franc. Avanc. Sciences, p. 60.

<sup>7)</sup> Archaologia XXXVI, p. 367, fig. 1, pl. 27. Im Brit. Museum, Nr. 346.

<sup>8)</sup> Columella II, 2, 26.



Der Augustinermönch Corbichon sagt in der in der Nationalbibliothek in Paris befindlichen Übersetzung des Bartholomäus Angliens von Glauvilla von 1488, liv. XVIII: „quant les benz sont jongz par les cornes ilz peuent plus fare de labour que quant ilz sont couples par les espanles ou par le col“<sup>1)</sup>.

Auch nach den Angaben des Constantinus Porphyrogenetos<sup>2)</sup> aus dem 10. Jahrhundert dürfte man, wie ich glaube, ebenfalls auf Verwendung des Hornjoches schließen. Er gibt nämlich an, man solle Öl und Terpentiu mischen, sieden und den Ochsen die Hörner damit einschmieren; wenn sie sehr arbeiten müssen, so würden sie dann nicht müde.

Daß auch schon der Strick, der um die Hörner geschlungen wurde, instande sein konnte, eine Veränderung bzw. Einschmürung des Hornzapfens zu bedingen, geht aus den Angaben hervor, die Colerus macht: um die Ochsen ziehen zu lehren, bindet man ihnen nur einen Strick vmb die Hörner | doch also das forneu der Strick nur ein wenig herunterhanget oder panmelt | vndd lass in also den strick tag vnd nacht vmb | etwan eine viertel Jahr nach einander |<sup>3)</sup>.

Diese Beispiele sollen genügen, um zu zeigen, daß die Möglichkeit der Anwendung des Hornjoches bei den alten Germanen vorhanden ist. Besonders aber wird dieses zur Sicherheit, wenn man erfährt, daß sich in Nord- und Mitteleuropa die Verwendung des an den Hörnern befestigten Joches bis jetzt erhalten hat und auch von

modernen Tierzuchtlehrern der damit verbundenen Vorteile wegen zum Gebrauche empfohlen wird. Während bei den Indiern, Siamesen und Chinesen sowie den meisten afrikanischen Völkern, mit Ausnahme der Kabylen und Ägypter sowie anderer von Europäern beeinflussten Stämme, allgemein das auf dem Halse aufliegende Joch in Gebrauch ist; während in Italien das Joch allgemein in Form des Nackenjoches Verwendung findet<sup>1)</sup>, wird es sowohl in Nordafrika wie in Spanien, Portugal und Südfrankreich meist an den Hörnern befestigt. Hier wird den Tieren ein bald mehr, bald weniger praktisch

hergerichteter Balken auf den Nacken hinter die Hörner gelegt und dann mittels Stricken oder Riemen um diese und die Stirne festgeschürzt. Zwischen Riemen und Stirne wird je nachdem ein Polster, Stroh oder ein Brett geschoben. Dies letztere ist mir aus dem französischen Departement „Indre“ bekannt (vergl. Abb.) und dürfte ungefähr der Anspannungsweise der Ansiedler vom Schloßberge entsprechen<sup>2)</sup>, wenn man sich das auf der Stirne



Anspannung der Rinder mittelst Stirnjoches im Departement Indre (Frankreich).

liegende Brett, unter das hier etwas Stroh geschoben wird, um den Druck zu vermindern, etwas breiter und bis zur Hornmitte reichend denkt. Dann haben wir in der der hinteren Hornweite zugekehrten glatten Fläche des Joches diejenige, welche die Deformation des Hornzapfens Nr. 489 herbeigeführt hat. Während durch den Druck des Stirnbrettes die Abflachung der übrigen Zapfen verursacht wurde.

Aus diesen Maßen der Hornzapfen geht folgendes hervor: Die Länge der Hornzapfen der Rinder vom Schloßberge variiert von 89 bis

<sup>1)</sup> Corbichon, Le propriétaire des choses. Lyon 1488, Livre XVIII.

<sup>2)</sup> Constantinus Caesar, Geoponica. Der Feldbau, übersetzt von Michael Herren, Straßburg 1845, p. 143, IV. Cap.

<sup>3)</sup> J. Colerus, Oeconomia. Wittenberg 1627, p. 365, V. Cap.

<sup>1)</sup> Mitteilung von Prof. Dr. Ezio Marchi, Perugia, unter dem 23. März 1903.

<sup>2)</sup> Es ist mir leider über das Vorkommen solcher Anspannungen in Deutschland nichts bekannt geworden





| Dimensionen<br>der Unterkiefer von<br><i>B. t. brachyceros</i><br>in Millimetern | Reste vom Schloßberg |     |     |     |     |     | Walhastow <sup>1)</sup> | Schaffis                 | Dachauer<br>Mooskub |
|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | 521                  | 540 | 516 | 539 | 546 | 545 | Samml. Daerst           | nach David <sup>2)</sup> | Mus. Zürich         |
| Länge des Unterkiefers . . . . .   | etwa 298             | —   | —   | —   | —   | —   | 318                     | 330—350                  | —                   |
| Länge der Backzahnreihe . . . . .  | 127                  | 127 | 124 | 123 | 130 | —   | 127                     | 126—144                  | 124                 |
| Länge des zahnlösen Teiles . . . . .   | 93                   | —   | —   | —   | —   | —   | 89                      | 69—84                    | —                   |
| Länge der Molarkreihe . . . . .  | 80                   | 80  | 79  | 77  | 82  | 82  | 78                      | 78—90                    | 83                  |
| Breite des Vertikalastes . . . . .   | —                    | 80  | 80  | —   | —   | 88  | 88                      | —                        | —                   |
| Höhe hinter M 3 . . . . .  | 59                   | —   | —   | —   | —   | —   | 55                      | 64                       | 63                  |
| Höhe vor M 1 . . . . .   | 42                   | —   | —   | —   | —   | —   | 42                      | —                        | —                   |

Ihren Dimensionen nach deuten diese Unterkiefer darauf hin, daß die Rinder vom Schloßberge noch kleiner waren als diejenigen der Pfahlbauten von Walhastow und von Schaffis, die der älteren Steinzeit angehören und schon der Konstanz der Merkmale der dort vorkommenden Haustiere wegen berühmt sind. Dabei sind die wenigen hier in Vergleich gesetzten Unterkiefer, von denen ich Nr. 293 in Tafel XVII, Fig. 2a abbildete, adulten Individuen angehört. Daß aber auch jüngere Tiere gegessen wurden, geht aus verschiedenen anderen Unterkieferresten hervor, die sich wie Nr. 557, 526, 549 den Zähnen nach als 1½ bis 2 jährigen Rindern zugehörend, bestimmen lassen.

Auch die Zahl der Kälber ist eine große (10) und dabei sind es nicht ganz junge Kälber, sondern wie Nr. 531, 524 und andere uns zeigen, Kälber von 24 Wochen.

Aus dem in Tafel XVI, Fig. 2d wiedergegebenen Frontalrest kann man schließen, daß auch Kälber jüngeren Alters verspeist wurden. Dieses Stück, Nr. 525, entspricht dem Frontale eines ungefähr 8 Tage alten Kalbes.

|                                | Nr. 525 | Neugeb.<br>Kalb<br>Flamkänd.<br>Rasse | 8 Tage<br>alt<br>Flamkänd.<br>Rasse |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Stirnweite . . . . .           | 93      | 84                                    | 100                                 |
| Stirnbreite . . . . .          | 115     | 113                                   | 119                                 |
| Seitliche Stirnlänge . . . . . | 78      | 61                                    | 68                                  |

Das häufige Vorkommen der Knochen junger Rinder und Kälber unter den Küchenabfällen der Bewohner des Schloßberges weist deutlich darauf hin, daß entweder die Herdenzucht in Germanien eine weit größere gewesen ist als dies bei den schweizerischen Pfahlbauten der

Fall war oder aber daß auf dem Schloßberg sich eine besonders begüterte Wohnstätte befand.

Die übrigen noch vorhandenen Schädelreste von *Bos taurus brachyceros* sind von untergeordneter Bedeutung, da wir an denselben nichts neues oder bemerkenswertes lernen können. Es sind vor allem: Nr. 538 die beiden Caudyli des Foramen magnus eines adulten Rindes, Nr. 547 ein Frontal- und Schläfengrubenrest eines sehr wahrscheinlich hornlosen oder sehr kurzhörigen Rindes, Nr. 548 ein oberer Orbitalrand mit anhängendem Frontalteil und Superiororbitallinie, sowie 9 Zähne aus dem Oberkiefer und 28 Zähne aus dem Unterkiefer von *Bos taurus*.

Wenn auch hornlose Rinder am Schloßberge vorkamen, so würde es mit Tacitus sehr gut übereinstimmen, ebenso sind ja aus schweizerischen und englischen Pfahlbauten hornlose Rinder bekannt. Sollen dieselben doch bis ins 18. Jahrhundert in der Lausitz vorgekommen sein<sup>3)</sup>. Da aber das Schädelstück Nr. 547 unvollständig ist, erscheint es besser, nicht darauf einzutreten, um nicht die Gefahr eines Versehens zu laufen, wie es dem sonst so gewissenhaften Rüttimeyer mit seinem Leptobos Frazeri nicht erspart blieb, welches Schädelstück<sup>4)</sup> bei genauer

<sup>1)</sup> Geschenk von S. A. Kennard.

<sup>2)</sup> A. David, Beiträge zur Kenntnis der Abstammung des Hausrindes usw. Landw. Jahrb. Schweiz. 1897, S. 122.

<sup>3)</sup> K. G. Anton, Die Geschichte der deutschen Landwirtschaft, I. Bd., Görtitz 1799, 17 S.

<sup>4)</sup> Brit. Museum Nr. 39714 presented by Charles Frazer. Vgl. Rüttimeyer, Die Rinder der Tertiärepoche. Abh. Schweiz. Pal. Ges. 1877 bis 1878. 165 S. Taf. VII, Fig. 1 u. 2.

Ich habe den Schädelrest tagelang studiert, aber kann nichts von Abdachung der Frontalia erkennen, wie dies bei hornlosen Rindern der Fall sein sollte, vielmehr steigen dieselben zu Hornansätzen auf.

Prüfung zwar keine Hörner, weil sie abgeschlagen sind, aber dafür den Ansatz deutlicher Hornstiele aufweist.

Uter den Knochenresten aus neolithischer Blütezeit von Klein-Wauzeben (Prov. Sachsen), die mir zur Untersuchung gesandt wurden als diese Arbeit schon fertig gestellt war, befand sich der Schädelrest eines hornlosen Rindes (*Bos taurus akertus*). Ich gebe dessen Abbildung in Fig. 2, Taf. XVIII.

Aus einem anderen Fundorte bei Vetschau (Prov. Brandenburg) erhielt ich das Kalvarium eines brachyceren Rindes, Fig. 2, Taf. XX, das vollkommen das bestätigt, was ich in dem vorgehenden über die Rassenzugehörigkeit und Abstammung des primitiven Rindes der deutschen Tiefebene gesagt habe.

Über die Größenverhältnisse geben die folgenden Maße Auskunft:

| Dimensionen                        | Hornloses Rind | Kurz-hörniges Rind |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Gesamte Stirnlänge . . . . .       | 174            | 180                |
| Länge des Stirnbeines . . . . .    | 170            | 172                |
| Stirnbreite . . . . .              | 188            | 152                |
| Stirnenge . . . . .                | 150            | 128                |
| Innere Augenbreite . . . . .       | 124            | 110                |
| Große Hinterhauptbreite . . . . .  | 192            | —                  |
| Kleine Hinterhauptbreite . . . . . | 90             | 95                 |
| Schädelhöhe . . . . .              | 148            | —                  |

#### Rumpf.

An Rumpfknochen liegen keine vollständigen vor. Einige kleine Wirbel, Becken- und Rippenstücke müssen als *Bos taurus* zugehörig bezeichnet werden. Sie aber einzeln aufzuführen, wäre bei der sonstigen Menge des Materials wenig lohnend.

#### Extremitäten.

Ich will in nachfolgenden Tabellen die Messungsergebnisse der Gliederknochen des kleinen Rindes vom Schloßberge mit einigen Vergleichsmaßen geben, ohne mich aber im weiteren auf eine mehr oder weniger gelehrte Auseinandersetzung über Form und Gestaltung der einzelnen Knochen und deren Maßverhältnisse einzulassen. Es dürfte dies den Rahmen meiner Arbeit überschreiten und werde ich voraussichtlich Gelegenheit haben, diese rein osteologischen Fragen in Kürze separat zu be-

handeln, ihr Wert für die Rassenbestimmung wird demnachgeachtet nie ein ausschlaggebendes werden.

Für uns genügt es hier, zu wissen, welcher Art und Rasse das aufgefundenen Rind zugehört und die beigegebenen Maße sollen späteren Mitarbeitern die Vergleichung erleichtern. Außerdem mögen uns dieselben noch dienen zur Berechnung der approximativen Körpergröße des vorliegenden Rindes, da uns die Unvollständigkeit der Knochen eine direkte Rekonstruktion nicht gestattet hat.

Wir können dabei zwei Wege verfolgen.

Einerseits können wir aus der bekannten, gemeinhin sehr konstant bleibenden Länge der Backzahreihe die Schädellänge und daraus die Widerristhöhe berechnen, doch wird bei der Kleinheit der Ausgangszahl das Endresultat natürlich relativ ungenau sein. Oder aber, wir können aus dem längsten uns bekannten Extremitätsmaß, das vertikal genommen ist, die Widerristhöhe mit mehr Genauigkeit berechnen.

Es ist dies z. B. am besten an Radius und Metacarpus auszuführen, zwei Knochen, die in natura fast senkrecht stehen, wenn das Tier nicht in Bewegung ist. Die Länge des einzigen vollständigen Radius, Nr. 135, beträgt 228 mm, die mittlere Länge aus acht vollständigen Metacarpus ist 157 mm, die Höhe der Carpalia muß nach Messungen an 12 rezenten Skeletten auf etwa 31 mm veranschlagt werden, woraus sich dann eine Höhe von 416 mm für die Distanz vom distalen Ende des Metacarpus bis zum proximalen des Radius ergäbe. Nach genauen Messungen an 12 Skeletten von *Brachyceros* rindern stellt sich das durchschnittliche Verhältnis dieser Distanz zur Widerristhöhe gleich wie 100:250, woraus sich dann eine approximative Widerristhöhe für das Rind des Schloßberges von 104 cm ableiten ließe, denen aber bei Inbetrachtziehung der Hufwand und Hautdicke noch etwa 3 cm beizufügen sind, sodaß wir in Summa auf 107 cm gelangen würden.

Berechnen wir nunmehr zur Kontrolle dieselbe Höhe aus der Länge der Zahnreihe des Unterkiefers, indem wir folgende Ansätze zugrunde legen, die nach einer großen Anzahl von Skeletten gewonnen wurden: Die Backzahreihe des Unterkiefers verhält sich zur Unter-

kieferlänge = 40:100, die Unterkieferlänge zur Basallänge des Schädels = 86:100, die Basallänge zur Widerristhöhe = 35:100.

Danach erhalten wir als Länge des Unterkiefers 31,5 cm, als Länge der Schädelbasis 36,5 cm und als Widerristhöhe mit Hinzufügung von 3 cm 108 cm.

Es zeigt sich somit, daß diese Berechnung ein ganz gleiches Resultat ergibt als die frühere, was die Richtigkeit derselben bestätigt.

Halten wir also an einer approximativen Widerristhöhe von 108 cm für dies altgermanische Rind fest, so gebührt demselben unter den moderneren Kurzhornrindern, die aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtliche Stellung.

|   | Widerrist-<br>höhe<br>cm |
|---|--------------------------|
| Subfossiles Rind der Höhle von Zschito nach Regalia <sup>1)</sup> . . . . . | 67 bis 91                |
| Kuh der Bretagne (Morbihan) nach Sanson <sup>2)</sup> . . . . .             | 95                       |
| Stier der Bretagne nach Sanson . . . . .                                    | 107                      |
| Rind vom Schloßberg (berechnet) . . . . .                                   | 108                      |
| Rind von Walthamstow (berechnet) . . . . .                                  | 110                      |
| West-sibirische Rinder nach v. Okulitsch <sup>3)</sup> . . . . .            | 111                      |
| Dachauer Mooskuh . . . . .  | 115                      |
| Hinterwälderschlag nach Lydtin und Werner <sup>4)</sup> . . . . .           | 116 bis 123              |
| Westwälderschlag nach Lydtin und Werner . . . . .                           | 122 „ 126                |
| Anglerschlag nach Lydtin u. Werner . . . . .                                | 124 „ 128                |
| Vogelsbergerschlag nach Lydtin und Werner . . . . .                         | 126 „ 128                |
| Schweiz. Braunviehschlag n. Müller <sup>5)</sup> . . . . .                  | 123 „ 133                |

Rekapitulierend muß erwähnt werden, daß aus unserer allgemeinen Betrachtung folgendes hervorgeht:

<sup>1)</sup> E. Regalia, Sulla fauna delle grotte di Frolo e Zschito. Archivio per Antropologia e l'Etnologia, vol. XXXIII, fasc. 2<sup>a</sup>, 1903, p. 228.

<sup>2)</sup> A. Sanson, Traité de Zootechnie. T. IV, 3. éd., 1896, p. 97.

<sup>3)</sup> v. Okulitsch, Die Viehzucht Westsibiriens. Forschungen usw. Festschrift für Krämer 1902, S. 156.

<sup>4)</sup> Lydtin und Werner, Das deutsche Rind. Arbeiten der D. L. G. 1899.

<sup>5)</sup> Müller, Das schweizerische Braun- und Fleckvieh. Ber. 1896, S. 13.

1. Die kranologische Kennzeichnung und Einteilung der rezenten Rinderrassen, wie sie von Ludwig Rüttimeyer eingeführt worden ist, hat sich in einzelnen fundamentalen Punkten als nicht völlig einwandfrei erwiesen.

2. Das in schroffem Gegensatz zu *Bos taurus brachyceros* Rüt. als *Bos taurus primigenius* Rüt. bezeichnete, ebenfalls kurzhörige Vieh der Niederungen ist mit dem *Bos taurus primigenius* der späteren neolithischen Kulturschichten durchaus nicht übereinstimmend, sondern weist in höchstem Maße die allen kurzhörigen Rindern gemeinsamen Charaktere auf.

3. Es ist ferner nachweisbar, durch unzweifelhafte geschichtliche Daten, daß das holländische und englische Vieh durch Importe indischer Rinder verbessert wurde, es daher nicht als reinblütige Form mehr betrachtet werden kann.

4. Man findet jedoch in Gegenden primitiver Kultur noch Rinder, welche ganz vollständig die dem Ur und seinen neolithischen Deszendenten eigenen osteologischen Charaktere aufweisen.

Diese allein sollten als der echte *Bos taurus primigenius* aufgefaßt werden. Die kurzhörigen Rinder der Tiefebene und Höhenländer sind hingegen insgesamt auf das Torfrind der Neolithiker aller Gegenden Europas zurückzuführen und ihre jetzigen Formverschiedenheiten in der Wirkung der Kreuzung mit den großen als *Bos taurus primigenius* bezeichneten Rindern und dem Einfluß der Lebensbedingungen und Zucht zu suchen.

Aus dem speziellen Teile unserer Untersuchung kann man folgern:

1. Das Rind der alten Germanen stimmt mit demjenigen der schweizerischen, französischen, britischen und skandinavischen Pfahlbauten und gleichzeitigen Kulturschichten überein. Es muß deshalb als das nach seinem Vorkommen so benannte „Torfrind“ angesehen und dem Typus des *Bos taurus brachyceros* zugeteilt werden.

2. Es sind heute noch in den Rindern der Bretagne, Westsibiriens und anderen, Reste der ursprünglichen, primitiven Form vorhanden. Dieselbe findet sich aber auch ganz besonders auf Island, wo wir fast allen Haustieren der alten Germanen des Schloßberges heute noch begegnen.

| Dimensionen der Scapula                     | Schloßberg      |                 |                  | Dachauer<br>Mooskuh |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
|   | links<br>Nr. 27 | links<br>Nr. 32 | rechts<br>Nr. 30 |                     |
| Größe Länge in der Mittellinie . . . . .    | 277             | 247             | —                | 299                 |
| Größe Breite im oberen Drittel . . . . .    | 135             | 125             | —                | 175                 |
| Breite am Hals . . . . .                    | 48              | 52              | 55               | 47                  |
| Längsdurchmesser der Gelenkfläche . . . . . | 50              | —               | 54               | 50                  |
| Querdurchmesser der Gelenkfläche . . . . .  | 41              | —               | 48               | 41                  |

| Dimensionen des Humerus                                 | Schloßberg |           |           |           |           |           | Dachauer<br>Mooskuh |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|   | Nr.<br>71  | Nr.<br>77 | Nr.<br>75 | Nr.<br>73 | Nr.<br>74 | Nr.<br>79 |                     |
| Größe Länge . . . . .                                   | 240        | —         | —         | —         | —         | —         | 242                 |
| Größe Breite des proximalen Gelenkkopfes . . . . .      | 64         | —         | —         | —         | —         | —         | 80                  |
| Querdurchmesser desselben . . . . .                     | 85         | —         | —         | —         | —         | —         | 102                 |
| Breite des Humerus in der Hälfte seiner Länge . . . . . | 28         | 28        | 35        | 35        | 36        | —         | 32                  |
| Querdurchmesser ebenda . . . . .                        | 37         | 42        | 43        | 38        | 44        | —         | 42                  |
| Längsdurchmesser der Trochlea . . . . .                 | 63         | 65        | 67        | 68        | 65        | 70        | 71                  |
| Höhe des äußeren Trochleales . . . . .                  | —          | 25        | 31        | 29        | 29        | 32        | —                   |
| Höhe des inneren Trochleales . . . . .                  | 59         | 38        | 58        | 43        | 36        | 55        | 67                  |

| Dimensionen des Radius                             | Schloßberg |                   |            |            |            |            |            | Dachauer<br>Mooskuh | Hind von<br>Irkutsk<br>nach<br>Tscherski <sup>1)</sup> |
|--|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
|  | Nr.<br>135 | Nr.<br>194        | Nr.<br>131 | Nr.<br>133 | Nr.<br>132 | Nr.<br>136 | Nr.<br>129 |                     |  |
| Größe Länge . . . . .                              | 228        | 173 <sup>2)</sup> | —          | —          | —          | —          | —          | 242                 | 260  |
| Breite des proximalen Endes . . . . .              | 68         | 58                | —          | —          | —          | —          | —          | 75                  | 75   |
| Durchmesser (vorn nach hinten) desselben . . . . . | 40         | 30                | —          | —          | —          | —          | —          | 37                  | 34   |
| Breite in der Hälfte des Radius . . . . .          | 36         | 27                | 37         | 35         | 35         | 34         | 29         | 33                  | 37   |
| Durchmesser ebenda . . . . .                       | 20         | 14                | 24         | 24         | 17         | 18         | 16         | 20                  | —  |
| Breite der distalen Gelenkfläche . . . . .         | 77         | 55                | 60         | 64         | 73         | 63         | 63         | 60                  | 67   |
| Durchmesser derselben . . . . .                    | 38         | 26                | 32         | 27         | 37         | 32         | 33         | 45                  | —  |

| Dimensionen der Metacarpen                      | Schloßberg. Adulte Individuen |     |         |     |         |     |         |     | Dachauer<br>Mooskuh |
|---|-------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------------------|
|   | Nr. 185                       |     | Nr. 189 |     | Nr. 188 |     | Nr. 190 |     |                     |
| Größe Länge (außen) . . . . .                   | 190                           | 177 | 173     | 172 | 165     | 152 | 140     | 130 | 178                 |
| Mittellänge . . . . .                           | 170                           | 166 | 155     | 161 | 148     | 138 | —       | —   | 178                 |
| Länge (innen) . . . . .                         | 188                           | 175 | 170     | 171 | 161     | 150 | —       | —   | 170                 |
| Breite am proximalen Ende . . . . .             | 53                            | 55  | 54      | 55  | 53      | 49  | 40      | 42  | 54                  |
| Durchmesser am proximalen Ende . . . . .        | 32                            | 30  | 33      | 36  | 32      | 30  | 24      | 24  | 32                  |
| Breite in der Hälfte . . . . .                  | 28                            | 25  | 30      | 29  | 29      | 27  | 20      | 19  | 28                  |
| Durchmesser in der Hälfte . . . . .             | 18                            | 20  | 21      | 21  | 20      | 17  | 14      | 14  | 20                  |
| Breite am distalen Ende . . . . .               | 56                            | 56  | 56      | 58  | 60      | 57  | 42      | 43  | 53                  |
| Durchmesser am distalen Ende . . . . .          | 30                            | 29  | 27      | 30  | 28      | 27  | —       | —   | 27                  |
| Kongruente Metacarpen bei Kinberg <sup>3)</sup> |                               |     |         |     |         |     |         |     |                     |
| Nr. . . . .                                     | 241                           | 133 | 98      | 93  | 30      | 51  | 26      | 16  |                     |

<sup>1)</sup> Tscherski, op. cit., p. 157.

<sup>2)</sup> Unvollständig, daher approximativ.

<sup>3)</sup> J. G. H. Kinberg, Undersökningar rörande Djurens historia. Öfversigt Kongl Vetenskap. Akad. Förbandl. 1869, Nr. 4, p. 465—525. Kinberg gibt hier die Maße einer Unmenge von subfossilen Metacarpen und Metatarsen von *Bos taurus brachyceros* aus Fundorten in Stockholm, so daß man mit Leichtigkeit für obige Metacarpen kongruente Stücke auffodert.

| Dimensionen der Phalangen  | Schloßberg |     |     |     | Dachauer Mooskuh |            |
|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------|------------|
|                            | Nr.        | Nr. | Nr. | Nr. | Vorderbein       | Hinterbein |
|                            | 233        | 234 | 321 | 239 |                  |            |
| <b>Phalanx I.</b>          |            |     |     |     |                  |            |
| Länge . . . . .            | 78         | 58  | —   | —   | 64               | 53         |
| Breite proximal . . . . .  | 40         | 30  | —   | —   | 26               | 23         |
| Breite distal . . . . .    | 25         | 18  | —   | —   | 23               | 23         |
| <b>Phalanx II.</b>         |            |     |     |     |                  |            |
| Länge . . . . .            | —          | —   | 34  | —   | 32               | 27         |
| Durchmesser . . . . .      | —          | —   | 30  | —   | 27               | 25         |
| <b>Phalanx III.</b>        |            |     |     |     |                  |            |
| Länge . . . . .            | —          | —   | —   | 86  | 71               | 61         |
| Breite . . . . .           | —          | —   | —   | 31  | 25               | 23         |
| Höhe (senkrecht) . . . . . | —          | —   | —   | 44  | 38               | 38         |

| Dimensionen des Femur                       | Schloßberg |     |     |     | Dachauer Mooskuh |
|---|------------|-----|-----|-----|------------------|
|   | Nr.        | Nr. | Nr. | Nr. |                  |
|   | 240        | 87  | 261 | 243 |                  |
| Größe Länge . . . . .                       | 318        | —   | —   | —   | 323              |
| Breite des proximalen Endes . . . . .       | 97         | 82  | —   | —   | 105              |
| Durchmesser desselben . . . . .             | 57         | 42  | —   | —   | 43               |
| Breite des Knochens in der Hälfte . . . . . | 30         | —   | —   | —   | 30               |
| Durchmesser ebenda . . . . .                | 86         | —   | —   | —   | 34               |
| Breite des distalen Endes . . . . .         | 86         | —   | 74  | 73  | 86               |
| Durchmesser desselben . . . . .             | 77         | —   | 98  | 104 | 114              |

| Dimensionen der Metatarsen                    | Schloßberg |     |     |     |     | Dachauer Mooskuh |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
|   | Nr.        | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |                  |
|   | 338        | 313 | 341 | 345 | 340 |                  |
| Größe Länge (außen) . . . . .                 | 302        | 198 | 196 | —   | —   | 206              |
| Mittellänge . . . . .                         | 186        | 185 | 171 | 184 | 164 | 206              |
| Länge (innen) . . . . .                       | 197        | 194 | 182 | —   | —   | 202              |
| Breite am proximalen Ende . . . . .           | 39         | 34  | 39  | 40  | 38  | 43               |
| Durchmesser am proximalen Ende . . . . .      | 38         | 28  | 38  | 38  | 35  | 36               |
| Breite in der Hälfte . . . . .                | 21         | 22  | 21  | 20  | 18  | 27               |
| Durchmesser in der Hälfte . . . . .           | 23         | 23  | 20  | 24  | 20  | 23               |
| Breite am distalen Ende . . . . .             | 47         | 42  | 46  | 38  | 38  | 50               |
| Durchmesser am distalen Ende . . . . .        | 27         | 20  | 21  | 22  | 23  | 29               |
| Kongruente Metatarsen bei Kinberg Nr. . . . . | 161        | 101 | 10  | —   | —   |                  |

### 3. *Ovis aries*. Das Hausschaf.

Die Hausschafreste sind bei weitem nicht so zahlreich wie diejenigen des Rindes, aber trotzdem nicht minder interessant, indem gerade sie uns einige wichtige Aufschlüsse über den Kulturzustand der Schloßbergbewohner geben.

In den Ältesten Pfahlbauten der Steinzeit der Schweiz begegnen wir den Überresten eines kleinen feinknochigen Hausschafes, das aus dem

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Grunde als eine scharf begrenzte, relativ konstante Rasse angesehen werden muß, weil gleichzeitig nur diese eine Form ohne bedeutende Variationen auftritt. Rüttimeyer gab ihr den Namen „Torfschaf“ (*Ovis aries palustris*<sup>1)</sup>).

Dieses Torfschaf besitzt in seiner ältesten Form folgende Knochencharaktere: Die Gliedmaßenknochen sind stets äußerst schlank und klein. Der Schädel, von dem aus den schweize-

<sup>1)</sup> Rüttimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 191.



rischen Pfahlbauten nur ein einziger, fast vollständiger, sich im Museum in Bern befindet und ein zweiter aus einem irischen Torfmoore im Museum von Paris, bekannt sind, ist gekennzeichnet durch eine flache Stirn und kleine, seitlich komprimierte Hornzapfen, die sehr schief zur Mittellinie des Schädels stehen. Die Zapfen sind ähnlich gebildet wie diejenigen der Ziegen, was mit der Form der Hörner und nach meinen Untersuchungen über Hornentwicklung mit dem ziegenartigen Haarkleide der Tiere zusammenhängt. Diese Zapfen sind nicht abwärts gebogen, sondern anwärts und rückwärts gerichtet. Ihre Größe kann variieren und dadurch wird auch ihre Form beeinträchtigt. Außerdem muß ich noch auf eine andere Erscheinung aufmerksam machen. Das Torfschaf der ältesten englischen Kulturschichten hat nicht immer die flache Stirne des Torfschafes der Schweiz, sondern seine Stirn ist oft gewölbt. Damit geht nun aber Hand in Hand eine Verkleinerung der Hornzapfen und Verlegung des Schwerpunktes. Mit dem Rudimentärwerden oder bloßen Verkleinern des Hornes und infolgedessen des Hornzapfens, tritt eine Verwölbung der Stirn ein, weshalb, wie bekannt, hornlose Schafe eine gebogene Profilinie haben. Ich habe auch beim Rinde darauf hingewiesen, daß die so lange als überaus charakteristisch angesehenen osteologischen Charaktere der Stirn von Gewicht, Richtung und Größe der Hörner mechanisch beeinflusst werden. Ich erinnere als Antagonismus an die Einknickung und Konkavität der Stirn bei stark gehörnten Wildschafen, deren Hornzapfen nicht hohl, wie die von *Ammotragus tragelaphus*, sind.

Dessenungeachtet sind die Erkennungsmerkmale des Torfschafes klare und scharfe, weshalb — wenigstens an den Hornzapfen — dieses Schaf fast von jedermann leicht erkannt wurde.

Das Torfschaf begleitet in dieser Form den schweizerischen Pfahlbauer bis zum Ende der Pfahlbauzeit und in die römischen<sup>1)</sup> Kolonien und helvetogallischen Niederlassungen hinein, und selbst bis heutzutage hat es sich in unveränderter Form in einem abgelegenen Alptale Graubündens, Nalps bei Dissentis, erhalten.

<sup>1)</sup> H. Krämer, Die Haustierfunde von Vindonissa. Revue suisse de Zoologie. 1. T., 1899, S. 212.

Aber nicht allein aus der Schweiz kennen wir dieses Tier, sondern es liegt mir in vielen sehr schönen Exemplaren vor aus den ältesten neolithischen Kulturschichten Englands, so z. B. aus dem Lea Alluvium von the Mills (Bromley, London East), von Canning Town (London E), von Poplar, ferner aus dem Forest-Bed von Tidal Basin, Canning Town u. a., ferner aus den späteren Schichten bis zu den Pfahlbauten von Walthamstow und London-Wall, die bis zur Römerzeit reichten<sup>2)</sup>.

Ähnlich wie das Nalpschaf in den schweizerischen Alpen hat sich auch das Torfschaf in einer etwas größeren, stärkeren und stattlicheren Form in den Bergen von Wales erhalten. Dr. Frank Corner war so gütig mir den Kopf eines Widders aus dem Hochlande von Wales kommen zu lassen.

Wir finden das Torfschaf ferner in den Überresten der Steinzeit Skandinaviens<sup>3)</sup>. Die ersten Besiedler Islands haben dieses Schaf gleichfalls dorthin mitgebracht, denn noch ist auf Island das Torfschaf in seiner reinsten Form vorhanden und völlig übereinstimmend mit demjenigen von Wales. (Tafel XX, Fig. 4.)

Aus südlichen Ländern ist das Torfschaf ebenfalls fossil und subfossil bekannt. Wir treffen es in den Terramaren von Modena<sup>4)</sup>, den Gräbern von Sanpalo d'Enza<sup>5)</sup>, der Grotta di Pertosa<sup>6)</sup> und anderen Fundstellen. In Frankreich kenne ich es selbst aus Abbéville und dem Pfahlbau des Sees von Paladrn<sup>7)</sup>.

Kurzum, es muß dieses Schaf als frühestes und als der allgemein verbreitete, stete Begleiter des kurzhörnigen, kleinen Hansrindes, Torfhundes und Torfschweines und des-

<sup>1)</sup> Diese große Anzahl von Schädelresten, auf die ich hier Bezugnahme und die ich andernorts zu publizieren gedenke, entstammen den Privatsammlungen meines Freundes Dr. Frank Corner, des Herrn A. Kenard Esq. und des Herrn Dr. Gardiner.

<sup>2)</sup> Madren, Müller, Neergaard, Petersen, Rostrop, Steenstrup, Winge, Affadsllynger fra Steenaldereen i Danmark. Kjøbenhavn 1900.

<sup>3)</sup> Canestrì, Oggetti trovati nelle terramare del Modenes. Ann. del. soc. d. Nat. Modena 1, 1866.

<sup>4)</sup> P. Strobel, I pozzi sepolcrali di Sanpalo d'Enza. Bull. Paleontologica Ital. 2, p. 6—17, ante 18.

<sup>5)</sup> E. Regalia, Sulla fauna della Grotta di Pertosa (Napoli) p. 19.

<sup>6)</sup> E. Chantre, Les Palafittes du lac de Paladrn. Chambéry 1871.

halb auch des neolithischen Menschen aufgefaßt werden.

In den späteren Pfahlbauten findet man eine etwas abweichende Form des Torfschafes. Die Hornzapfen sind hier stärker und gerundeter, nicht mehr zweikantig wie normale Zapfen des echten Torfschafes<sup>1)</sup>. Schon Glur<sup>2)</sup> hat in richtiger Weise die Ansicht ausgesprochen, es sei dies Tier als ein Kreuzungsprodukt des Torfschafes mit einer anderen Rasse aufzufassen. Ich stimme dieser Annahme durchaus bei, zumal da diese leicht erkennlichen Schafreste in den von mir untersuchten deutschen und englischen Kulturschichten nur dann auftreten, wenn gleichzeitig das Schaf nachzuweisen ist, mit dem das Torfschaf gekreuzt wurde.

Dieses Schaf tritt in den schweizerischen Pfahlbauten zuerst in der jüngerer Steinzeit mit Kupferspuren<sup>3)</sup> auf. Anfangs ist es noch sehr selten, später wird es aber immer häufiger und ist bis zur Römerzeit<sup>4)</sup> in zunehmender Anzahl vorhanden.

Ebenso wie das Torfschaf, so ist auch dieses Schaf vom ersten Momente seines Auftretens an scharf gekennzeichnet, sowohl durch Horn- wie Schädelcharaktere, welche jede verwandtschaftlichen Beziehungen zum Torfschafe völlig ausschließen.

Ich habe in einer rezenten Publikation<sup>5)</sup> für diese Subspezies den Namen „Ovis aries Studeri“ und die deutsche Benennung „Kupferschaf“ vorgeschlagen, sowie eingehende Betrachtungen über Herkunft und Abstammung angestellt, auf die ich hier verweisen muß.

Die Hauptmerkmale dieser neuen Form bestehen in schweren, großen Hornzapfen und entsprechenden Hörnern, welche letztere meist beim adulten Individuum einen vollständigen Kreisbogen beschreiben und deren Spitzen aus-

wärts gedreht sind. Das Tier war von mittelgroßer Gestalt; größer als das Torfschaf und seine Knochen plumper gebaut.

Die Hornzapfen sind im oberen Teile dicht an der Basis mit Sinus versehen. Der Querschnitt ist an der Basis rundoval bis rechteckig, gegen die Mitte triangulär. Die Spitzen der Hornzapfen stehen je nach Alter, Geschlecht und Reinheit der Rasse mehr oder weniger auseinander. Die Merkmale von Stirn- und Schädelknochen können für den einzelnen Fall nach den Gesetzen der Hornwirkung leicht abgeleitet werden.

Dies sind die beiden Schaformen, denen wir unter den Küchenabfällen vom Schloßberge begegnen.

Das Kupferschaf kam vom Süden Europas her und wurde vielleicht mit dem Kupfer-, Bronze-, Bernstein- und Goldhandel nach dem Norden verbreitet.

Über die Herkunft des Torfschafes hat man schon mehrere Hypothesen mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit aufgestellt. Beweisbar, wie diejenige des Kupferschafes, ist hier die Abstammung nicht. Sicher geht aber aus allem hervor, daß das Torfschaf nicht europäische Ursprungs ist, sondern zusammen mit dem kleinen, kurzhörigen Rinde mit den frühneolithischen Menschen oder schon vorher nach Europa eingewandert ist und dann im Laufe der Jahrtausende eine allgemeine Verbreitung fand.

So war es auch auf den Schloßberg gelangt, zu dessen Ausiedlern, oder wahrscheinlicher mit denselben. Dean gewiß ist, daß es den Bewohnern des norddeutschen Tieflandes, wie denjenigen Englands schon lange, lange vorher bekannt war, ehe die Besiedelung des Schloßberges stattfand.

Daß diese Ansiedelung aus einer späten Zeit, nach dem Ende der Steinzeit stattfand, geht wohl auch daraus hervor, daß das Kupferschaf Helvetien und Gallien unter den Schafresten präponderiert, ebenso wie die Kreuzungsprodukte zwischen den beiden Rassen.

Was Ovis Studeri erschien, da mußte das Torfschaf früher oder später weichen. Man bedenke, daß Ovis palustris, wie man an seinen Nachkommen erkennt, nur eine kurze, grobe,

<sup>1)</sup> Ich bemerke, daß, wenn die Zapfen sich verkleinern, sie wie bei allen anderen Schafen allmählich von rundem Querschnitte werden.

<sup>2)</sup> G. Glur, Beiträge zur Fauna der Pfahlbauten. Mittell. Naturf. Gesellsch., Bern 1894, S. 22.

<sup>3)</sup> Theo Studer, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bielertales. Mittell. Naturf. Gesellsch., Bern 1892, S. 90—91.

<sup>4)</sup> H. Krämer, op. cit.

<sup>5)</sup> Über ein neues prähistorisches Hausschaf und dessen Abstammung. Vierteljahrsschrift Naturf. Gesellsch., Zürich 1904, I. Heft.

filzige Mischwolle besaß und außerdem infolge seiner kleinen Gestalt nur einen unbedeutenden Fleischertrag lieferte. Noch jetzt wird angegeben, daß ein abgebalgtes Waleser Bergschaf nicht mehr als 10 kg wiege<sup>1)</sup>.

Deshalb mußte den Völkern der spätern Steinzeit das größere Kupferschaf willkommen sein, wenn auch seine schon reichere, längere Mischwolle ebenfalls noch recht grob war.

Die gallischen und germanischen Völker trugen anfangs nur Gewandung aus Fellen und bloß die Häuptlinge und Vornehmen vermochten es, tenere, wollene Kleider zu benutzen. Aus der Wolle dieses Schafes verfertigten die Belgier in späterer Römerzeit jene dichten Mäntel, die sogenannten „Laenac“, mit denen sie Rom und ganz Italien versorgten<sup>2)</sup>. Ihr Reichtum an Schafherden mit rauher, kurzhaariger Wolle war berühmt.

Die Römer jedoch führten feinvolligere Schafe aus ihren damals schon so hoch entwickelten Zuchten in ihre Kolonien ein und so kam zu Stande, was Strabo uns erzählt, daß die Römer in den nördlichsten Gegenden den Heiden hielten, die ziemlich feine Wolle lieferten.

Das römische Schaf, über dessen Rassen H. Krämer bei der Besprechung der Haustierfunde aus der römischen Kolonie Vindonissa<sup>3)</sup> eine anziehende und lebendige Schilderung entworfen hat, scheint eine deutliche Spur seiner Verbreitung durch ganz Europa zurückgelassen zu haben. Schon früher habe ich darauf hingewiesen<sup>4)</sup>, daß die Neigung zur Vielhörigkeit, die bei der Kreuzung mit dem ursprünglichen, wohl mit dem Kupferschafe identischen Schafe der Römer verwendeten afrikanischen Langbeinschafes (*Ovis aries longipes* Fitz.) eigentümlich ist, vom Prinzip der Hornentwicklung aus,

als eine recht charakteristische angefaßt werden muß. Wo das polyzerate Longipeschaf, das wir mit denjenigen von Nepal, den altägyptischen (*Ovis aries palaeoegypticus*, Duerst et Gaillard), tunesischen und anderen identifizieren, oder aber seine selbst durch Kreuzungen entstandenen Naehkommen, vorkamen, wird man es an den polyzeraten subfossilen Cranien leicht erkennen können.

Außer den von mir früher schon erwähnten Fundorten, treffen wir diese Schafrasse in römischen Niederlassungen der Schweiz<sup>1)</sup> und in den späteren Pfahlbauten Englands und Irlands in großer Menge<sup>2)</sup>. Keiner der mir bis jetzt bekannt gewordenen Reste gehört unzweifelhaft einer früheren Periode an, als der der römischen Okkupation. Wir finden das mehrhörige Schaf dann auch in den Pfahlbauten von Gängelow<sup>3)</sup> bei Wismar in Mecklenburg und bis ins späte Mittelalter hinein in Skandinavien verbreitet. Olaus Magnus erwähnt darüber bei der Beschreibung der Haustiere der Insel Gotland folgendes: „Haec (Gotlandia insula) arietes, sive verueces, caeteris robustiores et procioreis producit: quibus quaterna, vel octona oornna crescant, . . . Lana habent longam et mollem: quam aliquando Romae exigua veste resolutam artifices hirtata faciunt, mirem commendant<sup>4)</sup>.“

Aus dem Grunde nimmt es uns auch nicht Wunder, daß die Zucht dieses Tieres noch heute auf Island, den Hebriden und in Großbritannien neben der des Torfschafes und des *Ovis Stueri* betrieben wird und erst der Import moderner hochgezüchteter Schafe dieselbe einzuschränken vermochte.

Unter den Knochenresten vom Schloßberge liegen uns im Ganzen 39 Schafknochen vor, von denen 26 auf das Kopfskelett entfallen. Das Schaf machte also nach einer approximativen Schätzung 14 Proz. der Haustierherden aus.

<sup>1)</sup> David Low, On the Domestic animals of the British Islands. London 1845, p. 65. Fitzinger, Über die Rassen des zahmen Schafes. III. Abt., S. 773. Abhandlg. Sitzungber. der Kais. Akad. d. Wissenschaften, Wien 1861.

<sup>2)</sup> Strabo IV, 3.

<sup>3)</sup> H. Krämer, Die Haustierfunde von Vindonissa. Revue Suisse de Zoologie 1899, p. 203.

<sup>4)</sup> Duerst und Gaillard, Studien über die Geschichte des ägyptischen Hauhschafes. Recueil Travaux relatifs Philol. et Archeol. égyptiennes et assyriennes Vol. XXIV, 1902, p. 37, 38.

<sup>1)</sup> Glur, op. cit., p. 32.

<sup>2)</sup> Coll. Dr. Corners and Wilde, Upon the unmanufactured Animal remains etc. Proceed. Roy. Irish Acad., Vol. VII, 1862, p. 208.

<sup>3)</sup> Rüttimeyer, Neue Beiträge zur Kenntnis des Torfschafes. Naturf. Gesellsch., Basel 1864, B. 172.

<sup>4)</sup> Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus. Antwerpen 1542, p. 131—132.

## Kopf.

Es ist zunächst ein Stück Schädelrest eines echten Torfschafes (Taf. XVI, Fig. 3b), welcher unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er besteht aus dem größten Teile des linken Frontales, dem Hornzapfen, sowie den anhängenden Resten des Parietales und Temporales. Die früher erwähnten Merkmale sind hier durchaus scharf wahrzunehmen. Die schwache Entwicklung der Hornzapfen bedingt eine sanfte Wölbung der Stirn. Die Stirneinknickung ist infolgedessen ebenfalls nur ganz unbedeutend. Die Maßzahlen sind aus der Tabelle ersichtlich. Die hier angegebenen Stirnbreitenmaße wurden aus der Hälfte berechnet.

glatt, nicht körnig. Andere hingegen nähern sich in Form und Gestalt weit mehr dem Kupferschafe. Die Hornzapfen sind länger, der Durchmesser elliptisch bis rechteckig, der Zapfen mit einer Kante unten und einer solchen an der Oberseite, die Stirnknickung wird dem Gewichte der Zapfen entsprechend stärker und die Stirne mußte deshalb flach sein.

Die beiden zusammengehörigen Hornzapfen des Kupferschafes, die ursprünglich in der Sagittalnabt noch aneinanderhängen, beim Ausgraben wohl aber auseinanderzusehen, weisen im ganzen den Typus des *Ovis aries* Stuerdi vom Bielersee an. Nur nähern sie sich schon etwas der isländischen rezenten Form oder der

| Dimensionen der Hornzapfen von <i>Ovis palustris</i>              | Schloßberg | England                            |            |  |            |                    |            |                        |            |                                    |   |                 |                 |
|---|------------|------------------------------------|------------|--|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|   |            | Neolithisch<br>Cambridge<br>London | Dr. Cornar | Les. Althavum<br>T. Millis<br>L. South | Dr. Cornar | Terfnoor<br>Irland | Mus. Paris | Fishbas<br>Walthamstow | Dr. Cornar | Schweiz<br>Schaffis<br>(Steinzeit) | Frankreich<br>Fishbas<br>Fishbau<br>(Mazowinger Zeit) | Recent<br>Nulps | Recent<br>Wales |
| Länge der Hornzapfen (äußere Kurvatur) . . . . .                  | 100        | 80                                 | 70         | 110                                    | 140        | 78                 | 75         | 80                     | 90         | 110                                |   |                 |                 |
| Umfang an der Basis . . . . .                                     | 75         | 70                                 | 54         | 95                                     | 80         | 100                | 80         | 75                     | 80         | 87                                 |   |                 |                 |
| Seitlicher Durchmesser der Basis der Hornzapfen . . . . .         | 15         | 15                                 | 15         | 21                                     | 20         | 18                 | 16         | 19                     | 18         | 20                                 |   |                 |                 |
| Horizontaler Durchmesser derselben von vorn nach hinten . . . . . | 26         | 25                                 | 15         | 32                                     | 28         | 37                 | 23         | 22                     | 28         | 29                                 |   |                 |                 |
| Stirnbreite . . . . .   | etwa 114   | 106                                | 105        | 109                                    | 114        | 105                | etwa 94    | 101                    | 123        | 101                                |   |                 |                 |
| Stirnge . . . . .   | " 82       | 77                                 | 68         | 77                                     | 84         | 70                 | —          | 74                     | 82         | 73                                 |   |                 |                 |
| Vordere Zwischenhornlinie . . . . .                               | " 42       | 47                                 | 53         | 43                                     | 65         | 43                 | —          | —                      | 50         | 45                                 |   |                 |                 |
| Hinterer Zwischenhornlinie . . . . .                              | " 84       | 82                                 | 75         | 81                                     | 89         | 78                 | —          | —                      | 84         | 76                                 |   |                 |                 |

Der Übergang dieser Form zu der des *Ovis* Stuerdi, des Kupferschafes, wird durch mehrere Hornzapfen vermittelt, die Kreuzungsprodukten zwischen den beiden Rassen angehören. Man glaubt sich sogar imstande, an den Hornzapfen den approximativen Grad der Bastardierung festzustellen. In Taf. XVI, Figur 3c ist dem Schädeldeckenrest des Torfschafes derjenige gegenübergestellt, welcher dem gleichen Schädelteile der sogenannten größeren Torfschafraße des Bielersees entspricht. Dieses Stück hat abgesehen von dem bedeutenderen Umfange und anderer Querschnitte des Zapfens noch ganz dieselbe Form der Frontalknickung. Der Hornzapfen ist hier auf seiner Außenfläche noch

subfossilen aus England. Die Hörner sind im Querschnitt noch weniger rund, sondern mehr elliptisch bis rechteckig mit fast gerader Innenseite, aber gerundeten Außenseiten. Es bildet sich nämlich auf der oberen und inneren und der unteren und hinteren Seite eine Kante aus, die wir beim primitiven Bielerseeschaf und dem Schafe von Sardinien erst in der Hornzapfenmitte beginnen sehen. Diese Bildung wird also wohl als ein Auftreten der Jugendcharaktere betrachtet werden müssen, indem das Horn nicht mehr die ganze Stärke und Kraft erlangt, die ihm im Wildzustande zu erreichen möglich wäre<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Der Hornzapfen wächst bekanntlich während des ganzen Lebens eines Tieres. Die an der Spitze

Auch die Meßergebnisse dieser Hornzapfen im Vergleiche zu den der schweizerischen Pfahlbauten, den englischen spätneolithischen Schichten und der isländischen rezenten Rasse dienen dazu, dieses Verhältnis zu illustrieren.

Schädelknochen der Fall war, besonders weil bisher genaue Angaben über die Größe der Variationen von Torfschaf und dessen rezenten Nachkommen fehlen.

Scapula. Es liegen drei Scapulareste vor,

| Dimensionen der Hornzapfen von<br><i>Ovis aries</i> Studeri           | Schloßberg | Island | Island | Litauen     | London      | Italien     | Kreuzungs-    |
|---|------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   | Nr. 699    | rezent | rezent | Neolithisch | Neolithisch | Neolithisch | produkt von   |
|   |            |        |        | Mus. Bern   | Mus. Bern   | Mus. Paris  | Moufflon mit  |
|   |            |        |        |             |             |             | Haarschaf     |
|   |            |        |        |             |             |             | von Savoyen   |
|   |            |        |        |             |             |             | Samml. Duerst |
| Länge der Hornzapfen (äußere Krümmung) . . . . .                      | 215        | 215    | 260    | 260         | 190         | 275         |               |
| Umfang des Zapfens an der Basis . . . . .                             | 142        | 140    | 165    | 126         | 144         | 163         |               |
| Seitlicher Durchmesser an der Basis . . . . .                         | 38         | 33     | 44     | 30          | 36          | 43          |               |
| Horizontaler Drehmesser (von vorn nach hinten an der Basis) . . . . . | 49         | 46     | 56     | 51          | 47          | 52          |               |
| Vordere Zwischenhorallinie . . . . .                                  | 37         | 39     | 39     | 63          | 37          | 44          |               |
| Hintere Zwischenhorallinie . . . . .                                  | 81         | 83     | 98     | 103         | 69          | 96          |               |
| Distanz der Spitzen des Hornzapfens . . . . .                         | 210        | 270    | 238    | 310         | 250         | 208         |               |

Die Anzahl der Unterkieferstücke ist eine recht große (25), aber nur ein einziger halbwegs vollständiger dabei, weshalb ich die An-

zahl jedoch nicht dem Torfschafe, sondern dem *Ovis Staderi* anzugehören scheinen, wenigstens ergibt sich dies aus der Maßvergleichung.

| Dimensionen der Scapula                     | Schloßberg |        | Merinoschaf           | Astrachanschaf        | Deutsches                            |
|---|------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|   | Nr. 54     | Nr. 43 | rezent ad. Nus. Paris | ad. rezent Nus. Paris | Landeschaft ad. rezent Samml. Duerst |
| Größe meidane Länge . . . . .               | 145        | —      | 145                   | 135                   | 145                                  |
| Größe Breite im oberen Drittel . . . . .    | —          | —      | 95                    | 95                    | 102                                  |
| Breite am Hals . . . . .                    | 19         | 21     | 18                    | 17                    | 20                                   |
| Längsdurchmesser der Gelenkfläche . . . . . | 30         | 34     | 33                    | 31                    | 34                                   |
| Querdurchmesser derselben . . . . .         | 21         | 22     | 20                    | 19                    | 22                                   |

gabe ihrer Maße unterlasse. Auch ist die Rassenzugehörigkeit überaus schwer zu bestimmen, doch wird man wohl nicht zu sehr fehl gehen, wenn man die größeren Unterkieferreste adulter Tiere dem *Ovis Studeri*, die kleineren *Ovis palustris* und seinen Kreuzungsprodukten zurechnet.

#### Die Extremitäten.

Die Unterscheidung der genannten Schaf- rassen und deren Kreuzungsprodukte an den Extremitäten ist schwieriger als dies an den

Jeues Schaf, von dem die Schulterblätter stammen, war größer als das Torfschaf und entsprach dem Merinoschaf oder dem deutschen Landeschaft.

Humerus. Auch an Humeri liegen mehrere Stücke vor, die jedoch nur aus distalen Enden bestehen. Sie dürften eher dem Torfschafe oder dessen Kreuzungsprodukten angehören, da sie kleiner als diejenigen des deutschen Landeschaftes sind und mit einem Humerus des Torfschafes von Schaffis nicht übel übereinstimmen. (Siehe nachfolgende Tabelle.)

Radius. Unter den Italiern ist ein sicheres Anseinanderhalten der beiden Schaffrasse infolge des unvollständigen Materiales nicht möglich.

Metacarpus. Die vier am besten erhaltenen Metacarpus sind zweifellos dem Torf-

beständige Form des Zapfens, wie auch der Hornscheide, ist die der Jugendzeit, d. h. es ist das „Jugendhorn“, die weiter gegen die Basis hin auftretenden Charaktere entsprechen denjenigen der späteren Lebensperioden. (Dauerhorn.)

| Dimensionen des Humerus<br>(dist. Ende)       | Schloßberg |         | Schaffs<br>Torfschaf | Deutsches<br>Landschaf |
|---|------------|---------|----------------------|------------------------|
|   | Nr. 116    | Nr. 122 | Mus. Bern            | Samml.<br>Duerst       |
| Längendurchmesser der Trochlea . . . . .      | 28         | 25      | 25                   | 32                     |
| Durchmesser des äußeren Trochleales . . . . . | 14         | 12      | 15                   | 18                     |
| Durchmesser des inneren Trochleales . . . . . | 18         | 15      | 20                   | 25                     |

| Dimensionen des Metacarpus                 | Schloßberg               |     |     |     | Schaffs<br>Torfschaf<br>Mus. Bern | Waldbauern<br>Torfschaf<br>Samml. Corner | Ovis aries Studeri |                 |                  |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Torfschaf und Kreuzungen |     |     |     |                                   |  | Schloß-<br>berg    | Les<br>Allerium | Samml.<br>Corner |
|  | Nr. 225                  | 226 | 356 | 224 |                                   |  |                    |                 |                  |
| Medians Länge . . . . .                    | 103                      | 122 | —   | 124 | 126                               | 119                                      | 120                | 135             | 152              |
| Länge an der Außenseite . . . . .          | —                        | 118 | —   | 122 | 122                               | 109                                      | 117                | 133             | 146              |
| Breite des proximalen Endes . . . . .      | 18                       | 19  | 20  | 21  | 20                                | 19                                       | 28                 | 26              | 29               |
| Durchmesser des proximalen Endes . . . . . | 12                       | 14  | 14  | 15  | 14                                | 14                                       | 18                 | 18              | 20               |
| Breite in der Hälfte . . . . .             | 8                        | 11  | 12  | 13  | 10                                | 11                                       | 20                 | 17              | 17               |
| Durchmesser in der Hälfte . . . . .        | 7                        | 8   | 9   | 8   | 9                                 | 8  | 10                 | 11              | 12               |
| Breite des distalen Endes . . . . .        | 9                        | 22  | —   | 23  | 21                                | 21                                       | 31                 | 30              | 31               |
| Durchmesser des distalen Endes . . . . .   | 8                        | 13  | —   | 15  | 13                                | 13                                       | 18                 | 16              | 18               |

schafe zuzurechnen, einer hingegen ist ein solcher von Ovis Studeri, was aus den größeren Breitenmaßen und dem Vergleiche mit englischen Stücken deutlich hervorgeht (Taf. XVI, Fig. 4a.)

Anderer Knochen der Vordergliedmaßen liegen nicht vor. Von den Hintergliedmaßen sind zwei Tibiareste Nr. 288 und 295 vorhanden, die gleichfalls wohl dem Torfschafe zugehörten. Die approximative Länge derselben ist 203 mm, die Breite des distalen Endes ist 23 mm. Die entsprechenden Maße bei Torfschafen von Schaffis sind 202 mm und 22 mm. Hingegen gehört der Tibiarest Nr. 292 einem größeren Schafe an, da seine proximale Breite 36 mm beträgt, oder wohl Ovis Studeri oder dessen Kreuzungsprodukte. Außerdem befindet sich noch ein Metatarsus eines Torfschafes bei den Knochen.

#### 4. Capra hircus. Die Hausziege.

Das gesamte über die Ziege vorliegende Material besteht aus einem Schädelkapselrest mit Hornzapfen, vier weiteren gut erhaltenen Hornzapfen, einigen kleineren Stücken von solchen, sowie einigen Unterkieferresten, die aus allbekanntesten Gründen mit bloß annähernder Sicherheit bestimmbar sind.

Der Typus der ältesten Pfahlbauziege hat sich bis heute in der einheimischen Hausziege mehr oder weniger rein erhalten.

Die Hornbasen stehen bei dieser Rasse nur eine kurze Distanz auseinander und steigen anfangs fast parallel empor, um dann später teils stärker, teils schwächer zu divergieren. Die Zapfen sind immer schmal und schlank, beim Bocke stärker als bei der Geiß.

In den schweizerischen Pfahlbauten der jüngeren Steinzeit tritt jedoch gleichzeitig mit Ovis Studeri eine Ziegenart (Kupferziege) auf, die ein weit mächtigeres Gehörn besitzt. Diese Rasse wird noch zur Römerzeit in der Schweiz gefunden und scheint von ihr die Ziege der Walliser Alpentäler vermutlich abzustammen<sup>1)</sup>.

Der Schädelkapselrest vom Schloßberge könnte wegen der Größe der Hornzapfen die Vermutung auftauchen lassen, als handle es sich hier um einen Vertreter dieser Form. Die genaue Kenntnis der Sexualdifferenz bei den Hörnern dieser Ziegen zeigt uns aber, daß es sich nur um einen alten Bock der Palustrirasse handelt. Diese Zapfen sind ziemlich umfangreich und das Frontale weist eine große Sinus

<sup>1)</sup> Kramer. Op. cit., p. 225.

bildung auf. Die übrigen Zapfen stimmen überein mit dem Typus derjenigen der Pfahlbauziegen der Schweiz und auch derjenigen der englischen Pfahlbauten, wovon mir eine überaus große Hornzapfennenge, meist von Loudon-Wall stammend, vorliegt.

(seinem Capitulare de villis<sup>1)</sup> seinen Verwaltern jährliche Rechnung darüber abforderte. Die Ziegenzucht zu Karls Zeiten war noch ganz ansehnlich, in Stefauswerth besaß er 17 Ziegenböcke, 58 Ziegen und 12 Zickelchen (hadiiculi nsw.<sup>2)</sup>).

| Dimensionen der Hornzapfen                 | Schloßberg |         |         |         | Schaffia Pfahlbauziege Mus. Bern | Moorfields London Samml. Corner |         |
|--|------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
|  | Nr. 689    | Nr. 469 | Nr. 454 | Nr. 451 |                                  | Nr. 304                         | Nr. 301 |
| Länge der äußeren Kurvatur . . . . .       | 120        | 150     | 150     | 185     | 160                              | 150                             | 180     |
| Umfang in der Basis . . . . .              | 110        | 80      | 85      | 95      | 83                               | 125                             | 120     |
| Seitlicher Durchmesser . . . . .           | —          | 24      | 21      | 21      | 20                               | 31                              | 31      |
| Durchmesser von vorn nach hinten . . . . . | —          | 28      | 29      | 33      | 28                               | 46                              | 52      |

Die Zapfen sind durchweg schlank und nach den daran haftenden Frontalstücken läßt sich erkennen, daß sie fast genau in der Verlängerungsebene des Stirnbeines liegen, oder nur einen stumpfen Winkel mit derselben bilden. Von vorn gesehen erscheinen sie ganz gerade, verlaufen deshalb parallel und sind durchaus nicht sehr lang. Das Zapfeninnere ist vollkommen sinnlos, nur wenige diploetische Scheidewände sind sichtbar. Außen weisen die Zapfen die Furchung auf, über deren Entstehung wir schon beim Ur gesprochen haben. Es herrschen hier jedoch die Hautfalten und Gefäßfurchen vor. Nur Nr. 451, der Rest eines rechten Hornzapfens, zeigt außen und innen im unteren Drittel des Zapfens eine eigenartige, tiefe Hornfurehe, die sich am besten mit der Blutrinne eines Dolchmessers oder Bajonettes vergleichen läßt. Dadurch entsteht eine beiderseitige Einkerbung des sonst normalen Querschnittes, der jederzeit eine äußere bogenförmige und innere gerade Seite besitzt.

Die Vertretung der Hausrziege, die ja im allgemeinen für eine niedere Kulturstufe charakteristisch ist, scheint, diesen Resten nach zu urteilen, durchaus nicht eine starke gewesen zu sein. Es liegen uns augenscheinlich nur vier bis fünf Individuen vor. Ihr Fleisch war wohl kaum sehr beliebt, weshalb denn auch schon bald nach der Karolingerzeit die Ziegenzucht Deutschlands sehr zurückging. Die Karolinger aber brauchten nicht allein die Felle, sondern auch die Hörner zu Kleidung und Geräten, weshalb Karl der Große in

Auf die Unterkieferreste näher einzutreten, lohnt sich nicht, und da an Extremitätenknochen nur wenige vorhanden sind, so kann damit die Besprechung der Reste der Torfziege ihr Ende finden.

##### 5. Canis familiaris. Der Haushund.

Die Reste des Hundes, an Zahl zwar verhältnismäßig gering, haben jedoch dadurch ein erhöhtes Interesse, da es nicht bloß ziemlich wertlose Rumpf- oder Gliederknochen sind, sondern weil sowohl eine Schädelhälfte wie 13 Unterkieferreste vorliegen.

Ein Punkt ist zuerst dabei auffallend.

Die Hunde scheinen nämlich ebenfalls verspeist worden zu sein; denn bei der Schädelhälfte ist der Gesichtsteil weggeschlagen und die Schädelkapsel in ihrer medianen Ebene mittels eines scharfen Instrumentes gespalten, wie dies als allgemein üblich, schon in der Einleitung erwähnt wurde. Man erkennt vollkommen deutlich den jugenden Schnitt. Auch die Extremitätenknochen sind aufgeschlagen, um das Mark aussaugen zu können. Die Unterkiefer allein wurden nicht aufgebrochen, wie bei den größeren Tieren, wohl darum, weil es sich hier nicht der Mühe gelohnt hätte.

Es dürfte aber somit die moderne Kynologie, die wohl in dem Münchener Hundeschlachthaus gipfelt, ihre Vorläufer schon bei den alten Germanen besessen haben.

<sup>1)</sup> Capitulare de villis vel curtis imperatoris. Cap. 66.

<sup>2)</sup> Specimen Breviarü rerum fiscalium Caroli Magni.

Beachtenswert ist auch, daß unter den zwölf wohl erhaltenen Unterkieferstücken nicht ein einziges Paar vorhanden ist. Selbst der abgebildete, Nr. 563 und 564, stimmt nicht ganz genau überein. (Tafel XVII, Fig. 1c.)

Die Anzahl der vorliegenden Hundeindividuen muß deshalb auf mindestens zwölf Stück geschätzt werden.

Was die osteologischen Charaktere des vorliegenden Hundes angeht, wie sie nach Schädelrest und Unterkiefer erkennbar sind, so war Herr Prof. Dr. Theophil Studer, den ich als Spezialist und anerkannte Autorität auf diesem Gebiete zuzog, so gütig, mich bei der Bestimmung mit seinem Räte und seiner musterhaften Sammlung zu unterstützen. Nach unserer gemeinsamen Prüfung handelt es sich hier um eine laikäolnische Hunderasse, die dem Typus des *Canis familiaris Inostranzewi*, Anutschin, zugehört.

Die hauptsächlichsten Charaktere des Schädels, die diese Bestimmung begründen, liegen vor allem in der langgestreckten Form desselben, sowie in der stark entwickelten, gerade verlaufenden Scheitelkrista, die nicht wie bei *Canis familiaris intermedius*, der sonst in Frage käme, nach hinten abfällt, sondern sich gegen das Hinterhaupt zu stetig erhöht. Diese Charaktere beruhen ferner in der sehr starken Einschnürung an der Schläfenenge und einer beulenförmigen Vorwölbung hinter den Orbitalprocessus in Verbindung mit der Größe des Winkels der Orbitalebene und sonstigen Gestaltung, wie sie nur bei den nördlichen Schlittenhunden der Sammlung des Museums zu Bern vorhanden war. Der Schädel erhält dadurch eine große Ähnlichkeit mit denjenigen der Kreuzungsprodukte von Wolf und Haushund in der genannten Sammlung.

Die Hunde vom Typus des *Canis familiaris Inostranzewi*, die jetzt noch im ganzen Norden der Erde, in der Umgebung des Eismeres als einziges Haustier der Polarbewohner vorkommen sind hier zum Ziehen der Schlitten, zum Hüten der Rentierherden und zur Jagd benutzt werden, stellen eine noch sehr primitive Hunderasse von mittlerer Größe dar, die auch in ihrem äußeren Habitus eine gewisse Wolfsähnlichkeit aufweist.

Archiv für Anthropologie X. F. Bd II.

Die Möglichkeit der Verbreitung dieser Hunde in der damaligen Spreewaldgegend zu begründen, macht durchaus keine Schwierigkeiten. Sehen wir doch, daß diese Hunde sogar etwas abseits der Hauptstraße des alten Bernsteinhandels, die vom Süden längs der Elbe nach der kimbrischen Halbinsel (Jütland) führte, bis nach den Pfahlbauhöfem an Bielerssee gedungen waren<sup>1)</sup>. Es ist deshalb auch viel leichter erklärlich, daß diese Hunde solche Verbreitungswege einschlugen, wenn wir nunmehr erkennen können, daß dieselben in den nördlichen Gegenden, welche die Haupthandelsstraße von Magdeburg gegen die kimbrische Halbinsel passierte, eine allgemeine Verbreitung besaßen.

Eine weitere Bestätigung dafür, daß dieser Hund sich in früheren Zeiten in bedeutend südlich gelegeneren Ländern aufhielt, als dies heutzutage der Fall ist, liegt in dem Vorkommen desselben in einer etwas durch die Domestikationseinflüsse veränderten Form als sogenannter „Elchhund“ in Skandinavien<sup>2)</sup>. Wohl auch zur Zeit der Ansiedlungen am Schloßberge mag dieser Hund seinen Herren die Elche aufgespürt haben, die sie sich zu erlegen abmühten, ähnlich wie es sein Nachkomme heute noch den Skandinavien tut.

Die Messungsergebnisse einer Reihe von Schädeln, die sich zum Teil im Berner Museum befinden, zum Teil aber von Studer und Anutschin untersucht wurden, finden in der nachfolgenden Tabelle ihre Gegenüberstellung. Sie zeigen, daß der Hund vom Schloßberge dem grönländischen Schlittenhunde und demjenigen vom Nutkasund an absoluter Größe am nächsten steht, während sich die relativen Zahlen für alle gleich gut darstellen. Der Schloßberghund ist nicht ganz so groß wie die Eskimohunde von Labrador, doch ist der Hirnteil hier nicht so lang wie bei ihm. Beim Hunde vom Nutkasund und demjenigen aus dem Bielerssee übertrifft die Hirnhöhlenlänge noch diejenige des Schloßberghundes. Und während die relative Schädelhöhe die der andern Hunde durchweg überflügelt, bleiben die Breitenmaße fast alle ein wenig hinter denjenigen der übrigen

<sup>1)</sup> Th. Studer, Die prähistorischen Hunde. Abhandlungen Schweiz. paläont. Gesellsch., 1901, S. 54.

<sup>2)</sup> Ibid., S. 50.



| Dimensionen des Schädels                   | Hand vom Schädelberg |       | Cantus front. Intrastranzosus nach Anteatschin |       | Sakfoester Hand mit dem Intrastranzosus von Mm. Bern |       | Sakfoester Hand vom Front. Mm. Bern |       | Hand von Intrastranzosus (Labrador?) von Mm. Bern |       | Hand von Intrastranzosus (Labrador?) von Mm. Bern |       | Hand vom Intrastranzosus (Labrador?) von Mm. Bern |       |
|--|----------------------|-------|--|-------|--|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
|  | mm                   | Proz. | mm   | Proz. | mm   | Proz. | mm                                  | Proz. | mm  | Proz. | mm  | Proz. | mm  | Proz. |
| Breitendurchm.                             | 175                  | 100   | 177  | 100   | 177  | 100   | 182                                 | 100   | 173   | 100   | 187   | 100   | 190   | 100   |
| Rechenbreite                               | 49                   | 28.0  | 67   | 37.0  | 71   | 40.0  | 57                                  | 32.7  | 46  | 26.6  | 55  | 31.7  | 55  | 31.5  |
| Gränzbreite des Schädels                   | 62                   | 35.4  | 67   | 37.8  | 71   | 39.5  | 66                                  | 38.5  | 66  | 38.2  | 66  | 37.9  | 66  | 38.4  |
| Breite über der Gehöröffnung               | 63                   | 36.0  | 64   | 36.2  | 69   | 39.0  | 60                                  | 34.6  | 55  | 31.8  | 62  | 34.8  | 69  | 38.4  |
| Jochbogenbreite                            | 114                  | 65.1  | 112  | 63.3  | 111  | 62.7  | 114                                 | 65.4  | 99  | 57.1  | 108   | 62.2  | 69  | 38.5  |
| Schläfenbreite                             | 32                   | 18.3  | 32   | 18.1  | 37   | 20.9  | 42                                  | 24.0  | 32  | 18.5  | 43  | 24.5  | 33  | 19.1  |
| Breite zwischen dem Orbitaforakulum        | 44                   | 25.1  | 43   | 24.3  | 56   | 31.6  | 54                                  | 30.6  | 45  | 26.0  | 58  | 33.0  | 51  | 29.1  |
| Gränzbreite zwischen dem Ausprägungspunkte | 39                   | 22.1  | 39   | 22.0  | 39   | 22.0  | 40                                  | 22.5  | 39  | 22.5  | 39  | 22.0  | 41  | 23.6  |
| Höhe des Schädels                          | 104                  | 60.6  | 115  | 65.0  | 115  | 65.0  | 107                                 | 60.7  | 97  | 56.1  | 107   | 60.7  | 107   | 60.7  |
| Gränzhöhe                                  | 63                   | 36.0  | 67   | 38.2  | 69   | 39.0  | 67                                  | 38.2  | 65  | 37.5  | 65  | 37.5  | 65  | 37.5  |
| Länge der Rechenbreite                     | 18                   | 10.3  | 19.5   | 11.0  | 18   | 10.2  | 19                                  | 10.9  | 16  | 9.3   | 19  | 10.9  | 19  | 10.9  |
| Länge der Jochbogenbreite                  | 29                   | 16.4  | 29   | 16.3  | 29   | 16.3  | 29                                  | 16.3  | 29  | 16.3  | 29  | 16.3  | 29  | 16.3  |
| Länge der beiden Kiefern                   | 9                    | 5.1   | 9  | 5.1   | 10   | 5.6   | 10                                  | 5.6   | 11  | 6.1   | 12  | 6.7   | 12  | 6.7   |

) Fehlt der verlorste Prämolar.

Hunde zurück. Der Schädel des Schloßberg-hundes war daher etwas langgestreckter, schmäler und höher. Daß aber die Breitenverhältnisse nicht zu sehr in die Wagschale fallen dürfen, geht daraus hervor, daß sie nur approximative sind und aus der Hälfte berechnet wurden. Der vorliegende Schädel ist aber genau in der Sagittallinie geteilt worden, weshalb die Maße doch recht exakte sind.

Auf die unzweifelhafte Differenz des Schloßberg-hundes, wie der Inostranzowhunde überhaupt, von dem Wolfe, die sich nicht allein im Schädel, sondern auch in dem Gebisse abspiegelt, brauchen wir hier ja nicht mehr einzutreten, da ja schon Anutschin durch seine Messungen und Vergleichen jeden Gedanken daran von vornherein entkräftet hat.)

Wir vermögen also den Hirnschädel des Hundes von Schloßberg gegenüber den andern, dem gleichen Typus des Canis familiaris Inostranzowi Anteatschin angehörigen Rassen durch folgende Charaktere kurz zu kennzeichnen:

Der Schädel ist verhältnismäßig langgestreckt, die Hirnpartie lang und nur schwach gewölbt, in der Schläfenregion stark eingeschnürt. Die Stirne ist nur wenig breit, etwas schmäler als bei den andern und in der Medialelinie ziemlich schwach vertieft, nach außen mit blässigen Auftreibungen und stark abfallenden Processus supraorbitales versehen. Die Crista parietalis ist stark entwickelt; auf dem fast ganz geraden Scheitel in geradem Verlaufe nach hinten in einen starken Hinterhauptshöcker übergehend. Das Hinterhauptsdreieck ist nicht besonders hoch. Die Höhe ist nur gleich der Hälfte der Breite. Die Bullae ossae sind groß, mit schwachen Kielen und die Augenböhlen relativ klein, mit steilen Rändern. Das Gebiß ist kräftig.

Die übrigen Reste des Schädels vom Schloßberg-hunde bestehen in einer Menge von Unterkieferknochen, die zum Teil fast vollständig in Bezahlung erhalten sind, von denen aber, wie gesagt, keiner genau zu einem andern paßt. Sie variieren in der Länge ziemlich stark, weniger

) D. N. Anutschin, Über die Hunderrassen der Steinperiode an den Ufern des Ladogasees. Fünfter (russischer) archäologischer Kongreß in Tiflis 1881. Referat von Stieda, Archiv. f. Anthrop., Bd. 14, 1882, S. 353.

aber in der Breiten- und Höhenentwicklung. Die beiden abgebildeten Aste, die zu einem Unterkiefer vereinigt wurden, waren für den vorliegenden Oberschädel ein wenig zu groß, werden also einem Individuum angehört haben, das die Dimensionen eines Laika oder des Hundes von Font hatte (s. Maßtabelle). Die Größe der andern würde nicht übel auch auf *Canis familiaris intermedius* gepaßt haben, für den Woldrich<sup>1)</sup> etwa 135 mm Unterkieferlänge und 73 mm Backzahnreihenumlänge angibt. Ähnlich ist auch der Unterkiefer des Bronzehundes (*Canis familiaris matris optima*), für den Zeitelles

sondern es weisen gerade die kleineren Unterkiefer auf das eventuelle Vorkommen einer der genannten andern Hunderassen hin, welcher Auffassung auch durch die Extremitätenknochenmessungen Unterstützung findet. Wie betont, ist aber dies bloß reine Vermutung, man müßte, um hier etwas entscheidendes zu finden, erst die Alters- und Geschlechtsvariation des Typus von *Canis familiaris Inostranzewi* an einer großen Zahl möglichst differenter Skelette feststellen. Da mir dies nicht möglich ist, muß ich an dieser einen, sicher nachweisbaren Hundeform festhalten.

| Dimensionen der Unterkiefer   | Schloßberg |     |     |     |     | Hund von Okak (Labrador) Mus. Bern | Hund von Font subfossil Mus. Bern |     |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   | Nr. 566    | 563 | 568 | 569 | 576 |                                    |                                   | 567 |
| Länge des Unterkiefers . . . . .  | 157        | 153 | 145 | 141 | 127 | 127                                | 154                               | 154 |
| Länge der gesamten Backzahnreihe . . . . .  | 82         | 80  | 78  | 78  | 72  | 71                                 | 74                                | 71  |
| Länge des zahnlosen Rammes vor Prämolare 3 . . . . .                                    | 7          | 6   | 5   | 5   | 5   | 5                                  | 8                                 | 13  |
| Breite des vertikalen Astes . . . . .   | 55         | 47  | 46  | 48  | 41  | 43                                 | 47                                | 51  |
| Höhe des horizontalen Astes zwischen dem hinteren Lückenzahn und dem Reißzahn . . . . . | 30         | 27  | 26  | 26  | 27  | 27                                 | 27                                | 28  |
| Höhe des horizontalen Astes hinter dem Eckzahn . . . . .                                | 20         | 19  | 20  | 20  | 20  | 20                                 | 23                                | 20  |
| Länge des Reißzahnes . . . . .  | —          | 23  | 21  | —   | 19  | —                                  | 21                                | 18  |

152 bis 155 mm Unterkieferlänge anführte<sup>2)</sup>. Man würde also, wenn uns glücklicherweise der Oberschädel nicht genaue Auskunft gegeben hätte, noch *Canis familiaris intermedius* und *Canis familiaris matris optima* mit in den Bereich der Zugehörigkeitshypothesen zu ziehen gehabt haben.

An *Canis familiaris deumanni* Nehring kam überhaupt nicht gedacht werden, da diese Unterkiefer, für die Nehring<sup>3)</sup> 188 bis 200 mm Länge vorschreibt, wie diejenigen des Wolfes ganz außer Betracht fallen. Dennoch kann man nicht sicher feststellen, daß alle diese von zwölf Individuen stammenden Unterkiefer, der Form des *Canis familiaris Inostranzewi* angehören müssen,

In Norddeutschland können die Hunderassen gewiß nicht alle entstanden sein. Sie sind also alle oder doch teilweise importiert. Es fragt sich bloß, welche derselben zuerst dort war.

Der Natur der Kulturschieben nach, in denen sie aufgefunden wurden, kann es sich nur um zwei derselben handeln, nämlich um den Torfhund, der auch in den ältesten schweizerischen Pfahlbauten zuerst auftritt und sodann um den *Canis familiaris Inostranzewi*. Gelange doch dieses Tier schon in der jüngeren Steinzeit bis in die Pfahlbauhöhlen des Bieler- und Neuenburgersees (Font); so muß es denn wohl im Norden früher schon vorhanden gewesen sein<sup>4)</sup>. Da aber auch seine Stammform im Gegensatz zu allen anderen Hunderassen auf den nordischen Wolf hindeutet, so sind wohl diese Gründe zureichend genug, um den Schluß wagen zu dürfen, daß diese Hundeform bei ihrer

<sup>1)</sup> Woldrich, über einen neuen Haushund der Bronzezeit. Mittell. Anthropol. Gesellsch., Bd. VII, S. 78, Wien 1878.

<sup>2)</sup> L. H. Zeitelles, Die vorgeschichtlichen Altertümer der Stadt Olmütz und ihrer Umgebung. Mittell. Anthropol. Gesellsch. Wies 1872, S. 66.

<sup>3)</sup> A. Nehring, Über eine große, wolfsähnliche Hunderasse der Vorzeit. Sitzungsbericht d. Gesellsch. natürl. Freunde 1884, S. 156.

<sup>4)</sup> Anntschin fand am Ladogasee den Torfhund (*Canis familiaris palustris ladogensis*) und den Inostranzewi; es wird dieser wohl eine Kreuzung von Wolf mit Torfhund sein.

fast ausschließlichen Verbreitung über nördliche Länder als diejenige Hunderrasse zu betrachten ist, die in damaligen nördlichen Germanien vor dem Eindringen südlicher Haustiervormen der Pfahlbauperiode verbreitet waren und die sich hier in Spreevalde noch längere Zeit erhielt.

Von Island, wo wir doch den anderen Haustiervormen der Schlußbergbewohner noch in fast gleich primitivem Zustande begegnen, ist mir bis jetzt der Laika nicht bekannt geworden; die isländischen Hunde, deren Schädel sich im Pariser Museum befinden, gehören alle dem Typus des *Canis familiaris palustris* an.

An Rumpf- und Extremitätenknochen dieser Hunde liegen nur wenige Stücke vor, so ein Beckenrest, einige Stücke von Humeri, ein einziger, aber vollständiger Radius und eine Tibia. Um einen Begriff von der Größe dieser Hunderrasse zu geben, stelle ich in den nachfolgenden Tabellen diese Stücke mit dem Aschenhund und Bronzehund in Vergleich.

Woldrich<sup>1)</sup> (?), der Bronzehund (*Canis familiaris matris optimae Jettelles<sup>2)</sup>*) und *Canis familiaris deummanns Nelring<sup>3)</sup>*, wovon letzterer aber jedenfalls aus späterer, wohl mittelalterlicher Zeit stammt.

### 6. *Equus caballus*, Das Pferd.

*Equi non forma non velocitate conspiciunt.*

Tacitus, Germ. 6.

Das Pferd war bei den alten Germanen weit seltener als das Rind und auch um vieles kostbarer. Es diente nur zu kriegerischen Zwecken, weshalb wir noch bis zur Merovingenzeit selten auf seine Verwendung zum Ziehen von Wagen stoßen, sofern dies nicht zu Kultuszwecken geschah (Tacitus, Germ. 10).

Deshalb waren die Pferde Germanien wohl ungestalt, schlechtgewachsen und nicht schnell, aber durch tägliche Anstrengung äußerst dauerhafte, in Nottällen sogar mit Baumrinde zufriedene Tiere, welche dessen ungeachtet von

| Dimensionen                              | Radius     |   |   | Tibia      |   |  |
|--|------------|---|---|------------|---|--|
|  | Schlößberg | <i>Canis fam. intermedius</i> nach Woldrich | <i>Canis fam. matris optimae</i> nach Naumann <sup>1)</sup> | Schlößberg | <i>Canis fam. intermedius</i> nach Woldrich | <i>Canis fam. matris optimae</i> Roseninsel n. Naumann |
|  | Nr. 149    |   |   | Nr. 299    |   |  |
| Größte Länge . . . . .                   | 141        | 158   | 178—188   | 168        | 170   | 188—190  |
| Breite des proximalen Endes . . . . .    | 27         | 16  | 20—22   | 30         | 31  | 34—38  |
| Durchmesser desselben . . . . .          | 12         | —   | —   | 15         | 13  | 14—15  |
| Breite in der Hälfte der Länge . . . . . | 13         | 12  | 15  | —          | —   | —  |
| Durchmesser daselbst . . . . .           | 5          | —   | —   | —          | —   | —  |
| Breite des distalen Endes . . . . .      | 23         | 22  | 27—30   | 19         | 20  | 22—23  |
| Durchmesser desselben . . . . .          | 16         | —   | —   | —          | —   | —  |

Die Messungen weisen also auf einen Hund hin, von einer Größe zwischen *Canis familiaris intermedius* und *Canis familiaris matris optimae*. Die Knochen können deshalb sehr gut bloß dem Inostranzwuhnde zugehört und wir somit keinen Anlaß haben, eine weitere Hunderrasse für den Schlößberg anzunehmen, sofern man sich nicht in das Reich der Hypothesen verlieren will.

Die fossilen Hunde, die man bis jetzt in Norddeutschland fand, sind nach Nelring der Torfhund (*Canis familiaris palustris* Rütimeyer), der Aschenhund (*Canis familiaris intermedius*

den Deutschen denen, die man aus anderen Ländern einfuhrte, vorgezogen wurden. (Cäsar, bell. gall. IV, 2; Tacitus, Germ. 6; Appian. d. r. Celt. 3). Die Germanen, obgleich tüchtige Reiter, ritten die Pferde nicht nach römischer Schule, nicht auf Drehungen (Virgil. Georg. III, 192) und kurze Wendungen zu (Tibull. IV, 1,

<sup>1)</sup> Nelring, Menschliche und tierische Reste des Spandauer Bronzeufundes. Verh. d. Gesellsch. f. Anthrop., Bd. 15, 1885, S. 357.

<sup>2)</sup> Ibid., Die letzten Ausgrabungen bei Thiele usw. Verh. d. Gesellsch. f. Anthrop., 1882, S. 178.

<sup>3)</sup> Ibid., Über eine große wolfsähnliche Hunderrasse der Vorzeit usw. Sitzungsber. d. Gesellsch. natürl. Freunde 1884, S. 155. Ich kenne den Torfhund auch aus Niemtsch (Kris Guben) etwa aus derselben Zeit wie der Schlößberg.

<sup>1)</sup> Naumann, Fauna der Pfahlbauten im Starnberger See. Archiv f. Anthropologie, Bd. VIII, 1873.

94); weil sie aber sonst gute Reiter waren, gab Cäsar (bell. gall. VII, 65) seinen germanischen Söldnern römische Pferde, die besten, die er hatte.

Am stärksten scheint die Pferdezucht zur Römerzeit bei den Chauken und Teuchteroren (Tacitus, Germ. 32, 35; Cäsar, bell. gall. II, 24; IV, 12) am schwächsten bei den Nerviern gewesen zu sein (Cäsar, II, 17); von den Quaden wird aus späterer Zeit berichtet, daß sie die Hengste kastrierten (Amm. Marcell. XVII, 12).

Die Pferde der Gallier galten als besser denn diejenigen der Germanen, da dieselben durch teuer bezahlte, importierte edlere Rosse verbesert wurden (Cäsar, bell. gall. IV, 2).

Daß die Pferde von den Germanen verspeist wurden, ist bekannt, geht aber von neuem aus diesen Schloßbergresten hervor.

Als Bonifacius seine Neubekehrten Pferdefleisch essen sah, da fragte er beim Papste Zacharias an, wie er sich zu verhalten habe, dieser verbot Pferdefleisch, Hasen und Biber zu speisen. Aber man fuhr fort die Biber zu essen solange man sie hatte und das gleiche geschah mit den Hasen. Daraus scheint hervorzugehen, daß man auch den Genuß des Pferdefleisches darum abschaffte, weil der Papst ihn verbot, sondern darum, weil die Pferde so selten wurden!).

### Kopf.

An Resten des Kopfskellates liegt bloß ein brauchbares Stück eines Unterkiefers vor, der aber in der schon in der Einleitung erwähnten Weise zerschlagen, und von welchem nur das Mittelstück erhalten geblieben ist.

Sodann sind noch einige ganz kleine Stücke von Alveolarrande des Oberkiefers mit je einem darin steckengebliebenen Backzahn, noch drei weitere kleine Unterkieferstücke und ein Maxillarrest mit dem Wangenhöcker vorhanden.

Der Unterkieferrest Nr. 504, der von einem rechten Aste eines adulten Pferdes stammt, ist jedoch das einzige meßbare Stück. Seiner Größenentwicklung nach scheint er einer stärkeren Pferdeart anzugehören als diejenige ist, aus deren kleinen Gliedmaßenknochen wir zwei Extremitäten rekonstruieren konnten. Entspricht die Größe dieses kleinen Pferdeschleges etwa derjenigen von La Tène, den Marek<sup>1)</sup> als helvetisch-gallisches Pferd bezeichnete, so ließen die Dimensionen des Unterkiefers eines solchen Pferdes aus dem Museum in Bern doch bei weitem hinter dem vorliegenden Unterkieferstück zurück, weshalb seine Zugehörigkeit zu einer größeren Rasse gesichert ist.

Will man auf Grundlage der an diesem

| Dimensionen des Unterkiefers                      | Schloßberg      | Rennpferd                    | Halbblut                | La Tène   |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|   | Größerer Schleg | engl. Vollblut Samml. Duerst | Normänner Samml. Duerst | Mus. Bern |
| Länge des Unterkiefers . . . . . mm               | —               | 394                          | 412                     | 374       |
| Höhe des horizontalen Astes hinter M. 3 . . . . . | 116             | 117                          | 114                     | 84        |
| Höhe des horizontalen Astes vor M. 1 . . . . .    | 79              | 69                           | 61                      | 60        |
| Länge der Backzahnreihe . . . . .                 | etwa 163        | 163                          | 169                     | 158       |
| Länge der Molarreihe . . . . .                    | 79              | 79                           | 83                      | 77        |

Die Ausgrabungen am Schloßberge haben nun ziemlich viele Überreste des Pferdes (72 Knochen) zutage gefördert, die wir der Reihe nach betrachten wollen.

Es ist jedoch das Material mangels ganz oder nur teilweise erhaltener Schädel recht unvorteilhaft, um einen wirklich wertvollen Beitrag zur Kenntnis der germanischen Pferde liefern zu können. Was mit dem vorhandenen Material aber möglich war, glaube ich gemacht zu haben.

<sup>1)</sup> G. Anton, Geschichte der deutschen Landwirtschaft, Bd. I, S. 127. Gortitz 1799.

Unterkiefer meßbaren Distanzen die Schädelbasis und Widerristhöhe der vorliegenden Pferderasse durch Rechnung approximativ feststellen, so kann man es, wenn man von folgenden Ansätzen<sup>2)</sup> ausgeht.

<sup>1)</sup> Josef Marek, Das helvetisch-gallische Pferd. Abhandlungen schweiz. paläont. Gesellsch., Bd. XXV, 1898.

<sup>2)</sup> Die Ansätze, nach denen hier die Berechnungen vorgenommen worden sind, wurden, wenn nicht Autoren angegeben sind, selbst an der Sammlung montierter Pferdeskelette des Muséum d'Histoire Naturelle in Paris ermittelt. Sie stützen sich somit auf ein großes Material.

Mol. Länge: Zahnreihe = 100:206  
 dann Zahnreihe = 163 mm  
 Zahnreihe: Basilarlänge = 140:292  
 dann Basilarlänge = 48 cm

Basilarlänge: Widerrist nach Nehring und Marek  
 =  $\frac{3}{16} + 3$  cm  
 folglich = 1,52 m Widerristhöhe

Dazu stellt sich das Diluvialpferd von Westeregeln mit 1,55 m Widerristhöhe als ungefähr übereinstimmend dar. Wir werden später sehen,

englischer und russischer Ponys eine Variationsgrenze von 46,8 bis 52,3 an. Auch stimmen die Maße dieser Scapula recht gut mit denjenigen aus den Kreisgruben von Oldenburg überein, welches Fossil Nehring veröffentlicht<sup>1)</sup>, und ebenso auch mit dem Bronzeperd von der Petersinsel im Bielessee (Museum Bern). Spezielle Eigentümlichkeiten konnten am Schulterblatte nicht wahrgenommen werden.

| Dimensionen der Scapula            | Schloßberg<br>Nr. 28 | Oldenburg<br>Kreisgruben<br>fossil. nach<br>Nehring | Petersinsel<br>(Mus. Bern) | Westeregeln<br>nach<br>Nehring | Turkest.<br>Sinte |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Größe Länge . . . . .              | 282                  | 280   | 292                        | —                              | 321               |
| Breite des oberen Teiles . . . . . | 147                  | 142   | —                          | —                              | 162               |
| Breite am Halse . . . . .          | 64                   | 49  | 60                         | 72                             | 60                |
| Breite der Gelenkfläche . . . . .  | 45                   | 40  | 53                         | 55                             | 48                |

| Dimensionen der Gelenkfläche<br>des Beckens                                    | Schloßberg<br>Nr. 10 | Petersinsel<br>(Mus. Bern) | Dauw<br>(Mus. Paris) | Andalusier s.<br>Schlachtroß Napoleons<br>in der Schlacht bei<br>Eylan<br>(Mus. Paris) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Breite des os ilium über der Gelenkfläche . . . . .                            | 42                   | 42                         | 46                   | 56   |
| Länge derselben . . . . .  | 56                   | 57                         | 57                   | 67   |
| Breite derselben . . . . .   | 46                   | 43                         | 43                   | 60   |
| Distanz vom Rande der Gelenkfläche bis zur<br>Mediansaht des Beckens . . . . . | 100                  | —                          | 118                  | 110  |

wie sich hierzu die aus den Extremitätenknochen berechneten theoretischen Widerristhöhen stellen.

#### Extremitäten.

Das Schulterblatt (Scapula). Nur ein einziger sehr unvollständiger und deshalb nicht meßbarer Rest Nr. 39 mit 77 mm Halsbreite und 58 mm Gelenkflächenbreite gehört ohne Zweifel der größeren Rasse an. Die andere, fast vollständig erhaltene Scapula Nr. 28 bezieht sich auf ein adultes Individuum der kleinen Rasse und wurde zur Rekonstruktion der Vorderextremität mit verwendet. Der Index der größten Breite des Schulterblattes ist 52,1. Es gehört dasselbe somit zu den schmalen Schulterblättern, wie dieselben für die orientalischen Pferde und Ponys charakteristisch sind. Kiesewalter<sup>1)</sup> gibt als Scapularindex

Der Oberarm (Humerus). Zwei Humeri Nr. 69 und 70 gestatten es, ihre Länge genau zu ermitteln. Beide scheinen indessen von dem gleichen Individuum herzuführen, da Nr. 69 ein rechter, Nr. 70 ein linker Humerus ist. Nr. 72, dessen Länge nur approximativ geschätzt werden konnte, weist jedoch mehr auf die größere Rasse hin. Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, sind die Dimensionen der kleinen Rasse, denen des Pferdes von La Tène einigermaßen entsprechend, wenn auch, wie bei allen anderen Knochen, das helvetisch-gallische Pferd eine größere Schlankheit und Zierlichkeit aufweist. Der größere Humerus nähert sich in seinen Dimensionen etwas mehr dem Pferde von Westeregeln.

<sup>1)</sup> L. Kiesewalter, Skelettmessungen am Pferde usw. Inaug.-Diss. Leipzig, S. 19.

<sup>1)</sup> Alfred Nehring, Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-Abagerungen usw. Landw. Jahrbücher 1864, Bd. XIII, S. 124.

| Dimensionen des Humerus                  | Schloßberg |     |      | La Tène     |     | Auserzier<br>(Mus. Bern) | Petersfels<br>(Mus. Bern) | Turkistanische<br>Stute<br>nach Nehring | Westeregeln<br>nach Nehring | Salzbröden<br>nach Nehring |
|--|------------|-----|------|-------------|-----|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
|  | Nr.        | Nr. | Nr.  | (Mus. Bern) |     |                          |                           |   |                             |                            |
|  | 69         | 70  | 72   |             |     |                          |                           |   |                             |                            |
| Größe Länge . . . . .                    | 241        | 241 | 290? | 231         | 251 | 256                      | 272                       | 294                                     | 313                         | 319                        |
| Breite am proximalen Ende . . . . .      | 75         | 75  | —    | 71          | 71  | 82                       | 90                        | 88                                      | 106                         | 100                        |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 80         | 80  | —    | 72          | 81  | 73                       | 94                        | 94                                      | 110                         | 109                        |
| Breite in der Hälfte der Länge . . . . . | 35         | 35  | 33   | 23          | 29  | 30                       | 32                        | 33                                      | 41                          | 39                         |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 40         | 38  | 41   | 29          | 39  | 39                       | 36                        | —                                       | —                           | —                          |
| Breite am distalen Gelenk . . . . .      | 64         | 65  | 82   | 60          | 60  | 62                       | 67                        | 64                                      | 83                          | 76                         |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 70         | 71  | —    | 62          | 69  | 87                       | 76                        | —                                       | —                           | —                          |

Der Unterarm (Radius). Von diesem Knochen sind nur zwei Stücke vollständig meßbar, Nr. 134 und 130 und 191, während mehrere andere distale Reste davon vorhanden sind, denen zwei, Nr. 139 und 327 in der Tabelle ebenfalls zugezogen wurden. Die Ulna fehlt unter den vorliegenden Resten vollkommen, was bei ihrer sonstigen schwachen Ausbildung nicht verwundern kann.

Nr. 134 vertritt mit Nr. 327 die Radien des kleinen Schlages, während sich Nr. 130 und 191, sowie 139 wohl auf die größere Rasse beziehen, die jedoch hier nicht die von Nehring für das Diluvialpferd von Westeregeln angegebenen Maße erreicht, ebensowenig wie die Radien des kleinen Schlages diejenigen von La Tène.

Die vorliegenden Radien beider Pferderassen müssen also als kurze bezeichnet werden, besonders aber diejenigen der kleinen Rasse. Wenn schon der erst erwähnte Scapularindex eine große Bedeutung für die Rassenkunde be-

Adam<sup>1)</sup> bei edlen, schnellen Pferden, während die kleinste bei Ponys und schweren Pferden vorkommt. Alle beiden Pferdeschläge des Schloßberges waren also keine edlen und schnellen Pferde, aber jedenfalls kräftigere und stärkere Tiere, als es die helvetisch-gallischen waren, deren Knochen durchweg eine zierlichere, schlankere Gestalt haben. Dies spricht sich besonders deutlich in dem Index der geringsten Breite in der Hälfte der Länge des Knochens zur Länge des Radius aus.

Für die kleine Rasse der Schloßbergpferde ist dieser Radienindex . . . . . 15,7  
Für das helvetisch-gallische Pferd nur . . . . . 11,2  
Das größere Schloßbergpferd hat schlankere Radien mit . . . . . 11,3  
Die denen von Westeregeln mit . . . . . 12,2  
ungefähr gleichstehen.

Die Handwurzel (Carpus). Knochen der Handwurzel waren keine bei den Resten vom Schloßberge vorhanden und diejenigen, die zur Rekonstruktion der Vorderextremität des kleinen

| Dimensionen des Radius                     | Schloßberg |     |            |     | La Tène     |     | Turkistan.<br>Stute nach<br>Nehring | Westeregeln<br>nach<br>Nehring |
|--|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | Nr.        | Nr. | Nr.        | Nr. | (Mus. Bern) |     |                                     |                                |
|  | 134        | 139 | 130 u. 191 | 327 |             |     |                                     |                                |
| Größe Länge . . . . .                      | 229        | —   | 336        | —   | 309         | 314 | 325                                 | 360                            |
| Breite des proximalen Endes . . . . .      | 74         | —   | 82         | —   | 67          | 73  | 78                                  | 92                             |
| Durchmesser des proximalen Endes . . . . . | 58         | —   | 48         | —   | 37          | 37  | —                                   | —                              |
| Breite in der Hälfte des Radius . . . . .  | 36         | 50  | 38         | 35  | —           | 35  | 37                                  | 44                             |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .        | —          | 27  | 29         | 23  | 23          | 22  | —                                   | —                              |
| Breite des distalen Endes . . . . .        | 58         | 96  | 75         | 66  | 63          | 67  | 73                                  | 90                             |
| Durchmesser desselben . . . . .            | —          | 46  | 35         | 42  | 38          | 35  | —                                   | —                              |

sitzt, so ist auch die Größe des Radius und diejenige des Humerus für den Gebrauchswert eines Pferdes von höchster Bedeutung. Die größte Länge des Vorderarmes findet sich nach

Pferdes Verwendung finden, stammen von einem rezenten Bergzebraskellet.

<sup>1)</sup> Adam, Vorträge über Pferdekunde. Stuttgart 1882.

Die Mittelhand (Metacarpus). Die Anzahl der Metakarpfen des Pferdes ist eine recht große (11), jedoch sind nur sieben davon vollständig erhalten und meßbar.

solche, bei denen dies Verhältnis 15,0 bis 17,0 ausmacht und als dickfüßig solche, bei denen es 17,0 bis 18,0 beträgt.

Somit gehört das kleine Schloßbergpferd

| Dimensionen des Metacarpus medius        | Schloßberg |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Petersinsel<br>(Mus. Bern) | La Tène<br>(Mus. Bern) | Solutré<br>Samml. | Duerst<br>Samml. | Westergötha<br>nach Schring | Turkistanische<br>Stute | nach Schring |  |
|--|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--|
|  | Nr.        | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. |                            |                        |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Größe Länge in der Mittellinie . . . . . | 201        | 203 | 208 | 211 | 218 | 222 | 230 | 221 | 214 | 220 | 225                        | 210                    |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Länge an der Außenseite . . . . .        | 199        | 200 | 206 | 207 | 218 | 221 | 227 | 216 | 208 | 214 | 225                        | 202                    |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Länge an der Innenseite . . . . .        | 183        | 197 | 200 | 202 | 211 | 215 | 222 | 213 | 204 | 212 | —                          | —                      |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Breite am proximalen Ende . . . . .      | 47         | 44  | 43  | 45  | 46  | 49  | 58  | 45  | 40  | 50  | 57                         | 46                     |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Durchmesser am proximalen Ende . . . . . | 29         | 27  | 28  | 30  | 30  | 32  | 34  | 27  | 32  | 32  | —                          | —                      |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Breite in der Hälfte . . . . .           | 28         | 29  | 31  | 34  | 29  | 31  | 35  | 29  | 23  | 35  | 41,5                       | 33                     |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Durchmesser in der Hälfte . . . . .      | 20         | 20  | 23  | 22  | 22  | 27  | 37  | 22  | 28  | 26  | —                          | —                      |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Breite am distalen Ende . . . . .        | 47         | 45  | 43  | 48  | 45  | 49  | 52  | 43  | 40  | 49  | 55                         | 47                     |                   |                  |                             |                         |              |  |
| Durchmesser am distalen Ende . . . . .   | 32         | 33  | 31  | 33  | 34  | 33  | 38  | 29  | 31  | 36  | —                          | —                      |                   |                  |                             |                         |              |  |

Der Unterschied zwischen den beiden Pferdeschlägen ist hier, bei der größeren Knochenanzahl ein weit verwickelterer, was uns einerseits wohl zu dem Schluß berechtigt, daß durch Kreuzungen der beiden Pferdeschläge Zwischenformen geschaffen wurden und andererseits wohl auch Alter und Geschlecht sowie Individualität eine gewisse Variation selbst solcher primitiver Rassen bedingen.

Was vorerst die Form angeht, so muß erwähnt werden, daß sie eine vollkommen gerade und ziemlich zylindrische, keineswegs eine prismatische ist. Die größeren Metakarpfen Nr. 329 und 324 gleichen zum Verwechseln denen von Solutré in meiner Sammlung.

Die Dünnfüßigkeit der kleinen Pferderasse, in der sie sich also vom nordischen Diluvialpferde scharf unterscheidet, spricht sich am deutlichsten ebenfalls in den Breitenindizes aus.

Der Breitenindex (Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge zur größten Länge) ergibt folgende Resultate:

|  |           |
|--|-----------|
| Für das kleine Schloßbergpferd . . . . . | etwa 14,0 |
| Für das La Tènepferd . . . . .           | 15,0      |
| Für das große Schloßbergpferd . . . . .  | 15,3      |
| Für das deutsche Diluvialpferd . . . . . | 17,5      |

Nach Tscherski<sup>1)</sup> bezeichnet man als dünnfüßig solche Pferde, bei denen dieses Verhältnis unter 15,0 liegt, als mittelfüßig

zu den dünnfüßigen, das große zu den mittelfüßigen Pferden.

Das Becken (Pelvis). Von Beckenknochen liegen nur zwei Bruchstücke vor. Es ist deshalb nicht gut möglich gewesen, sich ein Bild über die Größe des Beckens zu machen. Dennoch stimmt es augenscheinlich, den wenigen ausführbaren Messungen nach, mit einem solchen von der Petersinsel im Bielesee überein, das nach Marek als einem helvetisch-gallischen Pferde angehörend betrachtet werden muß. Daraus folgt, daß die Beckenreste dem kleinen Pferde des Schloßberges angehören, was auch leicht ersichtlich ist, wenn man deren Maße mit denjenigen eines andalusischen Hengstes vergleicht, der Napoleon I. bei Eylan als Schlachtroß diente und jetzt im Muséum d'Hist. Nat. in Paris sich befindet.

Der Oberschenkel (Femur). Nur ein einziger Femur erwies sich als soweit intakt, daß mit genügender Sicherheit Längenmessungen vorgenommen werden konnten. Der zur Restauration des Hinterbeines des kleinen Pferdes verwendete Knochen ist derjenige eines Rindes. Alle anderen vorhandenen Femurreste sind distale oder Mittelstücke.

Der Femur Nr. 253 stimmt in der Länge nicht übel mit einem solchen von La Tène überein, in den Breitenverhältnissen machen sich aber auch hier die früher erwähnten Charaktere geltend.

<sup>1)</sup> J. D. Tscherski, Wissenschaftliche Resultate der Neusibir. Expedition. Mem. Ac. Imp. St. Petersburg, tom XL, 1893, p. 366.

| Dimensionen des Femur  | Schloßberg |            |            |           | La Tène<br>(Mus. Bern) |     | Westeregeln<br>jav. nach<br>Nehring | Turkestan,<br>Stute nach<br>Nehring |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Nr.<br>263 | Nr.<br>251 | Nr.<br>249 | Nr.<br>99 |                        |     |                                     |                                     |
| Größe Länge . . . . .  | 360 (?)    | —          | —          | —         | 351                    | 316 | 340 (?)                             | 383                                 |
| Breite des proximalen Endes im Niveau des<br>Caput femoris . . . . . | —          | —          | —          | —         | 101                    | 82  | —                                   | 108                                 |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .                                  | —          | —          | —          | —         | 79                     | 74  | —                                   | —                                   |
| Breite des Femur in der Hälfte . . . . .                             | 44         | —          | —          | 46        | 29                     | 25  | —                                   | —                                   |
| Durchmesser ebenda . . . . .   | 46         | —          | —          | 38        | 34                     | 28  | —                                   | —                                   |
| Breite des distalen Endes . . . . .                                  | 99         | 83         | 71         | —         | 81                     | 71  | 105                                 | 79                                  |
| Durchmesser desselben . . . . .                                      | 103        | 88         | 94         | —         | 106                    | 97  | 112                                 | 110                                 |

Der Unterschenkel (Tibia). Vom Unterschenkel liegt etwas mehr vollständiges Material vor, als vom Femur, so daß wir instande sind zwei Tibiae ganz genau und eine dritte mit annähernder Genauigkeit zu messen. Es wäre nicht unmöglich, daß alle drei Unterschenkelknochen dem kleinen Pferdeschlage angehörten,

beschrieben, die anlässlich des Bronzefundes <sup>1)</sup> mit anderen Knocheuresten zusammen entdeckt wurde. Daß auch ein größeres plumperes Pferd gleichzeitig vorkam, wird durch den genannten Forscher ebenfalls erwähnt. Die diesem angehörige Tibia übertrifft allerdings die hier vorliegende um mehrere Centimeter an Länge.

| Dimensionen der Tibia                    | Schloßberg |            |            | La Tène<br>(Mus. Bern) | Westeregeln<br>nach Nehring | Spandauer<br>Bronzefund<br>nach Nehring | Turkestanische<br>Stute<br>nach Nehring |
|--|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|---|
|  | Nr.<br>266 | Nr.<br>264 | Nr.<br>265 |                        |                             |   |   |
| Größe Länge . . . . .                    | 302        | 305 (?)    | 358        | 349                    | —                           | 311                                     | 347                                     |
| Seitliche Länge . . . . .                | —          | —          | 343        | —                      | 340                         | 287                                     | 319                                     |
| Breite des proximalen Endes . . . . .    | 75         | —          | 93         | 79                     | —                           | 80                                      | 91                                      |
| Durchmesser desselben . . . . .          | 53         | —          | 79         | 84                     | —                           | —                                       | —                                       |
| Breite der Tibia in der Hälfte . . . . . | 34         | —          | 41         | 37                     | —                           | —                                       | —                                       |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 28         | —          | 30         | 29                     | —                           | —                                       | —                                       |
| Breite des distalen Endes . . . . .      | 56         | 62         | 78         | 64                     | 68                          | 60                                      | 71                                      |
| Durchmesser desselben . . . . .          | 56         | 59         | 40         | 35                     | —                           | —                                       | —                                       |

da auch eine Tibia von La Tène fast dieselben Längenmaße aufweist wie Nr. 265. Dennoch habe ich diese Tibia zur Rekonstruktion des Hinterbeines der größeren Rasse verwendet, da sie in ihren Breitenmaßen sich denn doch stark von den anderen unterscheidet und kein Astragalus des Bergzbras dazu paßte, sondern erst in demjenigen eines englischen Rennpferdes ein genau passendes Stück gefunden wurde. Es scheint, wenn auch in der Länge etwas kurz, diese Tibia daher dennoch einem Tiere der größeren Rasse oder einem Kreuzungsprodukte mit der kleinen angehört zu haben.

Nehring hat aus Spandau ebenfalls die Tibia eines kleinen, zierlichen Pferdes be-

Die Fußwurzel (Tarsus). Der Astragalus fehlt unter den Schloßbergknochen vollständig, hingegen war ein Calcaneus Nr. 314 sowie ein Stück eines solchen vorhanden.

Seine Länge und Breite stimmt genau mit derjenigen überein, die Nehring für den aus dem Spandauer Bronzefund stammenden Calcaneus des kleinen Bronzeferdchens angibt <sup>2)</sup>.

Der Mittelfuß (Metatarsus). Die Mittelfußknochen sind nicht in der gleichen Anzahl vorhanden wie die Metacarpalia, und es scheint

<sup>1)</sup> A. Nehring, Menschliche und tierische Reste des Spandauer Bronzefundes, Verhandl. d. Gesell. f. Anthropologie 1883, Bd. 15, S. (357—359).

<sup>2)</sup> A. Nehring, Fossile Pferde usw. Landw. Jahrbücher 1884, S. 137.



auch nur ein einziger, Nr. 334 und 350, der größeren Rasse anzugehören, weshalb er zum Aufbau jener Hinterextremität Verwendung fand.

Die Maßverhältnisse lassen erkennen, daß die Metatarsen des kleinen Pferdchens auch hier mit dem von Marek publizierten schlanken Metatarsale des Spandauer Bronzefundes übereinstimmen. Sie sind ebenfalls schlank und nicht ganz so breit und gedrungen wie dasjenige der großen Rasse Nr. 334 und 350, das mit dem von Nehring publizierten von Westeregeln sehr übereinstimmt. Die Breitenindizes lassen uns diese Knochen in folgendem Lichte erscheinen: Kleines Schloßbergpferd 11,9, Spandauer Bronzefund 10,6, Großes Schlag 12,0, Westeregeln 13,9.

sprechen durchaus den vorhandenen Metakarpfen und Metatarsen, weshalb die Rekonstruktion der Extremitäten hier auf keine Schwierigkeiten stieß. Das kleinste Fesselbein, Nr. 228, stimmt mit demjenigen sehr genau überein, das Nehring vom Spandauer Bronzefund publiziert, während die Phalangen des größeren Schlages sich in ihren Mäßen denen von La Tène und Westeregeln nähern. (S. untenstehende Tabelle.)

Die Hufbeine (Phalanx III). Während die Kronbeine vollkommen fehlen und bei dem Aufbau der Extremitäten durch diejenigen des gleichen Tieres ersetzt wurden, von dem die Carpalia oder Tarsalia genommen waren, so sind die Hufbeine in der Anzahl von vier vorhanden, wobei aber drei von Hinterhufen und nur eines von Vorderhufen stammt. Es läßt

| Dimensionen des Metatarsus medius        | Schloßberg |            |            |                   | Hofwyl<br>Terfmonor<br>(Mus. Bern) | Peterinsel<br>(Mus. Bern) | Westeregeln<br>nach Nehring | Spandauer<br>Bronzefund<br>nach Marek | La Tène<br>nach Marek | Westeregeln<br>nach Nehring |
|--|------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | Nr.<br>328 | Nr.<br>326 | Nr.<br>323 | Nr.<br>334 u. 350 |                                    |                           |                             |                                       |                       |                             |
| Größe Länge in der Mittellinie . . . . . | 237        | 254        | 256        | 274               | 240                                | 259                       | 277                         | 237                                   | 254                   | 248                         |
| Länge an der Außenseite . . . . .        | 232        | 252        | 256        | 270               | 235                                | 254                       | 270                         | 229                                   | 248                   | 243                         |
| Länge an der Innenseite . . . . .        | 229        | 247        | 250        | 260               | 231                                | 250                       | —                           | —                                     | —                     | —                           |
| Breite an dem proximalen Ende . . . . .  | 44         | 45         | 44         | 50                | 42                                 | 45                        | 56                          | 42                                    | —                     | 47                          |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 41         | 42         | 40         | 43                | 35                                 | 27                        | —                           | —                                     | —                     | —                           |
| Breite in der Hälfte . . . . .           | 29         | 27         | 30         | 33                | 26                                 | 27                        | 37                          | 25                                    | 31                    | —                           |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 28         | 26         | 29         | 30                | 24                                 | 28                        | —                           | —                                     | —                     | —                           |
| Breite des distalen Endes . . . . .      | 44         | 45         | 44         | 47                | 43                                 | 41                        | 57                          | 40,5                                  | 47                    | —                           |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .      | 37         | 36         | 38         | 38                | 32                                 | 32                        | —                           | —                                     | —                     | —                           |

Die Fesselbeine (Phalanx I). Von den Fesselbeinen sind fünf Stück erhalten, die fast ganz unverletzt geblieben sind, da es sich wohl kaum gelohnt hätte, sie auszusaugen. Sie ent-

sprechen sich an ihrer Form recht gut erkennen. Sie sind durchweg kleiner als die von Nehring in Westeregeln gefundenen Stücke.

(S. nebenstehende Tabelle.)

| Dimensionen der Fesselbeine (Phalanx I)  | Schloßberg |            |            |            |            | Peterinsel<br>(Mus. Bern)<br>nach Marek | Spandauer<br>Bronzefund<br>nach Nehring | La Tène<br>nach Marek | Westeregeln<br>nach Nehring |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|
|  | Nr.<br>228 | Nr.<br>230 | Nr.<br>227 | Nr.<br>232 | Nr.<br>229 |   |   |                       |                             |
| Größe Länge . . . . .                    | 68         | 75         | 75         | 77         | 79         | 78                                      | 68                                      | 71—77                 | 86                          |
| Mediane Länge . . . . .                  | 59         | 65         | 69         | 68         | 72         | —                                       | —                                       | —                     | —                           |
| Breite am proximalen Ende . . . . .      | 49         | 44         | 53         | 51         | 44         | 48                                      | 45,5                                    | 40—47                 | 64                          |
| Durchmesser am proximalen Ende . . . . . | 33         | 30         | 37         | 36         | 34         | —                                       | —                                       | —                     | —                           |
| Breite in der Mitte . . . . .            | 29         | 31         | 34         | 33         | 30         | 30                                      | 29                                      | 27—29                 | 41                          |
| Durchmesser in der Mitte . . . . .       | 18         | 21         | 24         | 22         | 20         | —                                       | —                                       | —                     | —                           |
| Breite am distalen Ende . . . . .        | 41         | 40         | 42         | 45         | 40         | 41                                      | 36,5                                    | 38—39                 | 48                          |
| Durchmesser am distalen Ende . . . . .   | 21         | 20         | 23         | 22         | 22         | —                                       | —                                       | —                     | —                           |

| Dimensionen der Hofbeine (Phalanx III)           | Schloßberg |            |            |            | Ausernier<br>(Mus. Bern) | Mörigen<br>(Mus. Bern) | Westeregeln<br>nach<br>Nehring |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Nr.<br>236 | Nr.<br>237 | Nr.<br>235 | Nr.<br>238 |                          |                        |                                |
| <b>Vorderhuf:</b>                                |            |            |            |            |                          |                        |                                |
| Größe Breite . . . . .                           | 83         | —          | —          | —          | 68                       | 70                     | 90                             |
| Länge der Vorderseite vom Kronfortsatz . . . . . | 82         | —          | —          | —          | 41                       | 48                     | 56                             |
| Periphere Länge . . . . .                        | 100        | —          | —          | —          | 126                      | 150                    | —                              |
| Seitliche Höhe . . . . .                         | 23         | —          | —          | —          | —                        | —                      | —                              |
| <b>Hinterhuf:</b>                                |            |            |            |            |                          |                        |                                |
| Größe Breite . . . . .                           | —          | 67         | 75         | 64         | 80                       | —                      | 85                             |
| Länge der Vorderseite . . . . .                  | —          | 48         | 55         | 48         | 43                       | —                      | 68                             |
| Periphere Länge . . . . .                        | —          | 166        | 163        | 145        | 125                      | —                      | —                              |
| Seitliche Höhe . . . . .                         | —          | 15         | 20         | 15         | —                        | —                      | —                              |

| Dimensionen des Calcaneus                    | Schloßberg<br>Nr. 314 | Spandauer<br>Bronzefund<br>nach<br>Nehring | Turkestanische<br>Stute<br>nach Nehring | Moosseedorf<br>(Mus. Bern) | Westeregeln<br>nach<br>Nehring |
|--|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| Größe Länge . . . . .                        | 90                    | 91,5                                       | 102                                     | 112                        | 117                            |
| Größe Breite am sustentaculum tali . . . . . | 45                    | 38   | 39                                      | 53                         | 55                             |

#### Mutmaßliche Größe der Pferde vom Schloßberge.

Ein allgemein verständlicher, greifbarer Abschluß unserer Betrachtungen über die Reste des germanischen Pferdes vom Schloßberge muß notwendigerweise in dem Versuche einer Rekonstruktion des Körpers jener Pferderassen liegen.

Nur so wird man imstande sein, sich ein anschauliches Bild der Haustiere, speziell der Pferde, machen können, die jene alten Spree-waldbewohner umgaben.

Es ist aber in unserem Falle die Sache nicht ganz einfach, weil weder ein Schädel noch ein ganzer Unterkiefer des Tieres vorhanden ist, nach deren Längen man nach dem Vorgange Nehrings, Mareks, Kiesewalters u. a. die Widerristhöhe zu berechnen imstande wäre. Wenn wir es trotzdem aus anderen Resten wagen, so ist es gut, die Richtigkeit unserer Berechnungen durch direkte Rekonstruktionsversuche zu kontrollieren.

Aus diesem Grunde habe ich aus den wenigen vollständigen und zueinander passenden Extremitätenknochen des Pferdes ein vollständiges linkes Vorderbein und ein vollständiges rechtes Hinterbein der kleinen Pferderasse montiert,

so daß ein weiteres linkes Hinterbein bis zum Kniegelenke, welches an Größe die beiden anderen Stücke überragt. (Taf. XVII, Fig. 3a, b, c.)

Es muß jedoch folgendes dazu bemerkt werden: Der Humerus (Nr. 71) ist derjenige eines Kindes von derselben Fundstelle. Er stimmt jedoch in Länge und den meisten Breitendimensionen vollkommen mit dem ebenfalls vollständig erhaltenen Pferdehumerus Nr. 69 überein (siehe Tabelle), er unterscheidet sich natürlich durch die Form, was aber für die Größenrekonstruktion ohne Einfluß ist. Der Pferdehumerus Nr. 69 konnte, da er ein rechtsseitiger ist, nicht zu diesem linken Vorderbeine Verwendung finden und der linksseitige Pferdehumerus Nr. 70 war zu beschädigt. Die Carpalia, die, wie erwähnt, fehlten, wurden durch solche eines Danus (*Equus zebra* Linné) aus den Dublettenvorräten der vgl. anatomischen Sammlung des Muséums d'Histoire Naturelle in Paris ergänzt. Von denselben Tiere stammt auch das Kronbein. Bei dem rechten Hinterbeine sind die fehlenden Tarsalia durch diejenigen des gleichen Danus ersetzt, wie auch das Kronbein. Der Femur stammt hier ebenfalls von einem Kinde, was schon früher erwähnt wurde.

Die Tarsalia und das Kronbein der unvollständigen Hinterextremität stammen von einem englischen Rennpferde her.

Alle diese hierbei verwendeten rezenten Knochen wurden so ausgewählt, daß sie nicht allein genau in ihren Gelenkflächen zu den subfossilen paßten, sondern auch in ihren Größenverhältnissen der ungefähren Wirklichkeit entsprachen.

Da die Knochen, die diese Extremitäten zusammensetzen, aber nicht von gleichen Individuen stammen, ja noch nicht einmal alle von adulten Individuen, so kann natürlich das Ergebnis ihrer Messungen nur ein ungenaues sein. Einem jungen Tiere gehört jedoch nur der einzige vollständige dabei verwendete Radius an, dessen proximale Epiphyse noch nicht mit der Diaphyse verwachsen ist.

Unter Berücksichtigung aller der geschilderten Verhältnisse stellen sich die gefundenen Höhenmaße wie folgt dar:

|  |        |
|--|--------|
| Linkes Vorderbein mit Scapula (kleiner Schlag).  |        |
| Höhe des Oberrandes der Scapula über dem Boden . . . . .   | 106 cm |
| Höhe des Buggelenkes (art. scapulo-humeralis) über dem Boden . . . . .   | 74,5 " |
| Höhe des Ellenbogengelenkes (art. humero-radialis) über dem Boden . . . . .  | 58,0 " |
| Höhe des Oberrandes des Vorderkniegelenkes (art. carpi) über dem Boden . . . . .                                       | 34,5 " |
| Rechtes Hinterbein (kleiner Schlag).   |        |
| Höhe des Hüftgelenkes (art. coxo-femoralis) gemessen bis zum Oberrande des Oberschenkelkopfes über dem Boden . . . . . | 102 cm |
| Höhe des Hinterkniegelenkes (art. femoro-tibialis) über dem Boden . . . . .  | 69 "   |
| Höhe des Sprunggelenkes (art. tarsi) gemessen bis Gelenk des Unterschenkels mit dem Rollbein über dem Boden . . . . .  | 41 "   |
| Linkes Hinterbein (größerer Schlag).   |        |
| Höhe des Hinterkniegelenkes über dem Boden 77 cm   |        |
| Höhe des Sprunggelenkes über dem Boden . . . . .   | 44 "   |

Berechnen wir nun hiernach die Pferdehöhe (Widerristhöhe, Galgenmaß), so kann dies auf nachfolgende Weise geschehen:

Das Verhältnis von Höhe des Oberrandes der Scapula und der Widerristhöhe wurde bei sämtlichen montierten Pferde- und Eselskeletten der Pariser und Züricher Sammlungen festgestellt. Es verhält sich hiernach im Mittel bei Zebra, Hemionus und Hemippus wie 100:104; bei kleinen Pferden (norwegische, isländische, tonkinesische Pferde) und bei schweren Kaltblütern (Percherous, Boulonnais usw.) im Durchschnitt

wie 100:107, bei sehr schrägschulterigen Pferden mit orientalischem Blut (Araber, Andalusier, englisches Rennpferd usw.) wie 100:110.

Daher stellt sich, wenn man die Pferde des Schloßberges in die zweite Kategorie einreicht, die Widerristhöhe des kleinen Schlages auf nur 116 cm einschließlich der 3 cm, die allgemein als Hufwand und Hautdicke hinzugerechnet werden. Denkt man aber an eine schrägere Stellung der Schulter und nimmt man das Verhältnis 100:110, so ergibt sich ebenfalls bloß 119 cm Widerristhöhe.

Etwas anders verhält es sich mit der Höhe des Widerristes, die aus der Hinterextremität des kleinen Pferdes zu berechnen ist.

Das Verhältnis von Höhe des Hüftgelenkes zur Widerristhöhe wurde an der genannten Skelettserie ebenfalls bestimmt und beträgt für die in Betracht fallende zweite Kategorie 100:126 im Mittel.

Daraus folgt, daß die Widerristhöhe des Pferdes, dem die restaurierte kleine Hinterextremität angehört haben konnte, 131 cm betrug.

Die dritte linke Hinterextremität erfordert ihrer Unvollständigkeit wegen noch die Ermittlung des Verhältnisses von Kniegelenkhöhe zu Widerristhöhe. Dieselbe wurde bei der genannten Skelettserie im Mittel als 100:172 festgestellt. Danach beträgt dann diese Widerristhöhe für die größere Pferderasse 136 cm.

Hier muß jedoch bemerkt werden, daß, wie wir schon anlässlich der Betrachtung der einzelnen Knochen (Tibia) erwähnt haben, die einzelnen Knochen nicht alle von gleich großen Individuen stammen und weiter der Winkel zwischen Tibia und Metatarsus bei der Montierung etwas zu klein geraten ist, welche beiden Momente die Pferdehöhe kleiner erscheinen lassen, als sie in Wirklichkeit wohl sein dürfte. Denn nach der früher (S. 270) ausgeführten recht genauen Berechnung der Höhe auf Grundlage der Unterkieferlänge fanden wir aus dem ungemein starken erhaltenen Unterkieferrest eine Widerristhöhe von 151 cm.

Um in dieser Frage noch sicherer zu gehen, habe ich nach den von Kiesewalter auf Seite 35, 36 und 37 zusammengestellten Ansätzen die Widerristhöhe des kleinen wie des großen Schlages aus den am besten erhaltenen

und typischsten Knochen vorgnommen, deren Resultate ich hier folgen lasse.

| Kleiner Schlag:               |           |        |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Widerristhöhe aus der Scapula | berechnet | 121 cm |
| " " dem Humerus               | "         | 112 "  |
| " " " Radius                  | "         | 99 "   |
| " " " Metacarpus              | "         | 129 "  |
| " " der Tibia                 | "         | 132 "  |
| " " dem Metatarsus            | "         | 126 "  |

Berechn. Widerristhöhe d. kl. Schlages im Mittel 119 cm

| Großer Schlag:               |           |        |
|------------------------------|-----------|--------|
| Widerristhöhe aus dem Radius | berechnet | 146 cm |
| " " " Metacarpus             | "         | 147 "  |
| " " " Metatarsus             | "         | 146 "  |
| " " der Tibia                | "         | 152 "  |

Berechn. Widerristhöhe d. gr. Schlages im Mittel 148 cm

Deutlich sind in dieser Zusammenstellung zu erkennen, daß bei dem kleinen Schlage die Schwankungen der berechneten Pferdehöhe größer sind als die des großen Schlages, wo eine ziemlich Übereinstimmung herrscht.

Setzen wir aber die gewonnenen Mittelzahlen in Beziehung zu den von uns durch die Rekonstruktion der Extremitäten wie durch Berechnung aus der Unterkieferlänge gewonnenen Zahlen, so dürften sich als approximative Mittelzahlen für die Pferdehöhe beider Schläge des Schloßberges ergeben:

Für den kleinen Schlag . . . . 118 cm

Für den großen Schlag . . . . 146 cm.

Damit würde sich die Pferdebevölkerung des Schloßberges der übrigen fossilen und subfossilen Pferdewelt folgendermaßen angliedern:

| Herkunft  | Widerristhöhe<br>em |
|---|---------------------|
| Diluvialpferd von Westerregeln nach Nehring . . . . . | 155                 |
| Diluvialpferd von Remagen nach Nehring . . . . .      | 151                 |
| Diluvialpferd von Solatré nach Gaillard . . . . .     | ca. 122             |
| Hauptpferd von Ligez (Bronze?) . . . . .              | 149                 |
| " vom Schloßberg . . . . .                            | 146                 |
| " von Schwaderman (Eisen) . . . . .                   | 144                 |
| " von der Petersinsel (Bronze) . . . . .              | 142                 |
| " " La-Tène (Eisen) . . . . .                         | 141                 |
| " " Anversier (Bronze) . . . . .                      | 135                 |
| " " Zielkanal (Bronze bis Eisen) . . . . .            | 136                 |
| " " Lüscherz (Kupfer bis Bronze) . . . . .            | 150                 |
| " vom Schloßberg (Pony) . . . . .                     | 118                 |
| (Shtland-Pony) . . . . .                              | 100—120             |

### Zugehörigkeit und Herkunft der Schloßbergpferde.

Die grundsätzliche Verschiedenartigkeit der beiden Pferdeschläge der Schloßbergbewohner geht, soweit sie aus den Rumpf- und Extremitätenknochen auf Grund der vorausgehenden Untersuchung sichtbar ist, am deutlichsten aus der nachfolgenden Gegenüberstellung hervor.

| Kleiner Schlag                        | Großer Schlag                                    |
|---------------------------------------|--|
| Widerristhöhe im Mittel 119 cm (Pony) | Widerristhöhe im Mittel 146 cm (mittelgr. Pferd) |
| Schmale Scapula                       | Breite Scapula                                   |
| Kurz-er, breiter Radius               | Längerer, schlanker Radius                       |
| Dünnfüßig (Index 14,0).               | Mittelfüßig (Index 15,5).                        |

Aus den Arbeiten A. Nehrings kennen wir verschiedene Reste der ältesten domestizierten Pferde Norddeutschlands. Auch dieser Autor unterscheidet zwei Rassen: eine kleine ponyartige und eine große, die dem Diluvialpferde ähnlich sieht.

Die von Nehring beschriebenen Reste stammen aus dem Pfahlbau von Spandau, welcher der dort gemachten Bronzegefunde wegen allgemein bekannt ist, aus einem Torfmoore bei Tribsee in Neu-Vorpommern, aus den oldenburgischen Kreisgruben<sup>1)</sup> und dem Torfmoore bei Alvesse (Braunschweig<sup>2)</sup>).

Es dürfte wohl einleuchtend sein, daß die eine der von Nehring hier aufgefundenen Pferderassen, die von ihm als klein und ponyartig, ja fast eselartig bezeichnet wird<sup>3)</sup>, mit dem oben beschriebenen kleinen Pferdeschlage vom Schloßberg zu identifizieren ist, da die Schloßbergfunde wohl ziemlich gleichalterige sind.

Dadurch erlangen wir zugleich Anhaltspunkte zur Vervollständigung der Charakteristik unseres kleinen Schloßbergpferdes.

Nehring hat einen von Tribsee stammenden Schädel eines alten Hengstes dieser kleinen Rasse veröffentlicht<sup>4)</sup> und an demselben die

<sup>1)</sup> A. Nehring, Fossile Pferde aus deutschen Diluvialablagerungen usw.; Landwirtschaftl. Jahrbücher, Bd. XIII, 1884, S. 109.

<sup>2)</sup> Ibid., Die letzten Ausgrabungen bei Thiedenow; Verhändl. Gesellsch. f. Anthropologie 1882, S. 178.

<sup>3)</sup> Ibid., Fossile Pferde usw., S. 98, Taf. VII, Fig. 7.

nachfolgenden Charaktere gefunden, die Marek noch weiter bestätigt hat<sup>1)</sup>.

Der Längenindex dieses Schädels, das Verhältnis der Basilarlänge zur Stirnbreite, wenn diese gleich 100 gesetzt wird, erlaubt es, die Pferderassen einzuteilen in breitstirnige und schmalstirnige. Breitstirnig nennt man nach Nehring die Pferderassen, deren Schädel-Längenindex unter 240 bleibt, schmalstirnig diejenigen, deren Index über 240 liegt. Zu diesen gehört die Großzahl der occidentalen Pferde, zu jenen das orientalische Pferd, die Ponys und die Esel.

Das kleine Pferd von Tribssee besitzt einen Längenindex von 223, der vollständig demjenigen eines Exmoorpony (Nr. 1263 der Sammlung der Landw. Hochschule zu Berlin) entspricht. Bei einem rezenten Islandpony (Nr. 1357) ist das Verhältnis ebenfalls 223,8, andere rezente Islandpferde weisen folgende Indizes auf: Nr. 1399 = 222,5; Nr. 1360 = 221,7; r.N 1400 = 221,7; Nr. 1342 = 218<sup>2)</sup>.

Der Schädel-Längenindex des Pferdes von Tribssee stimmt also auffallend mit demjenigen der englischen Ponys und des isländischen Pferdchens überein.

Bei der Untersuchung der sonst ähnlich gestalteten Pferde Helvetogalliens konstatiert Marek, daß sich ihr Längenindex nie so tief senke, d. h. die Stirne nie so breit sei wie beim Pferde von Tribssee, sondern mit 233 bis 237 dem Index des arabischen Pferdes ganz gleich stehe. Es müsse das Pferd von Tribssee als ein Pony aufgefaßt werden, was auch die anderen Schädelmaße bestätigen<sup>3)</sup>.

Der hieraus ersichtliche Unterschied mit dem helvetisch-gallischen Pferde wird durch die geschichtlichen Angaben gestützt. Nach Cäsar und Tacitus waren die gallischen Pferde größer und besser als diejenigen der Germanen, und führten die Gallier stets neues, teuer bezahltes ausländisches Pferdmaterial ein. So ist es leicht zu erklären, daß das helvetisch-gallische Pferd orientalischen Charakter besitzt, da es

wohl aus der Kreuzung des kleinen Ponys der Germanen mit orientalischen importierten Pferden entstanden ist.

Wir können daher dieses kleine Pony des Seldöbberges als eine primitive Pferderasse auffassen und werden in späteren Betrachtungen die Richtigkeit dieser Annahme bestätigen finden. Die Charaktere des Rumpfs und Extremitätenskeletts wie auch die Schädel haben uns gezeigt, daß wir es nicht mit einem so überaus grazilen und dünnknochigen Pferde zu tun haben, wie das helvetisch-gallische es ist, sondern der germanische Pony hat kurze, aber kräftige Knochen, sein kurzer Radius und Humerus deuten auf eine nur geringe Eignung zur Schnellkeitsleistung hin. Sein breiter Schädel läßt ihn fast eselartig erscheinen. Kurzum, es ist ein Typus für sich, eine Stammform der Hauspferde. Nehring hat dieses Tier in seinen früheren Publikationen mit dem sehr unbestimmten Namen „kleines Bronze Pferd“ bezeichnet. Es scheint aber aus den erwähnten, wie weiterhin behandelten Gründen eine genauere Benennung gerechtfertigt. Als solche schlage ich vor, den charakteristischen Pony der alten Germanen und des ganzen europäischen Nordens als

#### *Equus caballus Nehringi*

zu bezeichnen. Dem Manne zu Ehren, dem die Wissenschaft so überaus viel in der Entwicklungsgeschichte des Pferdes und seiner Rassen verdankt und der auch zuerst die Reste dieses kleinen deutschen Fossilpferdes beschrieben hat.

Dieses Pferdchen aber als „Bronze Pferd“ zu bezeichnen, dürfte angebracht sein, denn dieses Tier wurde nachweislich schon zur Diluvialzeit auf europäischem Boden gefunden, so bei den Ausgrabungen Sirodots<sup>4)</sup> am Mont Dol bei Saint Malo in der Bretagne mit Mammutresten zusammen. Sanson<sup>5)</sup> hat unter den dort aus-

<sup>1)</sup> Marek, Das helvetisch-gallische Pferd usw., Abhandlungen Schweiz. paläont. Gesellsch., Bd. XXV, 1908, S. 10 u. 45.

<sup>2)</sup> Nehring, Fossile Pferde, S. 105.

<sup>3)</sup> Marek, op. cit., S. 10 u. 11.

<sup>4)</sup> Sirodot, Matériaux pour servir etc., vol. VIII, 2<sup>me</sup> série, 1873, p. 276.

<sup>5)</sup> Sanson, loc. cit., p. 282 und Traité de Zootechnie, Tome III, p. 56. Sowie nach mehreren mündlichen Mitteilungen des Verstorbenen, außerdem in verschiedenen Hüllen der Charvate, Grottes de Mongaulier, de la Chaise, Bois-du-Loe und an anderen nordfranzösischen Stationen. Vgl. auch Alb. Gaudry, De Textiles des Saigues en France à l'époque quaternaire. Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires, II. fasc., Paris 1880, p. 83—82.

gegrabenen Pferdeknochen diejenigen des mittelgroßen Diluvialpferdes entdeckt, das Nehring als *Equus caballus fossilis germanicus sive robustus* bezeichnete und das Sanson als seiner geographischen Rassengruppe des *Equus caballus britannicus* angehörig erklärt. Außerdem aber fanden sich daselbst gleichzeitig die Knochen eines kleinen Pferdchens, an denen Sanson die Charaktere derjenigen seiner Rassengruppen nachwies, die er als *Equus caballus hibernicus* bezeichnet hatte und zu welcher er die irischen Ponys, sowie die im nordfranzösischen Littoral, speziell in der Bretagne unter dem Namen *Race de Léon* und *Race du Conquet* vorkommenden kleinen Pferde rechnete.

Die Beobachtungen werden noch durch Cossar Ewart<sup>1)</sup> bestätigt, der die Auffindung eines lebenden kleinen Pferdchens in Connemara (Irland) signalisiert, das er „Celtic Pony“ nennt und welches ganz ähnliche Charaktere wie das arabische Pferd aufweise, aber keine Kastanienbildung an den Hinterbeinen besitze und anstatt einer von oben bis unten behaarten Schwanzrinne eine solche von mantierartiger Behaarung habe. Ewart glaubt sich deshalb zu der Hypothese berechtigt, daß dieses kleine Pferd, vor Ankunft der neolithischen Menschen seine zentralasiatische Heimat verlassend, sich bis nach Nordenropa verbreitete, wo es dann in der Quaternärzeit von nordischen Neolithikern domestiziert wurde.

Für uns würde darin eine Bestätigung der Richtigkeit unserer Auffassung zu finden sein, daß die Haustierte der alten Germanen noch heute alle auf den entlegenen nordischen Inseln anzutreffen sind.

Was schließlich die Zugehörigkeit des mittelgroßen Pferdes der Schloßbergbewohner angeht, so ist darüber nicht mit gleicher Sicherheit zu urteilen. Dennoch ist es nach den Ausführungen Nehrings als wahrscheinlich anzunehmen, daß wir es hier mit einem Abkömmling des germanischen Diluvialpferdes *Equus caballus fossilis germanicus sive robustus* zu tun haben. Möglicherweise könnte es auch ein von den slawischen

Völkern während der späteren Periode des Schloßberges importiertes großes Pferd sein. Bis dies genau zu entscheiden, bestimme ich es als *Equus caballus robustus* Nehring.

## B. Wilde Tiere.

### 7. *Cervus elaphus* Lin. Der Edelhirsch.

Unter den wilden Tieren des Spreewaldes, welche den Schloßbergbewohnern als Nahrung dienten, nimmt der Edelhirsch die erste Stelle ein.

Die vielen Hirschknochen (75 Stück), die uns unter den Küchenabfällen des Schloßberges begegnen, beweisen einerseits das häufige Vorkommen in den Wäldern, wie auch die Beliebtheit der Jagd dieses Tieres. Andererseits weist aber das Vorwiegen der Ober- und Unterschenkelknochen darauf hin, daß den damaligen Schloßbergern das Verständnis für den Genuß, den eine gute Hirschkeule gewährt, auch wenn sie nicht nach moderner, sondern der von Tacitus erwähnten algermanischen Kochkunst behandelt wurde, nicht fehlte.

Nach der berechneten Individuenzahl von zehn Stück stellt sich der Edelhirsch mit 40 Proz. an die erste Stelle des Wildpretanteiles der Ernährung der Schloßbergbewohner.

Kopf. Die Überreste der Geweihe und der Unterkiefer sind hier ziemlich allein brauchbar; die wenigen anderen Schädelknochen sind so klein zermalmt und zerschlagen, daß es hoffnungslos wäre, sie identifizieren zu wollen.

Es liegen 14 Geweihstücke vor, von denen aber nicht ein einziges einem besonders starken, guten Hirsche angehört. Nr. 428 ist der basale Teil des Geweihs eines guten Kapitalhirsches. Der Umfang über der Rose mit 24,5 cm ist beinahe so groß wie der des zehnnendigen Elches. Die abgebrochene Augensprosse sitzt schon ganz dicht bei der Rose. Das Stück dürfte daher von einem Sechzehn- oder Achtzehnder stammen. Nr. 427 ist ein etwas längeres Basalstück eines Zwölfenders mit 19 cm Rosenumfang und Nr. 422 mit 16 cm Rosenumfang dasjenige eines Gabelhirsches. Die übrigen Stücke sind meist abgeschlagene Sprossen.

An Resten des Unterkiefers liegen sechs Stück vor, von denen Nr. 515 ein fast vollständig rechter Ast des Unterkiefers eines

<sup>1)</sup> Ewart, J. Cossar, On a new horn from the Western Islands. Roy. Soc. Edinburgh. 3. ord. Meeting 4. Dez. 1902. Abstract in the „Times“.

alten Hirsches ist. An demselben ist der dritte Prämolare verkümmert, und hinter dem dritten Molaren befindet sich eine besonders tiefe Einknickung, die durch die abnorme pathologische Verlängerung des dritten Molaren der rechten Oberkieferseite herbeigeführt worden ist. Nr. 519 ist der dazugehörige linke Astrest, der ebenfalls,

An Rumpfknochen liegen nur zwei Halswirbelreste vor.

Die Extremitätenknochen sind zwar in ziemlicher Menge vorhanden, jedoch alle kurz und klein geschlagen. Es sind einzig einige proximale Humerus- und Tibiacenden, welche in einem einigermassen brauchbaren Zustande sind,

| Dimensionen der Unterkiefer                                   | Schloßberg        |         |         |         | Schlesien         | Frankreich            |
|---|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|
|   | Nr. 515           | Nr. 511 | Nr. 482 | Nr. 510 | ♂<br>n. Tscherski | ♀<br>Samml.<br>Duerst |
| Gesamtlänge . . . . .   | 315               | —       | —       | —       | 286               | 291                   |
| Länge der Backzahreihe . . . . .                              | 113 <sup>1)</sup> | 125     | 128     | 131     | 113               | 113                   |
| Länge des zahrfreien Teiles . . . . .                         | 90                | 96      | 93      | 85      | —                 | 88                    |
| Breite des Vertikalastes hinter dem dritten Molaren . . . . . | 92                | —       | —       | —       | —                 | 66                    |

<sup>1)</sup> Fehlt der dritte Prämolare.

wenn auch viel geringer, die Einknickung hinter dem dritten Molaren aufweist. Nr. 511 und 482 sind Mittelstücke linker Äste und Nr. 510 dasjenige eines rechten Astes.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, war der Hirsch des Schloßberges modernen Formen an Größe überlegen.

wohl deshalb, weil sie bei der Zubereitung der Laffen und Kellen an Scapula und Femur hängen blieben. (S. nachstehende Tabellen.)

Von Metatarsen ist ebenfalls nur ein einziges distales Endstück, von einem starken Hirsche stammend, vorhanden (Nr. 199). Seine transversale Breite ist 58, der Durchmesser 30 mm.

| Dimensionen des Humerus                                 | Hirsch     |        |                             |                                       | Elch       |                                       |            |
|---|------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|   | Schloßberg |        | Jana, fossil nach Tscherski | Skelett Nr. 121 recent nach Tscherski | Schloßberg | Skelett Nr. 120 recent nach Tscherski | jav.       |
|   | Nr. 85     | Nr. 80 |                             |                                       | Nr. 76     |                                       | Mns. Paris |
| Größe Länge der Trochlea                                | 61         | 62     | 69                          | 58                                    | 79         | 75                                    | 74         |
| Höhe des äußeren Trochlelendes . . . . .                | 26         | 25     | 34                          | 26                                    | —          | —                                     | —          |
| Höhe des inneren Trochlelendes . . . . .                | 37         | 34     | 52                          | 43                                    | 73         | 61                                    | 73         |
| Breite des Humerus in der Hälfte seiner Länge . . . . . | 27         | 24     | 37                          | 26                                    | 42         | 42                                    | 32         |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .                     | 34         | 36     | 43                          | 34                                    | 52         | 47                                    | 37         |

| Dimensionen der Tibia                      | Hirsch         |                |                 |                 |                | Reh        |         |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------|
|  | Schloßberg     |                |                 |                 |                | Schloßberg |         |
|  | ad.<br>Nr. 272 | ad.<br>Nr. 268 | juv.<br>Nr. 274 | juv.<br>Nr. 263 | ad.<br>Nr. 273 | Nr. 289    | Nr. 297 |
| Breite des proximalen Endes . . . . .      | 82             | 82             | 75              | 65              | —              | 56         | 34      |
| Dessen Durchmesser . . . . .               | 75             | 67             | 61              | 50              | —              | —          | —       |
| Breite der Tibia in der Hälfte ihrer Länge | 30             | —              | 30              | —               | 40             | 12         | 12      |
| Durchmesser ebendasselbst . . . . .        | 20             | —              | 20              | —               | 30             | —          | —       |
| Breite des distalen Endes . . . . .        | —              | —              | —               | —               | 47             | 25         | 23      |
| Durchmesser desselben . . . . .            | —              | —              | —               | —               | 50             | —          | —       |

Um zu einem Abschlusse über die Vertretung des Hirsches unter den Küehenabfällen des Schloßberges zu gelangen, können wir sagen, daß es mindestens zehn Individuen sind, die an den besprochenen Resten ihren Anteil haben. Darunter waren jedoch nur drei alte gute Hirsche, während die übrigen junge oder auch weibliche Tiere zu sein scheinen. Es wird diese Tatsache wohl weniger auf den Gutschmack der Schloßberger zurückzuführen sein, als auf die größere Schwierigkeit der Jagd älterer Tiere und Kapitalhirsche. Im ganzen ist der damalige Hirsch dem rezenten durchaus kongruent, die geringen Maßdifferenzen zugunsten des subfossilen Stammvaters sind wohl mehr individuell und durchaus nicht ausschlaggebend.

### 8. *Capreolus vulgaris* Lin. Das Reh.

Während Rehgehörne unter den Kulturresten vom Schloßberge durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören, sind Rehknochen verhältnismäßig rar, seltener wenigstens als Knochen vom Hirsch. Vermutlich wurden sie von den Hunden mit Vorliebe als Nahrung verwendet oder sind von den Schloßbergbewohnern selbst zerkaut worden, wie denn überhaupt die kleinen Knochen nur selten vorhanden sind, so daß es unrichtig wäre, aus dem genannten Faktum auf ein geringes Vorkommen des Rehes in dem Spreewalde zu schließen.

Die Rehgehörne hingegen zeichnen sich teilweise durch eine hervorragende Schönheit und Form aus, auch sind sie zum Teil vollständig erhalten. Die Großzahl derselben ist abgestoßen und von den Schloßbergern im Walde gefunden worden. Nr. 448 ist jedoch abgeschlagen, es hängt ihm noch ein Stück des Rosenstockes und des Frontales an.

Nr. 446 und 442 ist das Gehörn eines Sechsenders, dessen hohes Alter in der großen Stärke der Hauptstange, der Perlblase auf derselben und der wundervollen Rose deutlich erkennbar ist. Die Gesamtlänge ist 22,1 cm und der Umfang der Rose 14 cm.

Nr. 443, 444 und 448 stammen ebenfalls von sechsendigen Böcken, die aber weit jünger waren als der vorige. Nr. 445 ist die Stange eines Gabels und 441 und 447 sind Reste anderer Gehörne. Keines der Gehörne paßt zu einem der anderen.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Eine höhere Endenzahl als sechs kann nicht beobachtet werden, eine Weiterentwicklung derselben wird wohl ebenso selten gewesen sein wie heutzutage.

Unterkieferreste sind fünf vertreten, von denen das besterhaltene Stück Nr. 456 ist. Es ist der linke Ast des Unterkiefers eines jungen Tieres; der dritte Molar ist im Begriffe auszubrechen. Seine Maße, verglichen mit denjenigen eines Sechsenders meiner Sammlung, stellen sich wie folgt dar:

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Größe Länge . . . . .  | 120 mm | 150 mm |
| Länge der Zahnreihe . . . . .                                  | 60 "   | 64 "   |
| Breite des Vertikallastes hinter dem dritten Molaren . . . . . | 36 "   | 36 "   |

An Rumpfknochen liegt ein Darmbeinrest vor und an Extremitätenknochen im ganzen 16, worunter die am besten erhaltenen zwei Schmelzblattstücke, vier Tibiae und der Rest einer Ulna sind. Die Maße der brauchbaren Tibiae sind unter Cervus aufgeführt.

Man wird die Anzahl der vorhandenen Rehe etwa auf fünf Individuen im Minimum taxieren müssen, so daß ihnen ebenfalls noch einer der wichtigeren Plätze bei der Ernährung der Schloßbergbewohner gebührt und unter dem Anteil des Wildpretes an derselben der dritte.

### 9. *Cervus Alces* Lin. Der Elch.

Diese größte der Hirscharten, die sich trotz der unaufhaltsam fortschreitenden Kultur aus graner Vorzeit noch hinübergerettet hat in unsere Zeiten und die, wenn auch in geringer Anzahl, sich noch im nördlichen Europa und Asien vorfindet, war in frühen Zeiten über das ganze Europa verbreitet.

Fossile oder besser subfossile Knochen des Elches sind in den verschiedensten Gegenden aufgefunden worden.

In Europa kennen wir solche aus Oberitalien<sup>1)</sup>, aus Frankreich<sup>2)</sup> und Österreich-Ungaru<sup>3)</sup>. Reichhaltig waren auch die Funde in der Schweiz,

<sup>1)</sup> H. v. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop. T. XVI, p. 465, 469.

<sup>2)</sup> J. de Cristol, Ann. Sci. Nat., sér. 2. vol. IV, 1835, p. 201; P. Gervais, Zoologie et Paléontologie françaises, 2<sup>e</sup> édit. 1859, p. 143.

<sup>3)</sup> Grossinger, Hist. phys. regn. Hung. I, p. 569; Kfiz, Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt 1891, S. 537.



die den Pfahlbauten des Steinalters entstammen<sup>1)</sup>. Jedoch fanden sich in diesem Lande auch Elchreste aus viel späterer Zeit in Torfmooren und Dammerde<sup>2)</sup>.

In keinem anderen Lande aber wurden so viele Elchknöcher gefunden wie in Deutschland und ganz besonders in Preußen und Mecklenburg. Man traf sie hier sowohl in Pfahlbauten wie in Kulturschichten<sup>3)</sup>. Sie kamen aber auch in Schleswig<sup>4)</sup>, in Braunschweig<sup>5)</sup>, in Hessen<sup>6)</sup>, Bayern<sup>7)</sup>, Schlesien<sup>8)</sup> u. a. vor.

Auch in Großbritannien<sup>9)</sup> trifft man bis zur Römerzeit auf die Reste dieses Tieres und in Skandinavien<sup>10)</sup> existieren die fossilen Knochen neben dem noch wild lebenden Tiere.

Aus Rußland<sup>11)</sup> und Sibirien<sup>12)</sup> sind ebenfalls Fossilien des Elches bekannt und er ist auch jetzt noch in einigen Gegenden Rußlands und im nördlichen Sibirien bis nach China ziemlich häufig<sup>13)</sup>.

Es scheint überhaupt in seiner geographischen Verbreitung der Elch mit dem Ur (S. 88)

<sup>1)</sup> Büttner, Fauna der Pfahlbauten, S. 63; Museum in Bern.

<sup>2)</sup> Meisner, Museum d. Naturgesch. Helvetiens, Nr. 9 n. 10, 1820, S. 67.

<sup>3)</sup> Nehring, Übersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische Quartär-Faunen, Zeitschr. Deutsch. Geolog. Gesellsch., Bd. XXXII, 1880, S. 468. Ibid., Neue deutsche Jagdzeitung 25. März 1880. Ibid., Katalog der Säugetiere, 1886, S. 97. Lisch, Jahrbücher des Vereins für mecklenburg. Gesch., Jahrg. II, 86; V, 122; VI, 87 usw. C. Struck, Die Säugetiere Mecklenburgs. Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenb., 30. Jahrg., 1878, S. 88.

<sup>4)</sup> Mittell. d. Vereins z. Verbr. naturw. Kenntnisse, 1859, S. 70.

<sup>5)</sup> Blasius, Naturgesch. der Säugetiere Deutschlands 1857, S. 436.

<sup>6)</sup> Raup, Akten der Urwelt, 1841, Taf. IV, Fig. 6.  
<sup>7)</sup> H. v. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop., T. XVI, p. 481.

<sup>8)</sup> Hensel, Verzöppert fossiler Säugetiere Schlesiens, Breslau 1852. Göppert, Zur Gesch. d. Elefanten in Schlesien, Jahresber. d. schles. Gesellsch. X, 1873, S. 47 bis 48.

<sup>9)</sup> Newton, The Elk in the Thames Valley. Geol. Quart. Journ. 1903, p. 86.

<sup>10)</sup> Nilsson, Skandinavisk Fauna, 2. Uppl. I, p. 490.

<sup>11)</sup> Brandt, Beiträge z. Naturgeschichte d. Elens. Mémoires de l'Acad. d. St. Pétersbourg. T. XVI, 1870, Nr. 8.

<sup>12)</sup> Tscherski, Wissenschaftliche Resultate usw. Mém. Ac. St. Pétersbourg 1892. Brandt, Neue Untersuchungen, Altaiische Höhle. Ibid., 1871, T. XV.

<sup>13)</sup> Radde, Reisen usw., Bd. I: Säugetiere, S. 268. L. v. Schrenk, Reisen usw., Bd. I, S. 174.

Hand in Hand gegangen zu sein; denn auch noch in historischen Zeiten war seine Verbreitung eine ungemein große.

Als südlichster Verbreitungsbezirk werden wohl die mesopotamischen und persischen Sümpfe aufgefaßt werden müssen. Denn wir kennen eine Darstellung aus der Zeit des Königs Chosroes II. von Persien, der in den Jahren 579 bis 628 n. Chr. regierte, die uns diese Monarchen auf der Jagd auf Elche, Arnihäffel und Wildschweine zeigt<sup>1)</sup>.

Es ist daher auch der Fund eines Elchgeweihs und einiger Knochenreste in Nordindien nicht ganz von der Hand zu weisen, da der einst mit dem Elch zusammen in Persien vorkommende Arnihäffel sich ja heutzutage nur noch im Norden Indiens wild erhalten hat<sup>2)</sup>.

Auch im zentralen Europa existierte um diese Zeit der wilde Elch noch allgemein und wurde von den Recken der Vorzeit gejagt. Während das Nibelungenlied uns von Elchen und Schelehen erzählt, wobei nach Dahms<sup>3)</sup> unter Elch das hornlose weibliche, unter Schelech aber das gehörnte männliche Tier zu verstehen sein soll, erfahren wir aus historischen Quellen, daß im VIII. Jahrhundert der Elch noch im heutigen Bayern vorkam<sup>4)</sup> und daß er sich im X. Jahrhundert noch in Drente<sup>5)</sup> und Flandern<sup>6)</sup> fand.

Er scheint dann allmählich nordwärts gedrängt worden zu sein, so daß nach Althertus Maganus<sup>7)</sup> und Gesner<sup>8)</sup> dieses Tier tief noch in Preußen, Slawonien und Ungarn vorkam.

Da der Elch nicht allein durch seine Größe und seltsame Gestalt auffällig, sondern auch sehr scheu und furchtsam war, sowie im Geruche einer außerordentlichen Heilkraft stand und seine Erscheinung als ein böses Omen aufgefaßt wurde, so ist es leicht erklärlich, warum

<sup>1)</sup> Duerst, Quelques ruminants sur des oeuvres d'art asiatiques. Revue archéologique 1902, I, p. 242.

<sup>2)</sup> Baker, Journ. asiat. soc. Bengal, Vol. IV, p. 506.

<sup>3)</sup> Dahms, Der Schelech des Nibelungenliedes, Naturw. Wochenschr. XIII, S. 268.

<sup>4)</sup> v. Friesen, Sitzungsbericht naturw. Gesellsch. Isis 1869, S. 225.

<sup>5)</sup> Heda, Episcop. Ultraject. Ultry. 1843, p. 83.

<sup>6)</sup> Le Hon, L'homme fossile 1867, p. 86, not. 1.

<sup>7)</sup> Alb. Maganus, Lib. Hist. animal. Tract. 1, cap. 3, fol. 37.

<sup>8)</sup> C. Gesner, Tierbuch. Zürich 1563. Fol. LXXXV.

sich zahlreiche Gelehrten des Mittelalters mit der Erforschung und Beschreibung dieses Tieres abgaben.

Die meisten derselben kannten jedoch das Tier selbst nur vom Hörensagen, und suchten nach damaliger Sitte mit Luther den Namen Elch in „Saemer“ oder dem Worte „Akko“ des Deuteronomus. Daß auch die griechischen und römischen Klassiker über das Wesen ihres „Alces“ nicht einig waren, konnte natürlich die Gelehrten des Mittelalters nur zu unlogischerem Denken anspornen. Pausanias, der nach Romulus Amasaeus den Elch für ein Tier der „regio Celtica“ erklärt, betrachtete ihn vernünftigerweise als einen großen Hirsch. Julius Solinus, der ihn als skandinavisches Wild ansieht, für ein maultierähnliches Tier mit vorhängender Oberlippe. Julius Cäsar aber rechnet ihn zu den Ziegen, Plinius endlich zu den Pferden, jedoch mit der Differenz, daß er sich nur durch lange Ohren und langen Hals vom Rinde unterscheidet. So kann es uns denn nicht wundern, wenn entsprechend der große Albertus den Elch als „Equicervus“ bezeichnet. Doch verwechselt er ihn mit dem „Reiner“, dem Rentiere, worüber sich Johann Colerus<sup>1)</sup> in seinem Traktat über das Elend sehr ereifert und in die für manche Leute auch jetzt noch beherzigenswerten Worte ausbricht: „Also gehets, wenn man von Dingen schreiben | die man nur gehöret | oder nicht recht eingenommen | oder selber gesehen hat. | Ich achte es davor | das es wol größer sey denn ein Hirsch | obs woll andere ziemlich klein machen. Ich habe traun eins vor zweyen Jahren gesehen | das war höher und größer denn ein Hirsch | ond war höher und größer geleunet | hatte noch keine Hörner.“

Colerus dürfte danach diese Elchkuh im Jahre 1605 gesehen haben, vielleicht war er damals schon Prediger in der Mark Brandenburg, wo er zu Parchim am 23. Oktober 1639 starb. Es ist möglich, daß damals noch Elche in der Mark vorkamen, nachweislich wurden viel später, 1720 und 1730, aus Polen und Preußen verschiedene Exemplare nach Sachsen, Brandenburg und Dessau verpflanzt. — Es muß

<sup>1)</sup> Joh. Colerus, *Oeconomia*, Wittenberg 1627. 14. Band, 58. Kap., S. 612.

nebenbei erwähnt werden, daß das Bild des Elches, das Colerus gibt, ein ganz vortreffliches, nach der Natur gezeichnetes ist, während spätere Autoren wie Severinus Goebelius<sup>2)</sup> und Uldaricus Heinsius<sup>3)</sup> nur ganz unglückliche Gravüren gaben, die mehr dem Rentier als dem Elche gleichsehen.

Über den deutschen Namen Elend, Elen, Elentier haben alle diese Autoren merkwürdige Gedanken. Colerus leitet ihn von dem hebräischen Worte „Akko“ ab, das ein betrübtes, trauriges Gemüte bedeute. Es sei, sagt er, ja ganz gleich dem Worte „Alce“, man brauche nur ein k durch ein l zu ersetzen. Daher, meint er, heiße es auch im Deutschen „Elend“, „da es auch ein recht elend Tier ist | denn es soll alle Tage den schweren Gebrechen einnal haben | davon ioh nichts weiß.“

Heresbach<sup>4)</sup>, der vor Colerus schrieb, nennt es „Elendt“. Nach Heinsius heißt der deutsche Name eigentlich Hellend. Die Schweizer, sagt er, nennen das Tier „Elch“, die Franzosen „la grande beste“, die Engländer „great beast“. Hiernach hätten also diese Nationen erst später die Worte „elan“ vom deutschen Elen und „elk“ vom schwedischen eig entlehnt.

Franzius<sup>5)</sup> meint, daß man das Elend wegen seiner schwachen und elenden Stimme so heiße. Cyprianus<sup>6)</sup> aber sagt, alles dies sei unrichtig und man müsse das deutsche Wort Elend laut Schottus vom schwedischen „elg“ ableiten. Grimm zufolge hat auch er nicht recht und das deutsche Wort Elen oder Elend sei den Slawen von ihrem „olen“ oder „jelen“, was „Hirsch“ bedeutet, abgesehen und es sei übel, nicht das vom altheutschen „elaho“ stammende „Elch“ anzuwenden.

Die Elchreste vom Schloßberge setzen sich im ganzen aus neun Knochenstücken zusammen.

<sup>1)</sup> Severinus Goebelius, Borussus, *Historia Brevi de Alce*. Venetiis 1596.

<sup>2)</sup> Uldaricus Heinsius, *gentis Curons, Dissertatio Historico-Zoologica de Alce*, Jenae 1681.

<sup>3)</sup> Conr. Heresbach, *Rei rusticae libri quatuor*. Coloniae 1570.

<sup>4)</sup> Wolfgangus Franzius, *Historia Animalium*. Wittenbergae 1612. Part. I, Cap. X, p. 51—52.

<sup>5)</sup> Joh. Cyprianus, *Continuatio historiae Animalium Wolfgangi Franzii*. Francofurti 1712. Part. I, Cap. X, Nr. 1, p. 596.

## Kopf.

Hier ist es zunächst der basale Teil (Geweihstiel) einer linken Elchschaufel (Geweihstange), die unsere Aufmerksamkeit erregt. Dieselbe stammt augenscheinlich von einem noch ziemlich jungen, wohl Zehndigen und ist ohne Zweifel bei Lebzzeiten abgeworfen worden, denn sie zeigt eine ovale, rauhe Trennungsfäche unterhalb der Rose. Man hat sie augenscheinlich im Walde abgelesen und dann mittels eines scharfen Instrumentes den basalen Teil abgehakt, während die Schaufel im Haushalte als Gerät Verwendung fand.

Die Maße dieses Geweihstiemes stellen sich im Vergleiche mit denjenigen eines Zehnders von Norwegen im Museum von Bern folgendermaßen dar:

|  | Schloßberg<br>Nr. 421<br>mm | Museum<br>Bern<br>mm |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Umfang über den Knochen-<br>ringen (Rose) . . . . .        | 250                         | 240                  |
| Breite des Geweihstiemes ober-<br>halb der Rose . . . . .  | 56                          | 54                   |
| Breite des Schaufelrestes 12 cm<br>über der Rose . . . . . | 101                         | 100                  |

Vom Kopfskelett ist noch Nr. 560 der Rest eines linken Prämaxillare erhalten geblieben, das infolge seiner Form und kräftigen Entwicklung sich deutlich über seine Zugehörigkeit anweist.

Unterkieferreste liegen zwei vor, nämlich Nr. 481 und 552. Nr. 481 ist der Vorderteil des linken Astes des Unterkiefers.

Sehr stark und kräftig entwickelt, ist er ungemein schwer und von sprödem, glasigen Bruch.

Nr. 552 ist das Mittelstück ebenfalls eines linken Unterkieferastes, der jedoch von einem anderen Individuum stammt als Nr. 481.

An Zähnen ist  $P_2$ ,  $P_1$  und  $M_2$  erhalten, deren Maße sich wie folgt darstellen:

|                  | $P_2$ | $P_1$ | $M_2$ |
|------------------|-------|-------|-------|
| Länge . . . . .  | 25 mm | 24 mm | 27 mm |
| Breite . . . . . | 13 "  | 14 "  | 18 "  |

Rumpf. An Rumpfknochen findet sich ein Kreuzbein vor, das jedoch sehr stark verletzt

ist. Es hat mit seinem starken, hohen Kamm, dem raschen Abfällen desselben nach hinten ganz den Typus des sacrum der Hirsche, ist jedoch noch größer als dasjenige der Rinder.

## Extremitäten.

Dieselben sind etwas stärker vertreten und fällt unter ihnen als besonders charakteristisch der rechte Metacarpus (Nr. 322) auf. Außerdem ist das distale Ende eines linken und eines rechten Humerus (Nr. 76 und 96) vorhanden, sowie ein Stück einer Ulna (Nr. 157) und das proximale Ende eines linken Femur (Nr. 241).

Die Knochenbeschaffenheit ist hier eine fast dureweg spröde mit fayencenartigem Bruche.

Die Maßverhältnisse der Humeri, die sehr starken Tieren angehören, sind in einer Tabelle unter Cervus elaphus angeführt (S. 280).

Die Metakarpn und Metatarsen des Elches sind überaus typisch gestaltet und leicht an ihrer großen Länge und Schlankheit, der tiefen zylindrischen Mittelrinne und der bauchigen Anschwellung des distalen Endes oberhalb des Gelenkes zu erkennen. Die Mittelfurche, deren unteres Ende durch die vordere Öffnung des Foramen nutritum eingenommen wird, ist mit scharfen Rändern versehen, die leicht über den Boden der Vertiefung überhängen.

Der Körper des Metacarpale ist langgestreckt und wird im unteren Viertel seiner Länge allmählich breiter und bildet die erwähnte Anschwellung. Leider ist das proximale Ende des Metacarpus abgebrochen, weshalb nicht alle Dimensionen mehr meßbar sind.

Was jedoch zum Vergleiche dienen kann, geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Die Anzahl und Art der Reste des Elches vom Schloßberge weisen darauf hin, daß das Vorkommen des Elches zur damaligen Zeit im Spreewalde doch wohl nicht ein bloß vereinzelter war. Wenn dies Tier wie auch der Ur zu dem seltenen Wilde gerechnet werden mußte, so liegen uns dennoch hier die Reste von zwei bis drei Individuen vor, die die Bewohner des Schloßberges verspeisten.

Den Maßzahlen nach zu urteilen, waren diese Tiere durchaus von derselben Größe wie ihre rezenten europäischen Nachkommen.

| Dimensionen der Metakarpus                               | Schloßberg | Norwegen<br>rezent<br>adult. ♂ | Norwegen<br>rezent<br>juv. ♀ | Jana<br>fossil | Skelett<br>rezent in<br>Petersburg |
|--|------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | Nr. 322    | Paris. Mus.                    | Paris. Mus.                  | nach Tscherski |                                    |
| Größe Breite der distalen Gelenkfläche . . . . .         | 63         | 65                             | 58                           | 57             | 68                                 |
| Größter Durchm. derselben von vorn nach hinten           | 44         | 42                             | 39                           | 36             | 43                                 |
| Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge . . . . . | 31         | 33                             | 29                           | 31             | 37                                 |
| Größter Durchmesser desselben selbst . . . . .           | 37         | 36                             | 24                           | 35             | 35                                 |
| Approximative Länge . . . . .                            | 350        | —                              | —                            | —              | —                                  |
| Größe aktuelle Länge . . . . .                           | 270        | 35,0                           | 317                          | 298            | 352                                |

### 10. *Bos primigenius* Bojanus. Der Ur.

Im Spreewalde lebte zur Zeit der Ausdehnungen am Schloßberge auch der Ur, dieser mächtige Vertreter des Genus *Bos*, und es ist wohl mehr als wahrscheinlich, daß der Wisent (*Bison europaeus*) ebenfalls vorkam, wenn wir auch keine Überreste von demselben unter den Schloßbergknochen antreffen.

Wenngleich das Vorkommen des Urrindes noch in viel späteren, historischen Zeiten in Zentralenropä hauptsächlich infolge der Arbeiten Nehrings<sup>1)</sup>, nimmehr unbestritten anerkannt wird, so ist es vielleicht dennoch nicht unangebracht, hier eine ganz knappe Darstellung der einstigen Verbreitung dieses Tieres und deren allmähliche Reduktion bis zum völligen Verschwinden zu geben.

Am frühesten begegnen wir dem Ur in den pliozänen Ablagerungen der sivalischen Hügel am Südalhänge des Himalaya, hier wurden verschiedene Individuen von Falconer<sup>2)</sup> und R. Lydekker<sup>3)</sup> nach kleinen osteologischen Differenzen mit verschiedenen Speziesnamen besetzt. Auch im Pliozän von China und Java wurden ähnliche Reste gefunden<sup>4)</sup>. Aus späterer pleistozäner Periode, in der nun der Ur über den ganzen asiatischen und europäischen Kontinent Verbreitung fand, kennen wir aus dem Tale

der Narbada in Nordindien einen Abkömmling dieser pliozänen Formen im *Bos namadicus*<sup>5)</sup>.

Aus derselben Zeitepoche stammen dann die Schädelreste des Urs, die der Abbé David in China fand, sowie diejenigen aus dem Pleistozän Javas.

Auch auf afrikanischem Boden finden wir den Ur schon zur pliozänen Periode von Ainjourel<sup>6)</sup> und dann in den pleistozänen Ablagerungen Nordafrikas recht häufig. Pomel bezeichnete die algerische Form wiederum mit einem besonderen Namen: *Bos opistomus*. Thomas<sup>7)</sup> nennt sie *Bos primigenius mauretanicus*. Dabei unterscheidet sie sich aber nicht im geringsten von der europäischen Form, wie ich durch eigene Beobachtungen an den algerischen Fossilien wahrnehmen konnte.

In Europa endlich hat man Reste des Ur fast in allen Gegenden aufgefunden, von den russischen Steppen, den Grenzen Sibiriens, dem hohen Norden Skandinaviens, den Mooren und Cavernen Großbritanniens an bis hinab in die Südspitze Italiens, Spaniens und Siziliens.

Daß die Verbreitung noch in historischer Zeit eine große war, beweisen die Darstellungen der Jagd des *Primigenius* durch babylonische<sup>8)</sup> und ägyptische<sup>9)</sup> Könige und ebensolcher Bilder aus mykenischer Zeit von Cypern und Griechenland<sup>10)</sup>.

<sup>1)</sup> Alfred Nehring, Über Herberstein und Hirs-fogel. Beiträge zur Kenntnis ihres Lebens und ihrer Werke. Berlin 1897.

<sup>2)</sup> Falconer, Palaeontological Memoirs and Notes. London 1865.

<sup>3)</sup> Lydekker, Indian tertiary and post-tertiary Vertebrata, vol. I, ser. X, p. 4. Mem. Geol. Survey India, 1878.

<sup>4)</sup> Koken, Paläont. Abhandl. 1885, S. 66, Fig. 2. Martin, Sammlungen geolog. Reichsmuseums, Leiden. Ser. I, Bd. IV, 1887, Nr. 63.

<sup>5)</sup> Lydekker, op. cit.; Blanford, Stone implements. Mackie-Repertory, Vol. 2, 97, 1867.

<sup>6)</sup> Pomel, Monographies. Les Boeuf-Tanreux. Alger 1855.

<sup>7)</sup> Thomas, Recherches sur les Bovidés fossiles de l'Algérie (Bull. Soc. geol. 1881, vol. VI, p. 92—136).

<sup>8)</sup> Ibid., Die Rinder von Babylonien, Assyrien und Ägypten, S. 9. Berlin 1899.

<sup>9)</sup> Ducrest, Notes sur quelques Bovidés préhistoriques. L'Anthropologie 1900, p. 156.

<sup>10)</sup> Ibid., Wilde und zahme Rinder der Vorzeit. Natur und Schule, 1903, 1. Heft, S. 30.

Wir hören auch von den Klasiikern Herodot, Cäsar, Plinius, Martial und Seneca von dem Ur, und im Mittelalter maeben uns die Chronisten manche Angaben, aus denen deutlich hervorgeht, daß der Ur, obgleich anfangs über ganz Zentraleuropa verbreitet, allmählich gegen Osten zurückgedrängt wurde, bis man ihn nach Herberstein im Jahre 1627 auch in Poleu anrottete.

Die Anzahl der Knochenstücke beträgt im ganzen sieben. Es ist ein Hornzapfen (Nr. 484) ein distales Humerusende (Nr. 68), ein distales Radiusende (Nr. 128), ein proximales Radiusende (Nr. 127), zwei distale Femurenden (Nr. 609 und 254) und ein Astragalus (Nr. 320).

#### Kopf.

Das besterhaltene Stück ist ohne Zweifel der linke Hornzapfen eines Ur. Derselbe scheint augenscheinlich von einem noch jugendlichen Stiere herzustammen.

Da man in der Literatur nur spärlichen Angaben über die Größenverhältnisse der Hornzapfen des Bos primigenius Boj. begegnet und es dennoch dem Forscher sehr von Nutzen sein kann, so denke ich, werden ee Fachgenossen nur begrüßen, wenn ich hier eine kleine Tabelle mit Vergleichsmaßen von Hornzapfen des Bos primigenius aus ganz verschiedener Provenienz einschalten, um deren ungefähre Variationsgrenzen einmal festzustellen.

Weil ich leider nicht Gelegenheit hatte, viele Primigeniusschädel aus deutschen Fundstellen sehen und studieren zu können, bin ich gezwungen, mich hierbei auf v. Meyer, Nehring und Hittcher zu berufen. Die übrigen Maße sind jedoch selbst genommen, und zwar sind hier nur die interessantesten und besterhaltenen Stücke der so verschiedenen, reichen Sammlungen aufgezählt, die mir zum Studium offen standen.

| Herkunft  | Länge der | Umfang | Vertikal-    | Horizontal-  |
|---|-----------|--------|--------------|--------------|
|   | äußeren   | an der | durchmesser  | durchmesser  |
|   | Kurvatur  | Basis  | en der Basis | en der Basis |
|   | mm        | mm     | mm           | mm           |
| 1. Hülsenberg (bei Krefeld) nach v. Meyer <sup>1)</sup> . . . . .   | 430       | 323    | 68           | 111          |
| 2. Treten (Pommern) nach Nehring <sup>2)</sup> . . . . .  | 450       | 270    | 70           | 100          |
| 3. Schloßberg (Spreewald) . . . . .   | 505       | 295    | 77           | 102          |
| 4. Hevel (bei Berlin) nach v. Meyer <sup>1)</sup> . . . . .   | 512       | 318    | 87           | 125          |
| 5. Pogrimmen (Ostpreußen) nach Hittcher <sup>3)</sup> . . . . .   | 520       | 235    | 60           | 83           |
| 6. Lyk (Ostpreußen) nach Hittcher <sup>3)</sup> . . . . .   | 640       | 350    | 85           | 130          |
| 7. Bannon (Pommern) nach Nehring <sup>2)</sup> . . . . .  | 560       | 310    | 80           | 107          |
| 8. Kirksdorightshire (Irland) Brit. Mus. Nr. 2245 . . . . .   | 570       | 335    | 87           | 114          |
| 9. Compiègne (Frankreich) Mus. Paris Nr. BV. 88 . . . . .   | 580       | 326    | 89           | 117          |
| 10. Peronne (bei Bala, Frankreich) Mus. Paris . . . . .   | 580       | 337    | 91           | 111          |
| 11. Rohenhessen (Schweiz) Lenzw. Samml. Zürich . . . . .  | 590       | 305    | 87           | 97           |
| 12. Elmbrücke (Utrecht) nach v. Meyer <sup>1)</sup> . . . . .   | 590       | 320    | 80           | 110          |
| 13. Königsberg (Preußen) nach Hittcher <sup>3)</sup> . . . . .  | 590       | 360    | 100          | 130          |
| 14. Thames Embankment (London) Brit. Mus. Nr. 46881 . . . . .   | 620       | 310    | 91           | 105          |
| 15. Monte Sacro (Rom) Mus. Paris . . . . .  | 620       | 339    | 91           | 120          |
| 16. " " " " Mus. Lyon . . . . .   | 623       | 286    | 80           | 99           |
| 17. Gare d'Orleans (Paris) Mus. Paris Nr. 1888-1 . . . . .  | 624       | 325    | 91           | 110          |
| 18. Abbéville (Frankreich) Mus. Paris Nr. 6855 . . . . .  | 625       | 330    | 90           | 115          |
| 19. Seeligenstedt (bei Frankfurt) nach v. Meyer <sup>1)</sup> . . . . .   | 625       | 363    | 111          | 120          |
| 20. ? (Frankreich), publiziert durch Faujas-St. Fonds <sup>4)</sup> , Curvier und H. v. Meyer, Mus. Paris . . . . . | 630       | 325    | 98           | 107          |
| 21. Athol (Perthshire, England) Brit. Mus. Nr. 36405 . . . . .  | 664       | 335    | 95           | 115          |
| 22. Compiègne (Frankreich) Mus. Paris Nr. 1184 . . . . .  | 665       | 334    | 93           | 117          |

<sup>1)</sup> H. v. Meyer, Über fossile Reste von Ochsen. Nov. Acta. Ac. Caes. Leop. Carol. 1835, p. 168.

<sup>2)</sup> Nehring, Das Horn eines Bos primigenius usw. Sitz.-Ber. Ges. nat. Fr., Berlin 1900, S. 1 bis 10, 2 Fig.

<sup>3)</sup> Hittcher, Untersuchungen von Schädeln der Gattung Bos usw. Königsberg 1888. Inaug.-Dissert.

<sup>4)</sup> Nehring, Über vereinzelt gefundene Hornkerns usw. Verhdt. Berl. Ges. f. Anthrop. 1888, S. 341 u. 342.

<sup>5)</sup> Faujas-St. Fonds, Memoire sur deux espèces de boeufs etc. Ann. Mus. d'Hist. Nat. 1, II, p. 188-200.



Ausdruck findet, sind Variationen wahrnehmbar, dennoch sind dieselben nicht so beträchtlich, daß die ovale Form des Querschnittes darunter leiden könnte. Das Verhältnis stellt sich im Durchschnitt wie 1 : 1,26 dar.

Was die Furchung der vorliegenden Zapfen angeht, so zählt man sechs Stück in der Richtung der Hornwindung, die jedoch nicht sehr tief eingeschnitten sind.

Diese Furchen entstehen durch die Faltung der inneren Hornschichten, die bei dem fortwährenden Dickenwachstum des Hornzapfens größer geworden, nicht mehr in die äußeren, kleineren und engeren Hornkegel hineinpassen und sich infolgedessen einfallen müssen und zwar immer in der Richtung des stärksten Zuges.

Es scheint mir aus diesem Grunde nicht ganz zutreffend, wenn man versuchen will, die Zahl und Tiefe dieser Furchung für eine Tierart oder für die „Wildheit“ eines Tieres charakteristisch anzusehen. Es ist auf Grund der entwicklungsgeschichtlichen Beobachtungen klar, daß die Lage und Anzahl dieser Rinnen abhängig muß von der Stärke des Dickenwachstums der Zapfen, von deren Form, die durch die Torsion der Hornscheide bedingt ist, sowie von allen denjenigen Faktoren, die, wie Alter, Geschlecht, Ernährungszustand, Instande sind, auf dieselbe einwirken. Es muß demnach naturgemäß diese Furchung individuell variieren und kann ebenso gut bei anderen Cavicornien von derselben Hornform auftreten; ich habe dieselbe mehrfach bei *Poepagus grunniens* beobachtet.

Es würde den Rahmen dieser Abhandlung bei weitem überheben, wollte ich mich in eine ganz genaue Beweisführung einlassen, ich gedenke dies jedoch anderorts im Zusammenhang mit der Behandlung des mechanischen Moments der Horn- und Schädelentwicklung zu tun. Ich kann hier nur kurz in wenigen Worten die Variation dieses Merkmales bei der von mir untersuchten großen Anzahl von Primigenusschädeln und Hornzapfen hervorheben.

Annähernd furchenlose Hornzapfen haben nur junge oder weibliche Exemplare; als Typen erwähne ich den von Monte Sacro (Rom) im Museum in Paris, sowie den von

Levallois-Perret. Während der erstere fast glatt ist, ist der zweite rau und stark porös.

Eine tiefe Furche und mehrere schwächere ist ziemlich häufig. Typisch ist besonders der Schädelrest von Suen-hoa-fou (China) mit einer sehr tiefen, langen Furche oben und vier kleinen Furchen oben und hinten.

Noch häufiger sind mehrere fast gleich tiefe Furchen unten und hinten, während der Zapfen vorne und oben glatt ist. Typisch hierfür ist der Schädelrest von Compiègne des Museums in Paris, sowie der laughörnige Schädelrest von Ilford im Brit. Museum.

Rings um den ganzen Zapfen voll starker Furchen, jedoch hinten und unten am tiefsten, sind ebenfalls sehr viele Schädel. Ich zählte über 23 allein in den englischen Sammlungen. Als Typus kann hier gelten der Schädel von Arpajon, der erstmals durch Cuvier<sup>1)</sup> publiziert wurde und sich im Museum in Paris befindet.

Wir können daher generell in der Furchenentwicklung vier Stadien unterscheiden; das Anfangsstadium, meist Jugendstadium, ist furchenlos oder nur mit Gefäß- oder Hautfaltenrinnen. In solchem Zustande finden sich nur wenige der fossilen Schädel, d. h. es sind uns nur wenige solcher junger Exemplare erhalten geblieben. Mehr Zapfen weisen eine tiefe Furche und einige schwache, noch mehr unten und hinten viele, fast gleich tiefe, große Furchen auf, während sie vorne noch ganz glatt sind und am häufigsten sind die Hornzapfen, die ringsum gefurcht sind.

Wie gesagt, lassen sich dennoch keine bestimmten Regeln daraus ableiten, obgleich man schließen kann, daß die weniger gefurchten Zapfen meist jungen und weiblichen Tieren, die stark gefurchten alten und männlichen Tieren angehören. Die Individualität und alle darauf wirkende Einflüsse können aber hier große Variationen bedingen, die nur dann klar werden, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, daß der Hornzapfen eine Bildung der Haut ist, die in ihrer Form durch die Entwicklung der Hornscheide bedingt ist.

<sup>1)</sup> Cuvier, *Ossements fossiles*, T. VI, p. 302.

## Extremitäten.

Die vorzüglichen Arbeiten Rütimeyers<sup>1)</sup>, die neuerdings ihre Ergänzungen in den kritischen Beobachtungen Tscherskis<sup>2)</sup> gefunden haben, ermöglichen es uns, diesen Teil etwas summarischer zu behandeln, da wir sehr wohl über die Charaktere des Knochengerstes von *Bos primigenius* unterrichtet sind, während dies für seinen Schädel weit weniger der Fall ist.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Maße des distalen Endes des Humerus verschiedener großer Rinder einer Vergleichung unterzogen. Es fällt dabei der Rekord in der Größe einem Fossil aus Ambolisatra (Mada-

gaskar) zu, dessen schon in einem früheren Kapitel Erwähnung getan wurde. Ich habe dies Fossil, von dem sich viele Reste im Museum von Paris befinden, mit *Bubalus palaeindicus* oder *sive antiquus sive Bainii* identifiziert und werde dieses Wildrind wie die gleichzeitig vorkommende taurine Form anderorts besprechen. Es übertrifft in allem, besonders aber den Längenmaßen, die in dieser Tabelle keine Berücksichtigung finden können, den Ur wie auch den *Bison priscus*.

Nach diesen zusammengestellten Extremitätenmaßen ist leicht ersichtlich, daß die vorhandenen Urreste nicht zu den größten zählten. Die Maße sind durchweg unter oder mit den kleinsten der von Rütimeyer angegebenen Durchschnittszahlen. Es scheint daraus hervorzugehen, daß der erwähnte Hornzapfen und die Extremitätenknochen von demselben, noch

<sup>1)</sup> Rütimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 77 bis 109. Neue Denkschriften Allg. schw. Gesellsch. 1862, Bd. IX.

<sup>2)</sup> Tscherski, Wissenschaftl. Resultate der nensib. Expedition. Mémoires Ac. St. Pétersbourg, Tome XL, Nr. 1, p. 75—152, 1892.

| Dimensionen des Humerus  | <i>Bos primigenius</i><br>Schloßberg | <i>Bos primigenius</i><br>mit<br>Rütimeyer,<br>Fauna usw.<br>S. 95, 96. | <i>B. palaeindicus</i><br>Ambolisatra<br>(Madagaskar) | <i>Bison priscus</i><br>nach<br>Tscherski | <i>Bison europaeus</i><br>nach<br>Rütimeyer | <i>Bos gaurus</i><br>Recent<br>Indien | <i>Bos taurus</i><br><i>brachyceros</i><br>Schloßberg |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
|  | mm                                   | mm  | mm  | mm  | mm  | mm                                    | mm  |
| Längendurchmesser der Trochlea . . . . .                         | 98                                   | 104   | 115   | 109                                       | 93—95                                       | 96                                    | 63—70   |
| Durchmesser (Höhe) des inneren Endes der Trochlea . . . . .      | 58                                   | 63  | 125   | 71  | 50—60                                       | 59                                    | 36—59   |
| Durchmesser (Höhe) des äußeren Endes der Trochlea . . . . .      | 43                                   | 40—50   | 77  | 48  | 37—39                                       | 42                                    | 25—32   |
| Geringster Durchmesser des Humeruskörpers in der Mitte . . . . . | 60                                   | —   | 74  | 76  | —   | 62                                    | 37—44   |
| Geringste Breite des Humerus ebendasselbst . . . . .             | 52                                   | —   | 64  | 60  | —   | 55                                    | 28—36   |

| Dimensionen des Radius   | <i>Bos primigenius</i><br>Nr. 128<br>Schloßberg | <i>Bos primigenius</i><br>Mittel nach<br>Rütimeyer<br>S. 98 | <i>Bos primigenius</i><br>China (Mus.) | <i>Bos primigenius</i><br>Nr. 127<br>Schloßberg | <i>Bos primigenius</i><br>China | <i>Bos gaurus</i><br>Indien | <i>B. palaeindicus</i><br>Ambolisatra<br>(Madagaskar) |
|--|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
|  | mm  | mm  | mm                                     | mm  | mm                              | mm                          | mm  |
| Größte Breite des distalen Endes des Radius                                  | 102   | 102—113   | 93                                     | —   | —                               | —                           | 110   |
| Größter Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten . . . . . | 61  | —   | 65                                     | —   | —                               | —                           | 67  |
| Durchmesser von vorn nach hinten in der Mitte des Radialkörpers . . . . .    | 40  | —   | 48                                     | 36  | 35                              | 38                          | 46  |
| Breite in der Mitte des Radialkörpers . . . . .                              | 64  | —   | 38                                     | 64  | 49                              | 62                          | 68  |
| Größte Breite des proximalen Endes des Radius . . . . .                      | —   | 108 (7)   | —                                      | 110   | 97                              | 110                         | 122   |
| Durchmesser von vorn nach hinten seines inneren Abschnittes . . . . .        | —   | —   | —                                      | 60  | 57                              | 57                          | 63  |



| Dimensionen des Femur  | Schloßberg             | Schloßberg             | n. Tscherski            | n. Tscherski  | Bos gaurus |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|
|  | Bos primig.<br>Nr. 509 | Bos primig.<br>Nr. 254 | Bos primig.<br>Scoticus | Bison priscus | Indien     |
|  | mm                     | mm                     | mm                      | mm            | mm         |
| Breite des distalen Endes . . . .                                | 142                    | 139                    | 140                     | 144           | 161        |
| Durchmesser des äußeren Condylus<br>der distalen Rolle . . . . . | 75                     | 61                     | —                       | 136           | 78         |

| Dimensionen des Astragalus              | Schloßberg<br>Bos primig.<br>Nr. 350 | Bos primig.<br>nach<br>Röttmeyer | Bos gaurus<br>Indien | Bos taurus<br>nach<br>Röttmeyer | Schloßberg             |         |         |         |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|   |                                      |                                  |                      |                                 | Bos taurus brachyceros |         |         |         |
|   |                                      |                                  |                      |                                 | Nr. 318                | Nr. 319 | Nr. 316 | Nr. 317 |
|   | mm                                   | mm                               | mm                   | mm                              | mm                     | mm      | mm      |         |
| Volle Höhe an der äußeren Seite . . . . | 79                                   | 83—89                            | 81                   | 74                              | 58                     | 59      | 62      | 63      |
| Breite der oberen Gelenkrolle . . . . . | 52                                   | 51—58                            | 55                   | 43                              | 37                     | 38      | 40      | 39      |
| Volle Dicke . . . . .                   | 42                                   | 46—51                            | 44                   | 40                              | 32                     | 32      | 34      | 35      |

jüngeren Exemplare stammen, welches, nm mit Nehring und Hensel zu sprechen, zu den „Zwergen“ seiner Art gehörte. Also war nur ein einziges Individuum des Ur unter den Küchenabfällen der Schloßberger vorhanden und dies Tier wohl schon ziemlich selten und schwer erlegbar.

#### Das Verhältnis der prähistorischen Haustiere der Germanen zu denjenigen der umgebenden Länder.

Wir stehen am Schlusse unserer Betrachtungen. Vieles ist uns durch dieselben über die Haustierwelt der germanischen Urzeit klarer geworden.

Wir haben erkannt, daß an eine völlige Abgeschlossenheit eines Stammes, einer Gens, gegen die sie umgebenden Völker nicht gedacht werden kann, da die Haustiere der Germanen mit denen der sie umgebenden Völker durchaus identisch sind. Das schon von Tacitus und Cäsar geschilderte Nomadenleben der suevischen Völkerschaften wurde durch ihre ausgedehnte Viehzucht und deren Erfordernisse bedingt. Bezeichnet doch Cäsar selbst diese Völker als Viehzüchter, die sich weniger von Getreide als von der Milch und dem Fleische ihrer Herden ernähren (Bell. gall. IV, 1). Bei unserer Bestimmung fanden wir diese Angaben durchaus bestätigt, indem sich die Viehzucht der Schloßbergbewohner als eine bedeutend

umfangreichere darstellte, wie diejenige der schweizerischen Pfahlbauer, deren Hauptaufgabe der Ackerbau war.

Es werden wohl die Züge der viehzüchtenden Nomaden gewesen sein, die bei den seßhaften Ackerbauvölkern die einzelnen Viehrassen verbreiteten. Der Herdenhaltung wegen waren diese Wandervölker so beweglich und suchten den Wohnsitz häufig wechseln, um ihrem Vieh und damit sich selbst neue Nahrung zu verschaffen. Darum begegnen wir denn in allen mittel- und nordeuropäischen Ländern während der gleichen Epoche meist den gleichen Haustieren.

Ich habe begonnen, die vorkommenden Haustiere je nach den verschiedenen Epochen in Karten bei ihren Fundorten einzutragen. Dennoch ist dieser Versuch, obwohl er sich schon auf 68 Fundorte bezieht, noch zu unvollkommen, um neue Anschauungen darauf gründen zu können. Deshalb ordne ich die dabei erhaltenen Resultate in einer Tabelle, wobei allerdings die lokale, allmählich fortschreitende Verbreitung der Formen nicht sichtbar wird. Es ist durchaus nicht bewiesen, daß die in nachfolgender Tabelle für eine Gegend aufgeführte Spezies oder Rasse über das ganze Land verbreitet war, sondern es kann nur ein einziger Rest an einem einzigen Punkte gefunden worden sein. Ich habe es sedann vermieden, die große Anzahl der aufgestellten Lokalrassen

und Spezies aufzuführen, durch deren verschieden gebildeten Namen man die Auffassung erhält, man hätte es wirklich mit etwas tatsächlich Verschiedenem zu tun. Ich habe im Gegenteil diese Formen zu identifizieren gesucht, wie ich es auch in dieser Abhandlung durchführte. Denn es scheint meines Erachtens mehr im Interesse der urgeschichtlichen Forschung zu liegen, den Zusammenhang der einzelnen Hausterrassen verschiedener Länder unter sich und deren zeitliche und örtliche Veränderungen verfolgen zu können, als instande zu sein, für Jede Gegend verschiedene Lokalrassen prähistorischer Haustiere aufzuzählen, die aber im Grunde genommen mit den Formen anderer Gegenden harmonieren. Ich habe deshalb auf Grundlage meiner eigenen Beobachtungen an 32 prähistorischen Fundstellen Englands, Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz, sowie mit Benutzung der über jeden Zweifel im Bestimmen der Haustierknochen erhabenen Arbeiten von Nehring, Rättemeyer, Studer und einiger weniger anderer Forscher die kleine nachfolgende Tabelle auf S. 292 u. 293 zusammengestellt.

Sie macht durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch gibt sie schon eine gewisse Wegleitung für das Bestimmen der Haustierformen und wird im Laufe der Zeit schon verbessert und umgestaltet werden.

Am schwierigsten ist die Ermittlung der Angehörigkeit zur letzten Epoche der Quaternärzeit oder zum Beginne der neolithischen Zeit, da die Meinungen der kompetenten Gelehrten hier noch recht verschiedene sind.

Leith Adams faßt z. B. die Haustierreste der postpliozänen Höhlen von Shandon und Ballynamtra als quaternär auf. Ich habe sie darum mit Vorbehalt in dieser Epoche angeführt, weil ich auch in anderen englischen Sammlungen Torfschaf- und Torfrindersehädelreste als aus dem New Forest Bed stammend bezeichnet fand. *Bos brachyceros* ist wahrscheinlich, wenn auch spärlich, in der paläolithischen Periode des Schweizerlandes vertreten, die neuen Ausgrabungen von Thaining werden uns demnächst wohl darüber aufklären. Nehring erwähnt ihn ebenfalls mit Vorbehalt an

dem Quaternär von Nußdorf bei Wien. Ich selbst kenne ihn aus verschiedenen französischen Fundorten, die ebenfalls zum Quartär gerechnet werden.

Das kleine eselartige *E. c. Nehringi* treffen wir sicher zur Diluvialzeit in nordfranzösischen Stationen; ebenfalls finden sich auch seine kleinen Knochen und einfachen Zähne in den englischen Höhlen. Wie sich das kleine Pferd von Thaining oder der Wildesel von Gera zu diesen Funden stellt, mit denen sie wohl in Größe und Charakteren viel Ähnlichkeit aufzuweisen scheinen, entzieht sich meiner Beobachtung. *E. c. robustus* ist in Frankreich wie in Deutschland diluvial und auch aus späteren Epochen gefunden worden. Zu welcher Hundestammform der quaternäre *Canis hibernicus* (?) von Ballynamtra gehört, weiß ich ebenfalls nicht zu ermitteln.

*Bos primigenius* ist in dieser Zeit überall, mit Ausnahme Irlands, vorhanden, jedoch bloß in wildem Zustande.

Klar ist aber, daß der diluviale Mensch noch keine ausgedehnte Viehzucht haben konnte, wenn er nicht das Rentier schon ebenso benutzte wie der hentige Nordländer.

Denn mit dem Beginne der neolithischen Periode tritt ganz unvermittelt eine ganze vollständige Haustierfauna auf, die man sehr gut als „Torffauna“ bezeichnet hat.

Diese ist durchweg für alle europäischen Länder dieselbe, wenigstens in den Haupttypen Schwein, Rind, Schaf und Ziege. Sie variiert bei Pferd und Hund, weshalb es nicht unwahrscheinlich ist, daß diese Tiere durch die Neolithiker lokal in den Hausstand übergeführt wurden.

In der Schweiz fehlt das Pferd bis zur Bronzezeit fast gänzlich, nur aus dem neolithischen Wauwil sind zahlreiche Knochen eines sehr großen Pferdes (*E. c. robustus*) und solche eines sehr kleinen (*E. c. Nehringi*) zum Vorschein gekommen. Es kamen diese Pferde wohl nur äußerst selten durch die Viehzucht treibenden Wanderhorden zu den ansässigen Pfahlbauern, die ihrer ebensowenig bedurften wie die Israeliten, als sie auf Moes und Josuas Geheiß den erbeuteten Pferden die Sprunggelenke zerschnitten.

| Epochen  |  | Schweiz   |   |  |  |  |  |
|----------|--|---|---|--|--|--|--|
|          |  | Hund  | Schwein   | Pferd  | Rind   | Schaf  | Ziege  |
| Diluvium | Paläolithische                             |   |   |  | Bos primigenius Boj.<br>B. t. brachyceros (?)          | O. palustris   |  |
|          | Neolithische<br>(ältere neolithische Zeit) | C. palustris<br>(Torfhand)                                | S. palustris<br>(Torfschwein)<br>S. scrofa dom. | E. e. rob. ?<br>E. e. Nehringi                                       | B. t. brach.<br>(Torfrind)                             | O. palustris<br>(Torfschaf)                              | C. hircus<br>(Torfziege)                       |
|          | Kupferzeit<br>(jüngere neolithische Zeit)  | C. palustris<br>C. Inostranzewi<br>C. Leineri             | S. palustris<br>S. scrofa dom.                  | E. e. rob.<br>E. e. Nehringi   | B. t. brach.<br>B. t. primig.<br>(H. t. akera-<br>tau) | O. palustris<br>O. Studeri<br>(Kupfer-<br>schaf)         | Torfsiege<br>C. Kellerei<br>(Kupfer-<br>ziege) |
|          | Bronzezeit                                 | C. palustris<br>C. Inostranzewi<br>C. matrix<br>optima    | S. palustris<br>S. scrofa dom.                  | E. e. Nehringi<br>E. e. orientales<br>= Helvetogalli-<br>sches Pferd | B. t. brach.<br>B. t. primig.                          | O. palustris<br>O. Studeri<br>O. ?<br>(Bronze-<br>schaf) | C. hircus<br>Kupfer-<br>siege                  |
|          | (Schloßberg)<br>Eisenzeit                  | C. palustris<br>(?) C. Inostranzewi<br>(Windo-<br>oisina) | S. palustris<br>S. scrofa dom.                  | Helvetogalli-<br>sches Pferd   | B. t. brach.<br>B. t. primig.                          | O. palustris<br>Ovis (Römer-<br>schaf)<br>O. Studeri     | C. hircus<br>Kupfer-<br>ziege                  |
|          | Slawenzeit<br>(Völkerwanderungszeit)       | C. palustris  | S. palustris<br>S. scrofa dom.                  | E. e. ?  | B. t. brach.<br>B. t. primig.                          | O. palustris<br>O. Studeri ?<br>O. ? (Römer-<br>schaf)   | C. hircus                                      |

## Frankreich

|          |  |              |                                   |   |   |   |                          |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Diluvium | Paläolithische                             |              |                                   | E. e. Nehringi<br>E. e. robustus                        | Bos t. primigenius Boj.<br>Bos. t. brach. |   |                          |
|          | Neolithische<br>(ältere neolithische Zeit) | C. palustris | S. palustris<br>S. scrofa domest. | E. e. robustus<br>E. e. Nehringi                        | B. t. brachy.                             | O. palustr.                                 | C. hircus<br>(Torfsiege) |
|          | Kupferzeit<br>(jüngere neolithische Zeit)  | C. palustris | S. palustris<br>S. scrofa domest. | E. e. robustus<br>E. e. Nehringi                        | B. t. brachy.<br>B. t. primig.            | O. palustr.<br>O. Studeri                   | C. hircus<br>(Torfsiege) |
|          | Bronzezeit                                 | C. palustris | S. palustris<br>S. scrofa domest. | E. e. robust.<br>E. e. Nehringi<br>E. e. orient. ?      | B. t. brachy.<br>B. t. primig.            | Ovis palustr.<br>Ovis Studeri               | C. hircus<br>(Torfsiege) |
|          | (Schloßberg)<br>Eisenzeit                  | C. palustris | S. palustris<br>S. scrofa domest. | E. e. robust.<br>E. e. Nehringi<br>E. e. orient.        | B. t. brachy.<br>B. t. primig.            | Ovis palustr.<br>Ovis Studeri<br>Römerschaf | C. hircus<br>(Torfsiege) |
|          | Slawenzeit<br>(Völkerwanderungszeit)       |              | S. palustris<br>S. scrofa domest. | E. e. robustus dom.<br>E. e. Nehringi<br>Helvetog. Pfd. | B. t. brachy.<br>B. t. primig.            | Ovis palustr.<br>Ovis Studeri<br>Römerschaf | C. hircus<br>(Torfsiege) |

| Epochen                                 |               | Norddeutschland  |                                |  |   |                                      |                                      |
|---|---------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |               | Hund   | Schwein                        | Pferd  | Rind  | Schaf                                | Ziege                                |
| Diluvium                                | (New-Forest)  |  |                                | E. c. robustus   | Bos primig. Boj.                                |                                      |                                      |
|   | Paläolithisch |  |                                |  |   |                                      |                                      |
| Neolithische (ältere neolithische Zeit) |               | C. palustris<br>[C. Inostranzewi]                                  | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. robustus   | B. t. brachyceros<br>B. t. akaratia             | O. a. palust.                        | C. hircus (Torfziege)                |
| Kupferzeit (jüngere neolithische Zeit)  |               | C. palustris<br>C. matris opt.<br>C. Inostranzewi                  | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. robustus<br>E. c. Nehringi                       | B. t. brachy.<br>B. t. akarat.<br>B. t. primig. | O. a. palust.<br>O. a. Studeri       | C. hircus (Torfziege)<br>Kupferziege |
| Bronzezeit                              |               | C. palustris<br>C. Inostranzewi (?)<br>C. matris optimae           | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi<br>E. c. robustus dom.                  | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                  | O. a. palust.<br>Ovis Studeri        | C. hircus (Torfziege)                |
| (Schloßberg) Eisenzeit                  |               | C. palustris (?)<br>C. Inostranzewi                                | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi<br>E. c. rob. dom.<br>E. c. orient. (?) | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                  | Ovis palust.<br>Ovis Studeri<br>Ovis | C. hircus (Torfziege)                |
| Slawenzeit (Völkerwanderungszeit)       |               | C. palustris<br>C. ileuomanus<br>C. Inostranzewi<br>C. matris opt. | S. scrofa dom.<br>S. palustris | E. c. rob. dom.<br>E. c. Nehringi<br>E. c. orient. (?) | B. t. brachy.<br>B. t. primig.                  | Ovis palust.<br>Ovis Studeri         | C. hircus (Torfziege)                |

## England

|   |               |                               |                                |                                  |   |  |                       |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Diluvium                                | Paläolithisch | C. hibernicus                 | S. scrofa dom.                 | E. c. Nehringi (?)               | Bos primigenus Boj.<br>B. t. brachy.                                  | Ovis palustris                                   |                       |
|   |               |                               |                                |                                  |   |  |                       |
| Neolithische (ältere neolithische Zeit) |               | C. hibernicus                 | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi                   | B. t. brachy.   | Ovis palust.                                     | C. hircus (Torfziege) |
| Kupferzeit (jüngere neolithische Zeit)  |               |                               | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi                   | B. t. brachy.<br>B. t. akarat.  | Ovis palust.<br>Ovis Studeri                     | C. hircus (Torfziege) |
| Bronzezeit                              |               |                               | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi                   | B. t. brachy.<br>B. t. akarat.<br>B. t. frontosus (?)                 | Ovis palust.<br>Ovis Studeri                     | C. hircus (Torfziege) |
| (Schloßberg) Eisenzeit                  |               | C. mat. optimae<br>C. Leineri | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi<br>E. c. orient.  | B. t. brachy.<br>B. t. akarat.<br>B. t. prim. (?)<br>B. t. front. (?) | Ovis palust.<br>Ovis Studeri<br>Ov. (Römerschaf) | C. hircus (Torfziege) |
| Slawenzeit (Völkerwanderungszeit)       |               |                               | S. palustris<br>S. scrofa dom. | E. c. Nehringi<br>E. c. rob. (?) | B. t. brachy.<br>B. t. akarat.<br>B. t. prim. (?)<br>B. t. front. (?) | Ovis palust.<br>Ovis Studeri<br>Römerschaf       | C. hircus (Torfziege) |

In der Kupferzeit — ich habe mir erlaubt, diesen klaren Ausdruck für die sehr zweifelhaft begrenzte spätere neolithische Zeit zu wählen — tritt allgemein das große Hausrind von primigenem Charakter auf und fast gleichzeitig das Kupferschaf. In den südlichen Stationen der Schweiz und Frankreichs treffen wir auch hier und da auf die großhörnige ägagrusartige Kupferziege, die aber meines Wissens nicht weiter nordwärts gelangte.

Die als *Bos taurus akeratos* bezeichnete hornlose Rinderform entstand und entsteht noch jetzt spontan unter sonst gehörnten Schlägen und bildete damals wohl noch keine konstante Form, wie dies jetzt in weiten Ländern der Fall ist.

In der nun folgenden Bronzezeit tritt im Süden zuerst das hornlose Bronzeschaf auf, dessen Typus aber durchaus noch nicht unanfechtbar und es nicht ausgeschlossen ist, daß es eine weibliche Form einer der beiden anderen Rassen darstellt. Um diese Zeit nehmen wir im helveto-gallischen Pferde schon die Wirkungen des Imports orientalischer Pferderassen wahr, die sich durch die Römer dann auch nach England erstreckten. Hier begegnet uns zu dieser Zeit schon das Rind des *Frontosustypus* und eine andere primigeniusartige Form. Zur

Römerzeit findet das polycerate Schaf eine allgemeine Verbreitung.

An den Hunden und Pferden allein ist die Richtung der Wanderungen der Haustiere nicht immer wahrnehmbar. Der *Canis Inostranzewi* und der *Canis Leineri* und wohl auch die heiden europäischen Pferde sind vom Norden nach dem Süden gezogen; bei den anderen Haustieren jedoch treffen wir die Zugrichtung von Süden nach Norden an.

Ein Beweis dafür ist, daß sich heutzutage die Haustiere der Schloßbergbewohner noch im Norden in derselben Form vorfinden und nur wenige Individuen inslar in abgelegenen Gegenden des Kontinents wohnen geblieben sind:

Der Hund (*Canis fam. Inostranzewi*) findet sich in Skandinavien, Sibirien, Grönland; das Schwein (*Sus serof. palustris*) in Island und einigen Alpentälern;

das Pony (*E. cah. Nehringi*) in Island, Schottland, Hebriden, Schottland, Irland und der Bretagne;

das Rind (*B. t. brachyceros*) in Island, Sibirien, Bretagne usw.;

das Schaf (*O. a. palustris*, Torfschaf) in Island, Wales, Hebriden, Färöer und Graubünden; das Kupferschaf (*O. a. Stenderi*) in Island, Hebriden, Färöer.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

## XII.

### Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson in ihrer Tragweite für die Anthropologie.

Von Dr. K. E. Ranke und Dr. Greiner, Arosa.

Das Thema des vorliegenden Referates ist dem Grenzgebiete zweier Wissenschaften, der Mathematik und der Anthropologie entnommen. Es liegt also in der Natur des Problems begründet, daß zu seiner möglichst umfassenden Erledigung eine Verbindung von Vertretern der beiden Wissenschaften sehr wünschenswert erscheinen mußte. Die beiden genannten Autoren haben sich daher zu diesem Zweck vereinigt und die Vorstudien zum größten Teil gemeinsam unternommen. Die Zusammenstellung der gefundenen Resultate und im wesentlichen auch die Abfassung des hier vorliegenden Textes ist dann von Dr. Ranke übernommen worden. Wenn einzelne Textstellen oder Anmerkungen ausschließlich von der Hand Dr. Greiners stammen, sollen sie daher durch Klammern von der nebenstehenden Form [ ] kenntlich gemacht werden. Die Anteile der beiden Autoren vollständig zu unterscheiden ist aber nach der Art des Zustandekommens dieser Arbeit unmöglich, da alles wichtige erst nach eingehender gegenseitiger Besprechung endgültig formuliert worden ist. Doch trägt natürlich Dr. Greiner die Verantwortung für das rein mathematische, Dr. Ranke, dessen Bedürfnis sich über das für die Anthropologie brauchbare in diesen neuen Theorien zu informieren die vorliegende Zusammenfassung ihre Entstehung verdankt, diejenige für den biologischen Anteil.

Das älteste Problem der Variationsstatistik ist die Frage nach einem exakten Vergleichungsmodus variierender Maße verschiedener Varietäten und Spezies.

Die Wichtigkeit desselben für die Anthropologie ergibt sich ohne weiteres daraus, daß nahezu alle ihre Schlüsse aus der Vergleichung der variierenden Eigenschaften der einzelnen Varietäten des Menschengeschlechts gezogen werden müssen. Bei der großen Variationsbreite, die sich auf alle Teile aller Organismen, auf alle ihre Maße und alle ihre sonstigen anatomischen und physiologischen Eigenschaften erstreckt, ist es von vornherein klar, daß das Einzelmaß des Individuums nicht zu diesem Gebrauch benutzt werden darf, aneb wegen der die menschliche Vorstellungskraft weit übersteigenden Zahl der Kombinationsmöglichkeiten gar nicht benutzt werden kann. Man muß also versuchen, aus der Summe der Einzelmaße eine vergleichbare Zahl zu abstrahieren.

Wie sich schon hier ergibt, ist unser Problem in letzter Instanz ein rein mathematisches, und kann am besten formuliert werden als die Frage nach einer möglichst kurzen, möglichst handlichen Beschreibung der zu vergleichenden Reihen durch eine kleine Anzahl möglichst einfach zu berechnender Parameter \*).

\*) Ein Parameter ist ein stellvertretendes Maß, das zu Vergleichszwecken benutzt werden kann. So ist z. B. der Durchmesser des Kreises ein Parameter desselben, und da mit der Kenntnis desselben auch alle anderen Größen- und Formeigenschaften des betr. Kreises ge-

Hente kennen wir nun allerdings eine Anzahl verschiedener Kurvenformen, die sich alle als empirische Variationspolygone, wenn auch sehr verschiedener Gegenstände, gefunden haben. Damit ist die einheitliche Lösung der Aufgabe schon von vornherein in Frage gestellt. Denn es muß schon aus den ersten Überlegungen klar werden, daß unser Problem nur dann eine relativ einfache Lösung zuläßt, wenn alle in Betracht kommenden Reihen gleiche oder doch sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen, so daß sie auch durch eine einzige Formel beschrieben und durch die gleichen Parameter charakterisiert werden können. Die Vergleichung wird aber ganz unmöglich, wenn die Reihen in sich verschieden, das heißt nach verschiedenen Gesetzen zustande gekommen sind und infolgedessen durch ungleichwertige Parameter beschrieben werden müssen. Das Problem der Reihenvergleichung enthält also ein weiteres im Keime, die Frage nach dem Verteilungsgesetz oder den Verteilungsgesetzen der Variationsreihen.

So kompliziert wie heute schien allerdings das Problem nicht immer und wenn wir nun zu besserem Verständnis der verschiedenen im Laufe der Zeiten gegebenen Lösungen diese in ihrer historischen Entwicklung zu schildern versuchen, so finden wir am Anfang unserer Betrachtung, — als sich zum erstenmal etwas aus dem Chaos abzulösen begann, — eine Generation von Forschern, die mit sehr viel primitiveren Kenntnissen rechnen mußte. Ihnen ist von den verschiedenen Formen der Variationsreihen wohl überhaupt nichts bekannt gewesen, als die eine Äußerung ihres Vorhandenseins, daß die Mittelwerte für gleiche Maße, das heißt also von gleichwertigen Reihen der gleichen Gegenstände, sich in auffallender Weise konstant zeigten.

Nichts mußte ihnen daher näher liegen, als eben den Mittelwert zur Vergleichung heranzuziehen, dessen praktische Brauchbarkeit für

geben sind, zugleich der einzige der für Vergleichung von Kreisen untereinander in Betracht kommt, so lange wir von der Lage der Kreise abstrahieren. Wollen wir Ellipsen vergleichen, so müssen wir zwei Parameter, die größte und kleinste Achse benutzen, da erst die Kenntnis beider eine vollständige Kenntnis der Gestalt der betreffenden Ellipse übermitteln usw.

derlei Fragen ja schon lange bekannt gewesen und es ist ein gutes Zeugnis für die Sicherheit derartiger instinktiver Überlegungen, daß diese Vergleichung der Mittelwerte mit dem Waßens unserer Kenntnisse zunächst nur immer weiter reichende Begründungen gefunden hat.

Die erste derselben ergab sich mit der Formulierung des Begriffes der mathematischen Erwartung\*) einer Reihe zufälliger einander ausschließender Ereignisse, in der man wieder gerade den Mittelwert erkannte. Es konnte daher der Mittelwert auch als derjenige Wert definiert werden, von dem bei fortgesetzten Messungen die Gesamtheit aller noch kommenden Maße am wenigsten abweichen werde, vorausgesetzt, daß die vorhandenen Messungen nach Zufall aus der Gesamtheit herausgegriffen waren, so daß sie — innerhalb der Grenzen des Zufalls — die einzelnen Größenstufen im gleichen Prozentsatz enthielten, in dem sie in der Gesamtheit vorhanden waren\*\*).

Da sich durch die Vergleichung der Mittelwerte praktisch brauchbare Resultate ergaben, mußten für die anthropologischen Objekte die

\*) Die mathematische Erwartung eines Spielers oder eines Wettenden z. B. ist gleich dem Gewinn des Spieles oder der Wette, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, daß der betreffende Spieler gewinnt. Erweitert gilt diese Definition für alle möglichen Größen. Vgl. Czuber (1), S. 149: „die auf eine einzelne Summe bezügliche mathematische Erwartung ist das Produkt aus der Summe und der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung, und die auf eine Reihe einander anschließender Eventualsummen bezügliche mathematische Erwartung gleich der Summe der Erwartungen, welche die einzelnen Beträge betreffen“.

\*\*) Die Bildung des Mittelwertes einer Reihe erfolgt bekanntlich dadurch, daß man die einzelnen Größenstufen mit ihrer relativen Häufigkeit, das heißt also mit ihrer empirischen Wahrscheinlichkeit multipliziert und nun die Summe dieser Produkte bildet. Der in praxi eingeschlagene Weg der Berechnung, die Größenstufen mit ihrer absoluten Häufigkeit zu multiplizieren, diese Produkte zu summieren und dann die Summe durch die Anzahl der in die Reihe eingehenden Maße zu dividieren, ist ja mit dem eben geschilderten gleichwertig. Darf man nun annehmen, die relativen Häufigkeiten der Größenstufen seien innerhalb enger Grenzen ihren Wahrscheinlichkeiten gleichzusetzen, das heißt ist die Reihe rein nach Zufall ohne jedes Auswahlprinzip aus der Gesamtheit der Maße herausgegriffen, so ist der Mittelwert als Summe der Größenstufen multipliziert mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten ohne weiteres auch die mathematische Erwartung der Reihe.



## Abbildungen auf Tafel XVI bis XX.

### Tafel XVI.

- Fig. 1. Schädelrest von *Sus scrofa palustris*. Rüttimeyer.  
 Fig. 2 a. Flachgedrückter Hornzapfen von der Seite, *Bos taurus brachyceros*.  
 Fig. 2 b. Wenig abgeflachter Hornzapfen von oben.  
 Fig. 2 c. Normaler Hornzapfen von demselben mit Schlafengrubenrest.  
 Fig. 2 d. Frontalrest eines Kalbes.  
 Fig. 3 a. Hornzapfen von *Ovis aries* Studeri, Knipfersehaf, Duerst.  
 Fig. 3 b. Hornzapfen von *Ovis aries palustris*. Rüttimeyer.  
 Fig. 3 c. Hornzapfen eines Bastardes zwischen den beiden vorgenannten Formen.  
 Fig. 3 d. Hornzapfen einer Torfziege, *Capra hircus*, Rüttimeyer, Duerst.  
 Fig. 4 a. Metacarpus von *Ovis aries* Studeri.  
 Fig. 4 b. Metacarpus von *Ovis aries palustris*.  
 Fig. 4 c. Metatarsus von *Ovis aries palustris*.  
 Fig. 4 d. Kleinster Metacarp. von *Bos taur. brachyceros*.  
 Fig. 4 e. Größter Metacarp. von *Bos taur. brachyceros*.  
 Fig. 4 f. Metatarsus von *Bos taurus brachyceros*.

### Tafel XVII.

- Fig. 1 a. Schädelrest von *Canis fam. Inostranzewi*.  
 Fig. 1 b. Humerusrest mit distal. Ende desselben Tieres.  
 Fig. 1 c. Unterkiefer von *Canis fam. Inostranzewi*.  
 Fig. 2 a. Unterkieferrest von *Bos taurus*.  
 Fig. 2 b. Unterkieferrest des Pferdes.  
 Fig. 3 a. Restaurierte linke Vorderextremität von *Equus caballus* Nehringi (n. subsp.).  
 Fig. 3 b. Restaurierte rechte Hinterextremität desselben Tieres.

- Fig. 3 c. Restaurierter Teil der linken Hinterextremität von *Equus cab. robustus*, Nehring.

### Tafel XVIII.

- Fig. 1 a. Distales Ende des rechten Metacarpus von *Cervus Alees* Lin.  
 Fig. 1 b. Basalende einer linken Eltschaulen.  
 Fig. 1 c. Distales Humerusende von *Cervus Alees*.  
 Fig. 2. Schädelrest des hornlosen Rindes von Klein-Wanzleben (Magdeburg).  
 Fig. 3 a. Linker Hornzapfen des *Bos primigenius* Bojanus.  
 Fig. 3 b. Distales Humerusende desselben Tieres.

### Tafel XIX (Vergleichsstücke).

- Fig. 1. *Bos primigenius* Bojanus, von Athol (Schottland). Brit. Museum, London.  
 Fig. 2. *Bos taurus primigenius* Rüttimeyer, Torfmoore der Somme (Nordfrankreich). Museum in Paris.  
 Fig. 3. Stier der Rasse der Vendée. Museum in Paris.

### Tafel XX (Vergleichsstücke).

- Fig. 1. Isländische Kuh, *Bos taurus brachyceros*. Museum in Paris.  
 Fig. 2. Schädelstück von *Bos taurus brachyceros* aus Vetschan. Museum für Völkerkunde in Berlin.  
 Fig. 3. Schädelrest von *Bos taurus brachyceros*, Pfahlbau von Walthamstow (Essex). Brit. Mus. London.  
 Fig. 4. Schädel eines Torfschafes von Island. Museum in Paris.  
 Fig. 5. Schädelrest von *Ovis aries* Studeri, Altnivium bei London. Sammlung Corner.

Fig. 1.



Fig. 3 a.




Fig. 2 a.

Fig. 2 b.




Fig. 2 c.

Fig. 2 d.



Fig. 3 c.

Fig. 3 b.



Fig. 3 d.



Fig. 4 a.



Fig. 4 b.



Fig. 4 c.




Fig. 4 d.



Fig. 4 e.




Fig. 4 f.

Fig. 1a.



Fig. 1b.



Fig. 1c.




Fig. 2.



Fig. 3a.



Fig. 3b.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

Bedingungen einer begründeten Erwartungsbildung erfüllt sein. Da aber eine begründete mathematische Erwartung nur gebildet werden kann, wenn die Ereignisse oder Gegenstände sich in irgendwie festgelegter Weise um einen fixen Mittelpunkt anordnen, so weist auch diese Begriffsbildung und die Erkenntnis ihrer praktischen Brauchbarkeit sofort weiter auf die Frage nach dem Verteilungsgesetze der betrachteten Erscheinungen. Wir sehen denn auch in der Folge eine immer weiter eindringende Erforschung der Natur dieses Gesetzes und des Kreises der ihm gehörenden Erscheinungen.

Die Gaußsche Entdeckung des Fehlergesetzes, am Anfang des 19. Jahrhunderts, bildete einen gewaltigen Fortschritt an. Das für uns wesentliche dabei ist, daß in demselben ein Gesetz aufgefunden wurde, nach dem sich die einzelnen Beobachtungsfehler um ihr arithmetisches Mittel anordnen sollten, und wie die Erfahrung bald in ausgedehntestem Maße bewies, auch tatsächlich anordnen, wenn auch immer nur annäherungsweise. Daraus ergab sich ohne weiteres, daß der Mittelwert als der theoretisch wahrscheinlichste — also innerhalb der Grenzen des Zufalls nach empirisch der häufigste — Wert der Fehlerreihe betrachtet werden mußte.

Damit war in der Geschichte unseres Problems ein entscheidender Schritt vorwärts getan worden. Denn in dem Fehlergesetz war eine sich praktisch bewährende Form des supponierten Verteilungsgesetzes gefunden, allerdings zunächst nur für eine bestimmte engbegrenzte Gruppe von Erscheinungen. Sehr bald zeigte sich aber, daß das Fehlergesetz nicht nur für Fehler, sondern für eine große Mannigfaltigkeit anderer variierender Dinge eine mehr oder minder strenge Gültigkeit besaß. Das Fehlergesetz fand damit Eingang in praktische Statistiken verschiedener Art, unter anderem auch in die Bevölkerungsstatistik und in Anthropologie und Zoometrie. Da Fechner (16) und Pearson (20 und 21) gerade diesem Stadium der Auffassung entgegengetreten, ist es für unser Verständnis dieser beiden von großer Wichtigkeit, und wir müssen etwas länger bei ihm verweilen. Die Gedankengänge, zu denen man

auf Grund der nahen Übereinstimmung einer großen Anzahl von Variationsreihen mit dem Fehlergesetz gelangen mußte und die ich gleich in der üblichen Anwendung auf die organische Variation schildere, sind etwa die folgenden.

### I. Fehlergesetz.

Überall wo menschliche Geschicklichkeit ein genaues Resultat erzielen möchte, z. B. bei der Messung jeder Größe mit jeder möglichen Methode, bei den Versuchen, ein bestimmtes Ziel mit allen vom Menschen seit den Uranfängen der Kultur erfundenen Hilfsmitteln der Ballistik zu treffen, bei jedem Versuch ein Ding genau nachzubilden, ergeben sich ausnahmslos kleine Unterschiede der erreichten Resultate von dem Urbild oder Abweichungen von dem gesteckten Ziel. Alle die erreichten Resultate weichen also mehr oder weniger untereinander ab. Messen z. B. zwei Leute ein und dieselbe Größe in einer im Verhältnis zur gemessenen Größe hinreichend kleinen Maßeinheit, so werden die Resultate nicht übereinstimmen. Aber auch wenn ein und derselbe Beobachter das gleiche Maß wiederholt nimmt, werden seine verschiedenen Messungen desselben Gegenstandes untereinander Verschiedenheiten aufweisen.

In der Anordnung all dieser kleinen Abweichungen läßt sich nun ein allgemeines Gesetz nachweisen. Wenn die Zahl der Schüsse nach der Scheibe oder der Messungen ein und derselben Größe nur hinreichend groß ist, so ordnen sie sich in regelmäßiger Weise zwischen das gefundene Maximum und Minimum ein. Die Kurve, die man dadurch erhält, daß man über den Abweichungen vom Mittelwert als Abszissen ihre relative Häufigkeit als Ordinaten aufträgt, zeigt stets eine überraschende Regelmäßigkeit; die einzelnen so erhaltenen Kurven besitzen eine unverkennbare geometrische Verwandtschaft und lassen sich innerhalb enger Grenzen durch die Gaußsche Fehlerfunktion beschreiben.

Die allgemeine Formel dieser Kurve ist  $y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-k^2 x^2}$ . Die einzelnen Formen dieses Kurven-Typs unterscheiden sich also nur

durch die Größe  $h$  voneinander, die sich aus den Abweichungen der einzelnen Werte vom Mittelwert unschwer berechnen läßt. Für diese Art Erscheinungen ist also die eingangs formulierte Aufgabe, die Variationsreihen durch eine möglichst kleine Anzahl unschwer zu berechnender Parameter zu beschreiben, glänzend gelöst. Der eine Parameter  $h$  ist direkt proportional der Genauigkeit der Beobachtungen und wird infolgedessen auch Präzisionskonstante genannt. Je kleiner sie ist, desto breiter ist der Gipfel der Kurve und desto größer ist die Strecke der  $x$ -Achse, über der endliche Anzahlen von Abweichungen bis zu einer bestimmten Kleinheitsstufe zu liegen kommen.

Durch Mittelwert und Präzisionskonstante sind alle dem Fehlergesetz gehörenden Reihen völlig eindeutig beschrieben. Der erstere gibt uns die Lage der einzelnen Reihe über der  $x$ -Achse, während die Präzisionskonstante oder eine ihr proportionale Größe ein Maß der Ausdehnung über der  $x$ -Achse liefert. Ins Anschauliche übertragen heißt das, der Mittelwert gibt Aufschluß über die absolute Größe und das Präzisionsmaß Aufschluß über die Größe der in einer bestimmten Anzahl von Beobachtungen zu erwartenden Größenschwankungen, das heißt also über die Variationsbreite.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts machte dann der belgische Statistiker Quetelet<sup>28, 29 und 30</sup>) die Entdeckung, daß nicht bloß die Resultate von Menschen intendierter Handlungen dem Fehlergesetz gehorchen, das heißt sich der oben erwähnten Gaußschen Kurve nahe anschließen, sondern daß dieses Gesetz auch für eine Anzahl der statistischen Erscheinungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft gilt. Auch die sozialen Erscheinungen, die anatomischen Formen, die physiologischen Eigenschaften ordnen sich nach Quetelet in regelmäßiger Weise dem Fehlergesetz nahe entsprechend um ihren Mittelwert. Das ist aber nur dann möglich, wenn die durch die Variation verursachten Größenunterschiede in gleicher oder doch sehr ähnlicher Weise zustande kommen, wie die Beobachtungsfehler, das heißt wenn die zur Ableitung des Fehlergesetzes gemachten Annahmen auch für die Ursachen der Variationsgültigkeit haben.

Hier wollen wir einen Augenblick innehalten.

Es zeigt sich nämlich, daß unser Problem zwei Seiten hat, die beide gleichmäßige Berücksichtigung verlangen. Die eingangs gegebene Definition desselben als der Frage nach einer praktisch brauchbaren Beschreibung der Variationsreihen erweist sich schon hier zu eng. Denn die Art der Beschreibung muß mit unserem Wissen über die Ursachen der Variation in Einklang zu bringen sein. Die mathematische Ableitung des Gesetzes darf keinen Widersinn im Zusammenhalt mit dem natürlichen Geschehen enthalten, wenn die Übereinstimmung der mathematischen Formel mit unseren Kurven nicht eine ganz zufällige, keinerlei weiteren Erkenntniswert besitzende bleiben soll.

Während nun die Ableitung der Fehlerfunktion im Hinblick auf das Entstehen von Beobachtungsfehlern nur plausible, sich ohne großen Zwang aus der Analyse der Beobachtungsfehler ergebende Annahmen enthält<sup>31)</sup>, bedürfen diese Annahmen einer Prüfung, ob sie auch, auf die Ursachen der Variation übertragen, die gleiche logische Berechtigung in Anspruch nehmen können. Wir wollen hier nur auf diese unerläßliche Forderung hinweisen, während wir die ausführliche Besprechung aufsparen, da ein Teil der von Fechner und Pearson gemachten Einwände gerade hier eingesetzt. Es sei nur erwähnt, daß die Annahmen der Gaußschen Analyse der Beobachtungsfehler ohne wesentliche Modifikation auf die Ursachen der

<sup>31)</sup> Das Fehlergesetz ergibt sich auf Grund der Annahmen, daß 1. die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Fehler eine stetige Funktion ihrer Größe mit stetigen ersten und zweiten Ableitungen sei, daß 2. die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers mit seiner Größe abnehme und daß 3. der Mittelwert der wahrscheinlichste Wert der Fehlerreihe sei. Es ist auch ableitbar aus dem Hypothesen, daß jeder einzelne Fehler die algebraische Summe einer unendlich großen Anzahl voneinander unabhängiger Elementarfehler von gleicher aber unendlich kleiner Wirkung sei, deren jeder ebenso gut negativ wie positiv sein könne, und stellt sich dann dar als Grenzfall des Binoms  $(p + q)^n$ , worin  $n$  gleich unendlich und, wie häufig, aber wie wir noch sehen werden, nützigerweise beibehalten wird,  $p = q = \frac{1}{2}$  ist. Vgl. Czuber (1), § 123 und 124; auch § 69.

Variation übertragen zu werden pflegen\*). Man nimmt demnach an, daß das Einzelmaß des Individuums seine endliche Abweichung von dem Mittelwert seiner Rasse der Summierung einer unendlich großen Anzahl unendlich kleiner Elementarstörungen verdanke, und zwar, daß sie des näheren aufzufassen sei als die algebraische Summe dieser Elementarabweichungen. Ferner wird angenommen, daß die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen einer einzelnen Störung durchgehend gleich groß, daß also auch die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer positiven Störung gleich der des Einwirkens einer negativen sei. Die Begründung dieser Hypothesen ist aber zunächst nur die Übereinstimmung der Variationsreihen mit dem Fehlergesetz. Sie stehen und fallen also mit dieser Übereinstimmung, wenn nicht anderweitige Gründe für sie angeführt werden können.

Im Fehlergesetz hatten wir ein Gesetz kennen gelernt, das in Wirksamkeit tritt, wenn ein Wille ein bestimmtes Ziel mit materiellen Mitteln zu erreichen strebt, bei dessen Verwirklichung ihm aber eine große Summe störender Kräfte zufälliger Natur, die Tücke des Objekts, in den Weg tritt. Die Annahme, dieses Gesetz sei auch für die Variation gültig, zog daher eine Reihe sehr eigenartiger Vorstellungen nach sich, die auch heute noch nicht ganz zur Ruhe gekommen sind. Alte, längst schon entschummerte Gedanken wollten in dieser Analogie der Variation mit menschlichen Willenshandlungen zu neuem Leben erwachen. Unwillkürlich denkt man ja dabei an die platonische Vorstellung des präexistierenden unveränderlichen Eidos jeder Erscheinungsform und des Widerstrebens der Materie gegen den Willen des

Schöpfers, der die Erscheinungen nach diesem Bilde formt.

Als erstes Gesetz aller organischen Variation glaubte Quetelet das folgende gefunden zu haben: Überall wo organische Variation freien Spielraum hat, das heißt also, wo sich eine vergleichsweise große Anzahl von Individuen der gleichen Art entwickeln kann, gruppieren sich die einzelnen Maße der einzelnen Organismen nach dem Fehlergesetz um den Mittelwert. Daraus folgt unmittelbar: Wenn wir im alten klassischen Sinn von Typus reden wollen, können wir damit nur den arithmetischen Mittelwert der Einzelmaße im Auge haben. Da wir Heutigen nun einmal alle das Gymnasium mit allen seinen Wollaten hinter uns haben müssen, ehe uns eine Beschäftigung mit Naturwissenschaft erlaubt werden kann, so hat sich denn auch das Problem des „Typus“ von vornherein mit dem Fehlergesetz enge verknüpft. Meist wurde der alte klassische Begriff wieder hervorgesucht und ohne weiteres der Mittelwert als Inkarnation des Typus angepriesen. So tat Quetelet, Gould und Stieda<sup>(22)</sup> in direktem Anschluß an ihn. Ihre Auffassung ist uns leicht verständlich und hat in ihrer Anlehnung an die alte Vorstellung zweifellos ihre gute Berechtigung. In ganz ähnlicher Weise, wie ich das für das Wort Klima<sup>(21)</sup> nachgewiesen habe streiten aber seither die alte Bedeutung und der Sinn des heutigen Sprachgebrauches einen meist unverständenen, darum aber nicht weniger erbitterten Kampf. Heute steht uns eine Anzahl von Definitionen für Typus zur Verfügung, denn abgesehen von den drei obengenannten, gaben Lexis<sup>(23)</sup>, Török<sup>(24)</sup>, Pearson<sup>(25)</sup> und Johannsen<sup>(12)</sup> einander feindlich gegenüberstehende Definitionen. Wir wollen uns hier noch nicht in den Streit mischen, sondern uns die Entscheidung für den Schluß aufsparen. Es sei nur bemerkt, daß sowohl der Mittelwert schlechthin (Quetelet usw.), als der Mittelwert unter der Bedingung, daß er innerhalb der Grenzen des Zufalls konstant sei (Lexis), daß sowohl die ganze Reihe, oder wenigstens die Gesamtheit der zu ihrer Charakterisierung nötigen Parameter (Pearson), als die Hälfte der Reihe, die zwischen Mittelwert und wahrscheinlichem Fehler rechts und links zu liegen

\* Quetelet zeigte, soviel mir bekannt, nur die nahe Übereinstimmung seiner Messungs- und Zahlungsergebnisse mit dem entwickelten Binom  $(p + q)^n$ , worin  $p = q$  und  $p + q = 1$ ,  $n$  aber „eine ziemlich große Zahl“ sein sollte, also ohne die Gaußsche Annahme, daß  $n$  unendlich sei, wodurch er eine diskontinuierliche Punkte-Reihe beliebigen Abstandes erhält, die sich der Gaußschen Kurve nahe anpassen läßt (zitiert nach W. Lexis [18]). Später wurde aber stets auf die eigentliche Gaußsche Kurve und ihre sogenannte Ableitung aus den Elementarfragen (die oben an zweiter Stelle gegeben) zurückgegriffen, die dann in der im Text angegebenen Weise formuliert zu werden pflegt.

kommt (Török), schließlich, daß auch die ganze Reihe nur unter der Bedingung, daß sie lediglich äußeren, nicht vererbaren Ursachen ihre Entstehung verdanke (Johannsen), schon als Typus angesprochen worden sind.

Wenn man sich auch über den Begriff Typus noch nicht hatte einigen können, so sehen man doch, eine Zeitlang wenigstens, darüber einig, daß die „reine Rasse“ sich im ganzen Tier- und Pflanzenreich dadurch kund tue, daß ihre Eigenschaften nach dem Fehlergesetz sich um ihren Mittelwert gruppieren. Variationsreihen reiner Rassen waren demnach durch den Mittelwert und eines der Präzisionsmaße — meist wurde hierzu der wahrscheinliche Fehler gewählt — und ihre wahrscheinlichen Fehler eindeutig beschrieben. Da auch zunächst noch keine Einwendungen gegen die Übertragung der Hypothese der Elementarfehler auf die Variationsursachen gemacht wurden, hatte es den Anschein, als sei unser Problem in allseitig befriedigender Weise gelöst. Der Mittelwert war und blieb die zum Vergleich benutzte Zahl, es war ihm nur für den praktischen Gebrauch eine Vorsichtsmaßregel in Gestalt seines wahrscheinlichen Fehlers beigefügt worden. Das Maß der Variationsbreite geriet, obwohl mehrfach hervorgehoben, wieder in Vergessenheit und konnte sich fürs erste einen Platz in der biometrischen Praxis nicht erringen.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb man bei dieser Auffassung der Variationsreihen stehen. Auch alle anderen Reihen variierender Dinge, die sich statistisch verfolgen ließen, wurden stets ausschließlich mit dem Fehlergesetz verglichen, das im Laufe der Zeiten, wie seine hängigen Gegner klagen, fast als heilig und unantastbar betrachtet wurde. Daß das Fehlergesetz manchmal recht schlecht mit den empirischen Polygonen übereinstimmte, wurde zunächst nicht weiter beachtet, da die Anzahl der Beispiele, in denen es sich brauchbar zeigte, doch eine recht große war. Schließlich war aber die Zeit auch dieser Betrachtungsweise abgelaufen, und es regte sich der Widerspruch.

Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Variationskurven (s. umstehende Seite), so sehen wir auch, daß bei dem allmählichen Bekanntwerden dieser großen Formverschiedenheiten ein

solcher Widerspruch gar nicht ausbleiben konnte. Denn es muß doch jeder zugeben, daß eine Anzahl der hier dargestellten Kurven (Fig. 1, 2, 3, 6) auch nicht einmal angenähert durch die Gaußsche Formel beschrieben werden können. Was zunächst in die Augen fällt, ist die häufige mehr oder minder starke Asymmetrie, die unter Umständen die Kurven völlig einseitig werden läßt (Fig. 1). Allerdings hat ihr Entdecker Hugo de Vries<sup>(16)</sup> diese einseitigen Kurven als halbe Galtonkurven bezeichnet und sie mit der einen Hälfte einer Gaußschen Kurve zu beschreiben versucht, doch muß dieser Versuch bei dem gerade umgekehrten Verlauf der beiden Kurven in ihrem wichtigsten Teile, nahe dem häufigsten Werte, als gescheitert betrachtet werden, ganz abgesehen davon, daß niemand einzusehen vermag, wohin die andere Hälfte der Fehlerkurve geraten sein soll. Diese Tatsache der Asymmetrie einer großen Anzahl von Variationsreihen haben denn auch sowohl Fechner als Pearson zum Ausgangspunkt ihrer Angriffe gegen die allgemeine Gültigkeit des Gaußschen Gesetzes gemacht. Sie betonen, daß die allgemeine Formel des Gesetzes sowohl einer asymmetrischen, wie der ja ebenfalls recht häufigen vollständig oder nahezu vollständig symmetrischen Form fähig sein müsse.

## II. Fechner.

Heißen wir zunächst bei Fechner.

Er hat sein Thema so weit gefaßt, daß es schwer erscheint, ein einigermaßen vollständiges Referat zu geben, ohne den zur Verfügung stehenden Raum zu überschreiten. Ich muß mich daher auf das Allerwichtigste beschränken und wegen vieler interessanter Einzelheiten auf das Original verweisen.

Schon der Titel seines 483 Seiten starken Buches „Kollektivaßlehre“<sup>(17)</sup> zeigt, daß er den Kreis der in Betracht zu ziehenden Erscheinungen zum erstenmal vollständig umgrenzt hat. Er versteht unter Kollektivaßlehre die Lehre von dem Verteilungsgesetz der Kollektivgegenstände und unter diesen wieder „Gegenstände, die aus unbestimmt vielen, nach Zufall variierenden Exemplaren bestehen, die durch einen Art- oder Gattungsbegriff zusammengehalten werden“.




Die Figuren 1 bis 5 sind der referierten Pearson'schen Abhandlung <sup>(12)</sup> entnommen. Er bezeichnet sie allgemein als „ausgeglichene Formen von Häufigkeitskurven, wie sie sich in der statistischen Praxis finden“, und gibt für die einzelnen Formen die folgenden Angaben ihres Vorkommens.

Fig. 1.




Kindersterblichkeit, Einkommen, Werte von Häusern, Variation von Kronenblättern usw. von Blumen, Cricket scores usw., Größe der Londoner Schulklassen.

Fig. 2.




Scharlach- und Diphtheriemortalität zwischen Geburt und 20. Lebensjahr, Häufigkeit der Zinsfüße von sicheren Wertpapieren usw.

Fig. 3.




Häufigkeit der Armen in Prozenten der Bevölkerung, der Scheidungen mit der Ehedauer, der Scharlachmortalität der verschiedenen Lebensalter, dito des Typhus usw.

Fig. 4.



Altersterblichkeit, Enteric-Fever-Morbidity, Barometerstände, Alter der Frau bei gewissem Alter des Mannes zur Zeit der Eheschließung, Kreiscurven usw.


Fig. 5.



Verschiedene leichte Grade von Asymmetrie, die sich der „Normalcurve“ (Gaußsche Kurve) zwar nähern, sie aber nie exakt verwirklichen; sehr häufig in anthropologischen Statistiken und in Zoometrie; auch alltäglich bei soziologischen und ökonomischen Statistiken.

Fig. 6.

Sog. Fibonaccikurve mit mehreren Gipfeln, die auf die Zahlen der Fibonaccireihe fallen, d. h. auf die Zahlen 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 usw. und ihre einfachen Multipla. Das gegebene Beispiel gibt die Anzahlen der Strahlenhöhen von 17 000 Blütenköpfen von *Chrysanthemum leucanthemum* nach Ludwig <sup>(13)</sup>.



Wir müssen hier einen Augenblick bei dem eigenartigen Zusammenhang stehen bleiben, der zwischen den beiden Komponenten seines Begriffes, der Variation nach Zufall und der Zugehörigkeit zu einem Gattungsbegriff besteht, und der uns einen tiefen Blick in die Mechanik unserer Begriffsbildung tun läßt. Fechner hat diesen Zusammenhang nicht weiter ausgesponnen, doch scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, daß, wie sich eben aus den Untersuchungen Fechners ergibt, unser Gattungsbegriff mit dem Bestehen eines Verteilungsgesetzes für die darunter subsumierten Erscheinungen unlösbar verknüpft ist. Man darf daraus wohl schließen, daß das instinktive Erkennen desselben schon bei der Begriffsbildung mitgepielt hat.

Halten wir also in erster Linie fest, daß die instinktive Abstraktion eines Gattungsbegriffes, und die damit unlösbar verbundene eines „typischen Gegenstandes“, sich immer nur da einstellt, wo die Gesamtheit der Gegenstände sich regelmäßig um einen fixen Variationsmittelpunkt gruppiert. Dabei ergibt sich nach Fechner als erstes Gesetz dieser Gruppierung, daß sich in jeder Einzelreihe eine Größenstufe findet, die deutlich häufiger ist als sämtliche übrigen Größenstufen von gleicher Ordnung, und von der aus die Häufigkeiten nach beiden Seiten rasch abnehmen. Fechner drückt diese Erscheinung so aus: „die zufällige Gruppierung der Kollektivgegenstände gestattet stets die Bestimmung eines dichtesten Wertes neben dem arithmetischen Mittel“. Dieser „dichteste“, empirisch häufigste, also auch empirisch wahrscheinlichste Wert, stellt sich dadurch unmittelbar dar als Ausgangspunkt der Variation, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Variatiou wieder in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe steht, die Häufigkeit der Abweichungen also mit wachsendem Abstand vom dichtesten Wert nach beiden Seiten rasch abnimmt.

Da aber, wie wir schon gesehen haben, die Reihen häufig asymmetrisch sind, fallen dichtester Wert und Mittelwert nicht notwendig und allgemein zusammen, wie es zur Ableitung des Gaußschen Gesetzes angenommen worden. Sind beide Werte aber verschieden, so ist der Mittelwert nicht mehr der Ausgangswert der

Variation, der sein Zustandekommen der häufigsten Ursachenkombination verdankt. In alten griechischen Bilde ist dann auch das Eidos, das der Gottheit bei der Bildung des „Gegenstandes“ vorschwebte, nicht mehr das arithmetische Mittel, sondern der dichteste Wert, der im alten griechischen Sinne des Wortes nun unmittelbar als typischer Wert aufgefaßt werden muß. Aber wenn wir auch für den heutigen Sprachgebrauch diese Bedeutung des Typus ablehnen, weil die eminent tiefsinnige, und, wie wir eben gesehen haben, in der Natur der Kollektivgegenstände wohl begründete Deutung dieser Begriffsbildung nicht allgemein bewußt zu sein pflegt, so kommen wir doch fürs erste zu einem ähnlichen Resultat. Allerdings denkt heute bei der Vorstellung eines „typischen“ Chinesen oder Japaners oder Zentrumsabgeordneten, Geistlichen oder Bierbrauers niemand ausführlich daran, daß ein ideales Bild dieser Kategorien existiere, als dessen mehr oder minder gelungene Nachbildungen die tatsächlich uns begegnenden Einzel-exemplare vom Schöpfer geformt worden seien. Aber den Begriff eines „typischen“ Bierbrauers oder Japaners hat darum doch jeder, und dabei pflegen wir als typisch dasjenige anzufassen, was die originellen Eigenschaften des betreffenden Gegenstandes, die ihn eben von der Allgemeinheit und von anderen Typen unterscheiden, in kenntlicher Ausbildung besitzt. Keinesfalls soll mit dem heutigen Sprachgebrauch, wenn wir von einem „guten Repräsentanten eines Typus“ oder von einem „typischen Individuum“ sprechen, die ganze Variationsreihe getroffen werden, denn jeder wird zugeben, daß nicht jeder Chinese ein typischer Chinese ist, daß es Bierbrauer und Geistliche gibt, die durchaus keine typischen Vertreter ihres Standes sind; usw. Andererseits denkt gewiß niemand ausdrücklich an den Mittelwert oder an den dichtesten Wert und noch weniger an die Gruppe zwischen den wahrscheinlichen Fehlern und dem Mittelwert.

Die Entstehung des Begriffes Typus liegt tief im Unbewußten und kann nur aus der Mechanik unserer Begriffsbildung überhaupt erkannt werden. Nehmen wir ein Beispiel und analysieren es, z. B. den typischen Japaner. Wir haben viele Japaner oder Abbildungen von solchen gesehen; der eine mehr, der andere

weniger. Alle diese Erinnerungsbilder sind mehr oder weniger treu im Zentralorgan aufbewahrt. Ihre Einzelheiten sind vielleicht abgeblaßt, aber durch ihre Übereinanderlagerung haben sie die konstanten Züge des allgemeinen Bildes hervorgerufen. Wir denken beim „typischen Japaner“ an tiefbraune, geschlitzte Augen, schwarzes Haar, gelbe Hautfarbe, breite Backenknochen, mäßige Körpergröße usw., das heißt, wir wissen, daß der Japaner sich durch eine Anzahl von Eigenschaften vom Weißen und vom Neger und von sämtlichen anderen gut ausgeprägten Formen des Menschengeschlechtes unterscheidet und halten für jede dieser Eigenschaften einen gewissen, sagen wir einmal „mittleren“ Grad in der Vorstellung bereit. Wir denken also beim typischen Japaner an eine Kombination von Eigenschaften, die wir nur bei ihm zu finden erwarten, und das körperliche Erinnerungsbild, das diesem Begriff Leben verleiht, ist entstanden aus einer Zusammenwirkung der Erinnerungsbilder von Japanern, die wir gesehen haben. Aus dieser letzten Einschränkung ergibt sich sofort, daß, wie wir ja alle schon wissen, jeder einzelne seinen eigenen Japanertypus gebildet hat, verschieden, je nach Kenntnissen und der Fähigkeit zu beobachten und zu zergliedern. Wie diese begriffliche Typusbildung verläuft, können wir nur vermuten. Allerdings liegt eine Art psychischer Mittelbildung vor, aber sie ist bei weitem nicht so einfach, wie die Bildung des arithmetischen Mittels. Eine ganze Anzahl von Schlüssen sind in ihr verborgen. Wir wissen zum Beispiel, daß in unserem psychischen Typus einer Nation nur das von anderen Nationen kenntlich unterschiedene in die Mittelbildung eingeht, daß wir von vornherein „nicht Typisches“ auszuscheiden geneigt sind. Wir dürfen demnach unseren Typusbegriff jedenfalls nicht ohne weiteres mit dem Mittelwert identifizieren; viel eher schon mit dem dichtesten Wert. Denn eine stark asymmetrische, sagen wir einmal einseitige, Variationsreihe vorausgesetzt, wird der vielleicht zehnmal so oft vorkommende häufigste Wert jedenfalls eine wichtigere Rolle in unseren Erinnerungsbildern spielen, als der durch nichts Besonderes gekennzeichnete Mittelwert. Da wir aber auch hier nur auf mehr oder minder begründete Vermutungen angewiesen sind, wollen

wir den instinktiv abstrahierten typischen Gegenstand weder mit dem einen noch dem anderen identifizieren, obwohl eine gewisse Verwandtschaft mit beiden zugegeben werden darf.

Damit ist aber die Vielseitigkeit unseres Begriffes noch lange nicht erschöpft. Was wir eben dargestellt haben, ist streng genommen nur die Vorstellung, die sich in unwissenschaftlichen täglichen Sprachgebrauch mit dem Adjektivum typisch verknüpft. Leider wird aber mit dem Wort Typus sowohl im täglichen wie im wissenschaftlichen Sprachgebrauch noch etwas anderes zu treffen versucht. Wir sprechen von „reinem Typus“ und von „Mischtypus“, und meinen dabei ganz unzweifelhaft ein dem Rassebegriff im Sinne der *petites espèces* untergeordnetes Etwas. In diesem Sinne haben wieder Pearson und wenn man will Johansson Recht, als Typus die ganze Variationsreihe zu bezeichnen.

Wir schließen: Es herrscht eine Verwirrung in den mit dem Worte Typus verbundenen individuellen Vorstellungen, die nicht aufhören kann, Streit und zwar unfruitbaren Streit zu gebären. Dieselbe im Sinne eines internationalen Übereinkommens zu schlichten, habe ich nicht mehr den Mut, seitdem mein gleichartiger Vorschlag für das Klima<sup>(1)</sup> gänzlich fehlgeschlagen. Der einzelne hat sich eben eine individuelle Definition zurecht gemacht, mit der er ohne Schwierigkeiten hantieren kann und verweigert kategorisch seine Zustimmung zu jeder Art von „Gedankenoperation“, die ihm auch nur ein Jota seiner Vorstellung rauben will. Sie ist also ein *noli me tangere*. Das eine kann dann aber nicht scharf genug betont werden: Zu wissenschaftlichen Überlegungen ist das Wort Typus, wenn ihm nicht eine ganz exakte individuelle Definition beigelegt wird, gänzlich unbrauchbar. Seine Benützung wird nur Verwirrung stiften.

Nun zurück zu Fechner. Seine Hauptgesichtspunkte sind: Der wichtigste Wert einer Reihe ist ihr häufigster Wert<sup>\*)</sup>. Dieser ist als

<sup>\*)</sup> Fechner (10) § 41, S. 88: „Der wahre Wert ist nichts anderes als der wahrscheinlichste Wert, der in einer Fehlerreihe, die hinreichend groß ist, um einen gesetzmäßigen Gang erkennen zu lassen, als empirisch dichtester Wert sich zu erkennen gibt.“

fixer Ausgangspunkt der Variation zu betrachten, von ihm, nicht von arithmetischen Mittel sind also die einzelnen Abweichungen zu berechnen, wenn sie uns ein Maß der Variation des einzelnen ergeben sollen. Zu beiden Seiten dieses dichtesten Wertes nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Variation mit ihrer Größe rasch — aber nicht auf positiver und negativer Seite allgemein gleich rasch — ab.

Von hier ist es nur mehr ein Schritt und zwar ein recht naheliegender, zu der Annahme, das Gesetz der Variation befolge nach der positiven und negativen Seite das Gaußsche Gesetz, das sich in einem häufigen speziellen Falle schon als gültig gezeigt hat, nur daß die beiden Hälften nicht allgemein das gleiche Neigungsgesetz besitzen, sondern daß die eine Seite steiler abfalle, also eine größere Präzision besitze als die andere. So wird Fechner schließlich zu einer Verallgemeinerung des Gaußschen Gesetzes geführt, die er als zwiespältiges Gaußsches Gesetz bezeichnet. Er erhält mit demselben eine asymmetrische Kurvenform dadurch, daß er zur Beschreibung der verschiedenen Hälften rechts und links von häufigsten Wert zwei verschiedene Gleichungen der Gaußschen Form benutzt. Er berechnet also, um durch ein Beispiel seine Methode klarzulegen, die Abweichungen nach der positiven Seite nach der Gleichung

$$y' = y_0 e^{-k'x'^2},$$

diejenigen nach der negativen aber mit Hilfe eines abweichenden  $k$  nach der Gleichung

$$y = y_0 e^{-kx^2}.$$

Wie man sieht, bedarf man zur Anwendung dieser Formeln einer vorgängigen Kenntnis des dichtesten Wertes, ohne dessen Kenntnis das zwiespältige Gaußsche Gesetz sich gar nicht anwenden läßt.

Zu seiner Berechnung geben Fechner und Lipps zwei Methoden an. Die erste derselben ist eine einfache Interpolationsbestimmung unter Benutzung der Tatsache, daß in unseren empirischen Polygonen stets eine häufigste Größenstufe zu finden ist, wenn die Reihe nur genügend groß und die „Reduktionslage“<sup>\*)</sup> richtig gewählt ist.

\*) Die einzelne Reduktionslage bestimmt sich durch die Wahl der Intervallgröße, innerhalb deren die An-

Innerhalb dieser häufigsten Größenstufe bestimmt sich dann der empirisch häufigste Wert in einfacher Weise aus dem Verhältnis der Anzahlen der diesem größten Intervall vorausgehenden und nachfolgenden Größenstufe\*).

Da dieser Bestimmung aber eine beträchtliche Unsicherheit schon durch die Willkür in der Wahl der Reduktionslagen und ferner durch die Unsicherheit der empirischen Anzahlen anhaftet, hat Fechner noch nach einer anderen gesucht und die definitive Bestimmung des dichtesten Wertes auf ein von ihm empirisch allgemein gültig befandenes „Gesetz“ gegründet.

Es ist das das Proportionsgesetz, demzufolge die beiderseitigen Abweichungszahlen,  $d$  i.  $m'$  und  $m$ , bezüglich des dichtesten Wertes sich verhalten, wie die einfachen mittleren Abweichungen  $e'$ ,  $e$ , d. i. wie  $\Sigma e' : m' = \Sigma e : m$ , bzw. des gleichen Wertes, mithin

$$m' : m = e' : e = \frac{\Sigma e'}{m'} : \frac{\Sigma e}{m},$$

wenn  $m'$  die Anzahl der Abweichungen nach der positiven,  $m$  diejenige nach der nega-

zahlen der ursprünglichen, durch die Grenze der Genauigkeit der Messung gegebenen primären Intervalle zusammengefaßt worden, und durch die Lage des Maximums des ersten dieser reduzierten Intervalle. Sind z. B. die Messungen auf einen Millimeter genau gemacht, so enthält die „primäre Verteilungstafel“ alle genommenen Maße in ihrer Verteilung in diesem primären Intervall, das heißt, sie gibt an, wieviel Maße auf je einen Millimeter Größenzuwachs gefallen sind. Diese primären Tafeln sind aber wegen der im Verhältnis zur gemessenen Anzahl oft sehr kleinen Intervallgröße meist unregelmäßig. Sie werden nun dadurch, daß man beliebig viele primäre Intervalle zusammenfaßt, also in unseren Beispiel je zwei, drei, vier oder mehr Millimeter, wesentlich regelmäßiger. Es gibt also eine Anzahl von Reduktionslagen, die sich durch die Größe ihres Intervalles voneinander unterscheiden. Verteilen sich nun die Werte z. B. auf die Strecke zwischen 100 und 150 mm, so sind für die Reduktionslage 2 mm zwei verschiedene Möglichkeiten vorhanden, je nachdem wir das erste Intervall bei 99 oder bei 100 mm beginnen lassen, für die Reduktionslage 3 mm aber drei solcher verschiedener Möglichkeiten usw.

\*) Fechner (10) § 87, S. 185,  $x : (i - \sigma) = (x_0 - x_{-1}) : (x_0 - x_1)$ , worin  $x$  den Abstand des dichtesten Wertes von der unteren Begrenzung der empirisch häufigsten Größenstufe,  $i$  die konstante Intervallgröße der reduzierten empirischen Verteilungstafel,  $x_0$  die Anzahl der Gegenstände im häufigsten Intervall,  $x_1$  die Häufigkeit in dem nach dem oberen Extrem zu benachbarten Intervalle,  $x_{-1}$  die Häufigkeit des nach der negativen Seite benachbarten Intervalles bedeutet.

tiven Seite des dichtesten Wertes,  $\Sigma \delta'$  die Summe der Abweichungen nach der positiven,  $\Sigma \delta$ , die Summe der Abweichungen nach der negativen Seite (Fechner<sup>19</sup>, § 33, S. 70).

Wendet man dieses Gesetz auf die Abweichungen und ihre Anzahlen über und unter dem häufigsten Intervall an, dessen Kenntnis also auch bei der zweiten Bestimmungsart notwendig ist, so kann man innerhalb dieses empirisch gefundenen Intervalles in den meisten Fällen einen Wert finden, der dem Proportionsgesetz genügt. Diese Möglichkeit, die Fechner für alle durchgerechneten Beispiele nachweist, gibt ihm dann wieder eine empirische Bestätigung des Proportionsgesetzes.

Eine theoretische Begründung oder Deutung dieses Gesetzes hat Fechner nicht zu geben versucht. Doch scheint mir wenigstens der Grund durchsichtig, der Fechner zur Aufstellung dieses Gesetzes bewogen. Die beiden Kurvenzüge, die zur Beschreibung der beiden Hälften unserer Polygone benutzt werden, gehen nämlich nur unter dieser Bedingung ohne schon äußerlich sichtbaren Sprung ineinander über, da sie nur für sie, für  $x = 0$ , beide den gleichen Wert ergeben. Ein innerer Grund für das Bestehen dieses Gesetzes ist aber bislang nicht aufzufinden gewesen<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>) [Das Gaußsche Gesetz gibt als Wahrscheinlichkeit für das Intervall von  $x$  bis  $x + dx$  den Wert:

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

die Häufigkeit erhalte ich daraus dadurch, daß ich mit der Gesamtanzahl der Abweichungen, also  $m$  multipliziere

$$\frac{mh}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2} .$$

[Lösen nun auf der einen Seite des dichtesten Wertes  $m'$  Abweichungen, und will ich ihre Häufigkeitskurve als halbe Gaußsche Kurve auffassen, so muß ich  $2m'$  Abweichungen in Rechnung bringen. Die Häufigkeit ist also hier:

$$\frac{2h'm'}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2} .$$

[Entsprechend für die andere Seite:

$$\frac{2h_1 m_1}{\sqrt{\pi}} e^{-h_1^2 x^2} .$$

Da die Gesamtzahl aller Abweichungen  $m' + m_1 = m$ , so sind die Wahrscheinlichkeiten:

$$y' = \frac{m'}{m} \frac{2h'}{\sqrt{\pi}} e^{-h'^2 x^2}$$

Doch wir wollen hier nicht vorgreifen, und die Kritik der Fechner'schen Aufstellungen erst nach der vollständigen Darstellung derselben versehen. Es sei genug, daß Fechner dieses Gesetz nicht nur notwendig zur Aufstellung seines Verteilungsgesetzes braucht, sondern auch tatsächlich in allen seinen Beispielen angenähert bestätigt gefunden. Lipps gibt dann noch den Beweis, daß auf Grund der Annahme, der dichteste Wert erfülle das Proportionalgesetz, sich in ähnlicher Weise wie das Gaußsche Gesetz auf Grund der Annahme, der dichteste Wert sei der Mittelwert, das zwispaltige Gaußsche Gesetz ableiten läßt ([10] § 135, S. 306 ff.). „Der Hypothese von arithmetischen Mittel in der Fehlertheorie steht somit in der Kollektivmallehre die Hypothese, daß das Proportionalgesetz den wahrscheinlichsten Wert unter den Exemplaren eines Kollektivgegenstandes bestimme, völlig gleichwertig zur Seite.“ Da sich aber für das Proportionalgesetz nur empirische Gründe beibringen lassen, hat Lipps noch eine zweite Ableitung gegeben, wieder analog der Ableitung des Gaußschen Gesetzes aus den Fehlerursachen, wobei er sich auf folgende Hypothesen stützt:

„1. Es wird eine unbestimmt große Anzahl  $n$  von Kräften  $K_1, K_2, K_3, K_4, \dots, K_n$  vorausgesetzt, die unabhängig voneinander an der Erzeugung der Exemplare eines Kollektivgegenstandes sich beteiligen.“

„2. Es besteht die Wahrscheinlichkeit  $p$  für das Auftreten und die Wahrscheinlichkeit  $q = (1 - p)$  für das Ausbleiben der Wirkung jeder einzelnen Kraft.“

„3. Jede Kraft erzeugt im Falle ihres Wirkens den Zuwachs  $i$ , wo  $i$  eine so kleine Größe vorstellt, daß ihre zweite Potenz neben endlichen Größen vernachlässigt werden darf.“

Diese Annahmen führen mit Notwendigkeit dazu, als Wahrscheinlichkeit der einzelnen Größenstufen von der Ordnung  $i$  die Glieder des entwickelten Binoms  $(p + q)^n$ , worin  $p \geq q$

$$y = \frac{m_i}{m} \frac{2h_i}{\sqrt{\pi}} e^{-h_i^2 x^2} .$$

[Da für  $x = 0$  die Wahrscheinlichkeiten gleich werden müssen, so muß  $m_i h_i^2 = m_1 h_1^2$ , oder, da die  $h$  umgekehrt proportional,  $m_i' e^{-h_i^2 x^2}$ , also das Proportionalgesetz.]

und  $(p + q) = 1$ , also eines asymmetrischen Newtonschen Binoms, anzunehmen. Lipps gibt für dasselbe mit Hilfe der Stirling'schen Formel einen näherungsweise Ausdruck, der wieder annäherungsweise in der Lage seines Maximums das Proportionalgesetz erfüllt, und eine Asymmetrie von der Ordnung  $i$  anzeigt. Er gibt aber weder ein praktisches Beispiel für seine Verwendbarkeit, noch zeigt er, wie und ob der dichteste Wert sich auf Grund dieses Gesetzes berechnen läßt.

Damit sind die Fechner-Lippschen Versuche zur Einführung einer asymmetrischen Kurvenform im wesentlichen erledigt. Sie führen zur Aufstellung des zwiespältigen Gauß'schen Gesetzes und zum Versuche einer theoretischen Begründung desselben. Die Einwände Fechners gegen das Gauß'sche Gesetz sind damit aber noch nicht erschöpft.

Außer dem Einwand, daß unsere empirischen Polygone nicht bloß zufällige Abweichungen von der symmetrischen Form des Gauß'schen Gesetzes aufweisen, sondern daß „Wesentliche Asymmetrie“ als der allgemeine Fall des Variationsgesetzes aufgefaßt werden muß, macht Fechner noch den weiteren, daß die untere Variationsgrenze unmöglich in unendlicher Entfernung vom Mittelwert liegen könne, da eine negative Abweichung, die die Größe des Mittelwertes, oder wenn wir im Sinne des zwiespältigen Gesetzes sprechen, des dichtesten Wertes, überschreite, ein Exemplar von negativer Größe, also etwas widersinniges, zur Folge haben müsse. Um diesem Dilemma auszuweichen, führt er statt der arithmetischen Abweichung, also der Differenz zwischen Einzelmaß und dichtestem Wert, die Verhältnisabweichung, also das Verhältnis des Einzelwertes zum dichtesten Wert als Maß der Variation ein. Die Grenzen der Variation liegen demnach bei Null und bei Plus unendlich, was gewiß ein sehr wesentlicher Vorteil dieser neuen Hypothese. Ihr entspricht dann die Annahme, daß die Einzelabweichung nicht als die algebraische Summe von Elementarabweichungen, sondern als Produkt aus einer großen Anzahl von Einzelstörungen aufzufassen ist, deren jede einzelne als verkleinernder, oder vergrößernder dem dichtesten Wert heigesezter Faktor wirkt.

Da nun das zwiespältige Gauß'sche Gesetz, wie wir es eben dargestellt haben, nur auf arithmetische Abweichungen berechnet ist, führt er statt des Verhältnisses von Einzelwert zum Variationsmittelpunkt die Differenz ihrer Logarithmen ein, welche Differenzen er ganz ebenso behandelt, wie früher die arithmetischen Abweichungen, das heißt, er bestimmt für diese logarithmischen Abweichungen die mittlere Abweichung vom dichtesten Werte nach jeder Seite einzeln und beschreibt ihre Anordnung dann durch das zwiespältige Gauß'sche Gesetz. Diese Art der Behandlung bezeichnet er als die logarithmische Verallgemeinerung des zwiespältigen Gauß'schen Gesetzes.

Fechner begründet diese Einführung der Verhältnisabweichungen des weiteren dadurch, daß er darauf hinweist, daß die Kollektivgegenstände in wesentlicher Abhängigkeit von ihrer Größe variieren, was er durch folgende Beispiele erläutert:

„Ein Floh ist durchschnittlich ein kleines Wesen und so sind auch die Abweichungen der einzelnen Flohexemplare vom durchschnittlichen Floh nur klein, nur Bruchteile von dessen mittlerer Größe, und der ganze Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Floh bleibt nur klein. Die Maus ist durchschnittlich viel größer als der Floh, das Pferd wieder viel größer als die Maus, ein Baum viel größer als ein Krant usw., und überall kehrt eine entsprechende Bemerkung wieder. Die Abweichungen der einzelnen Mäuseexemplare von der mittleren Maus sind durchschnittlich größer als die der einzelnen Flohexemplare vom mittleren Floh usw. Auch läßt sich diese Abhängigkeit der durchschnittlichen Größe der Variationen von der durchschnittlichen Größe des Gegenstandes daraus verstehen, daß die inneren und äußeren ändernden Ursachen auf große Gegenstände mehr Angriffspunkte finden als auf kleine. Zwar auch die Qualität der Gegenstände hat, durch die größere oder geringere Leichtigkeit, mit der sie den ändernden Einflüssen nachgibt, Einfluß; ferner kann die Zugänglichkeit für andere ändernde Einflüsse nach Umständen verschieden sein. Also ist eine genaue Proportionalität der mittleren Größe der Abweichungen mit der mittleren Größe der

Gegenstände von vornherein nicht zu erwarten. Aber jedenfalls bleibt die Größe der Gegenstände ein Hauptfaktor für die Größe ihrer Änderungen und wenn schon deren durchschnittliche Größe bei verschiedenen Kollektivgegenständen nicht der Mittelgröße der Gegenstände rein proportional ist, so bleibt doch sehr denkbar, daß für jeden, insbesondere bei der für ihn gegebenen Leichtigkeit, den ändernden Einflüssen zu folgen und Zugänglichkeit zu denselben, das einfachst mögliche Verteilungsgesetz der Abweichungen sich vielmehr auf Verhältnisabweichungen als arithmetische Abweichungen beziehe.“ ([18]. § 35, S. 78).

Fechner meint also, bei gleichem Reiz und gleicher relativer Antwortfähigkeit auf denselben, variiert ein großer Organismus in demselben Verhältnis, in dem die Körpergrößen der beiden Organismen stehen, mehr als ein kleiner. Ein Gedankengang, den wir vielleicht noch präziser in folgende Form fassen können: Die mittlere Körpergröße eines Organismus ist schon a priori ein approximatives Maß der Antwortfähigkeit seines Körperwachstums auf Wachstumsreize, zeigt also eine direkte Abhängigkeit von dieser Art Reaktionsfähigkeit.

Die Kritik der Fechnerschen Angriffe und Lösungsversuche hat zunächst zwischen diesen beiden selbst zu unterscheiden.

Seine beiden Einwände, der der wesentlichen Asymmetrie und der der notwendigen Begrenzung auf der negativen Seite bei Null, sind, so lange wir die diskontinuierliche Variation als gleichberechtigt im Kreise unserer Betrachtung belassen, nach dem Gesagten schon ohne weiteres als vollberechtigt anzusehen. Ihre Richtigkeit ist so selbstverständlich, daß eine weitere Besprechung nicht notwendig ist.

Schwieriger ist die Beurteilung des positiven Teiles seiner Arbeit. Er zerfällt der Hauptsache nach in die Aufstellung des zwiespältigen Gaußschen Gesetzes und seine Ableitungen, und in die Annahme, die „Verhältnisabweichung“ sei als Maß der Variation zu betrachten, d. h. die Wirkungen diskreter Ursachegruppen verbanden sich als Faktoren zu einem Produkt und nicht als Summanden zu einer Summe.

Blieben wir zunächst bei dem zwiespältigen Gaußschen Gesetz, so bietet dasselbe einer Kritik mannigfache Handhaben. Zunächst sehen wir, daß es gar nicht imstande ist, alle Formen der Variationskurven zu beschreiben. Selbst wenn wir von den multimodalen Kurven (Fig. 6), das heißt von denjenigen, die mehrere dichteste Werte aufweisen, völlig abgesehen (vgl. dieses Referat Seite 328 und 329), bleiben noch die einseitigen Kurven, deren charakteristische Gestalt zweifellos aus dem wahren Gesetz „der Variation“ ableitbar sein muß, wenn ein solches wirklich existieren sollte. Das zwiespältige Gaußsche Gesetz gibt dieselben aber in der gleichen Weise wieder, die wir schon bei den Versuchen von Hugo de Vries erwähnt. Es muß also ebenfalls gerade den wichtigsten Teil nahe dem dichtesten Wert ganz ungenügend wiedergehen.

Ferner gibt es uns keine einheitliche Formel an die Hand, die eine exakte Bestimmung des dichtesten Wertes erlaubt, vielmehr beruht diese Bestimmung auf einem rein empirischen, praktisch immer nur angenähert sich bewährenden Prinzip. Dieses Prinzip, das Proportionalgesetz, schreit mir aber nur eine beschreibende Bedeutung zu besitzen. Es sagt etwas aus, was wir schon auf den ersten Blick aus unserer allgemeinen Tafel entnehmen können, und was von vornherein ziemlich selbstverständlich ist, nämlich, daß auf der steiler ansteigenden Kurvenseite der Flächeninhalt vom Extrem bis zum dichtesten Wert kleiner ist als der Flächeninhalt vom dichtesten Wert zum Extrem der sanfter abfallenden Seite, und zwar angenähert in dem Verhältnis, in welchem die mittleren Abweichungen beider Hälften zueinander stehen. Man versteht, wie nahe auch hier wieder der Gedanke liegt, beide Hälften getrennt durch Gaußsche Kurven zu beschreiben und daß dieses Verfahren auch angenähert brauchbare Resultate liefern kann. Da aber der Inflexionspunkt der sanfter abfallenden Seite um so näher an den dichtesten Wert rückt, je kleiner die mittlere Abweichung der steileren Hälfte wird, um zuletzt direkt auf den dichtesten Wert zu fallen, wenn die steilere Hälfte verschwindet, muß doch noch ein anderer Zusammenhang zwischen den beiden Hälften be-

stehen, den das Fechner'sche Gesetz völlig vermissen läßt. Fechner kennt diese Schwäche seines Gesetzes wohl, da er mehrfach betont, das zwispaltige Gauß'sche Gesetz vermöge ohne weitere Modifikation nur schwach asymmetrische Kurven ausreichend zu beschreiben. Das Proportionsgesetz kann also sehr wohl für die Variation nur innerhalb gewisser Grenzen, nicht aber allgemein gültig sein, und sich nicht als primäres Gesetz, sondern als einer der sekundären Ausflüsse des noch unbekanntem allgemeinen Gesetzes bewähren, ähnlich wie Lipps z. B. sogar für seine Näherungsformel des asymmetrischen Binoms ein approximatives Befolgen des Proportionalgesetzes nachweist (§ 136, S. 317 und 318). Damit steht in Zusammenhang, daß das zwispaltige Gauß'sche Gesetz zwar keinen äußerlich sichtbaren Sprung, wohl aber im Maximum einen Sprung im zweiten Differentialquotienten enthält, den die Natur nach dem bekannten Axiom wohl kaum mitnehmen dürfte\*).

Zuletzt enthalten aber auch die gegebenen Ableitungen kleinere und größere Unzugänglichkeiten. Die erste derselben geht auf eine versteckte Petitiō principii zurück, insofern als sie von vornherein getrennte Verteilungsgesetze für die verschiedenen Teile der Kurve annimmt\*\*). Sie steht und fällt ferner mit der Gültigkeit des Proportionsgesetzes und bringt infolgedessen keinerlei weitere Erkenntnis, so lange uns das Proportionsgesetz so unverständlich ist wie heute noch. Die zweite dagegen ergibt, wie schon bemerkt, eine Asymmetrie von der Ordnung  $i$ , worin  $i$  die Größe der Wirkungen der einzelnen

Elementarstörungen. Da aber, wie wir bei der Kritik der Pearsonschen Lösungsversuche noch des genaueren nachweisen werden, die Wirkung der einzelnen Elementarursachen infolge der offenkundigen Stetigkeit der Variation unendlich klein angenommen werden muß, wird auch diese Asymmetrie unendlich klein. Die zweite Ableitung gibt also entweder eine symmetrische Kurve oder sie steht im Widerspruch mit anderweitigen sicheren Wissen über die Variation\*).

Das Fechner'sche zwispaltige Gauß'sche Gesetz kann uns also nicht das allgemeine Gesetz der Variation darstellen. Nun hat allerdings Fechner dasselbe auch in seiner logarithmischen Verallgemeinerung verwendet, so daß auch diese damit, streng genommen, schon des Anspruchs verlustig ginge, eine vollständige Lösung unseres Problems zu sein. Doch ist die logarithmische Verallgemeinerung ihrem in der Kollektivmaßlehre allerdings nicht deutlich zum Ausdruck kommenden Sinne nach völlig unabhängig von dem zwispaltigen Gauß'schen Gesetz und von so großer Tragweite für unser Problem, daß sie noch einer eingehenden Besprechung bedarf.

Da sie ganz auf die Annahme der Verhältnisabweichung an Stelle der additiven aufgebaut ist, müssen wir noch ein paar Worte über diese voraussetzen.

Schon die Analyse eines relativ einfachen Vorganges, der sich ganz innerhalb der Grenzen der Möglichkeiten hält, zeigt uns, daß die alte Annahme zu absurden Resultaten führen muß. Denken wir uns ein Individuum, das allein schon durch die Vererbung minderwüchsig sei und denken wir uns, der Grad dieses Minderwuchses sei so groß, daß das ausgewachsene Individuum, wenn keine weiteren störenden Ursachen einwirken, die Größe  $\frac{1}{2}a$ , also die halbe Größe des typischen Wertes erreichen würde, eine, nebenbei gesagt, nicht unmögliche Annahme. Dieses Individuum wachse nun auf unter thermischen Verhältnissen, die allein für sich die

\* ) [Während für die Funktion

$$y = e \cdot e^{-k^2 x^2}$$

der erste Differentialquotient

$$y' = -2 \cdot k^2 x \cdot e^{-k^2 x^2}$$

mit  $x = 0$  verschwindet, nimmt der zweite

$$y'' = 2 \cdot k^4 \cdot e^{-k^2 x^2} (2 \cdot k^2 x^2 - 1)$$

mit  $x = 0$  den Wert  $-2 \cdot k^4 \cdot e$  an. Da die beiden Kurvenhälften zwar gleiche  $e$ , aber verschiedene  $k$  besitzen, haben sie im Punkte  $x = 0$  verschiedene zweite Ableitungen.]

\*\* ) [Die dort gegebene Ableitung ist nicht einwandfrei. Doch kann sie leicht durch eine strengere ersetzt werden. Dabei muß freilich von vornherein angenommen werden, daß für positive Abweichungen ein anderes Gesetz gelte als für negative. Die Bestimmung der Konstanten ist auch nicht richtig (S. 309). Den richtigen Wert gibt die Ann. S. 305 dieses Referats.]

\* ) [Diese Herleitung ist durchaus unbrauchbar. Denn nach dem Grenzübergange von dem Polygon zur Kurve erhält man wieder das symmetrische Gauß'sche Gesetz. Das Übergewicht des einen als der Ursachen stört die Symmetrie nicht, sondern wirkt nur wie eine „konstante Fehlerquelle“, indem sie die ganze Häufigkeitskurve nach jener Seite verschiebt.]



gleiche Wirkung haben sollen, die also allein für sich ebenfalls ein Individuum von der Größe  $\frac{1}{2}m$  hervorbrächten, wieder keine widersinnige Annahme, und nehmen wir drittens an, daß die Ernährung allein für sich wieder den gleichen Effekt ausübe — denken wir also etwa an einen arktischen Baum auf dürrer Boden — so ergibt sich als resultierende Gesamtgröße nach der alten Annahme ein Individuum von der Länge  $—\frac{1}{2}m$ , also ein imaginäres Individuum, während die Gesamtgröße nach der Fechner'schen Hypothese nur  $\frac{1}{2}m$  betragen wird, ohne Zweifel der weit wahrscheinlichere Wert. In ihrer Anwendbarkeit auf die Erscheinungen bei dem Zustandekommen der Variation ist also die Fechner'sche Hypothese der alten bedeutend überlegen. Wie aber die Annahme der Verhältnisabweichung auf mehrere Variationskurven zurückwirken muß, zeigt sich aus den folgenden Ausführungen Dr. Greiners:

[Da die Bemerkungen Fechners über sein logarithmisches Verfahren fast nur den rechnerischen Vorgängen gelten, ist es angebracht, den mathematischen Sinn dieser Rechnung ausführlicher darzulegen. Ich halte mich dabei durchaus an die logarithmische Behandlung des einfachen Gauß'schen Gesetzes, da dem zweiseitigen keine verständliche Theorie zugrunde liegt und es so für theoretische Überlegungen unbrauchbar ist.]

[Wenn wir das Gauß'sche Gesetz aus der Hypothese der Elementarursachen ableiten, so finden wir für jede Ursachenkombination eine gewisse Wahrscheinlichkeit und dazu proportional eine Häufigkeit. Werden nun den Ursachenkombinationen, so wie sie aufeinander folgen, äquidistante Punkte auf einer Abszissenachse zugeordnet und die zugehörige Häufigkeit über diesen Intervallen als Rechtecke aufgetragen, so erhalten wir erst ein Polygon, das, wenn die Anzahl der Kombinationen ins Unendliche wächst, in die bekannte Gauß'sche Häufigkeitskurve übergeht. Diese Kurve bezieht sich also nur auf Verteilung der Ursachenkombinationen und hat von vornherein nur ideale Bedeutung.]

[Bei einer empirischen Häufigkeitskurve denken wir uns nun an, wenn wir eine Theorie der Kurve bilden wollen, die Abweichungen von

einem Mittelwert durch wechselnde Ursachenkombinationen veranlaßt. Dann ist die Theorie die gleiche wie bei der Gauß'schen Kurve, aber doch braucht die Kurve selbst nicht die gleiche Gestalt zu haben.]

[Die Gestalt der reellen Kurve (um sie mit diesem Namen in Gegensatz zu der idealen Gauß'schen zu bringen) hängt von dem Einfluß ab, den wir den idealen Ursachenkombinationen auf die reellen Maße zuschreiben. Davon werden die Wahrscheinlichkeiten, und damit der Inhalt jener Rechtecke der idealen Kurve, nicht geändert, wohl aber fragt es sich, in welchen Punkten des reellen Maßstabs, der ja die Abszissenachse bildet, und über welchen Intervallen diese Rechtecke aufzutragen sind.]

[Nun gibt es zwei von vornherein gleich berechnete Auffassungen dieses Einflusses: Entweder bewirkt eine Ursache einen Zuwachs oder eine Verminderung von bestimmter Größe, wirkt also additiv; oder aber sie bewirkt eine proportionale Vergrößerung oder Verkleinerung, wirkt also multiplikativ.]

[Bei der ersten Auffassung werden die Verhältnisse der Gauß'schen Kurve für die reelle Kurve gewahrt, denn den äquidistanten Abszissen jener entsprechen äquidistante Maße dieser.]

[Schwieriger ist die Übertragung der idealen Kurve in eine reelle bei der zweiten Auffassung. Der Anschaulichkeit halber wollen wir annehmen, daß eine Anzahl positiv und negativ wirkender Ursachen bestehe, deren Wirkungen endlich und der absoluten Größe nach gleichwertig sind. Nun sei  $A$  der Ausgangspunkt der Variation, d. h. durch das Hinzutreten einer der variierenden Ursachen werde das Maß, das dem Punkte  $A$  entspricht, vergrößert oder verkleinert. Wir können uns so ausdrücken, daß durch die Variationsursachen der Punkt  $A$  selbst auf der Abszissenachse verschoben werde (Fig. 7.)

[Auf der idealen Achse  $xx$  nimmt der Punkt  $A$  durch das Hinzutreten einer oder mehrerer positiver Ursachen der Reihe nach die Lagen  $a, b, c \dots$ , bei negativen die Lagen  $d, e, f \dots$  ein, welche unter sich äquidistant sind. Die reellen Maße werden, wie angenommen, von den Ursachen proportional beeinflusst. Die positive wirkt wie eine Multiplikation mit einem Werte  $k > 1$ , die negative wie eine Division


durch den gleichen Wert. Es sind also die Abstände der aufeinander folgenden Punkte  $A'$ ,  $a' b' c'$  vom Nullpunkt der reellen Achse  $x' x''$  verhältnissgleich:

$$\frac{oa'}{oa'} = \frac{ob'}{oa'} = \frac{oc'}{ob'} = k$$

und ebenso rückwärts

$$\frac{oa'}{oa'} = \frac{od'}{od'} = \frac{oe'}{oe'} = k.$$


Fig. 7.



[Während die Folge der Punkte  $d, e, f, \dots$  auf der negativen Seite der ideellen Achse ins Unendliche läuft, nähern sich die entsprechenden Punkte  $d', e', f', \dots$  der reellen Achse mehr und mehr der Grenze Null, erreichen sie aber nur in unendlicher Annäherung, eben nach unendlich oft wiederholter Division durch  $k$ .]

[Äquidistante Punkte der ideellen Achse übertragen sich also als Punkte verhältnissgleichen Abstandes vom Nullpunkt.]

[Um diese Übertragung rechnerisch durchzuführen, brauchen wir nur zu bedenken, daß die Logarithmen verhältnissgleicher Zahlen äquidistant sind. Eine Punktfolge wie  $x' x''$  finde ich also leicht, indem ich die Numeri äquidistanter Logarithmen aufsuche und in beliebigem Maßstabe auf einer Abszissenachse auftrage. Über diesen Intervallen errichte ich nun Rechtecke, die den entsprechenden der ideellen Kurve inhaltsgleich sind. So erhalte ich mein reelles Variationspolygon. In der Grenze, bei unendlich kleinen Intervallen erhalte ich Kurven folgender Gestalt, welche ich Fechner'sche Kurven nennen will (Fig. 8). Wir sehen also symmetrische, im



Nullpunkt begrenzte Kurven. Die Asymmetrie hängt, bei konstanter Präzision, von der Stelle des dichtesten Wertes ab. Liegt er nahe bei Null, so kann die Kurve völlig einseitig werden,

liegt er weit ab (der Fall ist nicht gezeichnet), so wird die Asymmetrie unbedeutend.]

[Solche Kurven zu finden und den empirischen Polygonen anzupassen, lehrt uns das Fechner'sche logarithmische Verfahren. Dieses Verfahren hat folgenden Gang:]

[Die empirische Kurve wird auf die ideelle Abszissenachse übertragen. Dort wird ihr eine theoretische Kurve angepaßt und diese theoretische ideelle Kurve wird wieder rückwärts übertragen auf die reelle Achse. Die erste Übertragung geschieht nun einfach dadurch, daß die Maße logarithmiert werden. Bei der zweiten Übertragung gehen wir dann wieder vom Logarithmus auf seinen Numerus zurück. (Diese zweite Übertragung ist bei Fechner nie ausgeführt, nur einmal vorübergehend erwähnt. [S. 80, Abschn. „Aus diesen für . . .“].)]

[Da also die Logarithmierung nachher wieder rückgängig gemacht wird, hat sie nur die Bedeutung einer Hilfsrechnung, nicht anders als die Einführung der Logarithmen bei ausgedehnten Multiplikationen.]

[Das Ergebnis ist eine theoretische Häufigkeitskurve, entsprechend der Auffassung, daß die variierenden Ursachen proportionale Variationen bewirken.]

[Nach Gauß ist die Wahrscheinlichkeit durch das Integral

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x'} e^{-h^2 x'^2} dx'$$

gegeben, die Gauß'sche Kurve also durch die Gleichung

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x'^2}.$$

Die Fechner'sche Kurve finde ich, wenn ich auf das Integral die Substitution  $\log x' = x$  anwende. Ich erhalte

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int \frac{1}{x} e^{-h^2 \log^2 x} dx$$

also die Kurvengleichung

$$y = \frac{h}{x \sqrt{\pi}} e^{-h^2 \log^2 x}.$$

Dem Mittelwert der Gauß'schen Kurven entspricht der Zentralwert.]

[Ich habe mich durch Zahlenrechnung davon überzeugt, daß diese Kurve bei nicht zu kleinem  $h$

(wenn sie also nicht zu flach verläuft) dem Fechner'schen Proportionalgesetz recht gut genügt. Danach wäre das „Gauß'sche zweiseitige Gesetz“ als Approximation an die Fechner'sche Kurve anzusehen.]

[Freilich geht Fechner auch bei dem logarithmischen Verfahren auf das zweiseitige Gauß'sche Gesetz zurück. Es wäre Sache der Empirie, auszumachen, ob die Asymmetrie nach der Logarithmierung immer noch zu groß ist, um das Gauß'sche einfache Gesetz anzuwenden.]

Wir sehen also, daß die Einführung der Verhältnisabweichung auch bei Gültigkeit des Gauß'schen Gesetzes für die Ursachenkombinationen asymmetrische Häufigkeitskurven liefert, die stets bei Null begrenzt sind und in vielen Fällen dem Proportionsgesetz annähernd genügen. Das ist eine Tatsache von der allergrößten Bedeutung, denn damit sehen wir zum erstenmal eine vollständig verständliche Theorie für das Zustandekommen asymmetrischer Häufigkeitskurven entwickelt, allerdings nur für eine bestimmte gerichtete Asymmetrie ganz bestimmten Grades, der sich allein von dem Verhältnis der absoluten Größe der Präzision zur absoluten Größe des Mittelwertes abhängig erweist. Es bedarf keiner neuen Untersuchung, um vorauszusagen, daß die logarithmische Verallgemeinerung des Gauß'schen Gesetzes nicht alle Variationskurven zu beschreiben vermag. Nicht einmal alle unimodalen. Doch bleibt es ein großes Verdienst, auf den Unterschied zwischen reeller und ideeller Verteilungskurve hingewiesen und eine verständliche Theorie entwickelt zu haben, die uns ohne weiteres die Begrenzung jeder Häufigkeitskurve bei Null liefert. Für die Anthropologie wird die eben vorgetragene Modifikation aber keine wesentlichen praktischen Folgen haben. Die logarithmische Verallgemeinerung vermag bei den in der Biometrie bisher aufgefundenen Verhältnissen zwischen Präzision und Mittelwert nur eine ganz geringe Asymmetrie zu liefern, die wir wohl im allgemeinen vernachlässigen können. Das gewöhnliche Gauß'sche Gesetz wird uns also praktisch so ziemlich das gleiche Resultat liefern. Wo sich die Fechner'sche Korrektur aber als wesentlich erweisen sollte, zieht sie auch eine Modifikation des Maßes der

Variationsbreite nach sich. Um die Variationsbreiten und namentlich den Variationsindex, d. h. das Verhältnis zwischen Mittelwert und Variationsbreite, vergleichbar zu machen, müßte auf einen Parameter der ideellen Kurve zurückgegangen werden, da diejenigen der reellen Kurven sich von der Lage des dichtesten Wertes abhängig zeigen müssen.

### III. Pearson.

Schon vor dem im Jahre 1897 erfolgten Erscheinen der Fechner'schen Kollektivmaßlehre hat der englische Professor für angewandte Mathematik an dem University College of London, Karl Pearson, dem als Statistiker von Fach unser Problem nahe liegen mußte, ganz selbstständig ein verallgemeinertes Häufigkeitsgesetz aufzustellen versucht, das die von Fehlergesetz abweichenden Gruppierungen aller möglichen Statistiken zu beschreiben instande sein sollte. In seiner ersten Veröffentlichung über diesen Gegenstand<sup>(12)</sup> 1896, gibt Pearson in chronologischer Reihenfolge die verschiedenen Lösungsversuche, die sich ihm nach und nach dargeboten haben. Da sie für unser Thema sämtlich von Interesse sind, will ich sie alle in gleicher Reihenfolge anführen.

Die Einleitung weist kurz hin auf das häufige Vorkommen asymmetrischer Häufigkeitskurven bei sicher homogenem Material, wobei sich alle Übergänge von völlig einseitigen Kurven bis zur symmetrischen Fehlerkurve gefunden haben. „Es muß daher jede Theorie, welche die ganze Reihe dieser Kurven umfassen soll, eine Kurvenform an die Hand geben, die fähig ist, alle Übergangsformen zwischen diesen Typen anzunehmen.“ Ebenso wie man die Fehlerkurve dadurch erhalten könne, daß man eine kontinuierliche Kurve durch die Punkte des Binoms  $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^n$  legt, für den Fall, daß  $n$  ziemlich groß ist, lasse sich eine verallgemeinerte Form der Wahrscheinlichkeitskurve dadurch erhalten, daß man eine kontinuierliche Kurve durch die Punkte des allgemeinen Binoms  $(p + q)^n$  legt, wenn  $p + q = 1$ .

Ehe Pearson aber diese Kurve ableitet, zeigt er, wie zu einem beliebigen asymmetrischen Häufigkeitspolygon das ihm nächststehende endliche asymmetrische Binom aufgefunden werden

kann. Es geschieht das mit Hilfe der vier ersten „Momente“ des empirischen Polygons (vgl. I, S. 229, „Mittelwerte der Fehlerpotenzen“, wo sich auch einige Literatur angegeben findet), die sich in  $p$ ,  $q$ ,  $n$  und  $c$ , dem Abstand der einzelnen Binomglieder in ihrer graphischen Darstellung, ausdrücken lassen, und somit vier Gleichungen zur Berechnung dieser Größen liefern. Für die Aufstellung dieser Gleichungen gibt Pearson drei verschiedene Methoden an, die etwas abweichende Resultate ergeben. In der ersten derselben betrachtet er die Masse des Polygons als entlang den einzelnen Ordinaten konzentriert (er nennt dies beladene Ordinaten). Für die zweite werden die Endpunkte der einzelnen Ordinaten des Polygons durch Gerade miteinander verbunden und der Inhalt des Polygons durch Integration der einzelnen so entstandenen Trapeze berechnet. In der dritten betrachtet Pearson das Häufigkeitspolygon als aus Rechtecken aufgebaut, die um die einzelnen Ordinaten als Mittellinien und über  $c$  als Basis errichtet sind<sup>\*)</sup>.

Die Anwendung dieser Methode wird an zwei Beispielen erläutert. Das erste zeigt, daß die Häufigkeit der Barometerstände in Cambridge dem Binom  $(0,9 + 0,1)^{20}$  entspricht. In dem zweiten, einer Berechnung des nächsten Binoms zu Prof. Weldon's Krabbenmessungen<sup>(17)</sup> ergeben sich negative Werte für  $n$  und für  $q$ , trotzdem ergibt das Binom in seinem nicht verschwindenden Teile ein Dreieck, das die Hauptmasse der Krabbenmessungen annähernd wiedergibt. Obwohl Pearson „diese Resultate nicht zu interpretieren vermag“, glaubt er folgern zu dürfen: „Wir können daraus entnehmen, daß selbst dann, wenn unsere Binomialkonstanten unverständliche Werte annehmen, unsere Methode in manchen Fällen noch eine sich eng anschließende polygone Figur ergibt“.

Die Tragweite der Methode ergibt sich aus dem Nachweise, daß, wenn  $n$ ,  $p$  und  $q$  reell sein sollen, es unmöglich ist, ein Binom einer Beob-

\*) Die gegebenen Lösungen sind, wenn  $m_n$  das  $n$ -te Moment um den Schwerpunkt

$$m_n = c^n (n p q + c)$$

$$m_n = -c^n n p q (q - p)$$

$$m_n = c^n [c_0 + n p q] [c_0 + 3(n-2)pq], \text{ worin}$$

für beladene Ordinaten  $c_0 = 0$ ;  $c_2 = 0$ ;  $c_4 = 1$ ,  
 \* Trapez  $\dots c_0 = 1/2$ ;  $c_2 = 1/2$ ;  $c_4 = 2$ ,  
 \* Rechteck  $\dots c_0 = 1/2$ ;  $c_2 = 1/2$ ;  $c_4 = 1/2$ ;  $c_6 = 1/2$ ,  
 als vierte Gleichung dient  $p + q = 1$ .

achtungreihe anzupassen, für die  $6 + 3\beta_1 - 2\beta_2$  einen großen negativen Wert hat. Die Normalkurve für die diese Funktion gleich Null wird, liegt jeder solchen Beobachtungsreihe näher als ein endliches Binom<sup>\*)</sup>.

Den zweiten Teil seiner Arbeit beginnt Pearson damit, nachzuweisen, daß die Fehlerkurve und das endliche symmetrische Binom eine enge geometrische Verwandtschaft besitzen, die unabhängig von der Größe von  $n$  ist. Für das Polygon läßt sich ohne Schwierigkeit nachweisen, daß seine Neigung sich zur mittleren Ordinate des jeweiligen Trapezes verhält, wie die mittlere Abszisse desselben zur mittleren quadratischen Abweichung. Für die Fehlerfunktion erhält man die gleiche Eigenschaft durch Differentiation: die Neigung der Kurve verhält sich zur Ordinate, wie die Abszisse zum mittleren Fehlerquadrat. „Mit kurzen Worten: Ihre Neigung gegen die  $x$ -Achse ist durch eine identische Relation gegeben. Durch entsprechende Wahl ihrer Konstanten können wir die Normalkurve (Fehlerfunktion) dem endlichen Binom eng anpassen, in Folge dieser Neigungseigenschaft, ohne jede Annahme in Ausbreitung eines unendlich großen Wertes von  $n$ . Gerade diese Eigenschaft ist es, die die Art und Weise rechtfertigt, in der Statistiker — und zwar mit Erfolg — die Normalkurve auf Fälle anwenden, in denen ohne Zweifel klein ist. Es scheint bislang nie betont worden zu sein, daß die normale Fehlerkurve abgesehen davon, daß sie den Grenzwert eines binomialen Ausdruckes darstellt, auch diese enge geometrische Verwandtschaft mit ihm besitzt.“

Indem nun Pearson für das asymmetrische Binom die gleiche Relation aufstellt, erhält er eine Differentialgleichung, die ihm eine Kurve liefert, die „das gleiche Gesetz der Neigung gegen die  $x$ -Achse befolgt, wie dieses Binom“. „Diese Kurve stellt also in der gleichen Beziehung zum asymmetrischen Binom, wie die normale zum symmetrischen.“

Läßt man in der so erhaltenen Differentialgleichung \*\*)  $n$  und  $c$  endlich, so erhält man eine

$$*) \beta_1 = \mu_1/\mu_1^2; \beta_2 = \mu_2/\mu_1^3.$$

$$**) \int \frac{dy}{y} = \frac{-y^x}{-x} = \frac{-y^x}{p q (n+1)e^x + (p-q)e^x x} = a + x$$

worin  $\gamma = \frac{2}{(p-q)e}$  und  $a = \frac{2 p q (n+1)e}{p-q}$ .

asymmetrische, auf der negativen Seite endlich begrenzte Kurve, die auf der positiven Seite zur  $x$ -Achse asymptotisch verläuft. Die Gleichung dieser Kurve ist

$$y = y_0 (1 + x/a)^{-a} e^{-\gamma x},$$

worin  $y_0$ ,  $a$  und  $\gamma$  Konstante.

Sie hat für  $x$  gleich Null ihr Maximum und geht dann über in  $y = y_0$ , dies ist also die Ordinate des dichtesten Wertes. Da also der Anfangspunkt der  $x$ -Achse im Fußpunkt der größten Ordinate liegt, müssen die Abweichungen vom dichtesten Wert aus gerechnet werden.

Zu dieser Kurve macht Pearson noch einige theoretische Bemerkungen. Zunächst wendet er sich gegen die übliche Auffassung, daß das zweite Glied des Nenners auf der rechten Seite der Differentialgleichung  $x(p - q)e^x$  gegen das erste  $px(p + 1)e^x$  vernachlässigt werden könne, so daß sich auf diese Weise die normale Fehlerkurve ableitet aus jedem Binom, ob nun  $q$  gleich  $p$  ist oder nicht. „Ich behaupte aber, daß das ungerechtfertigt ist, ausgenommen für sehr kleine Werte von  $x$ . Wenn die Abweichung  $x$  beträchtlich ist und  $e$  verschwindend klein, so muß  $x$  ein unendlich großes Vielfaches von  $e$  sein;  $e$  ist aber in der Tat die Einheit, in der  $x$  gemessen werden muß, und wenn nicht  $p$  gleich  $q$  ist, so ist die Normalkurve nur eine Annäherung, selbst wenn  $a$  groß ist, nahe der größten Häufigkeit.“

Des weiteren wendet sich Pearson gegen die übliche Annahme, die Anzahl der Elementarursachen müsse als unendlich groß angenommen, das  $n$  unseres Binoms also auf alle Fälle gleich unendlich gesetzt werden.


„Nun ist es wahr, daß die biologischen und physikalischen Statistiken, auf die wir unsere Kurven anwenden wollen, wesentlich kontinuierliche Kurven ergeben, aber daraus scheint nicht mit Notwendigkeit zu folgen, daß  $n$  gleich unendlich sein muß; während die häufige Asymmetrie ein hinreichender Beweis dafür ist, daß die Vernachlässigung von  $x$  gegen  $a$  unberechtfertigt ist.“

„So kann z. B. das Maximum einer Fiebersterblichkeitskurve nicht unendlich weit vom Zeitpunkt der Geburt abstehen, der die Kurve nach der einen Seite begrenzt, noch kann eine

Heiratsalterskurve die größte Häufigkeit in unendlichem Abstand vom Pubertätsalter zeigen, noch in einer Kurve der Häufigkeit von Zinsfuß das Maximum, das zwischen 3 und 4 liegt, von Null durch eine unendliche Entfernung getrennt sein. Es ist deshalb klar, daß, wenn die eben genaueren Kurvenformen überhaupt als zufällige Verteilungen behandelt werden sollen, es ganz verlorene Mühe ist, dieselben mit dem Grenzwert eines symmetrischen Binoms zu vergleichen. In Wirklichkeit wissen wir gar nichts über die Natur der Elementarursachen in biologischen, physikalischen oder ökonomischen Häufigkeitskurven. Die Kontinuität solcher Kurven könnte ja von ganz anderen Ursachen abhängen als von der Größe von  $n$ . Wenn ich 20 Münzen werfe, so ist eine diskontinuierliche Reihe von 0, 1, 2, . . . 20 Kopfwürfen der alleinmögliche Umfang der Resultate. Jede einzelne Münze, die hier eine Elementarursache vertritt, kann nur Kopf oder Schrift geben, also müssen eine bestimmte ganze Anzahl Münzen Kopf, eine andere ganze Anzahl Schrift geben. Wenn ich jedes beliebige Verhältnis von Kopf zu Schrift erhalten soll, muß ich eine unendliche Anzahl von Münzen benutzen, denn jede Elementarursache muß eine Einheit vom Ganzen betragen. Aber vielleicht ist die Kontinuität biologischer oder physikalischer Häufigkeitskurven eine Folge einer beschränkten Anzahl von Elementarursachen mit der Möglichkeit, das Resultat als Bruch darzustellen (Power of fractionising the result). Wenn wir 20 Münzen werfen, können unmöglich 13,5 Kopf und 6,5 Schrift geben, sondern wir müssen 200 Münzen werfen, damit 135 Kopf und 65 Schrift geben können. Und doch sind diese beiden Dinge nicht identisch. Der erste Fall entspricht einem Wert zwischen zwei Ordinaten von  $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^{20}$  und der zweite einer gegebenen Ordinate von  $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^{200}$ . Solange wir über Natur und Anzahl der Elementarursachen in Physik und Biologie nichts wissen und so lange wir deutlich asymmetrische Häufigkeitskurven finden, müssen wir meines Erachtens nach allgemeineren Resultaten sehen als denen,

die sich aus der Annahme  $p = q$  und  $n = \infty$  ergeben. Die Form der oben in § 8 gegebenen Kurve stellt eine mögliche Form asymmetrischer Häufigkeitskurven dar. Ihre Rechtfertigung liegt wesentlich, wie bei der Normalkurve, in ihrer Fähigkeit, statistische Beobachtungen zu beschreiben.<sup>4</sup>

„Doch muß gleich bemerkt werden, daß die in § 8 gegebene verallgemeinerte Wahrscheinlichkeitskurve, obwohl sie die Normalkurve als speziellen Fall enthält, noch nicht allgemein genug ist. Sie ist nach einer Richtung begrenzt, nach der anderen unbegrenzt. Diese Begrenzung nur der einen Seite entspricht theoretisch vielen Fällen aus der Ökonomie, Physik und Biologie, aber es gibt viele sehr verschiedene Fälle, in denen theoretisch eine Begrenzung auf beiden Seiten existiert, das heißt also der Spielraum der Variation beschränkt ist. Man klebe z. B. ein Trapez  $ABCD$  aus weißem Papier auf einen schwarzen Zylinder, so daß die Symmetrieachse  $ef$  des Trapezes mit der Achse des Zylinders parallel ist. Lassen wir nun den Zylinder rotieren, so resultiert eine Reihe grauer Farbentöne zwischen einem dunkeln bei  $e$  und einem helleren bei  $f$ . Wenn wir nun von mehreren hundert Personen den mittleren Farben-



ton bestimmen lassen, der durch Mischung der Töne bei  $e$  und  $f$  entsteht, so werden wir eine kontinuierliche Häufigkeitskurve erhalten, die aber ganz innerhalb der Töne  $e$  und  $f$  liegt. Oder wenn wir annehmen, eine Häufigkeitskurve sei dadurch gebildet, daß man die Häufigkeit bestimmter Verhältnisse, z. B. der Beinlänge zur ganzen Körperlänge oder der Brustpanzerlänge zur ganzen Länge, aufzeichnet, so sind die Variationsgrenzen durch 0 und 1 gegeben. Dabei sind andere Werte nicht etwa ungeheuer unwahrscheinlich, sondern sie sind durch die Bedingungen des Problems völlig ausgeschlossen. Die Kurven, die Professor Weldon und Herr

H. Thompson für shrimps, crabs und prawns erhalten haben (vgl. Weldon [37 24]), Thompson (34), können also nur näherungsweise normale Kurven sein, selbst wenn es möglich wäre, daß das untersuchte Verhältnis alle Werte zwischen 0 und 1 annähme. Tatsächlich muß aber der mögliche Variationsumfang noch viel enger sein. Wir können nicht a priori sagen weshalb, aber für eine Krabbe ist ein Brustpanzer von  $\frac{2}{3}$  oder  $\frac{1}{100}$  der ganzen Länge, und für einen Erwachsenen ein Bein von  $\frac{2}{3}$  oder  $\frac{1}{100}$  seiner Körperlänge Unmöglichkeiten; es sind das Mißgeburten, die kaum das Alter der vollen Entwicklung erleben dürften. Genau dasselbe gilt für Schädelindizes und wahrscheinlich für alle relativen Organgrößen eines ausgewachsenen Organismus. Wir können die Variationsgrenzen nicht im Voraus bestimmen, aber wir sind sicher, daß solche existieren, und es sind Größen, die wir aus unseren Messungen bestimmen müssen, so gut wie das Mittel und die mittlere quadratische Abweichung. Wir können annehmen, daß für die meisten biologischen Messungen an ausgebildeten Organismen ein Gebiet der Stabilität besteht, wobei Organgrößen, die außerhalb dieses Gebietes liegen, mit dem Fortbestehen des Individuums unvereinbar sind, vorausgesetzt, daß dasselbe überhaupt den ausgewachsenen Zustand erreichen konnte. Die Frage nach dem Umfang beschränkt sich übrigens nicht auf biologische Statistiken. Barometerstandskurven müssen die gleiche Eigenschaft zeigen. Es gibt exzessiv hohe und niedrige Barometerstände, die nicht nur keinen einzigen meteorologischen Beobachter am Leben ließen, sondern die auch mit den tatsächlichen Grundzügen der physikalischen Beschaffenheit unserer Erde unvereinbar sind. In der vitalen Statistik treffen wir auf die gleiche Erscheinung. Eine Kurve des Prozentsatzes der Lebensalter der Mütter aller in einem Jahre geborenen Kinder einer geographischen Einheit muß begrenzt sein durch das Alter der Pubertät und des Klimakteriums, Schranken, welche nicht ohne Grenze gegen Kindheit und höchstes Alter ausgedehnt werden können. Auch in Morbidität und Mortalitätskurven, wo die untere Grenze des Lebens ohne weiteres klar ist, existiert aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine obere Grenze,

wenn wir sie auch nur durch die Analyse unserer Beobachtungen selbst finden können. Ein Mensch von heute mit seiner geordneten Organisation mag 120 Jahre leben können, aber wir haben seine vitalen Möglichkeiten überschritten, wenn wir z. B. 200 Jahre dafür setzen.“

„Das Problem der Variationsgrenzen scheint also ein sehr wichtiges, es schließt theoretisch die Anwendung der Normalkurve für eine Anzahl statistischer Objekte aus. Allerdings ist es richtig, daß für manche praktischen Zwecke Häufigkeitskurven begrenzten Umfangs merklich gleich sein können den unbegrenzten oder sogar der Normalkurve, aber in anderen Fällen ist das nicht der Fall und unter allen Umständen könnte uns die begrenzte Kurve vielleicht Aufschluß geben über den möglichen Umfang — die Grenzen der Stabilität — was in sich selbst von größtem Wert wäre.“

„Wir haben damit folgenden Staudpunkt gewonnen: Um erfolgreich statistische Daten zu beschreiben, bedürfen wir verallgemeinerter Wahrscheinlichkeitskurven, welche Asymmetrie und Variationsgrenzen in Rechnung ziehen. Die verallgemeinerte Kurve, die wir eben abgeleitet haben, ist asymmetrisch, aber ihr Umfang ist nur nach einer Seite begrenzt.“

„Wir benötigen demnach der folgenden Typen von Häufigkeitskurven:

Typus I. Umfang nach beiden Seiten begrenzt und Asymmetrie.

„ II. Umfang nach beiden Seiten begrenzt und Symmetrie.

„ III. Umfang nur nach einer Seite begrenzt und Asymmetrie.

„ IV. Umfang nach beiden Seiten unbegrenzt und Asymmetrie.

„ V. Umfang nach beiden Seiten unbegrenzt und Symmetrie.

„Typus V ist die Normalkurve“ (Fehlerfunktion), „Typ IV ist für geringe Asymmetrie von Poisson in Form einer approximativen Reihe behandelt worden (Sur la probabilité des jugements, Chap. 3), Typ 3 ist oben gegeben, er wurde zuerst von mir ohne Diskussion in Roy. Soc. Proc. Vol. 54, p. 331 veröffentlicht.“

In dem nun folgenden dritten Teil seiner Arbeit leitet Pearson eine asymmetrische Häufigkeitskurve begrenzten Umfangs ab mit Hilfe des gewöhnlichen Beispiels einer Urne, in der im ganzen  $n$  Kugeln enthalten sind, wo-

von  $pn$  schwarz und  $qn$  weiß sein sollen, aber ohne die gewöhnliche Annahme, daß nach dem Zug jede Kugel wieder in die Urne zurückgelegt werde. Die Wahrscheinlichkeit, daß der erste Zug eine schwarze Kugel ergeben werde ist demnach  $pn/n$ , die Wahrscheinlichkeit, daß der zweite Zug wieder eine schwarze Kugel ergibt, aber gleich  $(pn-1)/(n-1)$ , da inzwischen nur mehr  $pn-1$  schwarze und  $n-1$  Kugeln im ganzen in der Urne enthalten sind; die gleiche Wahrscheinlichkeit für den dritten Zug wird  $(pn-2)/(n-2)$ , diejenige für den  $s$ ten also gleich  $(pn-s+1)/(n-s+1)$ .

Pearson erhält also die folgende „hypergeometrische Reihe“:

$$\frac{pn(pn-1)(pn-2)\dots(pn-r+1)}{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)} \cdot \left(1+r \frac{qn}{pn-r+1} + \frac{r(r-1)}{1 \cdot 2} \frac{qn(qn-1)}{(pn-r+1)(pn-r+2)} + \frac{r(r-1)(r-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{qn(qn-1)(qn-2)}{(pn-r+1)(pn-r+2)(pn-r+3)} + \text{usw.}\right)$$

Diese Reihe hat die gleiche Bedeutung wie früher das entwickelte Binom: jedes Glied gibt die Wahrscheinlichkeit einer der möglichen Kombinationen schwarzer und weißer Kugeln, wenn immer je  $r$  Kugeln gezogen werden. Tragen wir die Glieder in konstantem Abstand als Ordinaten auf, so erhalten wir wieder ein Häufigkeitspolygon.

Und nun sucht Pearson wieder die Kurve, „die die gleiche geometrische Relation für ihre Neigung besitzt, wie dieses eben gegebene Polygon“. Er erhält so die Differentialgleichung:

$$1/y \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2}$$

worin

$$\beta_1 = \frac{c^2(r+1)(n-r+1)(1+qn)(1+pn)}{(n+2)^2}$$

$$\beta_2 = \frac{cn(n-2r)(p-q)}{2(n+2)^2}$$

$$\beta_3 = \frac{1}{n+2},$$

wenn  $c$  der Abstand der einzelnen Polygonglieder,  $n$  die Anzahl der Kugeln in der Urne, d. h. also der überhaupt vorhandenen Elementarursachen,  $r$  die Anzahl der jeweils ge-

zogenen Kugeln, d. h. also die konstante Anzahl der bei dem Zustandekommen jedes Individuums einer Reihe auftretenden Elementarursachen,  $pn$  und  $qn$  die Anzahlen der in der Urne vorhandenen schwarzen und weißen Kugeln, d. h. also die Anzahl der überhaupt vorhandenen positiven und negativen Elementarursachen bedeutet.

Diese Differentialgleichung lieferte Pearson zunächst sämtliche Formen, die er oben als notwendig postulierte. Er gibt die vier neuen Kurvengleichungen und die Art der Berechnung ihrer Konstanten an, wobei er wieder mit Hilfe der ersten vier „Momente“ Gleichungen für sie erhält, und zeigt, wie die Zugehörigkeit einer gegebenen Reihe zu einer der fünf Kurvenformen aus dem Verhalten der schon oben für das Binom angegebenen kritischen Funktion

$$6 - 3\beta_1 - 2\beta_2$$

erschlossen werden kann. In einem Supplement aus dem Jahre 1901 hat Pearson, veranlaßt durch das Auffinden von empirischen Reihen, die mit den gegebenen fünf Kurvenformen nicht zu beschreiben waren, nach einer genaueren Diskussion der Differentialgleichung noch zwei weitere Kurventypen beigelegt, und eine zweite kritische Funktion angegeben, mit deren Hilfe es in allen bisher bekannten Beispielen gelingt, die Variationsformen homogener statistischer Reihen zu beschreiben.

In der ersten Abhandlung schlägt Pearson zur Ableitung der einzelnen Kurvenformen seiner Differentialgleichung das folgende Verfahren ein.

„Wollen wir nun die Kurve finden, die die gleiche geometrische Relation für ihre Neigung besitzt, wie das oben gegebene Polygon, so sehen wir, daß sie ihren Typus verändert, je nach dem Vorzeichen von

$$\beta_2^2 - 4\beta_1\beta_3.$$

Nun hängt die Ausführung der Integration der in Rede stehenden Differentialgleichung davon ab, ob

$$\sqrt{\beta_2^2 - 4\beta_1\beta_3}$$

reell oder imaginär ist. Im ersteren Fall kann der quadratische Ausdruck im Nenner in einfache Faktoren zerlegt werden, und man erhält

nach der Integration eine einfache logarithmische Gleichung für  $y$ . Im zweiten tritt aber in der Gleichung für  $y$  eine trigonometrische Funktion ( $\arctg$ ) auf.

Dieser zweite Fall liefert unmittelbar die Gleichung

$$y = \frac{y_0}{1 + (x^2/a^2)^m} e^{-v \arctg x/a}$$

eine asymmetrische, beiderseits unbegrenzte Kurve, die Pearson in der Folge als Typus IV bezeichnet. In ihr ist

$$a = \frac{1}{4} e \sqrt{4(1+pn)(1+qn) - (n-2r)^2};$$

$$v = \frac{n(n-2r)(p-q)}{\sqrt{4(1+pn)(1+qn) - (n-2r)^2}};$$

$$m = \frac{1}{2}(n+2).$$

Diese Kurve geht erstens für  $n$  gleich unendlich, zweitens für  $r, n$  gleich  $\frac{1}{2}$  und drittens für  $p$  gleich  $q$  in die normale Kurve über.

Im ersten Fall liefert die Integration, wenn  $a_1$  und  $a_2$  die Wurzeln von

$$\beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 x^2$$


und

$$1/v = \beta_3(a_1 - a_2)$$

die Kurvengleichung

$$y = y_0(1 - x/a_1)^{-v/a_1}(1 - x/a_2)^{v/a_2}.$$


Pearson fährt nun fort: „Nehmen wir an, daß  $y_0$ ,  $v$ ,  $a_1$  und  $a_2$  jedes Vorzeichen annehmen können, so sehen wir, daß diese Häufigkeitskurve drei fundamentale Unterformen aufweist.“



$$I. y = y_0(1 + x/a_1)^{v/a_1}(1 - x/a_2)^{-v/a_2}.$$


„Eine asymmetrische Kurve begrenzten Umfangs, das Maximum gegen die Mitte zu. Für gewöhnlich sind  $v a_1$  und  $v a_2$  gebrochene Zahlen, die Kurve wird also imaginär zwischen den Grenzen  $-a_1$  und  $a_2$ .“





$$\text{II. } y = y_0 (x/a_1 - 1)^{-r a_1} (1 - x/a_2)^{r a_2}$$


„Hierin variiert die Ordinate zwischen  $x = a_1$  und  $x = a_2$  von Unendlich bis Null. Die Kurve ähnelt den Reihen, die man bei nationalökonomischen Problemen (Wertänderungen) erhält, oder derjenigen der Kindersterblichkeit.“



$$\text{III. } y = y_0 (1 - x/a_1)^{-r a_1} (1 + x/a_2)^{-r a_2}$$

„Eine asymmetrische Kurve begrenzten Umfangs mit einem Minimum gegen die Mitte zu. Dieses Verschwinden der Mitte ist kein ganz ungewöhnlicher Zug in der Statistik. Das Vorherrschen der Extreme wird nicht nur in meteorologischen Beobachtungen gefunden, sondern auch bei Preisbewerungen, wobei die Mittelmäßigen zufällig einmal genug Verstand besitzen, sich der Bewerbung zu enthalten, der Typ ist der gleiche wie Galtous Kurve der Consumptivity.“


„Die Kurve enthält außerdem mehrere interessante aber weniger fundamentale Unterformen:



„IV. Machen wir  $a_2$  gleich unendlich in I.

$$y = y_0 (1 + x/a_1)^{r a_1} e^{-r x}$$


Die Greuze des asymmetrischen Binoms, welche in § 8 beschrieben wurde.“



„V. Mache  $a_1 = a_2$

$$y = y_0 (1 - x^2/a_1^2)^{r a_1}$$

eine symmetrische Häufigkeitskurve begrenzten Umfangs.“




„VI. Machen wir  $r$  negativ in V.“

„Eine symmetrische Häufigkeitskurve begrenzten Umfangs, das Minimum in der Mitte.“

„VII. Setzen wir in V.  $r = p a_1$  und machen  $a_1 = \infty$

$$y = y_0 e^{-p x^2}$$

so erhalten wir die Normalkurve.“



„VIII. Setzen wir  $a_2 = \infty$  in II

$$y = y_0 (x/a_1 - 1)^{-r a_1} e^{-r x}$$

„Eine asymmetrische Häufigkeitskurve, deren Ordinate von  $\infty$  bis 0 über unbegrenzten  $x$  variiert.“

„Alle acht eben gegebenen Typen sind in der einzigen Form enthalten:

$$y = y_0(1 + x/a_1)^{\alpha_1}(1 - x/a_2)^{\alpha_2}$$

oder

$$y = y_1 x^r (1 - x/c)^s,$$

wenn wir den Konstanten positive, negative oder Grenzwerte geben. Um das zu tun, müssen wir  $\mu$  und  $r$  in  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  und  $\beta_3$  Werte geben, die nicht leicht verständlich sind (not easily intelligible), wenn wir uns streng an unser Beispiel halten, eine bestimmte Menge Sand\*) aus einer bestimmten Menge einer Mischung von zwei Sandarten zu entnehmen. Wie dem auch sei, der letztgegebene Kurventyp ist die Häufigkeitskurve für Wahrscheinlichkeiten a priori (siehe Crofton, Probability, § 17, Encycl. Brit.) und erlaubt eine direkte Interpretation der folgenden Art.<sup>4</sup>

„Gegeben sei eine Linie von der Länge  $\lambda$  und angenommen, auf ihr seien  $r + 1$  Punkte nach Zufall verteilt. Was ist die Häufigkeit, mit der der Punkt  $pr$  vom einen Ende und  $qr$  vom anderen Ende der Reihe von  $r + 1$  Punkten auf das Element  $\delta x$  der Linie fällt?“

„Die Antwort ist ohne weiteres:

$$\binom{r}{pr} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{pr} \left(1 - \frac{x}{\lambda}\right)^{qr} \frac{\delta x}{\lambda}$$

oder wir erhalten eine Häufigkeitskurve des Typus

$$y = y_0 x^{pr} (1 - x/\lambda)^{qr}.$$

„Wir können das Problem noch etwas anders ausdrücken. Nimm  $r + 1$  Karten und stecke sie zufällig zwischen die Seiten eines Buches, so ist die Häufigkeit der Seite, die auf die  $(pr + 1)$ te Karte folgt, durch die obige Kurve gegeben“ und in Anmerkung hierzu: „Worauf besonders zu achten ist, ist der Umstand, daß wir es hier mit einer Verteilung zu tun haben, in der die Elementarsachen in einem Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen.“

„Ehe wir nicht sehr viel genauer wissen, als das bisher der Fall ist, wie die Größe eines Organs eines Individuums von der Größe der gleichen Organe seiner Vorfahren abhängt, oder

\* Das Wort „Sand“ ist gewählt, um eine große Menge kleiner Kugeln zu veranschaulichen.

was die Natur der Ursachen sei, die Preise oder Einkommen oder die Mortalität eines bestimmten Alters bestimmen, kann ich das Recht nicht einsehen, mit dem als einziges Gesetz der Verteilung die normale Kurve  $y = y_0 e^{-px^2}$  der viel allgemeineren

$$y = y_0(1 + x/a_1)^{\alpha_1}(1 - x/a_2)^{\alpha_2}$$

vorgezogen wird, welche nicht nur die erstere einschließt, sondern auch das Element der Asymmetrie liefert, welches ohne Zweifel in vielen statistischen Reihen gegenwärtig. Wie wir die erstere als Grenze einer Münzwurfbreie auffassen können, so gibt uns die letztere die Grenze für Kreisspiel- oder Kartenexperimente. Es ist nicht leicht einzusehen, warum Natur oder Nationalökonomie vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitsrechnung dem Münzenwerfen näher verwandt sein sollen als dem Kreisdrehen oder dem Karteziehen. Auf alle Fälle sind wir vom rein praktischen Standpunkt aus berechtigt, die allgemeinere Form zu verwenden, so lange die Analyse nicht zu schwierig ist. Wir erhalten so ein Maß der Abweichung gegebener statistischer Reihen vom normalen Kurventyp und in manchen Fällen asymmetrischer Reihen kann unsere allgemeinere Formel noch benutzt werden, wo es den Gipfel der Unvernunft bedeutete, die Normalkurve überhaupt anwenden zu wollen.“

Im folgenden gibt Pearson noch die Theorie der Anpassung seiner neuen Kurventypen an empirisches Material und schließt mit einem umfangreichen Kapitel, in dem er an 15 genau ausgeführten Beispielen die ganz überraschend exakte Wiedergabe empirischer Reihen durch die einzelnen Formen seiner „allgemeineren Häufigkeitskurve“ nachweist.

Die beiden Kurvenformen, die ihm in seiner ersten Veröffentlichung entgangen waren, und die er, wie schon erwähnt, im Jahre 1901 in (17) beifügte, sind zwischen Typ III und Typ IV eingeschoben und haben die Gleichungen:

V.  $y = y_0 x^{-p} e^{-x^2}$ , worin  $\gamma = c_1/c_0$  und  $p = 1/c_0$ , wenn die ursprüngliche Differentialgleichung in

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{c_0(c_1 + x)}$$

umgeformt. Eine asymmetrische Kurve von einseitig begrenztem Umfang wie Typ III.

VI.  $y = y_0(x - a)^{m_1} 1/x^{m_2}$ . Eine Kurve, die sich aus dem alten Typ I ableitet, wenn  $m_1 = \nu a_1$  oder  $m_2 = \nu a_2$  negativ ist. Ebenfalls eine asymmetrische Kurve von einseitig begrenztem Umfang, wenn ihr Umfang zwischen  $a$  und  $\infty$  angenommen wird.

Nämliche von seiner Differentialgleichung ableitbaren Kurvenformen sind schließlich von Pearson in dem folgenden Schema übersichtlich zusammengestellt worden.

Wenn

$$K_1 = 2\beta_2 - 3\beta_1 - 6$$

und

$$K_2 = \frac{\beta_1(\beta_2 + 3)^2}{4(4\beta_2 - 3\beta_1)(2\beta_2 - 3\beta_1 - 6)}$$

worin  $\beta_1 = \mu_1^2 \mu_2^2$  und  $\beta_2 = \mu_1 \mu_2^2$ , so ergibt sich aus dem Verhältnis dieser beiden Kriterien die Zugehörigkeit eines beliebigen empirischen Materials zu den Pearsonschen Typen folgendermaßen:

|  |                |
|--|----------------|
| $K_2 = \infty$ . . . . .               | Übergangskurve |
|  | Typ III        |
| $\infty > K_2 > 1$ . . . . .           | Typ VI         |
| $K_2 = 1$ . . . . .                    | Übergangskurve |
|  | Typ V          |
| $1 > K_2 > 0$ . . . . .                | Typ IV         |
| $K_2 = 0; \beta_1 = 0; \beta_2 = 3$    | Normalkurve    |
| $K_2 = 0; \beta_1 = 0; \beta_2 \geq 3$ | Typ II         |
| $K_2 < 0$ . . . . .                    | Typ I.         |

Seinem Supplement hat Pearson keine weiteren allgemeinen Betrachtungen beigelegt. Wir dürfen also daraus entnehmen, daß er die Ansichten, die er in seiner ersten Arbeit aussprach, im wesentlichen unmodifiziert aufrecht erhalten will.

Betrachten wir Pearsons Lösung zunächst in ihrer Beziehung zur Geschichte des Problems.

Schon der erste Abschnitt seiner Arbeit stellt uns dann einen wichtigen Fortschritt dar.

Allerdings hatte schon Quetelet unsymmetrische Reihen mit unsymmetrischen endlichen Binomen verglichen, deren er eine Anzahl berechnet hatte (vgl. W. Lexis 16, 16). Doch war man bisher auf eine empirische Auswahl zwischen den von Quetelet gegebenen Beispielen beschränkt gewesen. Pearson gibt uns dagegen die Art der Berechnung des einer gegebenen Reihe sich am nächsten anschließenden Binoms und zeigt gleichzeitig die Grenzen

dieser Methode an. Dabei ergibt sich denn, daß nur ganz bestimmte Reihen überhaupt durch das Binom in einigermaßen befriedigender Weise wiedergegeben werden können. Andere ergeben Resultate, die in Widerspruch mit den ursprünglich auf das Binom hinleitenden Annahmen stehen, wie z. B. negative Anzahlen von Elementarursachen, und wieder andere lassen sich trotz ihrer Asymmetrie überhaupt nicht durch ein asymmetrisches Binom besser wiedergeben, als durch die Fehlerfunktion, denn sie weichen nach der entgegengesetzten Seite von der Fehlerfunktion ab. Pearson legt dabei Wert darauf, daß das asymmetrische Binom sich fähig zeigt, empirische Reihen einigermaßen zu beschreiben, selbst wenn die Konstanten desselben einen uns völlig unverständlichen Sinn angenommen haben. Wir werden noch sehen weshalb.

Daraus folgt ohne weiteres, daß das Binom überhaupt nicht das allgemeine Gesetz der Entstehung der Variationskurven sein kann.

Im zweiten Teile gibt Pearson an Stelle des asymmetrischen Binoms eine Kurve, die zu ihm im gleichen geometrischen Verhältnis steht, wie die Fehlerfunktion zum symmetrischen. Diese Relation, über deren Natur Pearson schweigt, gibt nun einen leicht verständlichen Sinn: Ebenso wie die Fehlerfunktion als eingeschriebene Kurve des aus dem symmetrischen Binom entstandenen Polygons aufgefaßt werden kann, so ist die in Pearsons § 8 gegebene Kurve nichts anderes als die dem asymmetrischen Binom eingeschriebene Kurve\*). Damit ist von vornherein schon klar, daß auch diese Kurve nicht alle empirisch gegebenen Häufigkeitspolygone zu beschreiben vermag, ebensowenig wie das asymmetrische Binom selbst. Auch sie kann also nicht die endgültige Lösung sein.

Im dritten Teile ist es dann Pearson gelungen, eine Differentialgleichung abzuleiten,

\*) [Die Kurve schließt sich, ihrer Differentialgleichung nach, so an das Polygon an, daß sie jeweils durch die Mitte einer Polygonseite geht und hier die „gleiche Neigung“ wie diese Polygonseite besitzt, d. h. also, diese Polygonseite zur Tangente hat. Es ist also eine Kurve, die von allen Polygonseiten berührt wird, d. h. eben eine dem Polygon eingeschriebene Kurve. Genau die gleiche Konstruktion wendet Pearson bei dem erweiterten Problem an.]

wieder von der eingeschriebenen Kurve einer aus dem Binom erhaltenen Reihe, die mit den ihr entsprechenden Kurvgleichungen den größten Teil der bislang beobachteten Kurven homogenen Materials in geradem glänzender Weise zu beschreiben imstande ist. Eine Ausnahme bilden bloß die multimodalen Kurven der diskontinuierlichen Variation von Blüthenanteilen, die uns aus den Arbeiten Ludwigs bekannt geworden sind (vgl. [17], [18], [19], [20]). Wir werden darauf noch zurückkommen.

Die erste Seite unseres Problems, von der wir ausgingen, hat also durch Pearson in sehr umfassender Weise ihre Lösung gefunden. Allerdings hat sich für die beschreibbaren Kurven eine ganze Anzahl von nicht gerade einfach zu berechnenden Parametern gefunden und sogar unterschiedliche für die verschiedenen Kurvenarten. Die daraus resultierende Schwierigkeit der Vergleichung ist, wenigstens für einige seiner Kurvenformen, von Pearson in etwas dadurch beseitigt worden, daß er nachwies, daß sie durch drei Parameter hinreichend beschrieben sind. Er nennt hierfür Mittelwert, mittlere quadratische Abweichung und Asymmetrie. Pearson hat diese Seite seiner Theorie nicht für alle seine Kurven durchgearbeitet. Auch liegt die Bestimmung der wahrscheinlichen Fehler der neuen Konstanten bisher nur in recht unhandlicher, für den praktischen Gebrauch sich noch nicht eignender Form vor. Doch wären diese Schwierigkeiten wohl noch zu beseitigen.

Die englische biometrische Schule, die sich die praktische Verwendung der Pearsonschen Methoden zur Aufgabe gestellt hat und ihre Kenntnis mit viel Enthusiasmus und Mühe überallhin zu verbreiten sucht, kommt damit für unser Problem zu folgendem Standpunkt: Eine exakte Kenntnis der Kurvenformen variierender Gegenstände wird nur an der Hand der Pearsonschen Analyse der Kurven und durch die aus seinen einzelnen Kurvgleichungen sich ergebenden Parameter vermittelt. Eine wissenschaftliche Behandlung der Formfragen und, was für uns wichtiger ist, eine wissenschaftliche Vergleichung von Variationsreihen, kann also diese Methoden nicht umgehen. Aus der Tatsache des Vorhandenseins einer Anzahl

unabhängiger Parameter ergibt sich, daß die Reihevergleichung nicht mit der Vergleichung des Mittelwertes, überhaupt nicht mit der Vergleichung eines einzigen Wertes erledigt ist, da sich die Reihe — auch nicht ihre Lage über der  $x$ -Achse — nicht durch einen einzigen Wert beschreiben läßt. Selbst wenn wir die absolute Größe einer Eigenschaft verglichen werden soll, ist also immer mindestens die Kenntnis des dichtesten Wertes neben dem arithmetischen Mittel vonnöten, häufig aber auch die Kenntnis des endlichen Variationsumfanges, der sich ja auch aus den Pearsonschen Gleichungen ableiten läßt.

Ehe wir diese Forderungen annehmen oder ablehnen, müssen wir ihre Folgen für die zweite Seite unseres Problems zu Rate ziehen, und auf dieser Seite finden wir denn eine ganze Anzahl von Mängeln der Pearsonschen Theorien, die ihren Anhängern entweder nicht bekannt sind oder doch hartnäckig von ihnen ignoriert werden.

Betrachten wir zunächst die Tatsache, daß Pearson die eingeschriebenen Kurven seiner hypothetischen Verteilungsgesetze benutzt, so finden wir, daß dieselben als solche überhaupt nicht interpretierbar sind. Die Natur muß uns unmittelbar das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten geben und es ist nicht denkbar, daß sie diesem Gesetz, das wir allerdings nicht kennen, eine Kurve einschreibt. Schon allein damit ergibt sich, daß keiner einzigen seiner Kurven eine verständliche, auf die Art des Entstehens der Variation anwendbare Theorie zugrunde liegt. Eine schwere Enttäuschung für den nach Erkenntnis Dürstenden, der sich durch alle die Rechnungen durchgearbeitet, um zum Kern der blendenden Resultate zu gelangen!

Die kontinuierlichen Kurven Pearsons sind also ohne verständlichen Bezug auf die Kombinationen der Elementarursachen, von denen er selbst ausgeht. Da Pearson außer ihnen nur noch diskontinuierliche Reihen gibt und selbst diese letzteren für den genaueren Ausdruck der Variationsgesetze ansieht, ist die nächste Frage, die uns zu beschäftigen hat: Ist die diskontinuierliche Reihe das exakte Bild der Variationsgesetze oder die kontinuierliche Kurve?

Es handelt sich demnach um die Entscheidung: Ist die Anzahl der Elementarursachen endlich oder unendlich. Die Art, wie Pearson sich mit dieser Frage auseinandersetzt, ist, wie mir scheinen will, keine ganz glückliche. Seine Einwendungen, gegen den vor ihm als stringent betrachteten Schluß: „Die Variation ergibt stetige Formenreihen, also muß die Anzahl der Elementarursachen unendlich groß und die Wirkung der einzelnen Elementarursachen unendlich klein angenommen werden“, richten sich sowohl gegen den Vordersatz als gegen den Schluß selbst. Erstens könne die Variation recht wohl diskontinuierlich sein, aber die Ungenauigkeit unserer Sinnesapparate und Instrumente verbinde uns, die einzelnen Variationsstufen wahrzunehmen. Zweitens könne aber die Kontinuität von ganz anderen Ursachen abhängen als von der Größe von  $n$ . Man könne sich zum Beispiel denken, daß zwar die Anzahl der Elementarursachen eine begrenzte, daneben aber eine Power of fractionising the result vorhanden sei.

Bei dieser dominierenden Wichtigkeit der Frage nach den Elementarursachen scheint es nicht überflüssig, die Variationsursachen selbst in dieser Hinsicht zu untersuchen.

Die in der Natur vorkommenden Variationsursachen, d. h. solche, die den einzelnen Individuen ihre individuellen Maße zuzumessen, sind Wärme, Licht, Ernährung, Vererbung und vielleicht noch eine Anzahl ähnlicher Faktoren. Wenn wir auch die Anzahl dieser Ursachenklassen nicht genau angeben können, so kann sie doch sehr wohl eine recht beschränkte sein. Trotzdem müssen wir die Anzahl der Elementarursachen selbst als unendlich groß und die Größe der Wirkung der einzelnen Ursache als unendlich klein annehmen. Analysieren wir z. B. die Wärme in ihren Wirkungen auf einen Organismus, so finden wir die Entwicklung eines solchen in erster Linie von den sogenannten Temperatursummen abhängig. Es sind das Gesamtwärmemengen, die während der Entwicklungszeit eines Organismus auf ihn eingewirkt haben. Sie setzen sich aber aus der wechselnden Wärme jedes Tages, jeder Stunde, jeder Minute und Sekunde, zuletzt eben jedes einzelnen Zeitdifferentials zusammen, deren jedes

einzelne auf das Wachstum von Einfluß gewesen ist und als deren Gesamtwirkung — bei Ausschluß anderweitiger Störungen — wir die schließliche Abweichung von dem typischen Werte aufzufassen haben. Wir sehen also, daß die Wirkung der Wärme, die je nach ihrer absoluten Menge beschleunigend, hemmend oder sogar zerstörend wirken kann, innerhalb der beiden Temperaturgrenzen jede beliebige Intensität zwischen dem völligen Hemmen jeder Entwicklung und einem Optimum der Beschleunigung anzunehmen vermag. Der kontinuierlichen Reihe von möglichen Wärmemengen, die nirgends eine Diskontinuität zeigt, entspricht eine ebenso kontinuierliche Reihe von Wirkungen. Das gleiche gilt für Licht und Ernährung, sowie die übrigen Faktoren des Milieus und wahrscheinlich — mutatis mutandis — auch von der Vererbung. Die Analyse der Elementarursachen ergibt uns also unweigerlich die bisher immer angenommene unendliche Anzahl derselben, die unendliche Kleinheit der Wirkung jeder einzelnen Ursache und die Kontinuität der möglichen Wirkungsgrade.

Sie ergibt also wirklich die Verhältnisse, die wir zum Verständnis der kontinuierlichen Variationskurven ganz unumgänglich nötig haben. Denn wie soll eine kontinuierliche Kurve sich aus der Kombination endlicher Bausteine ergeben?

Der Versuch, sich mit der Konstruktion einer Power of fractionising the result über diese Schwierigkeit wegzubelfen, muß demnach wohl schon von vornherein als gescheitert betrachtet werden. Leider hat Pearson nicht weiter ausgeführt, wie er sich diese „Kraft“ gedacht hat. Denn wenn es nicht bei einem leeren Wortspiel sein Bewenden haben soll, müßte doch durch die Annahme einer solchen „Teilkraft“ die Möglichkeit gewährleistet sein, mittels derselben jedes beliebige Verhältnis, also auch infinitesimal voneinander abweichende Verhältnisse, erzielen zu können. Es will mir nicht gelingen einzusehen, wieso das möglich sein soll, ohne ein Zurückgehen auf infinitesimale Bausteine.

Pearson muß auch die Schwäche dieses Argumentes nicht unbekannt gewesen sein, denn er wendet sich sofort weiter gegen die Tat-

sache der Kontinuität unserer Variationskurven überhaupt. Sein hierher treffender Einwand, die Genauigkeit unserer Instrumente genüge nicht, um die tatsächliche Diskontinuität nachzuweisen, will mir aber, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr als ein Produkt der Verlegenheit erscheinen. Denn es ist doch nicht einzusehen, wieso ein bestimmtes Maß, z. B. die Schädelbreite diskontinuierlich variieren sollte. Das würde ja bedingen, daß sie sich bei allen Individuen aus gleich großen, regelmäßig geforneten Elementen aufbaue, die ganz regelmäßig gelagert wären, wovon, wie wir alle wissen, gar keine Rede sein kann; ganz abzusehen von den täglichen Schwankungen, z. B. der Körpergröße und den Schwankungen des Gewebsturgors, die alle Organgrößen mehr oder minder wesentlich affizieren müssen, und deren Diskontinuität ebenfalls widersinnig.

Der Grund allerdings, der Pearson zu dieser auffälligen und so schwer zu beweisenden Annahme veranlaßte, ist uns schwer einzusehen. Er ist darin zu sehen, daß sich seiner Ableitung bei der Annahme  $n$  gleich unendlich die größten Schwierigkeiten entgegenstellen. Pearson braucht die endliche Anzahl von Elementarursachen, um überhaupt eine asymmetrische Kurve ableiten zu können. Seine „hypergeometrische Reihe“ geht für  $n$  gleich unendlich ohne weiteres in das asymmetrische Binom über, und dieses wieder nach den bisherigen Analysen für die gleiche Annahme in die Fehlerfunktion. Für  $n$  gleich unendlich wird also nach dem bisherigen das asymmetrische Binom symmetrisch. Pearson wendet sich allerdings auch gegen diese Annahme, aber er bleibt uns den Nachweis schuldig, was aus seiner Differentialgleichung

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{p q (n+1) x^2 + (p-q) \frac{c}{2} x}$$

für  $n$  unendlich groß und  $c$  unendlich klein werden soll, wenn nicht die Fehlerfunktion\*).

\*) [Die bisherigen Lösungen gehen von der Stirling'schen Näherungsformel aus (Cauchy (?), S. 95 f.). Dabei zeigt sich leicht, daß man, um endliche Werte zu bekommen,  $r, c (= z)$  und  $n \cdot c^2$  endlich setzen muß, also mit  $n = z$  unendlich klein von der Ordnung  $\frac{1}{\sqrt{z}}$ .

Wir können schließen: Die von Pearson gegebene Ableitung seiner Häufigkeitskurven steht und fällt — von dem an erster Stelle gegebenen Einwand abgesehen — mit der Annahme, daß  $n$  endlich sei. Wir glauben aber geneigt zu haben, daß diese Annahme unhaltbar ist\*).

Seine Ableitung enthält aber noch andere Unzulänglichkeiten theoretischer Art. Wir haben oben erwähnt, daß das endliche Binom für manche Kurven widersinnige Annahmen ergibt. Die gleichen Annahmen treten aber bei der endgültigen Lösung Pearsons abermals auf. Wenn Pearson zur Ableitung seiner Kurven  $y_0, v, a_1$  und  $a_2$  „jedes Vorzeichen“ annehmen läßt, so bedeutet das nichts anderes, als daß er in einigen derselben die Anzahl der Elementarursachen oder  $p$  oder  $q$  hat negativ werden lassen. Pearson nennt das mit Recht „Werte, die nicht leicht verständlich sind“, kann aber der Konsequenz nicht answeichen. Er braucht also zur Ableitung einiger seiner Kurvenformen Annahmen, wie die einer Wahrscheinlichkeit, daß mehr Ursachen einwirken, als überhaupt vorhanden sind, oder daß weniger Ursachen als gar keine am Werke waren\*\*).

$r$  von der Ordnung  $\frac{1}{\sqrt{z}}$ , so daß  $n$  gegen  $r$  selbst unendlich groß ist. Wenn wir in obiger Differentialgleichung die Größen in diesem Verhältnis unendlich groß und unendlich klein werden lassen, so verschwindet aber das zweite Glied des Nenners gegen das erste, und wir erhalten wieder die Differentialgleichung der Gauß'schen Kurve. Wenn Pearson sagt, daß dies Verschwinden nicht nötig sei, so müßte er zeigen, daß ein anderer Grenzübergang möglich ist, wobei die Gleichung einen Sinn behält. Dazu sehe ich aber keinen Weg.]

\*) Damit fällt auch sein Beispiel der Analogie der Kombination der Elementarursachen mit dem Ziehen von Karten aus einem Pack mehrerer Spiele.

\*\*\*) Er hat übrigens, durch die ausgezeichneten praktischen Erfolge der so gewonnenen Kurven ermutigt, später die anfängliche Scheu vor solchen Annahmen so sehr verloren, daß er sie einmal meines Erachtens ganz unöbigerweise macht, wo ihm die Möglichkeit, ein verständliches Resultat zu erhalten, offen stand. Auf Tafel 9 seiner ersten Abhandlung gibt Pearson eine Übersicht aller der Formen, die sein Typ III, die eingeschriebene Kurve des asymmetrischen Binoms, anzunehmen vermag. Mich interessierten vor allem die Beispiele, die das Zustandekommen der einseitigen Kurven auf Grund dieser Hypothese veranschaulichen. Es sind das die Kurven I und II dieser Tafel. Für die erste derselben gibt Pearson  $p = (-0,87)$ , also negativ. Nun kann aber das Parametersche  $p$  nur dann negativ werden, wenn entweder  $n$  oder  $p$  oder  $q$

Eine eingehendere Besprechung verdient auch noch das theoretisch sehr wichtige Problem der Begrenzung unserer Kurven. Pearson stellt, wie wir gesehen haben, neben der uns schon aus Fechner geläufigen Forderung, daß die Variationskurve bei Null begrenzt sein müsse, auch die weitere Forderung auf, daß das allgemeine Gesetz neben dieser Form sowohl beiderseits unbegrenzt als auch beiderseits endlich begrenzte Formen anzunehmen imstande sein müsse.

Für seine Forderung beiderseits unbegrenzter Formen gibt Pearson keinen Grund an. Er nimmt sie mit, da sie seine Ableitung liefert. Er weist aber einmal darauf hin, daß zwar seine eingeschriebenen Kurven teilweise unbegrenzt werden können, das Gesetz selbst, die hypergeometrische Reihe, aber nicht, und vertröstet auf eine spätere Arbeit, in der an Stelle der eingeschriebenen Kurven die Anpassung der Reihen selbst gegeben werden solle. Diese spätere Arbeit ist nie geschrieben worden. Wir wissen nun schon, daß sie keinerlei Vorteil bringen könnte, denn es ist ausgeschlossen, daß das allgemeine Gesetz der Variation aus einer endlichen Anzahl diskontinuierlicher Punkte bestehe, da die Variation selbst sicher kontinuierlich fortschreitet<sup>\*)</sup>. Daß seine Methode beiderseits unbegrenzte Kurven liefert, und zwar nicht bloß als Übergangsform, die sich nie exakt verwirklichen würde, sondern als gerade bei der organischen Variation sehr häufig aufgefundene Form, muß uns wieder als ungelöster Widerspruch erscheinen.

negativ werden. Für die zweite Kurve gibt er  $p = 0,001$ . Das  $p$  seiner Gleichung kann aber nur für sehr kleines  $p$  oder  $q$  so kleine Werte annehmen.

$$p = \gamma a = \frac{4pq(n+1)}{(p-q)^2}$$

Wir können also, wenn wir von der Kurve auf die Bedingungen, die in der realen Welt der Erscheinungen diese Kurvenform hervorbringen könnten, zurückzuschließen wollen, zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen. Pearson ist im weiteren Verlaufe seiner Arbeit nur auf das negative  $p$  zurückkommen (Beispiel X und XI) und hat die Gleichung für diesen Fall näher analysiert, während er die Gleichung für gegen Null konvergierendes  $p$  oder  $q$  nicht weiter betrachtet hat.

<sup>\*)</sup> Das Anpassen der ursprünglichen Reihen muß Resultate ergeben, deren Unveränderlichkeit und Unmöglichkeit sich mit Händen greifen läßt.

Sehr wichtig ist aber seine zweite Forderung, daß das allgemeine Gesetz auch beiderseits begrenzter Formen fähig sein müsse. Die Beispiele, die er zur Begründung dieser Ansicht gibt, scheinen mir deshalb einer näheren Betrachtung wert (vgl. dieses Referat S. 314 und 315). Das erste ist etwas künstlich aufgestellt und erfüllt zwar Pearsons Absicht, die Möglichkeit doppelseitig begrenzter statistischer Reihen überhaupt zu beweisen, sehr gut, vom Standpunkte des Anthropologen aber dürfte es sich doch fragen, ob dergleichen Verhältnisse bei der Entwicklung von Organismen vorkommen können. Das zweite ist für die Anthropologie von wesentlich größerer Bedeutung, da es sich mit dem Verteilungsgesetze der Indizes beschäftigt. Zweifellos sind für einige derselben die äußersten Grenzen schon bei 0 und 1 gelegen und die tatsächlichen Grenzen sind notwendig noch enger, aber es handelt sich dabei um zusammengesetzte Ereignisse, nicht mehr um freie organische Variation. Das allein bedingt hier die Begrenzung, die dem Einzelereignis und damit dem Variationsgesetz als solchem allein deshalb noch nicht zukommen brauchte. Das dritte Beispiel ist physikalischer Natur, erläutert aber das Zustandekommen einer solchen Reihe sehr gut. Eine ganz unzugängliche Grenze ist durch das ja möglicherweise endliche Gesamtgewicht der Atmosphäre gegeben. Ob aber der Barometerstand nicht auch den zusammengesetzten Ereignissen zuzurechnen, bedürfte noch einer eigenen Untersuchung, da exzessiv hohe Barometerstände über einer Erdstelle — von den Gleichgewichtsbedingungen abgesehen — gerade infolge des gegebenen Gesamtgewichtes der Atmosphäre exzessiv niedrige an anderen Bedingungen müssen. Das vierte ist wieder auf das deutlichste ein zusammengesetztes Ereignis, für das fünfte aber, die hypothetische, absolute Grenze der Lebensdauer, ist eine Entscheidung a priori unmöglich. Ob hier wirklich eine sich unweigerlich erschöpfende Menge von Möglichkeiten vorliegt, oder ob die höchsten Werte nur unendlich unwahrscheinlich werden, kann a priori nicht entschieden werden.

Aber wenn wir auch ganz von Pearsons Beispielen absehen, so können wir doch schon

a priori sagen, daß Begrenzungen der freien Variation vorkommen müssen. Vor allem durch die Funktion. Man denke z. B. nur an die Fortpflanzungsorgane, etwa an die der Insekten (vgl. Standfuß [27]). Das Vorkommen von Begrenzungen ist also zuzugeben. Mir scheint es sich aber, soweit meine heutige Übersicht reicht, dann immer um zusammengesetzte Ereignisse zu handeln. Die Begrenzung liegt ja, z. B. bei den Fortpflanzungsorganen, nicht in der Art der Kombination der Ursachen der Formänderungen, sondern darin, daß nur das Zusammentreffen zweier bestimmter, voneinander unabhängig variierender Formen, das Fortleben der Art ermöglicht. Die Variationskurve wird durch die Anlese an beiden Seiten beschnitten.

Die von Pearson erhaltenen Resultate von Variationsumfängen verdienen noch eine kurze Besprechung, da sie ein besonders durchsichtiges Beispiel an die Hand geben, daß theoretisch unzulängliche Methoden auch praktisch unbrauchbare Resultate liefern müssen. Wo bleibt die Verwendbarkeit einer Methode, die für einen Kollektivgegenstand, dessen Begrenzung bei 0 und 1 von vornherein unweigerlich feststeht, einen unendlichen Variationsumfang ergibt? Das ist aber bei Pearsons Methoden durchaus nichts ungewöhnliches. Pearson selbst gibt gleich im zweiten praktischen Beispiel, das er seiner besprochenen Abhandlung beifügte, einen solchen Fall. Auch die endlichen Variationsumfänge, die sich nach Pearson ergeben haben, sind nicht besser. Müssen wir schon von vornherein die Brauchbarkeit eines Kriteriums abweisen, das für sicher begrenzte Formen unbegrenzte Kurven nachweist, und nach der gleichen Methode als endlich begrenzt sich herausstellende Kurven in ihrer Begrenztheit stark bezweifeln, so haben andererseits auch die Werte von Variationsumfängen, die bislang aufgefunden sind, keinerlei weitere Erkenntnis gebracht. Sie reichen oft ins Negative, sind auch im ganzen meist größer als denkbar (vgl. Dunker [2]), und Pearson konnte andere nur mit großer Anstrengung, und unter Anwendung von allerlei größeren und kleineren Änderungen in seiner Methode ad hoc, in eine

für den vorliegenden Zweck nicht zu unwahrscheinliche Form bringen. Genau das gleiche gilt theoretisch von den übrigen Konstanten seiner Kurven, nur daß die Resultate hier praktisch weniger leicht als unrichtig dargetan werden können. Doch muß allen seinen Konstanten, als auf Grund unmöglich richtiger Annahmen berechnet, jede Bedeutung für die Biologie abgesprochen werden, die darüber hinausgeht, eine approximative empirische Beschreibung von gegebenen Variationsreihen zu geben.

Die Pearsonsche Entdeckung, daß eine große Anzahl unimodaler Variationskurven sich durch eine bestimmte Differentialgleichung beschreiben lassen, hat also einstweilen rein empirischen Wert. Es ist ihm völlig mißlungen, seiner Entdeckung einen verständlichen Sinn unterzulegen. Die von ihm gegebenen Ableitungen sind als mit dem Geschehen in der Natur unvereinbar abzuweisen.

Damit fallen auch diejenigen Forderungen der englischen biometrischen Schule, die sich auf die Pearsonschen Methoden der Beschreibung von Variationskurven beziehen. Biologie und Anthropologie können nur von Theorien Gebrauch machen, die sich nicht mit dem Inhalt ihres Wissens in unauf löslichem Widerspruch befinden. Bei der Benutzung der Pearsonschen Gleichungen und Berechnungsmethoden von Hauptwerten usw. in ihrer heutigen Form ist aber für jeden wissenschaftlichen Gebrauch große Vorsicht sehr zu empfehlen, denn ihre Anwendung erweckt einen falschen Anschein von Genauigkeit und Sicherheit, der ihnen in keiner Weise zinkommt. Erweckt wird dieser Anschein von Genauigkeit durch die Angabe der wahrscheinlichen Fehler der Kurvenkonstanten, die sich auffallend klein sind. Es ist klar, daß sich auf Grund der Annahme, eine gegebene Gruppe gehöre in ihrer Verteilung einem der Pearsonschen Typen, der wahrscheinliche Fehler einer Repräsentativmessung ermitteln läßt. Hätten wir eine unendlich große Gruppe gemessen, so müßte, von den Messungsfehlern abgesehen, der betreffende Typus in den Messungsergebnissen genau wieder zum Vorschein kommen (Typus im Sinne der sechs Pearsonschen „Typen“ ge-



braucht). Messen wir nur eine kleinere Anzahl, so wird der Typ mit zufälligen Abweichungen, deren Grad von der Zahl der Messungen abhängt und berechnet werden kann, wiedergegeben sein. Daß die so berechneten Fehler etwa von der Ordnung der gleichen Fehler für die Fehlerfunktion sind, ist auch nicht weiter verwunderlich. Wie soll aber die erste unerlässliche Annahme gerechtfertigt werden, wenn, wie wir gesehen haben, die Möglichkeit ganz ausgeschlossen ist, daß die tatsächliche Verteilung nach einem der Pearsonschen Gesetze zustande kommt\*)?

Damit ist die Kritik der heute gegebenen Lösungen beendet. Ehe wir schließen, muß aber noch die Frage beantwortet werden: Was soll der heutige Anthropologe mit seinen Kurven anfangen, wenn weder Gauß, noch Fechner und Pearson das richtige Gesetz der Variation wiedergeben? Von Fechners zweiseitigem Gaußschen Gesetz und Pearson ist das oben festgestellt worden. Kehren wir also noch einmal zu Gauß zurück.

Die Einwände, die gegen die Gültigkeit der Fehlerfunktion gerichtet worden sind, haben wir schon aufgeführt. Sie sind erstens starke wesentliche (nicht rein zufällig zustande gekommene) Asymmetrie solcher homogenen Materials, zweitens die notwendige Begrenzung jeder Variationsreihe bei Null und drittens die Begrenzung mancher Formen auch nach der positiven Seite im Endlichen. Der dritte Einwand ist eben als unrichtig

\*) Die Resultate, die man mit den so berechneten wahrscheinlichen Fehlern erhält, sind denn auch praktisch als unrichtig nachweisbar. Pearson gibt zum Beispiel für die Verteilung der Indizes der altpyrischen Schädel nach Messungen von Joh. Ranke nach seinem Kriterium eine Kurve des Typ IV, und zeigt, daß sie sich dieser Reihe etwas genauer anschließt als die Fehlerfunktion. Palin Elderton<sup>(9)</sup> berechnet im ersten Band der Biometria den Genauigkeitsgrad der Beschreibung der gleichen Reihe durch die Gaußsche Kurve an Hand einer von Pearson selbst<sup>(10)</sup> angegebenen Methode. Dabei stellt sich heraus, daß die Genauigkeit so groß ist, daß unter vier gleich zahlreichen zufällig herausgeriffenen Repräsentativmessungen drei voraussichtlich größere Abweichungen aufweisen werden, als die Reihe der altpyrischen Schädel. Was soll aus einer Methode, die Reihen genauer beschreibt, als die Übereinstimmung mit der Theorie überhaupt sein kann? Mir scheint es fast nötiger, nach einer Erklärung zu suchen, warum unsere Kurven sich dem Fehlergesetz so häufig genauer anschließen als wir nach der Theorie erwarten dürfen.

nachgewiesen worden. Die freie Variation braucht keine endlich begrenzten Reihen zu liefern. Die zweite ist durch die Fechnerische Hypothese der Ursachenverknüpfung beseitigt, die das strenge Gesetz der Variation gibt, während das einfachere zu berechnende Gaußsche Gesetz in den meisten Fällen als Approximation genügt. Es bleibt uns also nur der erste Einwand.

Betrachten wir die stark asymmetrischen Formen genauer, in erster Linie also die ganz einseitigen Kurven. Dieselben sind, wenn wir nur die biologischen Statistiken berücksichtigen, gefunden worden 1. bei diskontinuierlicher Variation, und 2. bei Sterblichkeitskurven. Diese beiden gehören also dem Gaußschen Gesetze nicht, auch nicht in seiner logarithmischen Verallgemeinerung. Das darf uns aber nicht sonderlich unternehmen; denn, um zunächst bei 1 zu bleiben, die Fehlerfunktion ist von vornherein nur anwendbar auf kontinuierliche Variation. Wir haben ja schon bei ihren Ableitungen gesehen, daß eine ihrer ganz unumgänglichen Annahmen die Stetigkeit der Funktion ist, die uns den Zusammenhang zwischen Variationsursache und variierender Eigenschaft ergeben soll. Die ganze Verwirrung kann geklärt werden, wenn wir nur daran festhalten. Es liegt in den meisten bisherigen Gedankengängen ein Denkfehler vor, der Spielräume von Möglichkeiten mit Elementarursachen verwechselt. Wörtlich ausgesprochen finden wir diesen Fehler bei Pearson, wo er die durch die Zweiseitigkeit der Münzen gegebenen Spielräume beim Münzwerfen direkt mit den Elementarursachen in Parallele bringt. Die Elementarursachen sind aber auch beim Münzwerfen unendlich viele an Anzahl und unendlich klein in ihrer Wirkung, aber ihre Wirkungen werden durch die Eigenschaft der Münzen, nur zwei stabile Gleichgewichtslagen zu besitzen, in zwei gleich große Spielräume geteilt. Auch beim Würfelspiel und bei den anderen Zufallsspielen sehen wir diese Einteilung der Möglichkeiten in Spielräume mit fixierter Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens (vgl. Kries<sup>[11]</sup>). Genau das Gleiche gilt für die diskontinuierliche Variation. Auch hier sind die Möglichkeiten nicht mehr durch eine kontinuierliche Linie darstellbar, sondern sie sind in eine Anzahl von gleich oder ungleich wahr-

scheinlich auftretenden Spielräumen geteilt. Sind die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume ermittelt, so kann man zurückschließen, eien wie großen Bruchteil aller Elementarmöglichkeiten jeder einzelne Spielraum enthält \*).

Ich kann hier nicht näher auf diese sehr wichtige Seite unserer Untersuchungen eingehen, da sie für die Anthropologie, die es immer mit kontinuierlicher Variation zu tun hat, nicht von Bedeutung ist \*\*).

Die diskontinuierliche Variation ist also von vornherein aus dem Kreise der dem Gaußschen Gesetze folgenden Erscheinungen auszuschließen. Wo hier eine Übereinstimmung zustande kommt, ist sie wirklich derart, wie sie Pearson in seiner Abhandlung im Auge hat. Die Fehlerfunktion ist dann die dem Häufigkeitspolygon annähernd nm- oder eingeschriebene Kurve und hat nur als solche eine äußerliche Ähnlichkeit mit ihm. Die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume verdanken nach allem, was wir heute wissen, ganz ungleichmäßigen, in der Organisation gelegenen Ursachen ihre Entstehung. Sie können in ihrer Anordnung sowohl dem symmetrischen wie asymmetrischen Binom ähneln, wie auch ganz unregelmäßig sein. Die Tatsache, daß sie ihre Nahrung aus der Gaußschen Kurve der Ursachenkombinationen beziehen \*\*\*) , ist das ein-

zige, was einiges Licht auf die häufige Unimodalität dieser Polygone werfen kann.

Aus dem vorliegenden Referat hat sich schon ergeben (vgl. dieses Referat S. 322), daß die Reihen der kontinuierlichen Variation, wenn sie wirklich aus der Konkurrenz unendlich vieler voneinander unabhängiger Ursachen von unendlich kleiner Wirkung entstanden sind, was wir doch wohl bejahen müssen, überhaupt nur die Gaußsche Form in ihrer logarithmischen Verallgemeinerung besitzen können. Überall wo sie asymmetrisch sind, müssen wir also nach störenden Ursachen suchen. Dieselben lassen sich denn auch für die wesentlich abweichenden Fälle wirklich auffinden. So z. B. auch für die Sterblichkeit, auch für die Kindersterblichkeit allein. Jeder Arzt weiß, daß Kinder von einem Monat oder einem halben Jahr, von einem Jahr oder von fünf Jahren nicht als Gegenstände homogenen Materials betrachtet werden dürfen. Es würde auch niemandem einfallen, z. B. die Körpergröße ohne Berücksichtigung des Alters zu untersuchen. Dasselbe tut aber der Statistiker, der die Sterblichkeit der verschiedenen Lebensalter miteinander vergleicht und sich dann über die Abweichung der Verteilung vom Fehlergesetz wundert. Nicht das Fehlergesetz wäre zu erwarten, sondern höchstens die gerade Linie, und jede Abweichung von ihr ist ein Maß der Ungleichartigkeit des Materials.

Der gleiche Gesichtspunkt muß für alle andere Kurven kontinuierlicher, freier organischer Variation gelten \*). Wo wir eine ausgesprochene Asymmetrie finden, ist das Material ungleichartig. Damit sind wir zu unserem Ausgangspunkt zurückgekehrt. Der statistische Usus, gegen den Pearson sich wendet, bedarf allerdings einer weitgehenden Einschränkung.

\*) Für die menschliche Variation ist die englische Schule praktisch schon zum gleichen Resultat gelangt. Sowohl Macdonell (\*), als Miß Fawcett und Miß Lee (\*), als auch Powys (\*\*\*) haben an einer ganzen Reihe von menschlichen Eigenschaften, der erstere für Verbrecher, die anderen für ägyptische Skelettreste nachgewiesen, daß ihre Verteilung der Gaußschen Kurve entspricht. In der an letzter Stelle zitierten Arbeit ist der Nachweis einer bestimmt gerichteten Asymmetrie für die Mehrzahl der Maße und zwar in der nach Fawcett zu erwartenden Richtung, besonders beachtenswert. (Auch aus K. Pearson's: On the laws of inheritance in Man (\*\*\*) ergibt sich der gleiche Schluß.)

\*) Das gibt unter Umständen ganz interessante Aufschlüsse. Während z. B. bei den meisten Reihen unkomplizierter freier Variation keiner der überhaupt möglichen Werte schon a priori wahrscheinlicher ist als seine Nachbarwerte, ist in der Organisation der Pflanze ein mit den übrigen Variationsursachen in Konkurrenz tretender Ursachenkomplex gegeben, demzufolge bestimmte Zahlenwerte, die Fibonaccizahlen, schon von vornherein wesentlich wahrscheinlicher sind als die übrigen (vgl. Ludwig [17-20]). Denken wir uns also die Variation graphisch dargestellt, so sind auf der X-Achse gewisse Strecken, deren Auftreten von vornherein wahrscheinlicher ist als das der andere. Baut sich über einer solchen X-Achse eine kontinuierliche Variationskurve der unkomplizierten Art auf, so muß sie notwendig die multimodale Gestalt annehmen, die auch für diese Organe gefunden hat.

\*\*) Es gäbe zwar auch diskontinuierlich variierende Organe, z. B. die Wirbel, die Finger und Zehen, die Anzahl der Kopfknochen usw., doch sind sie bisher nicht in den Kreis der biometrischen Betrachtungsweise gezogen worden.

\*\*\*) Der einzelne Spielraum ist als Integral über eine endliche Strecke der X-Achse derselben aufzufassen.

Das Gaußsche Gesetz darf nicht ohne weiteres auf Statistiken aller Art angewendet werden, sondern es bedarf immer erst einer Untersuchung, ob die Annahmen desselben sich auch auf das vorliegende Problem anwenden lassen. Für die organische Variation ist das ohne Zweifel zuzugeben, soweit dieselbe kontinuierlich ist; für die diskontinuierliche Variation ist es aber ohne weiteres abzuweisen. Sollte sich für sie eine Übereinstimmung mit dem Fehlergesetz ergeben, so heißt das nur, daß die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume sich diesem Gesetz entsprechend anordnen und es muß weiter nach der Ursache dieses Verhaltens gesucht werden\*).

Für den Anthropologen ist also nur das Gaußsche Gesetz von Wichtigkeit. Für seine Probleme beansprucht es aber auch völlige Gültigkeit. Wo es selbst und seine Fechnerische logarithmische Verallgemeinerung nicht hinreichen, um eine Variationsreihe zu beschreiben, ist die Variation gestört. Meist wird es sich dabei um Störungen durch die erbliche Komponente der Variationsursachen handeln. Wir können also ein paar Worte über die biologische Bedeutung des Gaußschen Gesetzes nicht vermeiden.

Wie wir oben schon gesehen haben, scheint sich aus der Anwendbarkeit des Fehlergesetzes auf die Variation zu ergeben, daß die Formbildung der Organismen von zwei einander widerstreitenden Faktoren beherrscht sei. Erstens von einer Tendenz, einen gewissen Mittelwert zu reproduzieren, und zweitens von einer großen Summe kleiner, in verschiedenen Richtungen wirkender Ursachen, die stets eine tatsächliche Abweichung von diesem Mittel hervorbringen. Es scheinen also zwei in verschiedener Richtung wirkende Ursachengruppen vorhanden zu sein, in deren einer, im formerhaltenden Prinzip, wir sofort die Tatsache der Vererbung zu erkennen glauben, während die zweite unter dem Namen der Variation wohlbekannt ist.

Analysieren wir zunächst das formerhaltende Prinzip, so finden wir allerdings in erster Linie die Vererbung, die wir in unserem alten Bilde ohne weiteres an die Stelle der Natur setzen dürfen, die sich aus Werk machte, Organismen

zu erschaffen. Wir wissen ja, daß sich überall im organischen Reiche eine so weitgehende Ähnlichkeit der Nachkommenschaft mit den Erzeugern wiederfindet, daß die Konstanz der Arten lange ein angesehenes Dogma sein konnte und daß es erst einer Entdeckung der sich weniger dem Blick aufdringenden, neben der überwiegenden Gleichartigkeit verschwindenden Variation bedurfte. Andererseits ist es aber auch bekannt, daß die Selektion, die unter wechselnden äußeren Umständen als kräftiges, formänderndes Prinzip wirkt, unter lange Zeit konstanten Verhältnissen, sowie sich einmal eine möglichst vollkommene Anpassung an die Lebensbedingungen ausgebildet hat, in ebenso rücksichtsloser Weise als formerhaltendes Prinzip antritt.

Formerhaltende Ursachen sind also 1. Vererbung und 2. konstante mittlere Lebensbedingungen.

Unter den Ursachen der Variation stehen in erster Linie, uns allen geläufig, die äußeren Lebensbedingungen in aller ihrer Mannigfaltigkeit. Da sie selbst in ihren Kombinationen in zufälliger Weise um einen Mittelwert variieren, sind sie für jedes Individuum in eigener Kombination wirksam und bringen so die regelmäßig um einen Mittelwert gruppierte Einzelwerte jeder einzelnen Eigenschaft eines Organismus hervor. Diese Einzelvariationen müssen aber auch noch andere Ursachen haben, denn sie teilen sich sofort wieder in zwei große, durchaus ungleichwertige Gruppen, in die vererbaren und die nicht vererbaren. Für die höher organisierten Tiere gilt dabei anscheinend ausnahmslos das Gesetz, daß die erste dieser beiden Gruppen, die vererbaren Eigenschaften, einer schon in der Organisation der Keimzelle und der Art ihrer Vereinigung gegebenen, später in den großen Zügen sich nicht mehr ändernden Ursachengruppe ihre Entstehung verdankt, während die zweite Gruppe unter den Begriff der Anpassungserscheinungen eingereiht werden darf. Die Vererbung, die Form und Größe des elterlichen Organismus erhält, ist also selbst kein völlig exakt wirkendes Gesetz, sondern sie reproduziert den elterlichen Organismus mit zufälligen Abweichungen. Wir haben dadurch zwei Komponenten der Variation, etwa entsprechend den Verhältnissen der Schußstreuung

\*) Die Spielräume müssen dann gleich groß und symmetrisch um den Mittelwert gelagert sein.

beim Scheibenschießen<sup>\*)</sup>. Die einmal eingetretene Variation des Keimplasmas zieht dann später in seiner Entwicklung zum ausgewachsenen Organismus bestimmte Abweichungen desselben vom allgemeinen Mittel nach sich, die wir als primäre angeborne Variation berechnen und die nun selbst wieder durch die Vererbung als neuer Mittelpunkt der Variation festgehalten werden. Für die Anthropologen scheint es sich dabei wieder um normale Variation nach das Rassenmittel, auch bei den erblichen Eigenschaften, zu handeln, ähnlich wie dies in der Johannsenschen Erbsenpopulation<sup>(19)</sup> der Fall gewesen<sup>\*\*)</sup>.

Wenn wir uns also eine Gruppe von individuell variierten Individuen des gleichen Typus als Ausgangspunkt einer Rasse vorstellen, so wird in der Nachkommenschaft jedes einzelnen für sich betrachtet, eine Tendenz, einen von der Nachkommenschaft des anderen etwas abweichenden Mittelwert zu reproduzieren, vorhanden sein, Verhältnisse, die bei dem uns beschäftigenden Problem der Variation der einzelnen Gruppen des Genus homo sapiens stets vorhanden sind und durch die Mischung der einzelnen Nachkommenschaftsgruppen untereinander noch weiter kompliziert werden. Die Größe der vererblichen Komponente der Variation richtet sich also außer vielen anderen uns unbekanntem Ursachen nach den Eigenschaften

<sup>\*)</sup> Subjektive Zielfehler und die objektive Gewehrstreuung.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Frage der Vererbbarkeit der durch Anpassung zustande gekommenen Bildungen glaube ich für den Menschen und die höher organisierten Tiere so lange nicht näher eingehen zu müssen, als von seiten der Anhänger der Vererbbarkeit derselben nicht schlagendes Beweise dafür beigebracht werden. Da wir aber von der überwiegenden Mehrzahl der erworbenen Eigenschaften sicher wissen, daß sie sich nicht vererben — man denke für den Menschen dabei nur an die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, die nebenbei bemerkt alle als Anpassungsergebnisse aufzufassen sind (vgl. R. Wettstein<sup>(19)</sup>), da ferner unter dieser Mehrzahl sich alle die Eigenschaften vollständig befinden, für die eine genaue Kontrolle überhaupt durchführbar — muß diese Annahme der Vererbung der erworbenen Eigenschaften nach dem Gesetze der Ökonomie des Denkens abgewiesen werden. Ich hebe dabei ausdrücklich hervor, daß für andere Vererbungsmechanismen, wie sie bei niederen Organismen und zum Teil bei den Pflanzen zu finden sind, eine solche Übertragung leicht denkbar und für einzelne Fälle auch nachgewiesen ist.

der Gruppe von Individuen, die im einzelnen Falle als Ausgangspunkt für die Varietäten- oder Artenbildung vorlag. Wir finden stets eine Tendenz, einen enghesgrenzten Formenkreis zu erzeugen, wo die Erblichkeit auf eine kleine Gruppe relativ gleichartiger Individuen als Ausgangspunkt zurückgeht und wir pflegen in diesem Falle von einer „reinen“ Rasse zu sprechen. Auch eine solche reine Rasse besitzt aber eine recht beträchtliche und unter sehr verschiedenen Lebens- und Entwicklungsbedingungen auch recht variable „Breite der Variation, die sich noch zusammensetzt aus einer vergleichsweise kleinen Menge erblicher Variation und einer Komponente, welche die Wirkung sämtlicher übrigen Ursachen enthält, die auf die Formbildung von Einfluß sein können.

Es wäre nun von allergrößtem Wert für die Anthropologie, wenn wir in stände wären, für den Menschen diese beiden Komponenten ähnlich wie in dem Beispiel für das Scheibenschießen voneinander zu trennen<sup>\*)</sup>. Leider sind uns die tatsächlichen Verhältnisse noch nicht definitiv bekannt, doch bietet uns das Gesagte schon einige Handhaben.

Wie wir gesehen haben, ist bei reinen Rassen die erbliche Komponente der Variation wesentlich kleiner als bei den sogenannten Mischrassen, und zusammengewürfelte Menschennassen verschiedener Varietäten werden infolge der ganz verschiedenen Tendenzen der Vererbung überhaupt kein Bestreben zeigen, sich regelmäßig um einen Mittelwert zu gruppieren. Doch braucht eine solche zusammengewürfelte Gruppe von Individuen nur sehr lange Zeit — sagen wir z. B. politisch — vereinigt zu bleiben, so werden sich, freie Mischung der einzelnen Gruppen vorausgesetzt, die verschiedenen Typen vereinigen und die vorher ganz unregelmäßige, aus Bruchstücken verschiedener Häufigkeitskurven zusammengesetzte empirische Verteilungskurve wird sich nach und nach immer regelmäßiger um den Mittelwert ordnen. Es wird eine Mischrasse zustande kommen.

Daraus folgt erstens: Folgt eine hinreichend große Bevölkerungsgruppe

<sup>\*)</sup> Selbststreuung  $a$  und subjektiver Schießfehler  $b$  vereinigen sich nach der Formel  $\sqrt{a^2 + b^2} = c$  zum Gesamtfehler  $c$ .

dem Gesetze der Gruppierung um den Mittelwert nicht, so haben wir es mit einer Zusammenfassung heterogener Elemente zu tun, die noch nicht lange oder doch nicht unter Freigabe der Mischung miteinander vereinigt sind.

Schwieriger sind die Verhältnisse bei der reinen Rasse und bei den Mischrassen zu überblicken, da die beiden Komponenten der Variation, die erblichen und die äußere Ursache, ja im entgegengesetzten Sinne wirken können und so der Unterschied der Größe der erblichen Komponente verdeckt sein kann. Aus unseren bisherigen Erfahrungen scheint aber hervorzugehen, daß die Variationsbreite der reinen Rasse stets beträchtlich kleiner ist als diejenige einer Mischung zwischen gut ausgeprägten Varietäten. Wir müssen daraus folgern, daß die übrigen Komponenten der Variation für die mittleren Verhältnisse einen beiläufig konstanten Wert besitzen.

Mit Hilfe dieser Annahme, deren absolute oder relative Richtigkeit für jeden einzelnen Fall untersucht werden muß, wird es vielleicht manchmal gelingen, die gewünschte Trennung vorzunehmen, um so mehr als historisch manches über Mischung, z. B. unserer europäischen Nationalitäten, feststeht. Mit den angegebenen Vorbehalten werden wir also Bevölkerungsgruppen mit relativ kleiner Variationsbreite als reine Rassen, solche mit vergleichsweise großer Variationsbreite als Mischrassen betrachten können. Jedenfalls ist aus dem Gesagten zu entnehmen, daß wir außer der absoluten Vergleichszahl, als welche uns das Fehlergesetz den Mittelwert liefert, auch noch eines exakten Maßes der Variationsbreite bedürfen.

Alle drei hierfür in erster Linie brauchbaren Größen sind schon für diesen Zweck vorgeschlagen worden: Von Stieda<sup>(13)</sup> und Galton<sup>(14)</sup> der wahrscheinliche Fehler, von Ihering<sup>(15)</sup> und Fechner<sup>(16)</sup> das Fehlermittel, während sich in der Physik das mittlere Fehlerquadrat eingebürgert hat, das von Pearson und seiner Schule auch als Maß der Variation benutzt wird<sup>\*)</sup>.

\*) Das mittlere Fehlerquadrat ist  $= \sqrt{\frac{\sum(d^2)}{n}}$ ; d. h.

Arbeits für Anthropologie. N. F. Bd. II.

Theoretisch ist das mittlere Fehlerquadrat der sichersten Parameter (Cauber [1], S. 230), doch kommt die Sicherheit des Fehlermittels derjenigen des Fehlerquadrates sehr nahe. Da dieses letztere aber viel einfacher zu berechnen scheint es, als ob ihm in praxi der Vorzug gebühren müsse. Anders liegt die Frage, wenn, wie Pearson glaubt, ein anderes Gesetz, zu dessen Kenntnis die Berechnung des mittleren Fehlerquadrates unerlässlich, als Maß angenommen werden muß. In diesem Falle ist es nur konsequent, das Fehlerquadrat, wenn man es doch berechnen muß, auch als Maß der Variation zu benutzen, während man sich dann die Berechnung des Fehlermittels ersparen kann.

Die endgültige Wahl zwischen mittlerem Fehlerquadrat und Fehlermittel kann der einzelne nicht treffen, sie ist der Vergleichbarkeit der Resultate wegen notwendig Sache einer internationalen Verständigung. Für das Fehlerquadrat muß schwer ins Gewicht fallen, daß die englische Schule gerade für diesen Parameter schon ein vorzügliches Vergleichsmaterial gesammelt hat und noch weiter ansammeln wird.

Wollen wir die Variationsbreite verschiedener Merkmale untereinander vergleichen, so bedürfen wir einer kleinen Modifikation unseres Maßes. Da die Variationsbreite verschiedener Organe in einem, wenn auch nicht ganz strengen direkten Verhältnis zur absoluten Größe des Organs steht, insofern als die absoluten Schwankungen eines großen Maßes, sagen wir z. B. der Körpergröße, stets beträchtlich größer sind als die eines kleinen, also z. B. der Nasenhöhe, und da es bei der Vergleichung derartiger Maße wesentlich darauf ankommt, die variable absolute Maßeinheit (Centimeter, Millimeter, Winkelgrade, -minuten, -sekunden, Farben-

gleich der Wurzel aus der Summe der Quadrate aller Abweichungen der Einzelwerte vom Mittelwerte dividiert durch die Anzahl der Einzelwerte. Das Fehlermittel ist  $= \frac{\sum d}{n}$ ; d. h. gleich dem Mittel aus allen Abweichungen vom Mittelwert, wenn ihr Vorzeichen unter acht gelassen wird und auch die negativen Abweichungen positiv in Rechnung gestellt werden. Der wahrscheinliche Fehler besitzt die Eigenschaft, daß er größer ist als die eine Hälfte der Abweichungen und kleiner als die andere. Er berechnet sich als 0,476 958 mal dem mittleren Fehlerquadrat oder 0,8453 mal dem Fehlermittel.

intensitäten usw.) auszuschalten, ist von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden, die Variationsbreite in Prozenten des Mittelwertes auszudrücken. Gegen die allgemeine Verwendung dieses Verhältnisses ist eingewendet worden (Dunker 4, 2), daß nanehmal bei nahe verwandten Formen nur der Mittelwert, nicht aber die Variationsbreite Unterschiede aufweisen, eine für die oben supponierte relative Konstanz der Variationsbreite unter gleichen äußeren Bedingungen sehr interessante Beobachtung. Wenn aber Dunker daraus schließen will, daß eine engere Abhängigkeit dieser beiden Größen, die die Bildung dieses Verhältnisses erlaube, nicht bestehen könne, so ist er damit doch zu weit gegangen. Gegen die Benutzung des Verhältnisses überhaupt kann dieser Einwand kein Gewicht hesitzen. Gerade da Variationsbreite und Mittelwert bis zu einem gewissen Grade voneinander unabhängig sind, während gleichzeitig, wie oben gezeigt, eine offensichtliche Abhängigkeit zwischen ihnen besteht, ist es von großem Interesse, ihr variierendes Verhältnis zu studieren. Ein Maß mit größerer relativer Variationsbreite ist dabei als das variablere voraussichtlich auch von größerem seriärem Werte.

Durch Mittelwert und Variationsbreite sind die dem Fehlergesetz gehorehenden Variationsreihen erschöpfend beschrieben, und da die Wahrscheinlichkeitsrechnung uns noch die wahrscheinlichen Fehler dieser beiden Größen an die Hand liefert, ist eine exakte Vergleichung der Reihen ermöglieht, unser Problem also vollständig gelöst, wenn uns noch ein sicheres Kriterium für wesentliche oder unwesentliche Abweichungen gegebener Reihen vom Fehlergesetz zu Gebote steht. Ein solches ist von Pearson<sup>(24)</sup> angegeben worden und durch die Tafeln von Palin Eldertou<sup>(\*)</sup> auch für die praktische Verwendung hinreichend handlich gemacht.

Mußte in dem vorliegenden Referate auch eine der Forderungen der englischen Schule abgewiesen werden, so möchte ich doch betonen, daß das Prinzip derselben nicht nur ein durchaus berechtigtes, sondern auch ein sehr notwendiges und nützlichcs ist. Die hier angegriffene Methode bildet nur einen ganz verschwindenden Teil der von ihr benutzten Me-

thoden und zwar gerade den bisher deutlich unfruchtbarsten Teil derselben. Wir hefinden uns mit ihr im Prinzip in völliger Übereinstimmung, wenn wir eine anthropologisch-statistische Reihe erst dann für durchgearbeitet erklären, wenn erstens ihre Übereinstimmung mit dem Gaußschen Gesetz geprüft und zweitens für den Fall der Übereinstimmung Mittelwert, Variationsbreite und Variationsindex neben ihren wahrscheinlichen Fehlern berechnet sind. Daß der einzelne Forscher diese Arbeit einem geschulten Rechner und seinen technischen Hilfsmitteln überlassen kann und soll, um seine Zeit nicht in für ihn besonders zeitraubenden Rechnungen zu verlieren, ist wohl nicht weiter hervorzuheben. Die Kenntnis der einschlägigen Theorien ist aber dem Anthropologen und Biologen, der aus statistischem Material Schlüsse ziehen will, unerläßlich.

#### Zusammenfassung der Resultate.

1. Das Fechnersehe zweiseitige Gaußsche Gesetz und die sechs Pearsonsehen Typen für Variationskurven sind in ihren Ableitungen teils biologisch undeutbar, teils biologisch unmöglieh. Sie besitzen also rein empirisch beschreibenden Wert. Ihre Anwendung bringt uns keinerlei Erkenntnis und sie sind zu jeder theoretischen Überlegung unbrauchbar.

2. Eine biologische Analyse der Variationsursachen führt zu Annahmen, die mit den zur Ableitung der Fehlerfunktion aufgestellten übereinstimmen. Diese gibt also auch für die Variation die Wahrscheinlichkeiten der Ursachenkombinationen.

3. Die Verteilung der Ursachenkombinationen ist als eine rein **ideelle Kurve** aufzufassen. Die tatsächliche Verteilung der variierenden Gegenstände hängt außer von ihr auch noch von der Art der **Ursachenverknüpfung** ab. Ist diese eine additive, so resultiert für die variierenden Gegenstände das einfache Gaußsche Gesetz; ist sie aber, wie Fechner will und was biologisch viel annehmbarer, multiplikativ, so wird die Gleichung der Variationskurve selbst

$$y = \frac{h}{x\sqrt{\pi}} e^{-M^2 \log \cot x}.$$

4. Dieses Gesetz gibt regelmäßig bei Null begrenzte, stets asymmetrische Kurven, deren Asymmetriegrad von der absoluten Größe des Mittelwertes und von der Präzision der ideellen Kurve abhängig, und ganz bestimmt gerichtet ist. Diese Asymmetrie ist in den meisten für die Anthropologie in Betracht kommenden Fällen so gering, daß ihre Variationskurven sehr angenähert durch das einfache Gaußsche Gesetz beschrieben werden können.

5. Das eben charakterisierte Verteilungsgesetz gilt nach der biologischen Analyse nur für die kontinuierliche Variation. Für die diskontinuierliche gilt zwar als ideelle Kurve der Ursachenkombinationen ebenfalls das einfache Gaußsche Gesetz, ihre reellen Variationskurven sind aber als eine Reihenfolge von Spielräumen mit fixierten Wahrscheinlichkeiten im Sinne von v. Kries<sup>14)</sup> zu betrachten. Ihre Form hängt von der relativen Größe dieser Spielräume ab, über die sich a priori nichts näheres aussagen läßt.

6. Das theoretisch allein in Frage kommende Verteilungsgesetz anthropologischer, kontinuierlich variierender

Maße zeigt sich, so weit heute die Beobachtungen reichen, empirisch fähig, alle untersuchten Variationsreihen homogenen Materials zu beschreiben. Wo eine wesentliche Asymmetrie vorhanden ist, die über die durch die logarithmische Verallgemeinerung gegebene hinausgeht, muß nach dem Grunde derselben gesucht werden. Er ist dann wohl meist in der Ungleichartigkeit des Materials gegeben.

7. Die statistische Untersuchung der anthropologischen Messungsreihen hat demnach zuerst die Übereinstimmung der Reihe mit dem theoretischen Verteilungsgesetz, also approximativ mit dem einfachen Gaußschen Gesetz, streng mit dessen logarithmischer Verallgemeinerung zu prüfen. Fehlt eine solche, so ist das Material als nicht homogen zu betrachten und nicht ohne weiteres zu Vergleichen brauchbar. Ist die Übereinstimmung befriedigend, so ist die Reihe durch Mittelwert und ein Präzisionsmaß eindeutig beschrieben. Derartiges Material ist, soweit die Variation allein in Frage kommt, mit der Angabe von Mittelwert, einem absoluten und einem relativen Maße der Variationsbreite nebst ihren wahrscheinlichen Fehlern statistisch hinreichend durchgearbeitet, um zu Vergleichen benutzt zu werden.

## Literatur.

<sup>1)</sup> E. Czuber, Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung. Leipzig, G. B. Teubner, 1903.

<sup>2)</sup> G. Duncker, On Variation of the rostrum in *Palaeornis vulgaris* Herbst. American Naturalist XXXIV, No. 404.

<sup>3)</sup> Idem, Korrelationsstudien an den Strahlzähnen einiger Flossen von *Acerina cernua* L. Biol. Zentralbl. Bd. 17, Nr. 21 u. 22, 1897.

<sup>4)</sup> Idem, Die Methode der Variationsstatistik. Arch. f. Entw. Mech., Bd. 8, 1899.

<sup>5)</sup> Idem, Variation und Asymmetrie bei *Pleuronectes* (Steud.) L. statistisch untersucht. Wissensch. Meeresunters. Helgolaud, N. F., III, 1905.

<sup>6)</sup> Idem, Über Asymmetrie bei *Gelasimus purgator* Latr. Biometrika I, 1903.

<sup>7)</sup> Idem, Symmetrie und Asymmetrie bei bilateralen Tieren. Breithopf u. Härtel, 1903.

<sup>8)</sup> W. Palin Elderton, Tables for testing the goodness of fit of theory to observation. Biometrika I, p. 155 ff.

<sup>9)</sup> Cicely D. Fawcett assisted by Alice Lee, A second study of the variation and Correlation of the human skull, with special reference to the Naquada Crania, Biometrika I, p. 488 ff.

<sup>10)</sup> G. Th. Fechner, Kollektivmathematik, im Auftrage der Kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Gottl. Friedr. Lipps. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

<sup>11)</sup> F. Galton, Correlations and their Measurement chiefly from Anthropometric data. *Proceed. Roy. Soc. London*, LXI, p. 401 ff.

<sup>12)</sup> Ihering, Zur Einführung von Oscillationsexponenten in die Krianiometrie. *Archiv f. Anthropologie*, Bd. X, S. 411 ff.

<sup>13)</sup> W. Johannsen, Über Erbllichkeit in Populationen und in reinen Linien. *Jena*, G. Fischer, 1903.

<sup>14)</sup> J. v. Kries, Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Freiburg in Baden* 1886.

<sup>15)</sup> W. Lexis, Artikel Anthropologie und Anthropometrie im *Handwörterbuch der Statswissenschaften*. 2. Aufl., Bd. I.

<sup>16)</sup> Idem, Über die Wahrscheinlichkeitsrechnung und deren Anwendung auf die Statistik. *Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik XIII*, neue Folge, 1886.

<sup>17)</sup> F. Ludwig, Über Variationskurven und Variationsflächen der Pflanzen. *Botanisches Zentralblatt*, Bd. LXIV, 1895.

<sup>18)</sup> Idem, Weiteres über Fibonacci-Kurven. *Botanisches Zentralblatt* Bd. LXVIII, 1896.

<sup>19)</sup> Idem, Die pflanzlichen Variationskurven und die Gaußsche Wahrscheinlichkeitskurve. *Botanisches Zentralblatt* Bd. LXXIII, 1898.

<sup>20)</sup> Idem, Variationskurven. *Botanisches Zentralbl.*, Bd. LXXXV, 1898.

<sup>21)</sup> W. R. Macdonell, On criminal Anthropometry and the Identification of Criminals. *Biometrika* I, p. 177 ff.

<sup>22)</sup> K. Pearson, Mathematical Contributions to the Theory of Evolution II. Skew variation. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, Vol. 186, Part. A. 1896.

<sup>23)</sup> Idem, Mathematical Contributions to the Theory of Evolution X. Supplement to a memoir on Skew Variation. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, Vol. 197, Part. A. 1901.

<sup>24)</sup> Idem, On the Criterion that a given System of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *Philosophical Magazine*, Vol. 4, p. 157—175.

<sup>25)</sup> K. Pearson and Alice Lee, On the Laws of Inheritance in Man. *Biometrika* II, No. 4, p. 357 ff.

<sup>26)</sup> K. Pearson, Mathematical Contributions to the theory of Evolution IV. On the Probable Errors of Frequency constants and on the influence of Random selection on Variation and Correlation. *Philos. Trans. Roy. Soc. London*, Vol. 191, Part. A. 1898.

<sup>27)</sup> A. O. Powys, Data for the Problem of Evolution in Man. *Anthropometric Data from Australia*. *Biometrika* I, p. 330 ff.

<sup>28)</sup> A. Quételet, *Lettres sur la théorie des probabilités*. Bruxelles 1846.

<sup>29)</sup> Idem, *Physique sociale*. Bruxelles 1849.

<sup>30)</sup> Idem, *Anthropométrie*. Bruxelles 1870.

<sup>31)</sup> Karl E. Ranke, Über den Begriff „Klima“. *Münchener mediz. Wochenschrift* 1901, Nr. 52.

<sup>32)</sup> M. Standfuß, Zur Frage der Unterscheidung der Arten bei den Insekten. *Entomologische Zeitschrift* 1903.

<sup>33)</sup> L. Stieda, Über die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der anthropologischen Statistik. *Archiv f. Anthropologie*, Bd. XV, 1882. Als Separatdruck in 2. Auflage bei Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1892.

<sup>34)</sup> H. Thompson, On Correlation of certain external parts of *Palaeomon serratus*. *Proceed. Roy. Soc.* 1894.

<sup>35)</sup> A. v. Török, Über Variationen und Korrelationen der Neigungverhältnisse am Untersiefer. *Zeitschrift für Ethnologie* XXX, 1898.

<sup>36)</sup> Hugo de Vries, Über halbe Galtonkurven als Zeichen diskontinuierlicher Variation. *Berichte der Deutschen botan. Gesellschaft* XII, 1894.

<sup>37)</sup> W. F. R. Weldon, Certain correlated Variation in *Cranon vulgaris*. *Proceed. Roy. Soc.* 1892.

<sup>38)</sup> Idem, On certain correlated variations in *Carcinus moenas*. *Proceed. Roy. Soc.* 1893.

<sup>39)</sup> R. Wettstein, Der Neo-Lamarckismus. *Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte*, Karlsruhe 1903.



## Neue Bücher und Schriften.

1. **Richard Semon:** Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeeres. Reiseerlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers in Australien, Neu-Guinea und den Molukken. Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann, 1903.

Wenn ein Reisewerk in der heutigen Zeit eine zweite Auflage erfährt, so hat es damit von vornherein den Beweis seiner Existenzberechtigung erbracht; denn viele der gegenwärtig in Menge erscheinenden Bücher über fremde Länder pflegt man ebenso schnell zu vergessen, wie man sie liest. Ein solches Buch ist das vorliegende, wie ich schon bei Besprechung der ersten Auflage an anderer Stelle hervorhob, nicht. Der Verfasser hat zahlreiche Einzelbeobachtungen über Tiere und Pflanzen der von ihm in den Jahren 1891 bis 1893 bereisten Gebiete, Studien über Land und Leute, Eindrücke, die die Landschaft der australischen Buschwälder, der Koralleninsel der Torresstraße, der Tropenvegetation von Neu-Guinea, Java und Ambon auf ihn machten, in so fesselnder Form geschildert, daß nicht nur der Kenner dieser Gebiete von der überraschend naturgetreuen Darstellung befriedigt sein wird, sondern auch jeder Fischhörer, der jene Gebiete nicht gesehen, instande sein dürfte, sich ein deutliches Bild von denselben zu machen.

In der vorliegenden zweiten Auflage hat der Verfasser die tiergeographischen Auseinandersetzungen, obwohl viel Material zur Beurteilung dieser Fragen in der Zwischenzeit hinzugekommen ist, stark gekürzt, da er seine Leser nicht in diesen Punkt von Interesse, aber meist kurzweiligen Hypothesen einführen wollte, bevor eine Klärung der verschiedenartigen Ansichten eingetreten ist. Dagegen sind die Fortschritte, die in der naturwissenschaftlichen Kenntnis jener Länder in den letzten Jahren eingetreten sind — ich will hier nur die Naturgeschichte der Digos erwähnen — soweit es in den Rahmen des Werkes paßt, berücksichtigt worden. Moge daher der zweiten verbesserten Auflage auch ein recht großer Leserkreis beschieden sein.

Breslau.

Grabowsky.

2. **U. T. Siretka:** Ornamente auf Birkenrinde und Fell bei den Ostjaken und Wajulen. Société Finno-Ougrienne. Helsingfors 1904.

Das Werk besteht aus 46 Tafeln, 3 unnummerierten Tafeln mit Fig. 1 bis 9, 15 Textfiguren (Fig. 10 bis 4) und 16 Seiten Text finnish und deutsch und bildet eine höchst wertvolle Materialsammlung für das betreffende Gebiet, deren eingehende Untersuchung an der Hand kundiger Eingeborener dringend wünschenswert war. Verf. bringt nur einige kurze Bemerkungen zur Erklärung der Ornamente bei, beobachtet, daß die Mehrzahl der Ornamente nach dem Quadratystem angelegt sind, oder daß man sie sich aus Teilen zusammengesetzt denken kann, die Quadrat- oder Rauteform haben; ferner daß an vielen die Symmetrie (gemeint ist Symmetrie) in die Augen fällt. Zu den

von ihm selbst gesammelten hat er die einheimischen Namen aufgezeichnet, während eine große Anzahl aus den vorhandenen Sammlungen von Ahlquist, Gombatti und den Museen von Tomak und Tobolsk entlehnter Stücke ohne jede Erklärung bleiben. Der Verf. hat nun leider zu unteruchen verabsäumt, wie sich die einheimischen Namensbeziehungen der Ornamente im Geiste der Eingeborenen zu so langem alten Gegenstände selbst verhalten, so z. B. wenn die aus Dreiecken und Vierecken zusammengesetzten Ornamente der Figuren 10, 12, 13 und 16 auf Tafel III den Namen „Fisch- oder Hechtzahne“ führen, — heißen dann diese geometrischen Zeichnungen so nur wegen ihrer äußeren Ähnlichkeit mit Fischzähnen (mit anderen Worten: ist „Fischzahne“ nur ein bloßer Name für das Ornament?) oder besteht die wirkliche Absicht des Künstlers darin, Fischzähne zu zeichnen, und findet diese Absicht ihren Ausdruck in jenen geometrischen Figuren? Ich vermute, daß ersteres der Fall ist, und glaube, daß man schon jetzt aus dem vorliegenden Tatsachenmaterial eine sehr wichtige Schlussfolgerung ziehen kann; nämlich daß die geometrischen Formen dieser Ornamente das primäre darstellen und die erklärenden Namen später hinzugefügt sind. Das folgt klar aus dem Formstudie, daß dieselben Figuren in verschiedenen Gegenden nach verschiedenen Bildern benannt sind, z. B. Ornament 7 auf Tafel IV heißt „Länge (Rumpf) des Elefanten“ am Flusse Wach und „Zobel“ an der Notta; Fig. 3, Tafel XXIII wird als „Wibbisp“ am Wach, als „Lärchenwurzel“ am mittleren Ob und als „Zabel mit Kopf“ am nördlichen Ob erklärt; Fig. 8 auf derselben Tafel erhält weniger als vier Interpretationen: „Wibbisp“ am Wach, „Kralen des Eisfuchers“ ebenda, „Plote (?) des Eisfuchers“ am Juran und „Eisfuch“ am Ob. Unterinander fast übereinstimmende rein geometrische Linienschemata werden bald als „Sveichenwurzel“ (Tafel XIV, Fig. 1), bald als „Hörner des Rennäters“, bald als „Froschschelenke“, bald als „Wurzel der Lärche“ oder als „Ast der großen Birke“ gedeutet. Schlangenlinien gelten als das Bild einer kirschenden Schlange oder als „Felszacken“ (Tafel XXI, Fig. 1 bis 3, Einsehe Zickzacklinien heißen „Hermelin-“ oder „Otterspuren“ und drei Quadrate nebeneinander „Marschspuren“ (Tafel XV, Fig. 1). Ich bin überzeugt, daß tiefer eindringende Forschungen auf diesem Gebiete zu demselben Goutz gelangen werden wie Referent beim Studium der Ornamente der Amurvolker und die jüngsten Untersuchungen über die der Indianer.

Das einzige Pflanzenornament der Sammlung ist die Blüte einer bilbbenden Brombeere, Taf. XII, Fig. 4, daß die Ostjaken wenig Zeichentalent und geringe Beobachtungsgabe besitzen, läßt schon ein Blick auf die Tafeln XXI und XXIII des Prachtwerkes von F. R. Martin, Sibirica, Stockholm 1897, auf denen von Ostjaken am Juran verfertigte Zeichnungen auf Papier publiziert sind. So begegnen wir in diesen Ornamenten auf Fell und Birkenrinde nur wenig realistischen Darstellungen, wie auf Tafel I dem Bilde eines Pferdes und Rennäters und einigen Vögeln auf

Tafel II, aber auch diese aus geometrischen Stücken aufgebaut.

Besondere Erwähnung verdienen einige sogenannte Stempelornamente, die an Schnupftabakdosen und Fetttuchchen vorkommen. Die Stempel werden aus Holz, Horn oder bisweilen auch Mammutknochen hergestellt, und das Negativ des Ornaments wird in das untere Ende eingegraben. Beim Gebrauch setzt man das Stempelbild auf die Birkenrinde auf und schlägt mit dem entsprechenden Kelle mit einem Stein oder anderem Schlagwerkzeug, bis das Bild klar genug eingraviert ist. S. Patkanov, Die Irtysh-Gebirge und ihre Volkskunst. I. Teil, Pet. 1897, S. 43, weist auf die Ähnlichkeit ostjakischer Ornamente mit denen anderer ostasiatischer Stämme, wie Mandschiner, Syrjener, Finnen, Liu und auch mit denen der Tataren, deren Einfluß auf die Entwicklung dieser Kunst bei den Ostjaken wohl nicht zu verkennen sei. Die schönsten dieser Muster, fährt er fort, tragen einen mittelasiatischen Charakter, der vielleicht durch die Vermittlung der Sarten und Tataren zu ihnen gekommen ist. Eine Betrachtung der Tafel II im zweiten Bande des Patkanovschen Werkes (Pet. 1900) führt diesen Einfluß deutlich vor Augen, und ich bin geneigt, türkische Einflüsse auch auf die Muster in der Sammlung von Sirelius anzunehmen.

Köln.

Dr. B. Laufer.

3. Dr. v. Hansemann: Das menschliche Skelett. Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmediziner zum Gebrauch bei Ausgrabungen. Berlin, August 1898. 128 S.

Das Buch hat Text und sechs Tafeln umfassende Buchlein entspricht seinem wirklichen Bedürfnis. Mit Recht wird seit langem darüber geklagt, daß ganz abgesehen von dem Raubbau der Laien auf archaischen Gebieten auch selbst der Fachleute der Erhaltung der Skelette und sonstigen Reste ein hinreichendes Verständnis nicht entgegengebracht wird. Diese Klagen sind indessen nur zum Teil berechtigt. Allerdings ist das Vorurteil noch nicht überwunden, daß die archaische Forschung lediglich chronologische oder technologische Aufgaben zu lösen hat; es leuchtet sich aber in immer weiteren Kreisen die Überzeugung Bahn, daß es mit der einseitigen Darstellung der materiellen Ergebnisse nicht getan ist, sondern daß ein Bild der Kultur aus den in Gräbern erhaltenen Resten nur aufgebaut werden kann, wenn man auch den Menschen selbst berücksichtigt, etwaige Funde an Haarknochen ausnimmt, kurz den biologischen Teile der vorgeschichtlichen Kultur zu seinem Rechte verhilft. Auch wo dieser höhere Gesichtspunkt anerkannt wird, fehlt vielfach der erforderliche Kenntnis des Menschen- und Tierskelets, um mit Erfolg Material für die Fragen zu sammeln, welche sich an das Volk selbst knüpfen.

Diesem Bedürfnis kommt das vorliegende Heftchen entgegen, in welchem alle Wünsche klar dargestellt ist, so daß jeder Laie sich daraus vergewissern kann, ob er das Skelett eines Kindes oder eines Erwachsenen vor sich hat, die Nachbestattung eines unvollständigen Leichens ausfinden kann. Mit Hilfe der Tafeln ist es leicht, das einmal aufgefundenen Skelett nicht nur in einzelnen Teilen, sondern vollständig zu bergen.

In der Einleitung behandelt der Verfasser die Gründe für die Verschiebung und Deformierung der Knochen im Grabe, erwähnt die Möglichkeit von Verschleppung einzelner Knochenstücke durch Wasser oder Tiere und gibt endlich eine dankenswerte Anweisung für die dauernde Erhaltung der eingesammelten Knochen. Es wäre indessen erwünscht, daß bei einer

Neuaufgabe des händlichen und nach jeder Richtung hin empfehlenswerten Heftchen auch die Technik der Einsammlung — nicht nur die der Konservierung — der Knochen behandelt würde. Gerade bei der Aufdeckung der Skelette werden die meisten Fehler begangen, die nicht wieder gut zu machen sind. Das in feuchter Erde lagerte Skelett ist nur ausnahmsweise so widerstandsfähig, daß man die Knochen sofort silberns klöffeln und herausnehmen kann. Der Regel muß ist ein vorsichtiges Abtragen des Erdeschuttes, so daß ganz allmählich die Knochen an der Luft trocknen und endlich einschneiden und herausheben werden können. Auch die Behandlung der Gelenkenden, die ja besonders wichtig sind, erfordert ganz bestimmte Vorichtsmaßregeln. Gleiches gilt von dem Verpacken und dem Transport des Skelettes bis zu dem Museum oder Aufbewahrungsranne, wo die endgültige Konservierung erfolgt.

G. Th.

4. H. Behlen: Der Pflug und das Fügeln bei den Römern und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit. Eine vergleichende agrargeschichtliche, kulturgeschichtliche und archäologische Studie, zugleich als Beitrag zur Ethnologischen Geschichte des Pfluges. 8. mit 8 Abbildungen. Verlag von C. Seel's Nachfolger in Bielefeld. 6 Mark.

Das interessant geschriebene und hübsch ausgestattete Werk bringt für die gesamte Volkskunde und Kulturgeichte Deutschlands wichtige Mitteilungen, auf eigene Studien und eingehende Literaturbenutzung gestützt. Interessant ist der Vergleich der Angaben der römischen Agrarschriftsteller mit den Fundergebnissen der modernen Forschung bezüglich des Ackerbaus und der Ackergeräte, woraus der Verfasser schließt, daß sich der römische Pflug und das römische Fügeln in nichts Wesentlichem von dem heutigen Pfluge und dessen Benutzung unterscheiden habe. Die „Höckerker“ erfahren eine eingehende Würdigung, hauptsächlich auf Grund der bekannten Forschungen in Bayern von H. v. Ranke; auch die „Terrassierungen“ in den heutigen Wäldern werden nach Müller für Württemberg und Welter für die Vogesen u. a. mit dem alten Ackerbau in Beziehung gesetzt; ihr Alter wird als La-Tene-Zeich und römisch angesetzt und eine enge Beziehung der Befestigungen und Wallburgen ans La-Tene- und Römerzeit zu den gleichzeitigen Ackerkulturen konstatiert. Um den Beginn der christlichen Zeitrechnung finden wir nach Behlen Deutschland reicher an einer ländlichen ackerbauenden Bevölkerung als jemals später und den Boden deutsprechend weit mehr angebaut und von Wald entblößt als selbst heute; die Vorstellung von den germanischen Urvätern dübert erst auf die tiefen Verfall der Eisenkultur bringende Völkerwanderungsperiode, seit dieser Zeit datieren im wesentlichen unsere heutigen Wälder. Die Blicke auf die älteren prähistorischen Epochen, die Hallstatt- und Bronzeperiode, sind kurzweilig, jedoch anregend und nach mancher Richtung hin auch für den Fachmann belehrend; zum Teil lehnt sich die Darstellung an Dr. A. Gatzke, aber die wertvolle Benutzung der prähistorischen Denkmäler, der Pfluge- und Fügeln-Darstellungen, der Feltnuschungen, der Bronze- und Tongefäße und der prähistorischen und römischen Ackergeräte selbst. Im „Nachtrag“ wendet sich der Verfasser gegen die zum Teil von den seinen weit abweichenden Ergebnisse seiner Vorgänger auf diesen Forschungsgebiete. Wir hatten diese Polemik etwas weniger ströbar gewünscht und mehr die tatsächlich doch bestehenden Übereinstimmungen als die Differenzen hervorgehoben.

J. R.

## REGISTER DES ZWEITEN BANDES (NEUE FOLGE).

(Abhandlungen, Kleinere Mitteilungen u. Referate. — Verzeichnis d. anthropolog. Literatur.)

|   | Seite |   | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Alnentafel der Lagiden . . . . .  | 52    | Bastrock der Marshall-Insulaner . . . . .   | 7     |
| Assosen, Ein Beitrag zur Anthropologie der —<br>Von A. A. Arutinow. Ref. . . . .  | 523   | Bedeutung, Die — Velem St. Velts als prähisto-<br>rische Gußstatte mit Berücksichtigung der<br>Autunen-Bronzefrage. Von Kalmán Freiherr<br>v. Miske . . . . . | 154   |
| Altertümer im Gebiete von Semipalatinsk. Kurze<br>Beschreibung von —. Von W. P. Nikitin. Ref. . . . .                           | 150   | Beiträge zur anthropologischen Untersuchung des<br>harten Gaumens. Von Dr. med. Moritz Bauer . . . . .  | 159   |
| — von Waldai und von Wod. Ein Beitrag zur<br>Kenntnis der —. Von N. Röhrlich. Ref. . . . .                                      | 147   | Bemerkungen über die Gattung Gorilla. Von<br>P. Matschie. Ref. . . . .  | 205   |
| Anthropologia svecica. Von G. Retzius. Ref. . . . .   | 53    | Berolice I, Typus der — . . . . .   | 85    |
| Anthropologie des russischen Volkes. Materialien<br>zur —. Von A. N. Krassnow. Ref. . . . .                                     | 216   | Berolice II, Typus der — . . . . .  | 103   |
| — Transbaikaliens und der Mongolei. Ein Bei-<br>trag zur —. Von J. Talko-Hryuzowicz. . . . .                                    | 215   | Bestattung, Ununterbrochene — Velem St. Velts.<br>Von Kalmán Freiherr v. Miske . . . . .  | 29    |
| Anthropologische Charakteristik des altaiischen<br>Volkestammes der Teleuguten. Von E. J. Lu-<br>zenko. Ref. . . . .            | 209   | Bestattungen im Schlitzen. Von A. B. Graf Bo-<br>brinskij. Ref. . . . .   | 157   |
| Antike Gefäße mit dem Stempel KIPBEL. Von<br>W. Latyschew. Ref. . . . .   | 157   | Beziehungen zwischen Maßen des harten Gaumens<br>und solchen des ganzen Gesichtes . . . . .   | 170   |
| Autunen-Bronze in Ungarn . . . . .  | 153   | Bronzenadel aus Velem St. Veit . . . . .  | 157   |
| — Erze in der Nähe von Velem St. Veit . . . . .   | 155   | Bronzener Beschlag eines Dolchgriffes aus dem<br>Terek-Gebiete. Von A. A. Spizyn. Ref. . . . .  | 156   |
| Apparat, Neuer — zum Messen des harten Gaumens<br>A Remetsch az Angyal. Von Ludwig Kotonai.<br>Ref. . . . .                     | 162   | Bronzezeit und Hallstattzeit im Schloßberg bei Burg<br>Burg, Der Schloßberg bei — im Spreewald, Kreis<br>Kottbus. Von A. Voos. . . . .                        | 230   |
| Arsinac II, Typus der — . . . . .   | 87    | Chinesische Soldaten, Körpermessungen an —. Von<br>Y. Koganei. Ref. . . . .   | 143   |
| Arsinac III, Typus der — . . . . .  | 104   | Crania svecica antiqua. Von G. Retzius. Ref. . . . .  | 51    |
| Art-fakte von Velem St. Veit . . . . .  | 29    | Datierung, Die — von Stonehenge. Von O. Mon-<br>telius. . . . .   | 139   |
| Astronomisches Argument für die Zeit der Errich-<br>tung von Stonehenge . . . . .   | 140   | Denkmäler der alten Kultur. In Rußland gefun-<br>dene —. Von C. B. Pharmakowski. Ref. . . . .   | 154   |
| A Virginia-Codex Firenze-Legendai. Von Kotonai.<br>Ref. . . . .   | 62    | Edelhirsebröste im Schloßberg bei Burg . . . . .  | 229   |
| Aulotes, Ahnentafel des — . . . . .   | 85    | Elchreste im Schloßberg bei Burg . . . . .  | 284   |
| Ausgrabungen im Jahre 1897 in der Nähe des<br>Dorfes Bassehmaschka, Bericht über —. Von<br>A. A. Spizyn. Ref. . . . .           | 148   | Entartung, Erbliche — bedingt durch soziale Ein-<br>flüsse. Von M. Alsherg. Ref. . . . .  | 142   |
| — im Kreise Tselcherkassi und Tschigirlin während<br>des Jahres 1901. Bericht über die —. Von<br>A. A. Hobrinskij. Ref. . . . . | 154   | Eolithische Steinindustrie . . . . .  | 48    |
| — im Kubangebiete. Von M. D. Tschuiko. Ref. . . . .   | 157   | Erbliche Entartung bedingt durch soziale Einflüsse.<br>Von M. Alsherg. Ref. . . . .   | 142   |
| — im taurischen Chersonnes. Von Koseinszko-<br>Waluzynicz. Ref. . . . .   | 146   | Ethnographische Bestandteile Turkestan . . . . .  | 195   |
| — im taurischen Chersonnes während des Jahres<br>1900. Von Koseinszko-Waluzynicz. Ref. . . . .                                  | 142   | — Wandlungen in Turkestan. Von Dr. R. Karutz . . . . .  | 184   |
| Australische Busch, Im — und an den Küsten des<br>Koralenmeeres. Von Richard Semou. Ref. . . . .                                | 353   | Ethnographisches aus Südwest-Frankreich. Von<br>L. Laloy . . . . .  | 185   |
| Baskenland, Das —. Von L. Laloy . . . . .   | 185   | Fächer der Marshall-Insulaner . . . . .   | 11    |
| Baskische Dörfer und Wohnungen . . . . .  | 186   | Fechners Kollektivmaßlehre . . . . .  | 300   |
| — Sprache und Mundarten . . . . .   | 185   |   |       |



|   | Seite |   | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Palatmaxilläre Länge und Breite Turners . . .   | 169   | Spiegel, sogenannte magische — und ihr Gebrauch. Von Prof. Dr. E. Balt in Tokio . . . . .                                       | 42    |
| Pearsons Häufigkeitsgesetz . . . . .  | 131   | Spiele der Basken . . . . .   | 192   |
| Peißspitzen aus Velem St. Veit . . . . .  | 313   | Spina-Basislänge als bestes Maß der Gaumenlänge . . . . .   | 165   |
| Pferdereste (Equus caballus) im Schloßberg bei Burg Pfalz, Der — und das Pflegen bei den Römern und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit. Von H. Behlen. Ref. . . . . | 374   | Stammlaum der Lagiden . . . . .   | 78    |
| Philonastie und Physikon, Abnetafel von — . . .   | 84    | Stonchiengr. Die Datierung von —. Von O. Montelius . . . . .  | 139   |
| Polymastie und Polythelie. Von W. Rosanow. Ref. . . . .   | 215   | Skizzenbl. (örögysz) kongreeseke. Von Lajos Katus. Ref. . . . .   | 62    |
| Prähistorische Hauttiere der Germanen in ihrem Verhältnis zu denen anderer Länder . . . . .   | 260   | Tänze der Basken . . . . .  | 193   |
| Primitive Pferdereste im Schloßberg bei Burg . . .  | 278   | Tasch-Rabat. Von N. N. Pantussow. Ref. . . . .  | 154   |
| Poloniäer, Die —. Ein Beitrag zur historischen Anthropologie. Von weiland Freiherr Karl v. Ujfalvy . . . . .  | 73    | Tatauierung der Frauen auf den Marshall-Inseln —, Ornamentik der — auf den Marshall-Inseln . . . . .                            | 14    |
| Protonius I Soter, Typus des — . . . . .  | 89    | Tatauierungs-Instrumente der Marshall-Insulaner — Muster der Marshall-Insulaner . . . . .                                       | 17    |
| Protonius II, Philadelphus, Typus des — . . . . .   | 95    | Taurische Chersones, Ausgrabungen im —. Von K. Waluzyniez. Ref. . . . .   | 146   |
| Protonius III, Euergetes I, Typus des — . . . . .   | 89    | Temperatur. Über das —. Von N. L. Seeland. Ref. . . . .   | 213   |
| Protonius IV, Philopator, Typus des — . . . . .   | 102   | Tierwelt, Die — der Ansiedlungen am Schloßberg zu Burg an der Spree. Von J. U. Duerst . . . . .                                 | 223   |
| Protonius V, Epiphanes, Abnetafel des — . . . . .   | 84    | Tiesenhausen, Baron Woldemar. Nekrolog. Ref. . . . .  | 151   |
| Protonius VI, Philometor, Typus des — . . . . .   | 104   | Torus palatinus . . . . .   | 120   |
| Protonius VIII, Physikon, Typus des — . . . . .   | 107   | Trundholm, Das Sonnenbild von —. Von Hans Seger . . . . .   | 64    |
| Protonius X, Lathyros, Typus des — . . . . .  | 110   | Türkstan, Ethnographische Wandlungen in —. Von Dr. R. Karziz . . . . .  | 184   |
| Protonius XI, Alexander I, Typus des — . . . . .  | 111   | Turkmenen in Türkstan . . . . .   | 155   |
| Protonius XIII, Auletes, Typus des — . . . . .  | 112   | Typus, Psycho-physischer — der Lagiden . . . . .  | 82    |
| Protonius Apon, Typus des — . . . . .   | 112   | Überdeckung der medialen oder lateralen Gefäß-furchen am harten Gaumen . . . . .  | 127   |
| Protonius Keranos, Typus des — . . . . .  | 99    | Ujfalvy F. Karl Eugen Freiherr v. . . . .   | 1     |
| Prunzen aus Velem St. Veit . . . . .  | 131   | Urochaurvete (Bea primigenius) im Schloßberg bei Burg . . . . .   | 245   |
| Raszwetow, A. P. Nekrolog. Ref. . . . .   | 215   | Variationen der Spina nasalis posterior . . . . .   | 178   |
| Rechtsverhältnisse von eingeborenen Völkern in Afrika und Ozeanien. Von Dr. J. R. Steinmetz. Ref. . . . .   | 61    | Velem St. Veit, Besiedelung von — . . . . .   | 29    |
| Rehrste im Schloßberg bei Burg . . . . .  | 281   | Velem St. Veits Bedeutung als prähistorische Gub-stätte . . . . .   | 125   |
| Reimen, Die — eines alten Tempels beim Flusse Angula. Von J. Windimirov. Ref. . . . .   | 149   | Vorslawische Anlage des Schloßbergs bei Burg . . . . .  | 241   |
| Russisches anthropologisches Journal. III. Jahrgang 1902. Ref. . . . .  | 289   | Waffen, die im Jahre 1901 im Kulangebiet gefunden worden sind. Beschreibung einiger —. Von E. Lenz. Ref. . . . .                | 156   |
| Schutz goldener Statären, Der in Anadol gefunden —. Von E. M. Priddy. Ref. . . . .  | 153   | — und Pferdeschirr, gefunden in der Nähe des Dorfes Demjanowka. Von E. Lenz. Ref. . . . .                                       | 149   |
| Schwammesen, Einige Bemerkungen über die —. Von P. Mitschke. Ref. . . . .   | 205   | Weißrassen, Ein Beitrag zur Anthropologie dar — im Kreise Sluzk des Minsker Gouvernements. Von A. Roschdestwenski. Ref. . . . . | 211   |
| Schlafstätten auf den Marshall-Inseln . . . . .   | 6     | Wildschweinste im Schloßberg bei Burg . . . . .   | 237   |
| Schloßberg, Der — bei Burg, im Spreewald, Kreis Cottbus. Von A. Voss . . . . .  | 239   | Wogulen-Ornamente. Ref. . . . .   | 353   |
| Schwein (sus serafa) im Schloßberg bei Burg . . .   | 236   |   |       |
| Sveinud, N. L. Nekrolog. Ref. . . . .   | 224   |   |       |
| Skelett, Das menschliche —. Von Dr. v. Hansemann. Ref. . . . .  | 354   |   |       |
| Sonnenbild, Das —, von Trundholm. Von Hans Seger . . . . .  | 64    |   |       |



The Ohio State University



3 2435 06391194 5

THE OHIO STATE UNIVERSITY BOOK DEPOSITORY



| D | AISLE | SECT | SHLF | SIDE | POS | ITEM | C |
|---|-------|------|------|------|-----|------|---|
| 8 | 04    | 16   | 15   | 8    | 04  | 004  | 9 |

| D | AISLE | SECT | SHLF | SIDE | POS | ITEM | C |
|---|-------|------|------|------|-----|------|---|
| 8 | 04    | 16   | 15   | 8    | 04  | 004  | 9 |